

# 引 言

本书是学习和使用高等代数和线性代数的辅导参考书,内容系统深入.本书适用于各类高校学生学习和复习时参考;并适合各类考试(例如研究生考试)前的复习以及应用代数的科学技术人员学习参考.

内容顺序按《高等代数学》(张贤科,许甫华编著.清华大学出版社,1998年),包括:系统的线性代数学,数与多项式理论,近世代数介绍,酉空间和内积空间,变换族(群),张量积和外积等,共11章.每章首先介绍概念和定理,然后是解题方法思路分析(绝大部分章均有),接下来逐一详细分析解答《高等代数学》一书收入的大量习题,最后是此次补充的习题和解答.本书对大量各类问题,包括一些难题,作了深入分析,给出详尽解答,并总结了解题方法.许多解题方法简洁巧妙,切入理论本质的理解,是作者多年教学的积累,期望能引导启发读者掌握解决问题的思路和方法,帮助读者克服在高等代数的学习、复习、迎考和应用中遇到的困难,培养学习代数的兴趣,增进对代数理论的深入理解.

第一作者有长期教授“非数学系线性代数”课程的经验(也有数学系高等代数教学经验),包括理论课和习题课(在中国科技大学和清华大学),有许多教学心得和解题方法技巧方面的总结,大多融入了本书.第二作者有长期从事数学系高等代数和其他代数、数论课程的教学及科研经验,使得本书收入了一些综合性强的习题.此次特别在第10、11章的补充题中,较系统介绍了线性空间的“变换族”(变换群)、空间的特征分解、对称平方等群表示论的基础问题,这是许多数学和应用领域常常需要的.

《高等代数学》一书有一些特点,也影响到本书,现将该书前言简述如下:内容较深厚,基础训练得到加强;包含了一些进一步的内容,采用了较新的理论观点.一方面,坐标和矩阵方法使用较多,因为有简洁直接性,可算性,也有助于对抽象概念的理解领悟;另一方面,映射和变换等概念和方法论述也很充分,这是进一步学习和阅读现代文献的基础.为了适应理论和应用两方面的新需求,采用了较新的理论角度,也写进了一些书中不常有的内容,一些地方试探了新的、可能更自然的发展脉路和证法.《高等代数学》一书适于高等学校作高等代数或者线性代数的教材.可以讲授两学期,每周四学时.也可以只讲授一学期,每周四或三学时,只讲第2—6章及若干介绍(若当形、二次型和欧氏空间,即7.7~7.9,8.1~8.4,9.1~9.3).带星号的内容一般不作要求.

《高等代数学》一书出版以来,收到全国各地一些读者来信,反映此书对他们学习帮助很大,其中也有自学、考研研究生的同学询问书上习题的解答.这也促使我们下决心编写目前这样一本解题方法方面的书.

本书中分析讨论的问题,数量很大,有各种层次.一方面有许多基础性问题,从多个角度帮助理解理论和概念,锤炼基本方法.另一方面,也有许多层次较高的问题,有助于进一步的学习和应用.不少问题的解答有独特思路和方法,有的是吸收了较新的成果,有些则

是作者的心得积累. 创新能力和创新意识的提高, 人人向往, 它需要我们主动地、深入地学习和理解现代理论, 在实践中不断培养分析和解决问题的能力. 我们希望本书在这面对读者能有所帮助, 帮您实现跨越.

不足之处, 请批评指正.

作 者

2000 年初夏于清华园

# 目 录

引言 .....	I
第 1 章 数与多项式 .....	1
1.1 定义与定理 .....	1
1.2 解题方法介绍 .....	4
1.3 习题与解答 .....	5
1.4 补充题与解答 .....	34
第 2 章 行列式 .....	36
2.1 定义与定理 .....	36
2.2 解题方法介绍 .....	39
2.3 习题与解答 .....	41
2.4 补充题与解答 .....	60
第 3 章 线性方程组 .....	64
3.1 定义与定理 .....	64
3.2 解题方法介绍 .....	69
3.3 习题与解答 .....	72
3.4 补充题与解答 .....	92
第 4 章 矩阵的运算与相抵 .....	94
4.1 定义与定理 .....	94
4.2 解题方法介绍 .....	98
4.3 习题与解答 .....	99
4.4 补充题与解答 .....	116
第 5 章 线性(向量)空间 .....	124
5.1 定义与定理 .....	124
5.2 解题方法介绍 .....	128
5.3 习题与解答 .....	129
5.4 补充题与解答 .....	149
第 6 章 线性变换 .....	153
6.1 定义与定理 .....	153
6.2 解题方法介绍 .....	157
6.3 习题与解答 .....	157

6.4	补充题与解答 .....	192
<b>第 7 章</b>	<b>方阵相似标准形与空间分解 .....</b>	<b>196</b>
7.1	定义与定理 .....	196
7.2	解题方法介绍 .....	206
7.3	习题与解答 .....	209
7.4	补充题与解答 .....	272
<b>第 8 章</b>	<b>双线性型、二次型与方阵相合 .....</b>	<b>275</b>
8.1	定义与定理 .....	275
8.2	解题方法介绍 .....	280
8.3	习题与解答 .....	280
8.4	补充题与解答 .....	312
<b>第 9 章</b>	<b>欧几里得空间 .....</b>	<b>314</b>
9.1	定义与定理 .....	314
9.2	解题方法介绍 .....	319
9.3	习题与解答 .....	321
9.4	补充题与解答 .....	355
<b>第 10 章</b>	<b>酉空间 .....</b>	<b>360</b>
10.1	定义与定理 .....	360
10.2	解题方法介绍 .....	366
10.3	习题与解答 .....	367
10.4	补充题与解答 .....	387
<b>第 11 章</b>	<b>张量积与外积 .....</b>	<b>397</b>
11.1	定义与定理 .....	397
11.2	习题与解答 .....	401
11.3	补充题与解答 .....	413
<b>符号说明</b> .....		<b>417</b>



## 数与多项式

## 1.1 定义与定理

**定义 1.1** 设  $G$  是一个非空集合, 在  $G$  中定义了一个二元运算  $*$  (即对  $G$  中任意  $a, b$  在  $G$  中有唯一元素 (记为  $a * b$ ) 与之对应), 且满足如下规律:

- (1) 封闭性 对任意  $a, b \in G$ , 总有  $a * b \in G$ ;
- (2) 结合律  $a * (b * c) = (a * b) * c$  (对任意  $a, b, c \in G$ );
- (3) 恒元 存在  $e \in G$ , 使  $e * a = a$  对所有  $a \in G$  成立;
- (4) 逆元 对任意  $a \in G$ , 总存在  $b \in G$ , 使  $b * a = e$ .

则称  $(G, *)$  为群, (4) 中的  $b$  称为  $a$  的逆元, 记为  $a^{-1}$ , (3) 中恒元也称为单位元.

如果还有对任意  $a, b \in G, a * b = b * a$ , 则称  $(G, *)$  为 Abel 群或交换群. Abel 群的运算常记为加法 (+), 恒元常记为 0 称为零元,  $a$  的逆元常记为  $-a$  称为  $a$  的负元.

**定义 1.2** 设  $R$  是一个集合, 在  $R$  上定义了两个二元运算, 分别记为加法 (+) 和乘法 (\*), 且满足:

- (1)  $(R, +)$  是 Abel 群;
- (2)  $(R, *)$  是半群, 即满足封闭性和结合律;
- (3) 分配律  $a * (b + c) = a * b + a * c, (a + b) * c = a * c + b * c$ , 对任意  $a, b, c \in R$  成立. 则称  $(R, +, *)$  为环. 如果环  $R$  对乘法有恒元  $e$ , 则称  $R$  为含么环. 若乘法满足交换律, 则称  $R$  为交换环. 在含么环  $R$  中, 对  $c \in R$ , 若  $\exists x \in R$  使得  $xc = cx = e$ , 则称  $x$  为  $c$  的逆元, 称  $c$  为可逆元.

**定义 1.3** 设  $F$  是有两个二元运算 (+) 和  $(\cdot)$  的集合, 且满足:

- (1)  $(F, +)$  是 Abel 群;
- (2)  $(F^*, \cdot)$  是 Abel 群,  $F^*$  指  $F$  的非 0 元全体;
- (3) 分配律;

则称  $(F, +, \cdot)$  为域.

**定义 1.4** 若域  $F$  的子集合  $K$  对于  $F$  中的原运算仍是一个域, 则称  $K$  是  $F$  的子域,  $F$  是  $K$  的扩域, 类似有子群, 子环的定义.

**定义 1.5** 若整数  $a$  与  $b$  除以  $m$  的余数相同, 则称  $a$  与  $b$  对模  $m$  同余, 记为  $a \equiv b \pmod{m}$ .

弃九法: 记正整数  $a$  的十进位表示的各位数字之和除以 9 的余数为  $\bar{a}$ , 则“弃九法”断言, 若  $a \times b = c$ , 则  $\bar{a} \times \bar{b} = \bar{c}$ ; 若  $a + b = c$ , 则  $\bar{a} + \bar{b} = \bar{c}$ .

**定理 1.1** 整数对模  $m$  的  $m$  个同余类构成的集合记为

$$\mathbf{Z}/m\mathbf{Z} = \{l + m\mathbf{Z} \mid l = 0, 1, \dots, m-1\} = \{\bar{0}, \bar{1}, \dots, \overline{m-1}\},$$

它对如下定义加法和乘法是一个交换环:

$$\bar{l}_1 + \bar{l}_2 = \overline{l_1 + l_2}, \quad \bar{l}_1 \cdot \bar{l}_2 = \overline{l_1 l_2}.$$

**定理 1.2** (1) 当  $m=p$  为素数时,  $\mathbf{Z}/p\mathbf{Z}=\mathbf{F}_p$  是域.

(2) 当  $m$  不是素数时,  $\mathbf{Z}/m\mathbf{Z}$  不是域. 此时  $\bar{l}$  可逆, 当且仅当  $l$  与  $m$  互素.

**定义 1.6**  $\mathbf{F}_p=\mathbf{Z}/p\mathbf{Z}=\{\bar{0}, \bar{1}, \dots, \overline{p-1}\}$ , 称为  $p$  元(有限)域(其中  $p$  为素数, 这样的域称为特征是  $p$  的域).

**定理 1.3** (Fermat)  $\mathbf{F}_p$  的元素  $x$  均满足

$$x^p = x.$$

**定理 1.4** 域  $F$  上  $X$  的多项式形式全体  $F[X]$  按如下运算成为交换环(称为多项式形式环)

$$\begin{aligned} \sum_{i=0}^{\infty} a_i x^i + \sum_{i=0}^{\infty} b_i x^i &= \sum_{i=0}^{\infty} (a_i + b_i) x^i, \\ \left( \sum_{i=0}^{\infty} a_i x^i \right) \left( \sum_{i=0}^{\infty} b_i x^i \right) &= \sum_{i=0}^{\infty} \left( \sum_{i+j=k} a_i b_j \right) x^k. \end{aligned}$$

其中  $a_i, b_i$  只有有限个非零.

**系** 多项式形式环  $F[X]$  中消去律成立, 即若  $fg=fh$ , 且  $f \neq 0$ , 则  $g=h$  (对任意  $f, g, h \in F[X]$ ).

**定义 1.7** 有消去律的含么交换环称为整环.

**定理 1.5** (带余除法) 对域  $F$  上任两多项式形式  $f, g \in F[X]$ , 若  $g \neq 0$ , 则总存在多项式形式  $q, r \in F[X]$  使

$$f = gq + r, \quad \deg r < \deg g \text{ 或 } r = 0,$$

且  $q$  和  $r$  由  $f, g$  唯一地决定.

**定义 1.8** 有带余除法的环称为 Euclid 环.

**定理 1.6** 记  $f$  与  $g$  的首一最大公因子为  $(f, g)$ , 若  $f = gq + r$ , 则  $(f, g) = (r, g)$ . (其中  $f, g, q, r \in F[X]$ ).

**定理 1.7** 域  $F$  上任两不全为 0 的多项式形式  $f, g \in F[X]$  的最大公因子  $d$  存在且唯一(不计常数倍); 且存在  $u, v \in F[X]$  使

$$uf + vg = d. \quad (\text{Bezout 等式})$$

**系 1**  $f$  与  $g (\in F[X])$  互素当且仅当存在  $u, v \in F[X]$  使得

$$uf + vg = 1.$$

**系 2** 若  $h \mid fg$ ,  $(h, g) = 1$ , 则  $h \mid f$ .

**系 3** 若  $(f, g) = 1, (f, h) = 1$ , 则  $(f, gh) = 1$ .

**系 4** 若  $f \mid h, g \mid h, (f, g) = 1$ , 则  $fg \mid h$ .

**系 5** 设  $f_1, \dots, f_n \in F[X]$ , 则其首一最大公因子  $(f_1, \dots, f_n)$  存在且唯一, 且存在  $u_1, \dots, u_n \in F[X]$  使得

$$u_1 f_1 + \dots + u_n f_n = (f_1, \dots, f_n) \quad (\text{Bezout 等式}).$$

**定义 1.9** 若域  $F$  上的非常数多项式形式  $f \in F[X]$  可表为

$$f = gh \quad (g, h \in F[X] \text{ 均非常数}),$$

则称  $f$  在  $F$  上是可约的; 否则称  $f$  是不可约的.

**定理 1.8** 域  $F$  上的多项式形式环  $F[X]$  是唯一析因整环. 即对任一非常数多项式  $f \in F[X]$  均有

$$f = p_1 p_2 \cdots p_s,$$

其中  $p_1, \dots, p_s$  是不可约多项式, 且不计常数倍及  $p_i$  的次序, 此分解是唯一的.

**定理 1.9** (算术基本定理) 整数环  $\mathbb{Z}$  是唯一析因环. 即任一整数  $n(0, \pm 1 \text{ 除外})$  均可表为素数的乘积  $n = p_1 \cdots p_s$ , 若不计正负号和素数的次序, 则此表示是唯一的.

**定理 1.10** 设  $f(X) \in F[X], c \in F$ , 则有

(1) (余数定理)  $f(X)$  除以  $X - c$  的余式为  $f(c)$ .

(2) (零点—因子定理)  $X - c$  整除  $f(X)$  的充分必要条件为  $f(c) = 0$ .

**定理 1.11** 域  $F$  上的  $n(\geq 0)$  次多项式  $f(X) \in F[X]$  在  $F$  中最多有  $n$  个根 (重根按重数计入).

**定理 1.12** 若次数小于  $n$  的两个多项式形式  $f(X), g(X) \in F[X]$ , 在  $n$  个不同点  $c_1, \dots, c_n \in F$  的值均相同, 即

$$f(c_i) = g(c_i) \quad (1 \leq i \leq n),$$

则  $f(X) = g(X)$ .

**定理 1.13** 设  $f(X) \in F[X], c \in F$ .

(1)  $c$  为  $f(X)$  的重根  $\Leftrightarrow f(c) = f'(c) = 0$ ,

$\Leftrightarrow c$  为  $(f(X), f'(X))$  的根;

(2) 若  $(f, f') = 1$ , 则  $f(X)$  无重根 (在  $F$  或其任意扩域中);

(3) 若  $f(X)$  在  $F$  上不可约且  $f'(X) \neq 0$ , 则  $f(X)$  无重根 (在  $F$  或其任意扩域中), 特别, 数域上不可约多项式在  $\mathbb{C}$  中无重根.

**定理 1.14** 设  $f(X), p(X) \in F[X], p(X)$  不可约.

(1)  $p(X)$  为  $f(X)$  的重因子  $\Leftrightarrow p(X)$  为  $f(X)$  与  $f'(X)$  的公因子.

(2)  $(f, f') = 1 \Leftrightarrow f(X)$  无重因子.

**古典代数学基本定理** 任一非常数复系数多项式在复数域中总有一根.

**定理 1.15**  $n$  次复系数多项式 ( $n \geq 1$ )  $f(X)$  在复数域  $\mathbb{C}$  中恰有  $n$  个根, 且总可以唯一分解为一次因子的乘积

$$f(X) = c(X - z_1)^{n_1}(X - z_2)^{n_2} \cdots (X - z_s)^{n_s}, \quad (c, z_i \in \mathbb{C})$$

**定理 1.16** 实系数多项式 (次数  $\geq 1$ )  $f(X)$  在实数域上总可以唯一分解为一次和二次不可约因子之积

$$f(X) = a(X - a_1)^{n_1} \cdots (X - a_s)^{n_s} (X^2 - b_1X + c_1)^{r_1} \cdots (X^2 - b_tX + c_t)^{r_t}.$$

**定义 1.10** 若  $f(X) \in \mathbb{Q}[X]$  且其系数为互素的整数, 则称  $f(X)$  为本原多项式.

**定理 1.17** 设  $f(X) \in \mathbb{Z}[X]$ , 则  $f(X)$  可分解为  $\mathbb{Q}[X]$  中  $r, s (\neq 0)$  次多项式的乘积当且仅当  $f(X)$  可分解为  $\mathbb{Z}[X]$  中  $r, s$  次多项式之积.

**定理 1.18**  $\mathbb{Z}[X]$  是唯一析因整环, 即任一  $f(X) \in \mathbb{Z}[X]$  可唯一表为若干素数和不可约的本原多项式之积.

**定理 1.19** 若整系数多项式  $f(X) = a_n X^n + \cdots + a_1 X + a_0 \in \mathbb{Z}[X]$  有有理根  $\frac{b}{a} \in \mathbb{Q}$ ,  $(a, b) = 1$ , 则  $a | a_n, b | a_0$ .

**定理 1.20** (Eisenstein 判别法) 设

$$f(X) = a_n X^n + \cdots + a_1 X + a_0 \in \mathbb{Z}[X],$$

若有素数  $p$  使  $p \nmid a_n, p | a_i (i=0, \cdots, n-1), p^2 \nmid a_0$ , 则  $f(X)$  在  $\mathbb{Q}[X]$  中不可约.

**定理 1.21** 设  $f(X) \in \mathbb{Z}[X]$  为首一多项式且  $f(X)$  在  $\mathbb{F}_p[X]$  中不可约, 则  $f(X)$  在  $\mathbb{Z}[X]$  中不可约.

**定理 1.22** 对称多项式总可唯一地表为初等对称多项式的多项式. 即对任意  $n$  元对称多项式  $f(X_1, \cdots, X_n)$  总存在唯一的  $n$  元多项式  $\varphi(Y_1, \cdots, Y_n)$  使得  $f(X_1, \cdots, X_n) = \varphi(\sigma_1, \cdots, \sigma_n)$ .

## 1.2 解题方法介绍

### 1.2.1 表对称多项式 $f(X_1, \cdots, X_n)$ 为初等对称多项式的多项式 $\varphi(\sigma_1, \cdots, \sigma_n)$ 的方法

(1) 表  $f$  为齐次对称多项式之和:  $f = f_n + f_{n-1} + \cdots + f_0$ , 先对每个  $m$  次齐次多项式  $f_m$  按下述步骤表出, 再合而得  $f$  的表示.

(2) 设  $f_m$  首项为  $aX_1^{i_1} X_2^{i_2} \cdots X_n^{i_n}$ , 写出满足以下三条件的所有可能数组  $(l_1, l_2, \cdots, l_n)$ :

$$\textcircled{1} (i_1, i_2, \cdots, i_n) \geq (l_1, l_2, \cdots, l_n),$$

$$\textcircled{2} l_1 \geq l_2 \geq \cdots \geq l_n,$$

$$\textcircled{3} l_1 + l_2 + \cdots + l_n = m.$$

(3) 令  $f_m(X_1, \cdots, X_n) = \sum_{(i_1, \cdots, i_n)} A(l_1, \cdots, l_n) \sigma_1^{l_1} \sigma_2^{l_2} \cdots \sigma_n^{l_n}$ , 其中  $(l_1, \cdots, l_n)$  是满足

(2) 中三个条件的数组,  $A_{(l_1, \cdots, l_n)}$  为待定系数.

(4) 取  $(X_1, \cdots, X_n)$  的若干特殊值 (例如  $(1, 1, \cdots, 1, 0, 0, \cdots, 0)$ ) 代入上式定出各系数  $A_{(l_1, \cdots, l_n)}$ , 即得出  $f_m$ .

### 1.2.2 求 $f, g$ 的首一最大公因式 $(f, g)$ 及 Bezout 等式 $(uf + vg = (f, g))$ 中 $u, v$ 的方法

(1) 辗转相除求  $(f, g)$ . 由带余除法可设

$$f = q_1 g + r_1 \quad \deg r_1 < \deg g$$

$$g = q_2 r_1 + r_2 \quad \deg r_2 < \deg r_1$$

$$r_1 = q_3 r_2 + r_3 \quad \deg r_3 < \deg r_2$$

$$\cdots \cdots \quad \cdots \cdots$$

$$r_{s-2} = q_s r_{s-1} + r_s \quad \deg r_s < \deg r_{s-1}$$

$$r_{s-1} = q_{s+1} r_s$$

由定理 1.6 知有

$$(f, g) = (g, r_1) = \cdots = (r_{s-2}, r_{s-1}) = c r_s,$$

这里要特别注意  $r_i$  与  $(f, g)$  的关系, 当  $r_i$  不是首一多项式时, 它们相差一个倍数.

(2) 先找公式, 再代入  $q_i$  算  $u, v$ . 应该说求  $u, v$  使  $uf + vg = (f, g)$  的思路大部分人是知道的, 但许多人往往得不到正确的结果, 其原因主要是从反解 (或称回代) 上述公式找  $f, g$  的关系中, 一开始就用具体的多项式参加运算, 结果越算越繁, 眼花缭乱. 我们认为要分两步走: ① 写出公式; ② 再代具体的多项式. 下面以辗转相除三次得到最大公因式为例说明方法. 由

$$\begin{aligned}(f, g) &= c(r_3) = c(r_1 - q_3 r_2) = c[(f - q_1 g) - q_3(g - q_2 r_1)], \\ &= c[f - q_1 g - q_3(g - q_2(f - q_1 g))], \\ &= c(1 + q_2 q_3)f - c(q_1 + q_1 q_2 q_3 + q_3)g,\end{aligned}$$

所以  $u = c(1 + q_2 q_3), \quad v = -c(q_1 + q_1 q_2 q_3 + q_3).$

再把辗转相除中的各  $q_i$  的表达式代入, 即可求出  $u, v$ .

### 1.3 习题与解答

1. 自然数全体  $\mathbf{N}$  对加法是否成群? 对乘法呢?

解 对加法不成群, 因为无恒元, 无逆元. 对乘法也不成群, 因为有恒元为 1, 但无逆元.

2.  $(\mathbf{Z}, +, \cdot)$  是否为域? 含  $\mathbf{Z}$  的最小域是什么? 为什么?

解  $(\mathbf{Z}, +, \cdot)$  不是域. 因为  $(\mathbf{Z}, +)$  是 Abel 群, 但  $(\mathbf{Z}, \cdot)$  是半群 (对乘法有恒元 1, 但无逆元). 要有逆元必须有分数, 所以含  $\mathbf{Z}$  的最小域为  $\mathbf{Q}$ , 这时  $(\mathbf{Q}, +)$  为 Abel 群,  $(\mathbf{Q}^*, \cdot)$  为 Abel 群, 且满足乘法对加法的分配律.

3. 举出  $(\mathbf{Z}, +)$  中三个子群例子.

解  $\{2K | K \in \mathbf{Z}\}, \{3K | K \in \mathbf{Z}\}, \{4K | K \in \mathbf{Z}\}.$

4. 在  $\mathbf{F}_2$  中计算:  $(a+b)^2, (a-b)^4, (a+b)^{32} \quad (a, b \in \mathbf{F}_2).$

解 因为在  $\mathbf{F}_2$  中, 任  $x \in \mathbf{F}_2$  均有  $x^2 = x, 2x = 0$ .

所以 
$$\begin{aligned}(a+b)^2 &= (a+b), \\ (a-b)^4 &= [(a-b)^2]^2 = (a-b)^2 = (a-b) = a+b, \\ (a+b)^{32} &= (a+b)^{4 \times 4 \times 2} = (a+b).\end{aligned}$$

这里用到  $-\bar{1} = \bar{1}$ .

注意 在一般的特征为  $p$  的域中, 仅有  $px = 0$ , 未必有  $x^p = x$  ( $x$  为域中任一元素), 只在  $F_p$  中有  $x^p = x$ , 因为  $F_p^*$  是乘法循环群.

5. 举出一些群, 环, 域的例子.

解  $(\mathbf{Z}, +)$  Abel 群;  $(\mathbf{Z}, +, \cdot)$  是环;  $\mathbf{Q}, \mathbf{R}, \mathbf{C}$  等均是域.

$\mathbf{Z}/8\mathbf{Z}$  中子集  $\bar{1}, \bar{3}, \bar{5}, \bar{7}$  是个群 (乘法群);

$\mathbf{Z}/5\mathbf{Z}$  中子集  $\bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}$  是乘法群.

6. 分别找出 3, 9, 4, 5, 8, 7, 11, 13 整除一个整数  $n$  的判则, 并证明之.

解 用 3 整除判则: 因为  $10 \equiv 1 \pmod{3}$ , 所以设  $n = a_0 + a_1 \times 10 + \cdots + a_k \times 10^k$ , 则

$$n \equiv a_0 + a_1 + \cdots + a_k \pmod{3},$$

所以

$$3 \mid n \Leftrightarrow 3 \mid \sum_{i=1}^k a_i.$$

**用 9 整除判则:**

因为

$$9 \mid n \Leftrightarrow n \equiv 0 \pmod{9}$$

又因为

$$n = \sum_{i=0}^k a_i \times 10^i \equiv \sum_{i=0}^k a_i \pmod{9}$$

所以

$$9 \mid n \Leftrightarrow 9 \mid \sum_{i=0}^n a_i.$$

**用 4 整除判则:** 因为  $100 \equiv 0 \pmod{4}$

所以

$$n \equiv a_0 + a_1 \times 10 \pmod{4},$$

故只要看末两位数字能否被 4 整除即可.

**用 5 整除判则:** 因为  $10 \equiv 0 \pmod{5}$ , 所以  $n \equiv a_0 \pmod{5}$  所以只要看个位数字能否被 5 整除.

**用 8 整除判则:** 因为  $1000 \equiv 0 \pmod{8}$

所以

$$n \equiv a_0 + a_1 \times 10 + a_2 \times 10^2 \pmod{8},$$

故只要看末三位数字能否被 8 整除.

**用 7 整除判则:** 因为  $11 \times 7 \times 13 = 1001$ ,

所以

$$1000 \equiv -1 \pmod{7},$$

故

$$\begin{aligned} n &= \sum_{i=1}^k a_i \times 10^i = \sum_{i=0}^{\lfloor k/3 \rfloor} b_i \times 10^{3i} \equiv \sum_{i=0} b_i (-1)^i \\ &= b_0 - b_1 + b_2 - b_3 + \cdots \pmod{7} \end{aligned}$$

即只要看把  $n$  从个位开始三位一组分组后得到的数字的代数和能否被 7 整除.

**用 11 整除判则:** 因为  $10 \equiv -1 \pmod{11}$

所以

$$\begin{aligned} n &= \sum_{i=0}^k a_i \times 10^i \equiv \sum_{i=0}^k a_i \times (-1)^i \\ &= a_0 - a_1 + a_2 - \cdots + (-1)^k a_k \pmod{11} \end{aligned}$$

故只要看(从个位数) $n$  的奇数位数字的和与偶数位数字和的差能否被 11 整除.

**用 13 整除判则:** 同 7, 即对任整数  $n$ , 看 13 是否能整除  $b_0 - b_1 + b_2 - b_3 + \cdots$ , 其中  $b_i (i=0, 1, 2, \cdots)$  是把  $n$  从个位开始三位一组分组后得到的数字.

例  $n=87654320$ , 则因为

$$n \equiv b_0 - b_1 + b_2 = 320 - 654 + 87 = -247 \pmod{13}$$

而  $13 \mid -247$ , 故  $13 \mid n$ .

**7. 证明  $641 \mid 2^{32} + 1$ .**

**证明** 方法 1. 因为  $641 = 2^6 \times 10 + 1 = 2^7 \times 5 + 1$

所以

$$-1 \equiv 2^7 \times 5 \pmod{641},$$

故

$$\begin{aligned} 1 &\equiv (2^7)^4 \times 5^4 = (2^7)^4 \times 625 \\ &\equiv (2^7)^4 (-2^4) = -2^{32} \pmod{641} \end{aligned}$$

即

$$2^{32} + 1 \equiv 0 \pmod{641}$$

方法 2.

$$\begin{aligned}
 641 &= 2^6 \times 10 + 1 = 2^7 \times 5 + 1, \\
 2^{32} + 1 &= 2^4 \times 2^{28} + 1 = (15 + 1)(2^7)^4 + 1 \\
 &= 3 \times (2^7)^3 [5 \times 2^7 + 1] + (2^7)^4 - 3(2^7)^3 + 1 \\
 &= 3 \times (2^7)^3 [5 \times 2^7 + 1] + 125(2^7)^3 + 1 \\
 &= (5 \times 2^7 + 1)[3 \times (2^7)^3 + (5 \times 2^7)^2 - 5 \times 2^7 + 1],
 \end{aligned}$$

所以

$$641 \mid 2^{32} + 1.$$

8. 域  $F_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$  的特征是多少? 计算  $(a+b)^{p^k}$  ( $a, b \in F_p$ ).

解 因为

$$F_p = \{\bar{0}, \bar{1}, \dots, \overline{p-1}\},$$

$$\overbrace{\bar{1} + \bar{1} + \dots + \bar{1}}^{p\uparrow} = \bar{p} = \bar{0},$$

所以  $F_p$  的特征是  $p$ ;

又因为在  $F_p$  中, 任  $x \in F_p$ , 有  $x^p = x$ ,

所以

$$(a+b)^{p^k} = (a+b)^{p^{k-1}} = \dots = a+b.$$

9. 列出  $\mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$  和  $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$  的乘法表.

解

$*$	0	1	2	3	4	5	6	$*$	0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	2	3	4	5	6	1	0	1	2	3	4	5	6	7
2	0	2	4	6	1	3	5	2	0	2	4	6	0	2	4	6
3	0	3	6	2	5	1	4	3	0	3	6	1	4	7	2	5
4	0	4	1	5	2	6	3	4	0	4	0	4	0	4	0	4
5	0	5	3	1	6	4	2	5	0	5	2	7	4	1	6	3
6	0	6	5	4	3	2	1	6	0	6	4	2	0	6	4	2
								7	0	7	6	5	4	3	2	1

10. 把多项式形式  $f(X) \in F_7[X]$  化为降幂排列形式:

$$\begin{aligned}
 (1) \quad f(X) &= (4X^3 + 2X + 6)(3X^3 - 4X^2 - 3) \\
 &= 12X^6 - 16X^5 + 6X^4 - 2X^3 - 24X^2 - 6X - 18 \\
 &= 5X^6 + 5X^5 + 6X^4 + 5X^3 + 4X^2 + X + 3.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (2) \quad f(X) &= (3X^5 + 5X^3 - 2)(4X^4 + 6X + 5) \\
 &= 5X^9 + 6X^7 + 4X^6 + X^5 + X^4 + 4X^3 + 2X + 4.
 \end{aligned}$$

11.  $\frac{1}{3} + \frac{1}{5}X^{\frac{1}{2}} + 4X^5 + \frac{1}{2}X^7$  是否是  $\mathbb{Q}$  上多项式?

解 因为不定元  $X$  的次数非全是自然数, 所以不是  $\mathbb{Q}$  上多项式.

12. 作  $f(X)$  除以  $g(X)$  的带余除法:

$$(1) \quad f(X) = X^5 + 4X^4 + X^2 + 2X + 3, \quad g(X) = X - 2.$$

解

$$2 \left| \begin{array}{cccccc} 1 & 4 & 0 & 1 & 2 & 3 \\ \frac{2}{6} & \frac{12}{12} & \frac{24}{25} & \frac{50}{52} & \frac{104}{107} \end{array} \right.$$

所以  $f(X) = g(X)(X^4 + 6X^3 + 12X^2 + 25X + 52) + 107$ .

(2)  $f(X) = X^n - 1$ ,  $g(X) = X - a$ .

解 因为  $f(X) = X^n - a^n + a^n - 1 = g \cdot q + r$   
 $= (X - a)(X^{n-1} + aX^{n-2} + \cdots + a^{n-1}) + a^n - 1.$

或直接做带余除法有

$$a \left| \begin{array}{cccccc} 1 & 0X^{n-1} & \cdots & \cdots & 0X & -1 \\ \frac{a}{a} & \frac{a^2}{a^2} & \cdots & \frac{a^{n-1}}{a^{n-1}} & \frac{a^n}{a^n} \end{array} \right.$$

所以  $f(X) = (X - a)(X^{n-1} + aX^{n-2} + \cdots + a^{n-1}) + a^n - 1.$

(3)  $f(X) = X^6 - 1$ ,  $g(X) = X^3 + X + 1$ .

$$\begin{array}{r|rrrrrrrr} X^3 + X + 1 & X^6 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & X^3 - X - 1 \\ & X^6 & & X^4 & X^3 & & & & \\ \hline & & & -X^4 & -X^3 & & & -1 & \\ & & & -X^4 & & -X^2 & -X & & \\ \hline & & & & -X^3 & +X^2 & +X & -1 & \\ & & & & -X^3 & & -X & -1 & \\ \hline & & & & & X^2 & +2X & & \end{array}$$

所以  $f(X) = (X^3 + X + 1)(X^3 - X - 1) + X^2 + 2X.$

或直接由因式分解式得

$$X^6 - 1 = (X^3 + X + 1)(X^3 - X - 1) + (X + 1)^2 - 1$$

13. 求下列各对多项式的最大公因子及 Bezout 等式:

(1)  $f(X) = X^5 + X^4 - 5X^3 - 5X^2 + 4X + 4$ ,  $g(X) = X^4 + X^3 - 17X^2 - 21X + 36$

解 定理 1.6 提供了求最大公因子  $(f, g)$  的方法——辗转相除(见 1.2.2), 我们将在 (3) 题写出详细的除法竖式, 这里只给出公式和各步答案.

$$f = gq_1 + r_1,$$

$$g = r_1q_2 + r_2,$$

$$r_1 = r_2q_3 + r_3,$$

$$r_2 = r_3q_4.$$

其中  $q_1 = X$ ,  $q_2 = \frac{1}{12}X - \frac{1}{36}$ ,  $q_3 = -\frac{9 \times 12}{125}X + \frac{9 \times 16}{125 \times 5}$ ,

$$q_4 = -\frac{25}{9} \cdot \frac{25}{108}(5X + 13), r_3 = \frac{108}{25}(X - 1).$$

所以  $(f, g) = (X - 1) = \frac{25}{108}r_3 = \frac{25}{108}(r_1 - (g - r_1q_2)q_3)$



$$\begin{aligned}
&= \frac{25}{108}[(f - gq_1)(1 + q_2q_3) - gq_3] \\
&= u(X)f(X) + v(X)g(X). \\
u(X) &= \frac{25}{108}(1 + q_2q_3) = -\frac{X^2}{60} + \frac{X}{100} + \frac{23}{100}; \\
v(X) &= -\frac{25}{108}(q_1(1 + q_2q_3) + q_3) = \frac{X^3}{60} - \frac{X^2}{100} - \frac{3X}{100} - \frac{4}{75}
\end{aligned}$$

注意 这里在求 Bezout 等式时,是先导出  $u(X), v(X)$  的计算公式,然后代入  $q_i$  计算,这样较简单,不易错.

$$(2) f(X) = 3X^4 - 8X^2 - 3, g(X) = X^3 - 2X^2 - 3X + 6.$$

解 由辗转相除知

$$\begin{aligned}
f &= gq_1 + r_1 \\
g &= r_1q_2
\end{aligned}$$

其中  $q_1 = 3X + 6; q_2 = \frac{1}{13}X - \frac{2}{13}; r_1 = 13(X^2 - 3)$ . 于是得  $(f, g) = (X^2 - 3)$ , 且有

$$(f, g) = (X^2 - 3) = \frac{1}{13}r_1 = \frac{1}{13}f - \frac{1}{13}q_1g,$$

所以 
$$u(X) = \frac{1}{13}, \quad v(X) = -\frac{1}{13}(3X + 6).$$

$$(3) f(X) = X^4 - 2X^3 - 2X^2 - 2X - 3, g(X) = X^3 + 6X^2 + 6X + 1.$$

$q_2 = \frac{X}{40} + \frac{39}{40 \times 8}$	$g$	$f$	$q_1 = X - 8$
	$X^3 + 6X^2 + 6X + 1$	$X^4 - 2X^3 - 2X^2 - 2X - 3$	
	$X^3 + \frac{9}{8}X^2 + \frac{1}{8}X$	$X^4 + 6X^3 + 6X^2 + X$	
	$\frac{39}{8}X^2 + \frac{47}{8}X + 1$	$-8X^3 - 8X^2 - 3X - 3$	
	$\frac{39}{8}X^2 + \frac{39 \times 9}{8 \times 8}X + \frac{39}{8 \times 8}$	$-8X^3 - 48X^2 - 48X - 8$	
	$r_2 = \frac{25}{64}X + \frac{25}{64}$	$r_1 = 40X^2 + 45X + 5$ $= 5(8X + 1)(X + 1)$	

所以 
$$\begin{aligned}
(f, g) &= (X + 1) = \frac{64}{25}r_2 = \frac{64}{25}(-q_2f + (1 + q_1q_2)g) \\
&= \left(-\frac{8}{125}X - \frac{39}{125}\right)f + \frac{8}{125}\left(X^2 - \frac{25}{8}X + 1\right)g \\
&= uf + vg.
\end{aligned}$$

14. (1) 求第 13 题中前 4 个多项式的最大公因子及 Bezout 等式.

解 记 13 题中前 4 个多项式分别为  $f_1, g_1, f_2, g_2$ . 并记 13 题(1), (2)的 Bezout 等式分别为

$$d_1(X) = (f_1, g_1) = (X - 1) = w_1f_1 + w_2g_1,$$

$$d_2(X) = (f_2, g_2) = (X^2 - 3) = w_3 f_2 + w_4 g_2.$$

则由

$$d_2(X) = d_1(X)(X+1) - 2 = d_1 q_1 + r_1,$$

得

$$(d_1, d_2) = 1 = -\frac{1}{2}r_1 = -\frac{1}{2}(d_2 - d_1 q_1) = \frac{1}{2}d_1 q_1 - \frac{1}{2}d_2,$$

把上述两个 Bezout 等式代入, 得

$$\frac{1}{2}(w_1 f_1 + w_2 g_1)q_1 - \frac{1}{2}(w_3 f_2 + w_4 g_2) = 1.$$

所以

$$(f_1, g_1, f_2, g_2) = 1,$$

且有  $u_1, u_2, u_3, u_4$  使

$$u_1 f_1 + u_2 g_1 + u_3 f_2 + u_4 g_2 = 1$$

其中

$$u_1 = \frac{1}{2}w_1 q_1 = -\frac{1}{120}X^3 - \frac{1}{300}X^2 + \frac{3}{25}X + \frac{23}{200},$$

$$u_2 = \frac{1}{2}w_2 q_1 = \frac{1}{120}X^4 + \frac{1}{300}X^3 - \frac{1}{50}X^2 - \frac{1}{24}X - \frac{2}{75},$$

$$u_3 = -\frac{1}{2}w_3 = -\frac{1}{26},$$

$$u_4 = -\frac{1}{2}w_4 = \frac{3}{26}(X+2).$$

(2) 求第 13 题中后 4 个多项式的最大公因子及 Bezout 等式.

解 记 13 题中后 4 个多项式分别为  $f_1, g_1, f_2, g_2$ . 并记 13(1), (2) 的 Bezout 等式分别为

$$d_1(X) = (f_1, g_1) = X^2 - 3 = w_1 f_1 + w_2 g_1, \quad (1)$$

$$d_2(X) = (f_2, g_2) = X + 1 = w_3 f_2 + w_4 g_2, \quad (2)$$

则

$$\text{因为 } X^3 - 3 = (X+1)(X-1) - 2 \longrightarrow d_1 = (X-1)d_2 + r_1$$

$$\text{所以 } (d_1, d_2) = 1 = -\frac{1}{2}d_1 + \frac{1}{2}(x-1)d_2 \quad (3)$$

把(1), (2) 代入(3) 中, 即得

$$\begin{aligned} & -\frac{1}{2}\left(\frac{1}{13}f_1 - \frac{3}{13}(X+2)g_1\right) \\ & + \frac{1}{2}(X-1)\left[\left(-\frac{8}{125}X - \frac{39}{125}\right)f_2 + \left(\frac{8}{125}X^2 - \frac{1}{5}X + \frac{8}{125}\right)g_2\right] = 1, \end{aligned}$$

故

$$u_1 = -\frac{1}{26}; \quad u_2 = \frac{3}{26}(X+2); \quad u_3 = -\frac{4}{125}X^2 - \frac{31}{250}X + \frac{39}{250};$$

$$u_4 = \frac{4}{125}X^3 - \frac{33}{250}X^2 + \frac{33}{250}X - \frac{4}{125}, \quad d(X) = 1.$$

15. 试求  $a$  与  $b$  使  $X^2 - 2aX + 2$  整除  $X^4 + 3X^2 + aX + b$ .

$$\begin{array}{r|l}
 X^2 - 2aX + 2 & \begin{array}{l} X^4 + 0X^3 + 3X^2 + aX + b \\ X^4 - 2aX^3 + 2X^2 \\ \hline 2aX^3 + X^2 + aX + b \\ 2aX^3 - 4a^2X^2 + 4aX \\ \hline (1 + 4a^2)X^2 - 3aX + b \\ (1 + 4a^2)X^2 - 2a(1 + 4a^2)X + 2(1 + 4a^2) \\ \hline 0 \end{array} \\
 \hline
 & q = X^2 + 2aX + 1 + 4a^2
 \end{array}$$

所以 
$$\begin{cases} 3a = 2a(1 + 4a^2) \\ b = 2(1 + 4a^2) \end{cases} \rightarrow \begin{cases} a = 0 \\ b = 2 \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} a = \pm \frac{\sqrt{2}}{4} \\ b = 3 \end{cases}.$$

16. 试证明  $X^2 + X + 1$  整除  $X^{3m} + X^{3n+1} + X^{3p+2}$  ( $m, n, p$  为任意正整数).

证 方法 1 因为  $X^3 - 1 = (X - 1)(X^2 + X + 1) \equiv 0 \pmod{X^2 + X + 1}$ ,  
所以  $X^3 \equiv 1 \pmod{X^2 + X + 1}$ .

于是

$$X^{3m} + X^{3n+1} + X^{3p+2} \equiv 1 + X + X^2 \equiv 0 \pmod{X^2 + X + 1}.$$

方法 2 因为  $X^{3m} + X^{3n+1} + X^{3p+2} = (X^{3m} - 1) + X(X^{3n} - 1) + X^2(X^{3p} - 1) + 1 + X + X^2$   
而

$$X^{3k} - 1 = (X^3 - 1)(X^{3(k-1)} + X^{3(k-2)} + \cdots + 1), \quad k \in \mathbf{N}.$$

故  $X^2 + X + 1 \mid X^{3m} - 1, X^{3n} - 1, X^{3p} - 1$ ,

所以  $X^2 + X + 1 \mid (X^{3m} + X^{3n+1} + X^{3p+2})$ .

17. 试证明  $(f(X), g(X))h(X) = (f(X)h(X), g(X)h(X))$  ( $h(X)$  为首一多项式).

证 由 Bezout 等式有

$$(f, g) = uf + vg,$$

则

$$\begin{aligned}
 \text{左边} &= (f, g)h = (uf + vg)h = ufh + vgh \\
 &= \text{右边的倍式},
 \end{aligned}$$

所以右边  $\mid$  左边.

又左边  $\mid f$ , 右  $\mid gh$ , 所以左  $\mid$  右, 且左, 右两边皆首一,

故左边 = 右边.

18. 设  $d(X) = (f(X), g(X)) \neq 0$ , 试证明  $\left(\frac{f(X)}{d(X)}, \frac{g(X)}{d(X)}\right) = 1$ .

证 因为由 Bezout 等式, 存在  $u, v \in F[X]$ , 使

$$d(X) = u(X)f(X) + v(X)g(X),$$

因  $d(X) \neq 0$ , 上式两边同除  $d(X)$  得

$$1 = u(X) \frac{f}{d} + v(X) \frac{g}{d}$$

故  $\left(\frac{f}{d}, \frac{g}{d}\right) = 1$ , 即  $\frac{f}{d}, \frac{g}{d}$  互素.

此时也有

$(u(X), v(X)) = 1$  即  $u, v$  互素,

(因为若有  $(u, v) = d_1$ , 则  $d_1 \mid$  右, 也应有  $d_1 \mid$  左, 故  $d_1(X) = 1$ ).

19. 试证明  $((f(X), g(X)), h(X)) = (f(X), (g(X), h(X))) = (f(X), g(X), h(X))$ .

证 设  $(f(X), g(X)) = d_1(X)$ ,  $(d_1(X), h(X)) = d_2(X)$  则由 Bezout 等式, 存在  $u_1, v_1, u_2, v_2$  使得

$$u_1 f + v_1 g = d_1(X) \quad (1)$$

$$u_2 d_1 + v_2 h = d_2(X) \quad (2)$$

把(1)代入(2)得

$$u_2 u_1 f + u_2 v_1 g + v_2 h = d_2$$

所以

$$(f, g, h) \mid d_2.$$

又 因为  $d_2 \mid h, d_2 \mid d_1 \rightarrow d_2 \mid f$ , 且  $d_2 \mid g$ ,

所以

$$d_2 \mid (f, g, h),$$

故

$$((f(X), g(X)), h(X)) = (f, g, h).$$

同理可证另一等式.

20. 设  $d(X) = (f(X), g(X))$ , 试证明在 Bezout 等式  $uf + vg = d$  中可以选取  $u, v$  使  $\deg u < \deg g, \deg v < \deg f$ .

证 若  $\deg u > \deg g$ , 则由带余除法, 存在  $q, u_1$ , 使  $u = qg + u_1, \deg u_1 < \deg g$ , 代入 Bezout 等式有

$$(qg + u_1)f + vg = u_1 f + (v + qf)g = d(X),$$

因为

$$\deg(v + qf)g < \deg f \cdot g,$$

所以

$$\deg(v + qf) < \deg f.$$

于是, 存在  $u_1, v_1 = (v + gf)$ , 使

$$u_1 f + v_1 g = d(X).$$

且  $\deg u_1 < \deg g, \deg v_1 < \deg f$ .

21. 设  $a, b$  为正整数, 试证明数集  $ma + nb$  ( $m, n$  过正整数) 包含  $(a, b)$  的大于  $ab$  的所有倍数.

证 此题要证的是当  $k(a, b) > ab$  时,  $k(a, b)$  都可写成  $ma + nb$  ( $m, n$  为正整数) 的形式. 因为对任两个正整数  $a, b$ , 由 Bezout 等式存在  $u, v$  使

$$(a, b) = ua + vb \rightarrow k(a, b) = kua + kvb,$$

记  $ku = qb + r$ , 则  $0 < r \leq b$ ,

所以

$$k(a, b) = (qb + r)a + kvb = ra + (aq + kv)b,$$

要  $k(a, b) > ab$ , 而  $r \leq b$  (所以  $ra \leq ab$ , 由此  $b$  的系数不能  $\leq 0$ )

故

$$aq + kv > 0.$$

22. (1) 试证明: 若  $(f, h) = (g, h) = 1$ , 则  $(fg, h) = 1$ .

解 由已知  $(f, h) = (g, h) = 1$ , 所以  $\exists u_1, v_1, u_2, v_2$  使得

$$u_1 f + v_1 h = 1, \quad (1)$$

$$u_2 g + v_2 h = 1. \quad (2)$$

(1), (2) 两边分别相乘, 即有

$$(u_1 f + v_1 h)(u_2 g + v_2 h) = 1.$$

乘开得

$$u_1 u_2 fg + (v_1 u_2 g + u_1 v_2 f + v_1 v_2 h)h = 1,$$

记  $u = u_1 u_2, v = v_1 u_2 g + u_1 v_2 f + v_1 v_2 h$ , 就有

$$ufg + vh = 1,$$

于是由 Bezout 等式知  $(fg, h) = 1$ .

(2) 试证明: 若  $(f, h) = d, f|g, h|g$ , 则  $fh|gd$ .

证 记  $f = f_1 d, h = h_1 d$ ,

因为  $f|g$ , 所以  $g = fq = df_1 q$ ,

又由于  $h_1 d|df_1 q$ , 且  $(f_1, h_1) = 1$ , 故  $h_1|q$ . 设  $q = h_1 q_0$ , 于是

$$gd = df_1 qd = df_1 h_1 dq_0 = fhq_0,$$

所以

$$fh|gd.$$

(3) 试证明: 最小公倍  $[f, h] = \frac{fh}{(f, h)}$ .

证 (i) 若  $(f, h) = 1$ , 则显然有  $[f, h] = f \cdot h$ ;

(ii) 若  $(f, h) = d(X) \neq 1$ , 则有

$$[f, h] = [df_1, dh_1] = d[f_1, h_1] = \frac{df_1 h_1 \cdot d}{d} = \frac{f \cdot h}{(f, g)}.$$

23. 设  $f(X) = f_1(X)f_2(X)$ ,  $\deg f_i > 0$ , 且  $(f_1, f_2) = 1$ , 试证明: 若  $\deg g(X) < \deg f(X)$ , 则存在  $u_i(X)$  使

$$g(X) = u_2(X)f_1(X) + u_1(X)f_2(X), \text{ 且 } \deg u_i < \deg f_i.$$

证 由已知  $(f_1, f_2) = 1$ , 则由 Bezout 等式,  $\exists u, v$  使得

$$uf_1 + vf_2 = 1.$$

两边乘  $g(X)$ , 有

$$ugf_1 + vgf_2 = g(X). \quad (*)$$

若  $\deg ug > \deg f_2$ , 则由带余除法知,  $\exists q, u_2$  使

$$ug = f_2 q + u_2, \quad \deg u_2 < \deg f_2,$$

代入 (\*) 式, 整理得

$$u_2 f_1(X) + (f_1 q + v g) f_2(X) = g(X).$$

记  $f_1 q + v g = u_1(X)$ , 则有

$$u_2 f_1(X) + u_1 f_2(X) = g(X), \quad \text{且 } \deg u_i < \deg f_i,$$

(因为  $\deg g < \deg f, \deg u_2 f_1 < f$ , 故  $\deg u_1 f_2 < \deg f = \deg f_1 f_2$ ).

24. 试证明若  $g(X), p(X) \neq 0$ , 则存在  $a_i(X)$  使  $\deg a_i < \deg p$ , 且

$$g(X) = a_0(X) + a_1(X)p(X) + \cdots + a_{e-1}(X)p(X)^{e-1},$$

$$\frac{g(X)}{p(X)^e} = \frac{a_0(X)}{p(X)^e} + \frac{a_1(X)}{p(X)^{e-1}} + \cdots + \frac{a_{e-1}(X)}{p(X)}.$$

证 (1) 若  $\deg g < \deg p$ , 则取  $a_0(X) = g(X), e = 1$  即可.

(2) 若  $\deg g > \deg p$ , 由带余除法有

$$g(X) = p q_0 + r_0, \quad \text{且 } \deg r_0 < \deg p,$$

若  $\deg q_0 > \deg p$ , 则又有

$$q_0 = p q_1 + r_1, \quad \text{且 } \deg r_1 < \deg p,$$

于是得

$$g(X) = p(p q_1 + r_1) + r_0 = p^2 q_1 + p r_1 + r_0.$$

继续下去, 必存在  $k$ , 使  $\deg q_k < \deg p$  (因  $q_i$  降次, 而  $p$  为有限次),

于是有

$$g(X) = p^{k+1} q_k + p^k r_k + \cdots + p r_1 + r_0.$$

记  $r_i = a_i, i=1, 2, \cdots, k, k=e-2, q_k = a_{k+1} = a_{e-1}$ , 即得

$$g(X) = a_{e-1} p^{e-1} + a_{e-2} p^{e-2} + \cdots + a_1 p + a_0.$$

两边同除  $p(x)^e$ , 则有

$$\frac{g(X)}{p(X)^e} = \frac{a_{e-1}(X)}{p(X)} + \frac{a_{e-2}(X)}{p(X)^2} + \cdots + \frac{a_1(X)}{p(X)^{e-1}} + \frac{a_0(X)}{p(X)^e}.$$

这就是微积分学中部分分式积分法的理论基础.

25. 若  $f(X), g(X) \in \mathbf{R}[X], \deg g < \deg f$ , 试证明分式  $g(X)/f(X)$  可被分解为形如  $a/(X-r)^e$  或  $bX+c/(X^2+sX+t)^e$  的部分分式之和 (这里设  $X^2+sX+t$  在  $\mathbf{R}[X]$  中不可约).

详言之, 若  $f(X) = \prod_{i=1}^m (X-r_i)^{e_i} \prod_{j=1}^n (X^2+s_jX+t_j)^{d_j}$ , 其中二次多项式均在  $\mathbf{R}[X]$  中不可约, 则  $g(X)/f(X)$  可被表为

$$\sum_{i=1}^m \sum_{k_i=1}^{e_i} \frac{a_{ik_i}}{(X-r_i)^{k_i}} + \sum_{j=1}^n \sum_{e_j=1}^{d_j} \frac{b_{je_j}X + c_{je_j}}{(X^2+s_jX+t_j)^{e_j}}.$$

(可用以下事实:  $\mathbf{R}[X]$  中不可约多项式只能是一次或二次的.)

证 设  $f = \prod_{i=1}^s p_i^{e_i}, Q_i = f/p_i^{e_i}$ , 则  $\exists u_i$ , 使

$$u_1 Q_1 + u_2 Q_2 + \cdots + u_s Q_s = g,$$

令  $u_i = p_i^{e_i} q_i + u_i'$ , 则  $\deg u_i' < \deg p_i^{e_i}$ , 由此可使  $\deg u_i Q_i < \deg f$  ( $1 \leq i \leq s-1$ ), 从而也有  $\deg u_s Q_s < \deg f$ .

所以

$$\frac{u_1}{p_1^{e_1}} + \cdots + \frac{u_s}{p_s^{e_s}} = \frac{g}{f},$$

由 24 题可得每个分式为

$$\frac{u_i}{p_i^{e_i}} = \frac{a_0(X)}{p_i^{e_i}} + \frac{a_1(X)}{p_i^{e_i-1}} + \cdots + \frac{a_{e_i-1}(X)}{p_i}.$$

其中  $\deg a_k < \deg p_i$ . 而  $p_i$  是一次或二次的.

26. (Taylor 公式) 设  $f(X)$  是数域  $F$  上次数不超过  $n$  的多项式,  $c \in F$ , 则

$$f(X) = \sum_{j=0}^n \frac{f^{(j)}(c)}{j!} (X-c)^j.$$

其中  $f^{(j)}(c)$  是  $f(X)$  的  $j$  次形式微商在  $c$  的值.

证 设  $f(X) = \sum_{j=0}^n a_j (X-c)^j$ , 令  $X=c$  得  $a_0 = f(c)$ ; 求导后, 代入  $X=c \rightarrow a_1 = f'(c)$ ; 再求导, 代入  $X=c$ , 得  $a_2 = f''(c)/2!$ , 继续下去可得

$$a_j = f^{(j)}(c)/j! \quad j = 1, 2, \dots, n.$$

27. 设  $f(X)$  是数域  $F$  上多项式,  $\deg f \leq n$ , 则  $c \in F$  是  $f(X)$  的  $m$  重根的充要条件为

$$\begin{cases} f^{(j)}(c) = 0 & (0 \leq j \leq m-1) \\ f^{(m)}(c) \neq 0 \end{cases}$$

证  $c$  是  $f(X)$  的  $m$  重根  $\stackrel{D}{=} f(X) = (X-c)^m g(X)$ , 且  $g(c) \neq 0$ .

$\Rightarrow$  由定义 有  $f'(X)|_c = 0, \dots$

$$f^{(m-1)}(X)|_c = m! (X-c)g(X) + m(m-1)\cdots 2(X-c)^2 g'(X) + \cdots + (X-c)^m g^{(m-1)}(X)|_c = 0.$$

最后一个等号是因为中间的展开式中每项都有因式  $(X-c)$ . 而

$$f^{(m)}(X)|_c = m!g(X) + (X-c)Q(X)|_c = m!g(c) \neq 0.$$

$\Leftarrow$  由 26 题, 当  $f^{(j)}(c) = 0$  ( $0 \leq j \leq m-1$ ),  $f^{(m)}(c) \neq 0$  时, 有

$$\begin{aligned} f(X) &= \frac{f^{(m)}(c)}{m!} (X-c)^m + \frac{f^{(m+1)}(c)}{(m+1)!} (X-c)^{m+1} + \cdots + \frac{f^{(n)}(c)}{n!} (X-c)^n \\ &= (X-c)^m g(X), \end{aligned}$$

且  $g(c) = \frac{f^{(m)}(c)}{m!} \neq 0$ , 所以  $c$  为  $f(X)$  的  $m$  重根.

28. 若多项式  $f(X)$  与  $g(X)$  互素, 则  $f(X)^2 + g(X)^2$  的重根是  $f'(X)^2 + g'(X)^2$  的根.

证 若  $x_0$  是  $f^2 + g^2$  的重根, 则有

$$\begin{cases} f(x_0)^2 + g(x_0)^2 = 0 & (1) \end{cases}$$

$$\begin{cases} f(x_0)f'(x_0) + g(x_0)g'(x_0) = 0. & (2) \end{cases}$$

$$\text{所以} \quad f(x_0)^2 f'(x_0)^2 = g(x_0)^2 g'(x_0)^2. \quad (3)$$

因  $f(X), g(X)$  互素, 所以  $f(x_0) \neq 0, g(x_0) \neq 0$

(1)代入(3)中有

$$f^2 f'^2 = -g^2 g'^2, \quad \text{消去 } f^2 \text{ 得 } f'^2 = -g'^2,$$

即  $f'^2(x_0) + g'^2(x_0) = 0$ , 故  $x_0$  是  $f'(X)^2 + g'(X)^2$  的根.

29. 证明多项式  $f(u(X), v(X))$  的  $n(>1)$  重根是  $f(u'(X), v'(X))$  的  $n-1$  重根. 其中  $u(X), v(X)$  是互素多项式,  $u'(X), v'(X)$  互素,  $f(X, Y)$  是没有一次重因子的齐次多项式.

证 (1) 可设  $f(u, v) = a_0(u - a_1 v) \cdots (u - a_m v)v \quad (*)$

其中  $a_i \in \mathbb{C}$  互异, (最后一个  $v$  也可能没有) 事实上, 因  $f(u, v)$  是齐次多项式, 设为  $d$  次, 则

$$v^{-d} f(u, v) = f\left(\frac{u}{v}, 1\right)$$

作为  $t = \frac{u}{v}$  的多项式可在复数域中完全分解为一次因子之积(可能有重的), 再乘以  $v^d$  即

得(\*)式(注意  $f(u, v)$  无一次重因子).

例如若

$$f(u, v) = u^2 v + 3uv^2 + 2v^3,$$

则

$$v^{-3} f(u, v) = \left(\frac{u}{v}\right)^2 + 3\left(\frac{u}{v}\right) + 2 = \left(\frac{u}{v} + 2\right)\left(\frac{u}{v} + 1\right),$$

故

$$f(u, v) = (u + 2v)(u + v)v.$$

(2) 设  $x_0$  是  $f(u(X), v(X)) = 0$  的  $n$  重根, 以  $u = u(x_0), v = v(x_0)$  代入(\*)式, 可知必有一个因子为 0, 而且只有这一个因子为 0, 不妨设为  $u(x_0) - a_1 v(x_0) = 0$ , 事实上, 在  $uv$  平面上(见图 1.1), (\*)式代表  $m+1$  条互异直线  $l_i: u - a_i v = 0$ , 第  $i$  个因子(代入后)为 0, 意味着  $P_0 = (u(x_0), v(x_0))$  在  $l_i$  上. 而  $P_0$  在  $l_i$  上, 又在  $l_j$  上( $i \neq j$ )则意味着  $P_0$  为原点, 即  $u(x_0) = v(x_0) = 0$ , 与  $u(X), v(X)$  互素矛盾.

(3) 于是

$$f(u'(X), v'(X)) = a_0(u'(X) - a_1 v'(X)) \cdots (u'(X) - a_m v'(X))v(X), \quad (**)$$

且以  $X = x_0$  代入后第一个因子为 0, 即

$$u'(x_0) - a_1 v'(x_0) = 0 \quad (\text{因 } n > 1, \text{ 故 } x_0 \text{ 是其 } n-1 \text{ 重根}),$$

由  $u'(X)$  与  $v'(X)$  互素, 可知  $x_0$  不是其余因子的根(与(2)同理).

注 若无条件“ $u'(X)$  与  $v'(X)$  互素”则不可. 反例如下: 设  $f(u, v) = uv, u(X) = X^5, v(X) = X^5 + 1$ , 则  $f(u, v) = X^5(X^5 + 1)$  有 5 重根  $x_0 = 0$ , 而  $f(u'(X), v'(X)) = 25X^8$  有 8 重根  $x_0 = 0$ .

30. 用  $X-a, X-b, X-c$  除  $f(X)$  的余式依次为  $r, s, t$ . 试求用  $g = (X-a)(X-b)(X-c)$  除  $f(X)$  的余式.

解 由已知

$$f(X) = (X-a)q_1 + r, \quad \text{所以 } r = f(a),$$

$$f(X) = (X-b)q_2 + s, \quad \text{所以 } s = f(b),$$

$$f(X) = (X-c)q_3 + t, \quad \text{所以 } t = f(c).$$

设  $f(X) = (X-a)(X-b)(X-c)q + d$ , 则  $\deg d \leq 2, d(X)$  为二次函数, 且在  $a, b, c$  三点取值  $r, s, t$ , 所以由 Lagrange 插值公式有

$$d(X) = r \frac{(X-b)(X-c)}{(a-b)(a-c)} + s \frac{(X-a)(X-c)}{(b-a)(b-c)} + t \frac{(X-a)(X-b)}{(c-a)(c-b)}.$$

31. 试求 7 次多项式  $f(X)$ , 使  $f(X) + 1$  能被  $(X-1)^4$  整除, 而  $f(X) - 1$  能被  $(X+1)^4$  整除.

解 方法 1 因为  $X=1$  是  $f(X)+1$  的 4 重根, 所以  $X=1$  是  $f'(X)$  的三重根. 同理可得  $X=-1$  是  $f'(X)$  的三重根. 又因为  $\deg f'(X) < \deg f(X) = 7$ , 故  $\deg f'(X) = 6$ , 于是设

$$f'(X) = a(X-1)^3(X+1)^3 = a(X^6 - 3X^4 + 3X^2 - 1) \quad (a \text{ 待定}),$$




图 1.1



积分得

$$f(X) = a\left(\frac{1}{7}X^7 - \frac{3}{5}X^5 + X^3 - X\right) + b.$$

又由已知  $f(1) = -1, f(-1) = 1$ , 可得

$$\begin{cases} a\left(\frac{1}{7} - \frac{3}{5}\right) + b = -1, \\ a\left(-\frac{1}{7} + \frac{3}{5}\right) + b = 1, \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = \frac{35}{16}, \\ b = 0. \end{cases}$$

所以 
$$f(X) = \frac{5}{16}X^7 - \frac{21}{16}X^5 + \frac{35}{16}X^3 - \frac{35}{16}X.$$

解 方法2 设  $f(X) = (X-1)^4 q_1 - 1 = (X+1)^4 q_2 + 1$  则有

$$f(-X) = (X+1)^4 q_1(-X) - 1 = (X-1)^4 q_2(-X) + 1$$

故  $f(-X) = -f(X).$

于是可设

$$f(X) = AX^7 + BX^5 + CX^3 + DX.$$

再利用  $f(1) = -1, (X-1)^4 \mid f(X)+1$ , 得方程组

$$\begin{cases} A+B+C+D = -1, \\ 4B+20A = 1, \\ -84A-20B = 0, \\ 35A+10B+C = 0. \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = 5/16, \\ B = -21/16, \\ C = 35/16, \\ D = -35/16. \end{cases}$$

32. 试求  $p, q, n$  使  $X^4 + pX^n + q$  有三重根 ( $0 < n < 4$ )

解 由已知该三重根满足

$$\begin{cases} f(X) = X^4 + pX^n + q = 0, & (1) \\ f'(X) = 4X^3 + npX^{n-1} = 0, & (2) \\ f''(X) = 12X^2 + n(n-1)pX^{n-2} = 0, & (3) \\ f'''(X) = 24X + n(n-1)(n-2)pX^{n-3} \neq 0. & (4) \end{cases}$$

若  $p=0$ , 则使(2), (3)只有零解, 而  $X=0$  也使(4)为0, 所以必  $p \neq 0$ ;

又  $n=1$  时, (3)只有零解, 这又使  $f'''(X)=0$ , 故  $n \neq 1$ ; 当  $n=2$  时

$$\begin{cases} f'(X) = 2X(2X^2 + p) = 0 \rightarrow X_1 = 0, X_{2,3}^2 = -\frac{p}{2} \\ f''(X) = 2(6X^2 + p) = 0 \rightarrow X_{1,2}^2 = -\frac{p}{6} \end{cases} \quad \text{所以无解.}$$

当  $n=3$  时

$$\begin{cases} f'(X) = X^2(4X + 3p) = 0, \\ f''(X) = 12X^2 + 6pX = 0, \end{cases} \quad \text{故 } X = 0.$$

此时  $f'''(X) \neq 0$ , 即(4)式成立, 且要使(1)成立必须  $q=0$ .

所以当且仅当  $n=3, p \neq 0, q=0$  时,  $X^4 + pX^3 + q$  有三重根.

33. 在  $\mathbf{R}[X]$  中分解:  $X^{2n}-1, X^{2n+1}-1, X^{2n+1}+1, X^{2n}+1$ .

解 因为

$$X^m - 1 = \prod_{k=0}^{m-1} (X - \omega_k), \quad \omega_k = e^{i\frac{2k\pi}{m}}$$

其中  $1, \omega_1, \omega_2, \dots, \omega_{m-1}$  为 1 的  $m$  次单位根. 又因为实系数多项式复根共轭出现, 而

$$(X - \omega_k)(X - \omega_{m-k}) = \left(X^2 - 2\cos\frac{2k\pi}{m}X + 1\right),$$

当  $m$  为偶数时,  $\pm 1$  均为根,  $m$  为奇数时只有 1 为根, 即  $m=2n$  时, 有

$$X^{2n} - 1 = (X^2 - 1) \prod_{k=1}^{n-1} \left(X^2 - 2X\cos\frac{k\pi}{n} + 1\right); \quad (1)$$

$m=2n+1$  时, 有

$$X^{2n+1} - 1 = (X - 1) \prod_{k=1}^n \left(X^2 - 2X\cos\frac{2k\pi}{2n+1} + 1\right); \quad (2)$$

同理

$$X^m + 1 = \prod_{k=0}^{m-1} (X - \zeta_k), \quad \zeta_k = e^{i\frac{\pi+2k\pi}{m}},$$

当  $m$  为偶数时, 无实根, 当  $m$  为奇数时,  $-1$  为根, 即有  $m=2n+1$  时

$$X^{2n+1} + 1 = (X + 1) \prod_{k=1}^n \left(X^2 - 2X\cos\frac{(2k-1)\pi}{2n+1} + 1\right), \quad (3)$$

$m=2n$  时,

$$X^{2n} + 1 = \prod_{k=1}^n \left(X^2 - 2X\cos\frac{2k-1}{2n}\pi + 1\right). \quad (4)$$

34. 证明  $\cos\frac{\pi}{2n+1}\cos\frac{2\pi}{2n+1}\cdots\cos\frac{n\pi}{2n+1} = \frac{1}{2^n}$ .

证 在 33 题(2)式中, 令  $X = -1$  得

$$-2 = -2 \prod_{k=1}^n 2 \left(1 + \cos\frac{2k\pi}{2n+1}\right) = (-2)2^n \prod_{k=1}^n 2\cos^2\frac{k\pi}{2n+1},$$

两端同除  $(-2)2^{2n}$  即得

$$\frac{1}{2^{2n}} = \prod_{k=1}^n \cos^2\frac{k\pi}{2n+1} \text{ 再开方即得结论.}$$

35. 证明  $\sin\frac{\pi}{2n} \cdot \sin\frac{2\pi}{2n} \cdots \sin\frac{(n-1)\pi}{2n} = \sqrt{n}/2^{n-1}$ .

证 由 33 题(1)式有

$$\prod_{k=1}^{n-1} \left(X^2 - 2X\cos\frac{k\pi}{n} + 1\right) = \frac{X^{2n} - 1}{X^2 - 1} = X^{2(n-1)} + X^{2(n-2)} + \cdots + X^2 + 1,$$

两边用  $X=1$  代入得

$$\prod_{k=1}^{n-1} \left(2 - 2\cos\frac{k\pi}{n}\right) = \prod_{k=1}^{n-1} 2 \cdot 2\sin\frac{k\pi}{2n} = n,$$

两边同除以  $2^{2(n-1)}$  并开方得

$$\prod_{k=1}^{n-1} \sin\frac{k\pi}{2n} = \frac{\sqrt{n}}{2^{n-1}}.$$

36.  $X^n - 1 \mid X^m - 1$  的条件是什么? 证明之.

解 设  $\omega_k = e^{i\frac{2k\pi}{n}}$ ,  $k=0,1,\dots,n-1$  为  $n$  次单位根,  $\zeta_k = e^{i\frac{2k\pi}{m}}$ ,  $k=0,1,\dots,m-1$  为  $m$  次单位根, 则有

$$X^n - 1 = (X-1)(X-\omega_1)\cdots(X-\omega_{n-1}), \quad (1)$$

$$X^m - 1 = (X-1)(X-\zeta_1)\cdots(X-\zeta_{m-1}). \quad (2)$$

由已知(1)的因子都是(2)的因子, 即  $n$  次单位根都是  $m$  次单位根. 所以条件是,  $m$  是  $n$  的倍数, 即

$$n \mid m.$$

37. 求  $a, b$  使  $X^4 + 2X^3 - 21X^2 + aX + b$  的根为等差数列, 并求出此数列.

解 记根为  $x_1, x_2 = x_1 + d, x_3 = x_1 + 2d, x_4 = x_1 + 3d$ , 则由根与系数的关系有

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = -2, & (1) \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1x_2 + x_1x_3 + x_1x_4 + x_2x_3 + x_2x_4 + x_3x_4 = -21, & (2) \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1x_2x_3 + x_1x_2x_4 + x_1x_3x_4 + x_2x_3x_4 = -a, & (3) \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1x_2x_3x_4 = b. & (4) \end{cases}$$

由(1),(2)两式得

$$\begin{cases} 2x_1 + 3d = -1, & (1)' \end{cases}$$

$$\begin{cases} 6x_1^2 + 18x_1d + 11d^2 = -21, & (2)' \end{cases}$$

由(1)'得  $x_1 = (-1-3d)/2$  代入(2)'中解得  $d^2 = 9$ ,  $d = \pm 3$

于是等差数列为

$$-5, -2, 1, 4 \quad \text{或} \quad 4, 1, -2, -5.$$

代入(3),(4)中得

$$a = -22, \quad b = 40.$$

38. 求  $p, q, r$  间的关系, 使  $X^3 + pX^2 + qX + r$  的根为等比数列.

解 记三个根为  $x_1, x_1d, x_1d^2$  则由根与系数的关系有

$$\begin{cases} x_1 + x_1d + x_1d^2 = x_1(1+d+d^2) = -p, & (1) \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1^2d + x_1^2d^2 + x_1^2d^3 = x_1^2d(1+d+d^2) = q, & (2) \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1^3d^3 = -r. & (3) \end{cases}$$

(1),(3)代入(2)中有

$$\sqrt[3]{-r} \cdot (-p) = q \rightarrow p^3r = q^3.$$

39. 把下列多项式分解为有理数及  $\mathbf{Z}[X]$  中本原多项式的积:

$$3X^2 + 12X + 21, \quad X^3/2 + X^2/3 + X + 5.$$

解 (1)  $3X^2 + 12X + 21 = 3(X^2 + 4X + 7)$ ;

$$(2) \frac{X^3}{2} + \frac{X^2}{3} + X + 5 = \frac{1}{6}(3X^3 + 2X^2 + 6X + 30).$$

40. 在  $\mathbf{Z}[X]$  中求  $12X^2 + 6X - 6$  的所有因子

解  $12X^2 + 6X - 6 = 6(2X^2 + X - 1) = 2 \cdot 3 \cdot (X+1)(2X-1).$

41. 求出下列多项式在  $\mathbf{Q}[X]$  中的不可约因子:

$$X^3 - 1001X^2 - 1; \quad X^4 + 50X^2 + 2.$$

解 由定理 1.19, 若整系数多项式  $X^3 - 1001X^2 - 1 = 0$  有有理根  $\frac{b}{a}$ , 则  $a \mid 1, b \mid -1$ , 故根只能为  $\pm 1$ , 把  $\pm 1$  代入知均不是根, 故没有一次因子, 于是也没有二次因子 (因为三次式分解出二次式就得有一个一次式), 因此不可约.

第二个式子可写为  $Y^2 + 50Y + 2$ , 因为没有有理根, 所以也不能分解.

\* 42. 设  $f(X), g(X)$  是  $F[X]$  中互素多项式, 求证  $Yf(X) + g(X)$  在  $F[X, Y]$  中不可约.

证 把此多项式看成为不定元  $Y$  的以  $F[X]$  中元素为系数的多项式  $(F[X])[Y]$ , 因  $f(X), g(X)$  互素, 故作为  $Y$  的多项式是本原的, 又是一次的, 所以不可约.

43. 下列多项式中哪些是在  $\mathbf{Q}$  上不可约的?

(1)  $X^3 + 2X^2 + 8X + 2$ , (2)  $X^3 + 2X^2 + 2X + 4$ , (3)  $X^{17} - 37$ , (4)  $X^4 + 21$ .

解 (1) 取  $p=2$ , 由  $p \nmid a_n, p \mid a_i, p^2 \nmid a_0$  利用 Eisenstein 判别法知: (1) 不可约.

(2) 由定理 1.19 知此多项式的根只可能是  $\pm 4, \pm 1$  或  $\pm 2$ , 代入知  $X = -2$  为根. 或由

$$X^3 + 2X^2 + 2X + 4 = X^2(X+2) + 2(X+2) = (X+2)(X^2+2),$$

故可约.

(3) 用 Eisenstein 判别法知不可约.

(4) 已知  $X^4 = -21$ , 故此方程只有复根, 所以  $X^4 + 21$  在  $\mathbf{Q}$  上不可约.

44. 证明: 若  $f(X) \in F[X]$  不可约, 则  $f(X+a)$  也不可约 ( $a \in F$ ).

证 用反证法. 若有  $f(X+a) = f_1(X) \cdot f_2(X)$ ,  $f_1, f_2$  为非常数, 作代换  $X+a=Y$  有

$$f(Y) = f_1(Y-a) f_2(Y-a) = g_1(Y) \cdot g_2(Y),$$

因为  $f_1(Y-a)$  与  $f_1(Y)$  首项同, 所以  $g_1(Y), g_2(Y)$  仍非常数, 与已知  $f(X)$  不可约矛盾.

45. 设  $f(X) = \sum_{i=0}^n a_i X^i \in \mathbf{Z}[X], \deg f = n > k$ , 且对素数  $p$  满足:

$$a_n \not\equiv 0, a_k \not\equiv 0, a_{k-1} \equiv \cdots \equiv a_0 \equiv 0 \pmod{p}, a_0 \not\equiv 0 \pmod{p^2}.$$

试证明  $f(X)$  有一个次数至少为  $k$  的不可约因子.

证 (1) 若  $f(X)$  不可约, 命题已证.

(2) 设  $f(X) = f_1 \cdots f_s$ , 其中  $f_i$  不可约, 并设其常数项为  $a_{i0}$ , 则

因为  $p \mid a_0 = a_{10} a_{20} \cdots a_{s0}$ , 所以  $\exists l$ , 使  $p \mid a_{l0}$ , 重新记  $g(X) = f_l(X)$ ,  $h(X) = \prod_{i \neq l} f_i(X) = \sum b_j X^j$ , 在  $g(X)$  中有  $p \mid a_{l0}, \dots, p \nmid a_{lm}$  (因为若  $p$  能整除  $f_l(X)$  的所有系数, 则  $p \mid f(X)$  与已知矛盾, 所以  $\exists m$ , 使  $p \nmid a_{lm}$ ).

考虑  $f(X) = g(X)h(X)$  两边  $X^m$  项的系数,

$$a_m = a_{lm} \cdot b_0 + a_{lm-1} \cdot b_1 + a_{lm-2} b_2 + \cdots + a_{l0} b_m,$$

因为  $p \mid a_{lm-1}, \dots, p \mid a_{l0}$ , 而  $p \nmid a_{lm} b_0$ , (注意  $p \nmid b_0$ )

所以  $p \nmid a_m$ ,

由已知得  $m=k$ ,

故  $\deg f_l(X) \geq m = k$ .

\* 46. 设  $f(X) = \sum_{i=0}^{2n+1} a_i X^i \in \mathbb{Z}[X]$ , 次数为  $2n+1$ , 试证明由下列条件可知  $f(X)$  不可约: 对素数  $p$  满足  $a_{2n+1} \not\equiv 0 \pmod{p}$ ,  $a_{2n} \equiv \cdots \equiv a_{n+1} \equiv 0 \pmod{p}$ ,  $a_n \equiv \cdots \equiv a_0 \equiv 0 \pmod{p^2}$ ,  $a_0 \not\equiv 0 \pmod{p^3}$ .

证 设  $f = g_1 \cdot g_2 = \left(\sum_{i=0}^n b_i X^i\right) \left(\sum_{i=0}^m c_i X^i\right)$ ,

因为  $p \mid a_0 = b_0 c_0$ , 所以可设  $p \mid b_0$ , 且设

$$p \mid b_0, b_1, \dots, b_{s-1}, \text{ 但 } p \nmid b_s, s < h \quad (\because f \not\equiv 0 \pmod{p})$$

由  $p \mid a_s = b_s c_0 + b_{s-1} c_1 + \cdots + b_0 c_s \quad (*)$

知  $p \mid c_0$ , 同样知  $p \mid c_1, \dots, p \mid c_{2n-s+1}$  (因为  $f \equiv a_{2n+1} X^{2n+1} \pmod{p}$ ),

若  $s \leq n$ , 则由  $(*)$  式知  $p^2 \mid b_s c_0$  (因为  $p^2 \mid a_s, p^2 \mid b_{s-1} c_1, \dots, b_0 c_s$ ), 所以  $p^2 \mid c_0$  与  $p^3 \nmid a_0$  矛盾.

若  $s > n$ , 则  $t = 2n - s + 1 \leq n$ , 由  $p^2 \mid a_t$ , 则  $t$  相当于上一种情况中  $s$ , 所以由  $(*)$  亦得  $p^2 \mid c_0$ , 而  $a_0 = b_0 c_0$ , 所以  $p^3 \mid b_0 c_0$ , 与  $a_0 \not\equiv 0 \pmod{p^3}$  矛盾, 故知  $f(X)$  不可约.

\* 47. (1) 设  $f(X) \in \mathbb{Z}[X]$  为首一多项式, 若  $f(X) \pmod{p}$  不可约, 则  $f(X)$  不可约 ( $p$  为素数).

证 用反证法. 若  $f(X) = g(X)h(X)$ , 则

$$f(X) \equiv g(X)h(X) \pmod{p} \quad \text{即 } \bar{f} = \bar{g}\bar{h},$$

以下只要证明  $\bar{g}\bar{h} = \bar{g} \cdot \bar{h}$ , 事实上设

$$g(X) = \sum b_i X^i, \quad h(X) = \sum c_i X^i,$$

则

$$\begin{aligned} \bar{g}\bar{h} &= \overline{\sum_{i+j=k} (b_i c_j) X^k} = \sum_{i+j=k} \overline{(b_i c_j) X^k} \\ &= \sum_{i+j=k} (\bar{b}_i \bar{c}_j) X^k = \bar{g} \bar{h}. \end{aligned}$$

于是  $\bar{f}$  可约, 与已知  $f(X) \pmod{p}$  不可约矛盾.

(2) 设  $g(X)$  是  $f(X)$  在  $\mathbb{Z}[X]$  中的因子, 则  $g(X) \pmod{p}$  是  $f(X) \pmod{p}$  的因子.

证 由(1)的证明已得: 若  $g(X)$  是  $f(X)$  的因子, 则  $\bar{g}$  是  $\bar{f}$  的因子.

(3) 证明以下多项式在  $\mathbb{Q}$  上不可约:

$$\textcircled{1} X^3 + 6X^2 + 5X + 25, \quad \textcircled{2} X^3 + 6X^2 + 11X + 8, \quad \textcircled{3} X^4 + 8X^3 + X^2 + 2X + 5.$$

证  $\textcircled{1} \bar{f}(X) = X^3 + X + 1 \pmod{2}$  在  $F_2$  中不可约, 因为若可约, 就应分解为一次因子与二次因子的乘积, 它的根只可能为  $\bar{0}, \bar{1}$ , 而  $\bar{0}, \bar{1}$  代入均不为 0, 所以没有一次因子, 故不可约, 于是由(1)  $f$  不可约.

$\textcircled{2} \bar{g}(X) = X^3 + 2X + 2 \pmod{3}$  在  $F_3$  中不可约, 因为  $\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}$  均不是根, 所以没有一次因子, 于是由(1)  $g$  不可约.

$$\textcircled{3} \bar{h}(X) = X^4 + X^2 + 1 = (X^2 + X + 1)^2 \pmod{2}$$

所以或  $h(X)$  不可约, 或  $h(X)$  有两个 2 次因子, 设

$$\begin{aligned} h(X) &= (X^2 + aX \pm 5)(X^2 + bX \pm 1) \\ &= X^4 + (a+b)X^3 + (ab \pm 5 \pm 1)X^2 \pm (5b+a)X + 5. \end{aligned}$$

$$\text{所以} \begin{cases} a+b=8, & 1) \rightarrow a=8-b \\ ab \pm 6=1, & 2) \\ 5b+a=\pm 2, & 3) \rightarrow 8+4b=\pm 2 \end{cases} \Rightarrow \text{无解} \begin{pmatrix} \text{由 1), 3) 得 } a, b \text{ 值} \\ \text{与 2) 矛盾} \end{pmatrix}$$

所以不可约.

**\*\* 48.** (1) 设  $\mathbf{R}=F[t]$  是不定元  $t$  的多项式形式环, 试把 Eisenstein 定理推广到  $\mathbf{R}[X]$  多项式, 并证明之.

证 Eisenstein 定理的推广: 设

$$f(t, X) = a_n(t)X^n + a_{n-1}(t)X^{n-1} + \cdots + a_1(t)X + a_0(t)$$

若  $t \nmid a_n(t), t \mid a_i(t), i=0, 1, \cdots, n-1, t^2 \nmid a_0(t)$  则  $f(t, X)$  在  $\mathbf{R}[X]$  中不可约.

用反证法证明 设  $f(t, X) = g(t, X) \cdot h(t, X)$ , 其中  $g(t, X) = g_m(t)X^m + \cdots + g_1(t)X + g_0(t), h(t, X) = h_l(t)X^l + \cdots + h_1(t)X + h_0(t)$ , 则因  $t^2 \nmid a_0(t) = g_0(t) \cdot h_0(t)$ , 故可设  $t \nmid h_0(t)$ . 设  $g(t, X)$  的不能被  $t$  整除的最低次系数为  $g_k (k \leq m < n)$ , 则

$$a_k(t) = g_k h_0 + g_{k-1} h_1 + \cdots + g_0 h_k,$$

故  $t \nmid a_k$ , 而  $k \leq m < n$ , 与已知  $t \mid a_i(t), i=0, 1, \cdots, n-1$  矛盾, 所以必不可约.

(2) 用(1)中结果证明  $X^3 + 3t^5 X^2 + 5t^2 X^2 + t^7 X + 32t + t^3$  在  $F[t, X]$  中不可约.

证 因为  $t \nmid a_3(t) = 1, t \mid a_2(t) = 3t^5 + 5t^2, t \mid a_1(t) = t^7, t^2 \nmid a_0(t) = 32t + t^3$ , 所以满足(1)中定理条件, 故在  $F[t, X]$  中不可约.

**\* 49.** 设  $f(X) = a_0 + a_1 X + \cdots + a_n X^n \in \mathbf{Z}[X], |a_0| > |a_1| + \cdots + |a_n|, a_0$  为素数(或  $\sqrt{|a_0|} - \sqrt{|a_n|} < 1$ ), 则  $f(X)$  在  $\mathbf{Z}$  上不可约.

证 设  $x_i$  是  $f(X)$  的复根, 则必  $|x_i| > 1$ , (否则,  $|a_0| = |-a_1 x_1 - \cdots - a_n x_n^n| \leq |a_1| + \cdots + |a_n|$ ) 若

$$f = g \cdot h = (g_0 + g_1 X + \cdots + g_s X^s) \cdot (h_0 + h_1 X + \cdots + h_t X^t),$$

则  $a_0 = g_0 \cdot h_0$ , 而

$$|g_0| = |g_s| |x_1 x_2 \cdots x_s| > |g_s| \geq 1, \text{ 同样 } |h_0| > 1,$$

所以  $a_0$  是合素与已知矛盾, 故  $f$  在  $\mathbf{Z}$  上不可约. 或者由

$$|g_0| \geq |g_s| + 1, |h_0| \geq |h_t| + 1, \text{ 有}$$

$$\begin{aligned} |a_0| &= |g_0| |h_0| \geq (|g_s| + 1)(|h_t| + 1) = |g_s| |h_t| + |g_s| + |h_t| + 1 \\ &\geq |a_n| + 2\sqrt{|g_s| |h_t|} + 1 = |a_n| + 2\sqrt{|a_n|} + 1 \\ &= (\sqrt{|a_n|} + 1)^2. \end{aligned}$$

所以  $\sqrt{|a_0|} - \sqrt{|a_n|} > 1$ , 与已知矛盾, 故  $f$  在  $\mathbf{Z}$  上不可约.

**50.** 设  $f(X) = a_0 + \cdots + a_n X^n \in \mathbf{Z}[X]$ , 而  $a_0, a_0 + \cdots + a_n, a_0 - a_1 + \cdots + (-1)^n a_n$  均非 3 的倍数, 则  $f(X)$  无整数根.

证 若有整数根  $x$ , 则  $x \equiv 0$ , 或  $1$ , 或  $-1 \pmod{3}$  所以上述三式之一应  $\equiv 0 \pmod{3}$ , 即有

$$x \equiv 0 \text{ 时, } a_0 \equiv 0 \pmod{3}$$

$$x \equiv 1 \text{ 时, } a_0 + \cdots + a_n \equiv 0 \pmod{3},$$

$$x \equiv -1 \text{ 时, } a_0 - a_1 + \cdots + (-1)^n a_n \equiv 0 \pmod{3},$$

与已知矛盾,故  $f(X)$  无整数根.

51. 设  $n$  为正整数,试证明  $X^4+n$  在  $\mathbf{Q}$  上可约当且仅当  $n=4m^4 (m \in \mathbf{Z})$ .

证 设  $(X^4+n)=(X^2+a_1X+b_1)(X^2+a_2X+b_2)$ , 于是有

$$\begin{cases} a_1+a_2=0 \rightarrow a_1=-a_2 & (1) \\ b_1+b_2+a_1a_2=0 \rightarrow b_1+b_2=a_1^2 & (2) \\ (a_1b_1+a_2b_1)=0 \rightarrow a_1b_2+(-a_1b_1)=a_1(b_2-b_1)=0 & (3) \\ b_1b_2=n & (4) \end{cases}$$

由(3)式得或  $a_1=0 \rightarrow a_2=0$ , 又由(2)式  $b_1+b_2=0$ , 即  $b_1=-b_2$ , 知与(4)式矛盾, 所以此时无解; 或  $a_1 \neq 0$ , 而  $b_2=b_1$ , 代入式(4)得  $b_1^2=n$ , 故  $b_1=b_2=\sqrt{n}$ , 再代入式(2)有  $a_1^2=b_1+b_2=2\sqrt{n} \rightarrow a_1=\pm\sqrt{2\sqrt{n}}$ , 于是  $a_2=\mp\sqrt{2\sqrt{n}}=\mp\sqrt{2}\sqrt[4]{n}$ . 由题目要求  $a_1, a_2$  不能为实数(必须是有理数), 所以要消去  $\sqrt{2}$ , 必须有

$$\sqrt[4]{n}=\sqrt{2}m \rightarrow n=4m^4 \rightarrow a_1=\pm 2m, m \in \mathbf{Z}.$$

此时

$$(X^4+n)=(X^2+2mX+2m^2)(X^2-2mX+2m^2).$$

52. (1) 记  $f_n(X)=X^n+a_1X^{n-1}+\cdots+a_n$ , 其诸复数根的  $k$  次幂之和记为  $S_k(f_n(X))$  或  $S_k$ , 试证明当  $m \leq n$  时,  $S_k(f_n)=S_k(f_m) (1 \leq k \leq m)$ .

证 由已知

$$f_n(X)=X^n+a_1X^{n-1}+\cdots+a_{n-1}X+a_n, \quad (1)$$

$$f_m(X)=X^m+a_1X^{m-1}+\cdots+a_{m-1}X+a_m, \quad (2)$$

当  $k \leq m \leq n$  时,  $a_k$  相同. 设

$$f_n(X) \text{ 的复根为 } x_1, x_2, \dots, x_n, \text{ 则 } S_k(f_n)=x_1^k+x_2^k+\cdots+x_n^k.$$

$$f_m(X) \text{ 的复根为 } x_{10}, x_{20}, \dots, x_{m0}, \text{ 则 } S_k(f_m)=x_{10}^k+x_{20}^k+\cdots+x_{m0}^k.$$

把  $S_k(f_n)$  与  $S_k(f_m)$  均表为初等对称多项式的多项式, 则因首项为  $(\overbrace{k, 0, \dots, 0}^{n \uparrow})$  和  $(\overbrace{k, 0, \dots, 0}^{m \uparrow})$ , 所以要  $l_1+\cdots+l_k=k$ , 且  $l_1 \geq l_2 \geq l_3 \geq \cdots \geq l_n$ , 或

$$l_1+\cdots+l_m=k \quad \text{且} \quad l_1 \geq l_2 \geq \cdots \geq l_m.$$

因此可能的幂次均为

$$\begin{array}{c|c} \overbrace{(k, 0, \dots, 0)}^{n \uparrow} & \overbrace{(k, 0, \dots, 0)}^{m \uparrow} \\ (k-1, 1, 0, \dots, 0) & (k-1, 1, 0, \dots, 0) \\ (k-2, 2, 0, \dots, 0) & (k-2, 2, 0, \dots, 0) \\ (k-2, 1, 1, 0, \dots, 0) & (k-2, 1, 1, 0, \dots, 0) \\ \vdots & \vdots \\ \overbrace{(1, 1, \dots, 1, 0, \dots, 0)}^k & \overbrace{(1, 1, \dots, 1, 0, \dots, 0)}^k \end{array}$$

于是有

$$S_k(f_n)=\sigma_1^k+A_1\sigma_1^{k-1}\sigma_2+A_2\sigma_1^{k-2}\sigma_2^2+\cdots+A_l\sigma_1\sigma_2\cdots\sigma_k, \quad (3)$$

$$S_k(f_m) = \sigma_1^k + B_1 \sigma_1^{k-1} \sigma_2 + B_2 \sigma_1^{k-2} \sigma_2^2 + \cdots + B_l \sigma_1 \sigma_2 \cdots \sigma_k. \quad (4)$$

式(3)中  $\sigma_i = (-1)^i a_i$ , 式(4)中的  $\sigma_i = (-1)^i a_i$ , 故两式中  $\sigma_i$  相同 ( $i=1, 2, \cdots, k$ ), 用  $(x_1, x_2, \cdots, x_n) = (x_{10}, x_{20}, \cdots, x_{m0}, 0, \cdots, 0)$  代入计算得 (其中  $x_{10}, x_{20}, \cdots, x_{m0}$  任取)

$$A_i = B_i, \quad i = 1, 2, \cdots, l.$$

(2) 试证明当  $m \leq n$  时, 有牛顿公式

$$S_m + a_1 S_{m-1} + \cdots + a_{m-1} S_1 + m a_m = 0.$$

(3) 试证明当  $m > n$  时, 有牛顿公式

$$S_m + a_1 S_{m-1} + \cdots + a_n S_{m-n} = 0.$$

证 因为  $a_1 = -(x_1 + x_2 + \cdots + x_n) = -\sigma_1$ ,

$$\begin{aligned} \text{所以} \quad -a_1 S_{m-1} &= (x_1 + x_2 + \cdots + x_n)(x_1^{m-1} + \cdots + x_n^{m-1}) \\ &= S_m + S(x_1^{m-1} x_2). \end{aligned} \quad (1)$$

其中  $S(x_1^{m-1} x_2)$  是以  $x_1^{m-1} x_2$  为首项的对称多项式.

$$\begin{aligned} (-1)^2 a_2 S_{m-2} &= (x_1 x_2 + x_1 x_3 + \cdots + x_{n-1} x_n)(x_1^{m-2} + \cdots + x_n^{m-2}) \\ &= S(x_1^{m-1} x_2) + S(x_1^{m-2} x_2 x_3) \\ &\quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \end{aligned} \quad (2)$$

$$\begin{aligned} (-1)^j a_j S_{m-j} &= (x_1 x_2 \cdots x_j + \cdots + x_{n-j+1} \cdots x_n)(x_1^{m-j} + \cdots + x_n^{m-j}) \\ &= S(x_1^{m-j+1} x_2 \cdots x_j) + S(x_1^{m-j} x_2 \cdots x_{j+1}). \end{aligned} \quad (j)$$

当  $m \leq n$  时

$$\begin{aligned} (-1)^{m-1} a_{m-1} S_1 &= (x_1 \cdots x_{m-1} + \cdots + x_{n-m+1} \cdots x_n)(x_1 + \cdots + x_n) \\ &= S(x_1^2 x_2 \cdots x_{m-1}) + m \sigma_m. \end{aligned} \quad (m-1)$$

其中  $\sigma_m = (-1)^m a_m$ , 把第(i)式乘  $(-1)^{i-1}$  后全部相加得

$$-a_1 S_{m-1} - a_2 S_{m-2} - \cdots - a_{m-1} S_1 = S_m + m a_m,$$

移项即(2)题证毕.

当  $m > n$  时

$$\begin{aligned} (-1)^n a_n S_{m-n} &= x_1 \cdots x_n (x_1^{m-n} + x_2^{m-n} + \cdots + x_n^{m-n}) \\ &= S(x_1^{m-n+1} x_2 \cdots x_n). \end{aligned} \quad (n)$$

同样, 第(i)式乘  $(-1)^{i-1}$  后全部相加得

$$-a_1 S_{m-1} - a_2 S_{m-2} - \cdots - a_n S_{m-n} = S_m,$$

移项即(3)题证毕.

(4) 记  $\sigma_k = (-1)^k a_k$  (假定读者已知行列式算法, 见第2章), 试证:

$$S_m = \begin{vmatrix} \sigma_1 & 1 & & & \\ 2\sigma_2 & \sigma_1 & 1 & & \\ 3\sigma_3 & \sigma_2 & \sigma_1 & \ddots & \\ \vdots & \vdots & & \ddots & 1 \\ m\sigma_m & \sigma_{m-1} & \cdots & \cdots & \sigma_1 \end{vmatrix}, \quad \sigma_m = \frac{1}{m!} \begin{vmatrix} S_1 & 1 & & & \\ S_2 & S_1 & 2 & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \\ \vdots & \vdots & & \ddots & m-1 \\ S_m & \cdots & \cdots & \cdots & S_1 \end{vmatrix}$$

证 我们先证明第一个等式, 用第二数学归纳法. 因为由(1)已证得  $S_k(f_n) = S_k(f_m)$ , 所以只要计算  $S_k(f_m)$  即可. 当  $m=2$  时有



$$\begin{aligned}
S_2 &= x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1x_2 \\
&= \sigma_1^2 - 2\sigma_2 = \begin{vmatrix} \sigma_1 & 1 \\ 2\sigma_2 & \sigma_1 \end{vmatrix}.
\end{aligned}$$

假设对  $m \leq k-1$  均成立, 则当  $m=k$  时, 把行列式按最后一行展开有

$$\begin{aligned}
\Delta_k &= (-1)^{k+1} k \sigma_k \begin{vmatrix} 1 & & & \\ \sigma_1 & \ddots & & \\ \vdots & \ddots & \ddots & \\ \sigma_{k-1} & \cdots & \sigma_1 & 1 \end{vmatrix} + (-1)^k \sigma_{k-1} \begin{vmatrix} \sigma_1 & 0 & \cdots & 0 \\ * & 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ * & \cdots & * & 1 \end{vmatrix} \\
&\quad + (-1)^{k-1} \sigma_{k-2} \begin{vmatrix} \sigma_1 & 1 & & \\ 2\sigma_2 & \sigma_1 & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \\ * & & & 1 \end{vmatrix} + (-1)^{k-2} \sigma_{k-3} \begin{vmatrix} S_3 & & & \\ & 1 & & 0 \\ * & & \ddots & \\ & & * & 1 \end{vmatrix} \\
&\quad + \cdots + (-1)^{2k} \sigma_1 S_{k-1} \\
&= -(k \sigma_k (-1)^k + (-1)^{k-1} \sigma_{k-1} S_1 + (-1)^{k-2} \sigma_{k-2} S_2 + (-1)^{k-3} \sigma_{k-3} S_3 \\
&\quad + \cdots + (-1) \sigma_1 S_{k-1}) \\
&= -(a_1 S_{k-1} + \cdots + a_{k-3} S_3 + a_{k-2} S_2 + a_{k-2} S_1 + k a_k) \\
&= S_k.
\end{aligned}$$

上面最后一个等号由本题第(2)题已证得. 且对一切  $m$  均成立. 第一个等式证毕.

同理, 对第二式用数学归纳法. 当  $m=2$  时,

$$\text{因为 } \sigma_2 = \sum_{1 \leq i < j \leq n} x_i x_j = \frac{1}{2} \left[ \left( \sum_{i=1}^n x_i \right)^2 - \sum_{i=1}^n x_i^2 \right] = \frac{1}{2} (S_1^2 - S_2) = \frac{1}{2!} \begin{vmatrix} S_1 & 1 \\ S_2 & S_1 \end{vmatrix},$$

因  $\sigma_1 = S_1$  及  $S_3 = \sigma_1^3 - 3\sigma_1\sigma_2 + 3\sigma_3$ , 知

$$\begin{aligned}
\sigma_3 &= \frac{1}{3} (S_3 - \sigma_1^3 + 3\sigma_1\sigma_2) = \frac{1}{3} \left( S_3 - S_1^3 + 3S_1 \cdot \frac{1}{2} (\sigma_1^2 - S_2) \right) \\
&= \frac{1}{3!} (2S_3 + S_1^3 - 3S_1 S_2) \\
&= \frac{1}{3!} \begin{vmatrix} S_1 & 1 & 0 \\ S_2 & S_1 & 2 \\ S_3 & S_2 & S_1 \end{vmatrix}
\end{aligned}$$

假设对  $\leq m-1$  均成立, 当  $m$  阶时, 把右边行列式按最后一行展开有

$$\begin{aligned}
\text{右边} &= \frac{1}{m!} [(-1)^{m+1} S_m (m-1)! + (-1)^{m+2} S_{m-1} \cdot S_1 (m-1)! \\
&\quad + (-1)^{m+3} S_{m-2} \cdot \sigma_2 \cdot \frac{(m-1)!}{2} 2! + \cdots + (-1)^{2m-1} S_2 (m-1)(m-2)! \sigma_{m-2} \\
&\quad + (-1)^{2m} (m-1)! S_1 \cdot \sigma_{m-1}] \\
&= \frac{(-1)^{m+1}}{m} [S_m - S_{m-1} \sigma_1 + (-1)^2 S_{m-2} \sigma_2 + \cdots + (-1)^{m-2} \cdot S_2 \cdot \sigma_{m-2}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& +(-1)^{m-1}S_1\sigma_{m-1}] \\
& =\frac{(-1)^{m+1}}{m}(S_m+S_{m-1}a_1+S_{m-2}a_2+\cdots+S_2a_{m-2}+S_1a_{m-1}) \\
& =(-1)^m\cdot a_m=\sigma_m.
\end{aligned}$$

所以对一切  $m$ , 第二个公式成立.

为了简化以下习题的求解过程, 我们给出:

表对称多项式  $f(X_1, \cdots, X_n)$  为初等对称多项式的多项式  $\varphi(\sigma_1, \cdots, \sigma)$  的方法.

53. 对下列多项式的根, 求相应指出的对称多项式的值.

(1)  $X^5 - 3X^3 - 5X + 1, \quad \sum X_i^4.$

**解** 先把已知对称多项式写成初等对称多项式的多项式. 因为该对称多项式为 4 次齐次部分, 首项的幂排成数组为  $(4, 0, 0, 0, 0)$ , 满足三条件的所有可能的数组  $(l_1, l_2, l_3, l_4, l_5)$  为

$$\begin{aligned}
& (4, 0, 0, 0, 0), (3, 1, 0, 0, 0), (2, 2, 0, 0, 0) \\
& (2, 1, 1, 0, 0), (1, 1, 1, 1, 0).
\end{aligned}$$

所以设 
$$\sum X_i^4 = \sigma_1^4 + A\sigma_1^2\sigma_2 + B\sigma_2^2 + C\sigma_1\sigma_3 + D\sigma_4, \quad (*)$$

以下取  $(X_1, \cdots, X_5)$  的特殊值, 定出  $A, B, C, D$ .

取

$$(X_1, \cdots, X_5) = (1, 1, 0, 0, 0), \text{ 有 } \sigma_1 = 2, \sigma_2 = 1, \sigma_3 = \sigma_4 = 0,$$

$$(X_1, \cdots, X_5) = (2, 1, 0, 0, 0), \text{ 有 } \sigma_1 = 3, \sigma_2 = 2, \sigma_3 = \sigma_4 = 0$$

分别代入  $(*)$  式得 
$$\begin{cases} 2 = 16 + 4A + B \\ 16 + 1 = 81 + 18A + 4B \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = -4 \\ B = 2 \end{cases},$$

取

$$(X_1, \cdots, X_5) = (1, 1, 1, 0, 0), \text{ 有 } \sigma_1 = 3, \sigma_2 = 3, \sigma_3 = 1, \sigma_4 = 0.$$

$$(X_1, \cdots, X_5) = (1, 1, 1, 1, 0), \text{ 有 } \sigma_1 = 4, \sigma_2 = 6, \sigma_3 = 4, \sigma_4 = 1,$$

得

$$\begin{cases} 3 = 81 + 27A + 9B + 3C, \\ 4 = 4^4 + 16 \times 6A + 6^2A + 16C + D. \end{cases}$$

把  $A, B$  值代入, 解得

$$C = 4, \quad D = -4.$$

故 
$$\sum X_i^4 = \sigma_1^4 - 4\sigma_1^2\sigma_2 + 2\sigma_2^2 + 4\sigma_1\sigma_3 - 4\sigma_4.$$

当  $X_1, X_2, X_3, X_4, X_5$  为多项式  $X^5 - 3X^3 - 5X + 1$  的根时,  $\sigma_1 = 0, \sigma_2 = -3, \sigma_3 = 0, \sigma_4 = -5, \sigma_5 = -1$

于是得

$$\sum X_i^4 = 2(-3)^2 + (-4)(-5) = 38.$$

(2)  $X^3 + 3X^2 - X - 7, \quad \sum X_i^6.$

**解** 求解过程同(1), 结论为

$$\sum_{i=1}^3 X_i^6 = \sigma_1^6 - 6\sigma_1^4\sigma_2 + 9\sigma_1^2\sigma_2^2 + 6\sigma_1^3\sigma_3 - 2\sigma_2^3 - 12\sigma_1\sigma_2\sigma_3 + 3\sigma_3^2$$

当  $X_1, X_2, X_3$  为多项式  $X^3 + 3X^2 - X - 7$  的根时,

$$\sigma_1 = -3, \sigma_2 = -1, \sigma_3 = 7,$$

故 
$$\sum_{i=1}^3 X_i^6 = 59.$$

(3)  $X^3 - X - 1$ ,  $\sum X_i(X_j - X_k)^2 (\{i, j, k\} = \{1, 2, 3\}, \text{对各种可能求和}).$

解 因为  $\sum X_i(X_j - X_k)^2 = 2X_1^2X_2 + 2X_2^2X_3 + \dots,$

所以 
$$\sum X_i(X_j - X_k)^2 = 2\sigma_1\sigma_2 - 18\sigma_3.$$

当  $X_1, X_2, X_3$  为  $X^3 - X - 1$  的根时,

$$\sigma_1 = 0, \sigma_2 = -1, \sigma_3 = 1,$$

此时 
$$\sum X_i(X_j - X_k)^2 = -18.$$

(4)  $X^4 - 5X^2 - 2X + 1$ ,  $\sum (X_i - X_j)^2(X_k - X_l)^2, \{i, j, k, l\} = \{1, 2, 3, 4\}.$

解 由已知得

$$\begin{aligned} \sum (X_i - X_j)^2(X_k - X_l)^2 &= 16X_1^2X_2^2 + \dots, \\ &= 16\sigma_2^2 - 48\sigma_1\sigma_3 + 192\sigma_4. \end{aligned}$$

当  $X_1, X_2, X_3, X_4$  为  $X^4 - 5X^2 - 2X + 1$  的根时,

$$\sigma_1 = 0, \sigma_2 = -5, \sigma_3 = 2, \sigma_4 = 1$$

此时

$$\sum (X_i - X_j)^2(X_k - X_l)^2 = 592.$$

(5)  $X^n + \dots + X + 1$ ,  $\sum X_i^3X_j^3X_k^3, (1 \leq i < j < k \leq n, n > 8).$

解  $f(X_1, \dots, X_n) = \sum X_i^3X_j^3X_k^3$  是 9 次齐次对称多项式, 首项为  $X_1^3X_2^3X_3^3$ , 满足三条件的数组  $(l_1, l_2, \dots, l_n)$  全体为  $(3, 3, 3, 0, \dots, 0), (3, 3, 2, 1, 0, \dots, 0), (3, 2, 2, 2, 0, \dots, 0), (3, 3, 1, 1, 1, 0, \dots, 0), (3, 2, 2, 1, 1, 0, \dots, 0), (2, 2, 2, 2, 1, 0, \dots, 0), (3, 2, 1, 1, 1, 1, 0, \dots, 0), (2, 2, 2, 1, 1, 1, 0, \dots, 0), (3, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, \dots, 0), (2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 0, \dots, 0), (2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, \dots, 0), (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, \dots, 0).$  故令

$$\begin{aligned} f &= \sigma_3^3 + A\sigma_2\sigma_3\sigma_4 + B\sigma_1\sigma_4^2 + C\sigma_2^2\sigma_5 + D\sigma_1\sigma_3\sigma_5 + E\sigma_4\sigma_5 \\ &\quad + F\sigma_1\sigma_2\sigma_6 + G\sigma_3\sigma_6 + H\sigma_1^2\sigma_7 + I\sigma_2\sigma_7 + J\sigma_1\sigma_8 + K\sigma_9, \end{aligned}$$

取

$$(X_1, \dots, X_n) = (1, 1, 1, 1, 0, \dots, 0), (1, 1, 1, -1, 0, \dots, 0),$$

得

$$\begin{cases} 6A + B = -15 \\ B = 3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = -3, \\ B = 3. \end{cases}$$

取

$$\begin{aligned} (X_1, \dots, X_n) &= (1, 1, 1, 1, 1, 0, \dots, 0), (1, 1, 1, 1, -1, 0, \dots, 0), \\ &\quad (1, 1, 1, -1, -1, 0, \dots, 0), \end{aligned}$$

得

$$\begin{cases} 20C + 10D + E = 27 \\ -4C + 6D + 3E = -39 \\ 4C - 2D + E = 15 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C = 3 \\ D = -3 \\ E = -3 \end{cases}$$

取

$$(X_1, \dots, X_n) = (1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, \dots, 0), (1, 1, 1, 1, 1, -1, 0, \dots, 0),$$

得

$$\begin{cases} 9F + 2G = -15 \\ F = -3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} G = 6 \\ F = -3 \end{cases}$$

取

$$(X_1, \dots, X_n) = (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, \dots, 0), (1, 1, 1, 1, 1, 1, -1, 0, \dots, 0),$$

得

$$\begin{cases} 7H + 3I = 12 \\ 25H + 9I = 48 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} H = 3 \\ I = -3 \end{cases}$$

取  $(X_1, \dots, X_n) = (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, \dots, 0)$ , 知  $J = -3$ ,

取  $(x_1, \dots, X_n) = (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, \dots, 0)$ , 知  $K = 3$ , 则有

$$f = \sigma_3^3 - 3\sigma_2\sigma_3\sigma_4 + 3\sigma_1\sigma_4^2 + 3\sigma_2^2\sigma_5 - 3\sigma_1\sigma_3\sigma_5 - 3\sigma_4\sigma_5 - 3\sigma_1\sigma_2\sigma_6 + 6\sigma_3\sigma_6 \\ + 3\sigma_1^2\sigma_7 - 3\sigma_2\sigma_7 - 3\sigma_1\sigma_8 + 3\sigma_9.$$

当  $X_1, \dots, X_n$  为  $X^n + \dots + X + 1$  的根时, 有

$$\sigma_1 = \sigma_3 = \sigma_5 = \sigma_7 = \sigma_9 = -1,$$

$$\sigma_2 = \sigma_4 = \sigma_6 = \sigma_8 = 1,$$

$$\begin{aligned} \text{所以 } f &= (-1)^3 - 3 \times (-1) + 3 \times (-1) + 3 \times (-1) - 3 \times (-1) - 3 \times (-1) \\ &\quad - 3 \times (-1) + 6 \times (-1) + 3 \times (-1) - 3 \times (-1) - 3 \times (-1) \\ &\quad + 3 \times (-1) \\ &= -1. \end{aligned}$$

**54.** 用初等对称函数表示下列对称多项式,

$$(1) (X_1 + X_2 + X_1X_2)(X_2 + X_3 + X_2X_3)(X_1 + X_3 + X_1X_3)$$

**解** 因为  $f(X_1, X_2, X_3) = f_6 + f_5 + f_4 + f_3$ ,

其中  $f_6$  是 6 次齐次多项式, 它的首项为  $X_1^2 X_2^2 X_3^2$ , 所以  $f_6 = \sigma_3^2$ ;  $f_5$  是 5 次齐次多项式, 它的首项为  $2X_1^2 X_2^2 X_3$ , 所以  $f_5 = 2\sigma_2\sigma_3$ ;  $f_4$  的首项为  $X_1^2 X_2^2$  (后项为  $X_1^2 X_2 X_3$ ), 所以可设  $f_4 = \sigma_2^2 + A\sigma_1\sigma_3$ , 又

$$f_4 = X_1 X_2 (X_2 + X_3)(X_1 + X_3) + X_2 X_3 (X_1 + X_2)(X_1 + X_3) \\ + X_1 X_3 (X_1 + X_2)(X_2 + X_3),$$

取  $(X_1, X_2, X_3) = (1, 1, -1)$ , 则  $\sigma_1 = 1, \sigma_2 = -1, \sigma_3 = -1$ , 代入 (\*) 式得  $0 = 1 + A(-1)$ , 所以  $A = 1$ .

$f_3$  的首项为  $X_1^2 X_2$  (后项为  $X_1 X_2 X_3$ ), 有

$$f_3 = (X_1 + X_2)(X_2 + X_3)(X_1 + X_3) = \sigma_1\sigma_2 + B\sigma_3,$$

取  $(X_1, X_2, X_3) = (1, 1, -1)$  代入得  $B = -1$ .

$$\text{所以 } f(X_1, X_2, X_3) = \sigma_1\sigma_2 + \sigma_1\sigma_3 + \sigma_2^2 + 2\sigma_2\sigma_3 - \sigma_3 + \sigma_3^2.$$

$$(2) (X_1^2 + X_2 X_3)(X_2^2 + X_1 X_3)(X_3^2 + X_1 X_2)$$

解 首项为  $X_1^4 X_2 X_3$ , 所以  $(l_1, l_2, l_3)$  可以取为  $(4, 1, 1), (3, 3, 0), (3, 2, 1), (2, 2, 2)$ .  
经计算得

$$f(X_1, X_2, X_3) = \sigma_1^3 \sigma_3 + \sigma_2^3 - 6\sigma_1 \sigma_2 \sigma_3 + 8\sigma_3^2.$$

$$(3) X_1^3 X_2 X_3 + X_1 X_2^3 X_3 + X_1 X_2 X_3^3$$

$$\text{答 } f(X_1, X_2, X_3) = \sigma_1^2 \sigma_3 - 2\sigma_2 \sigma_3.$$

$$(4) X_1^3 X_2^3 X_3 X_4 + \cdots + X_1 X_2 X_3^3 X_4^3$$

$$\text{答 } f = \sigma_2^2 \sigma_4 - 2\sigma_1 \sigma_3 \sigma_4 + 2\sigma_4^2.$$

55. 在  $\mathbb{Z}[X]$  中分解因式:

$$X^6 - 1, \quad X^8 - 1, \quad X^{12} - 1, \quad X^{32} - 1.$$

$$\text{解 } X^6 - 1 = (X-1)(X+1)(X^2+X+1)(X^2-X+1),$$

$$X^8 - 1 = (X-1)(X+1)(X^2+1)(X^4+1),$$

$$X^{12} - 1 = (X-1)(X+1)(X^2+1)(X^2+X+1)(X^2-X+1)(X^4-X^2+1),$$

$$X^{32} - 1 = (X-1)(X+1)(X^2+1)(X^4+1)(X^8+1)(X^{16}+1).$$

\* 56. 设  $F$  为域, 考虑  $F$  上的无限序列

$$f = (a_i) = (a_0, a_1, a_2, \cdots),$$

两个序列  $f = (a_i)$  和  $g = (b_i)$  的和定义为

$$(a_i) + (b_i) = (a_i + b_i)$$

积定义为  $(a_i)(b_i) = (c_i)$ , 其中

$$c_i = a_0 b_i + a_1 b_{i-1} + \cdots + a_i b_0,$$

试证明

(1)  $F$  上序列全体是含幺(乘法单位元)交换环;

(2)  $f = (a_i)$  可逆当且仅当  $a_0 \neq 0$ ;

(3) 记  $X = (0, 1, 0, 0, \cdots)$ ,

则

$$X^2 = (0, 0, 1, 0, \cdots),$$

$$X^3 = (0, 0, 0, 1, 0, \cdots).$$

记  $X^0 = (1, 0, 0, \cdots)$ , 则任一序列  $f$  可写为

$$f = (a_i) = \sum_{i=0}^{\infty} a_i X^i = a_0 X^0 + a_1 X + a_2 X^2 + \cdots$$

(于是  $F$  上无穷序列全体记为  $F[[X]]$ , 称为形式幂级数环);

(4) 设映射  $\varphi: F \rightarrow F[[X]]$ ,  $\varphi(a) = aX^0$ , 则  $\varphi$  是单射, 且保持  $F$  的加法和乘法, 即  $\varphi(a+b) = \varphi(a) + \varphi(b)$ ,  $\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b)$ . (由此可把  $F$  与  $F[[X]]$  等同, 即把  $a$  和  $aX^0$  等同, 从而  $F[[X]] = \{f = a_0 + a_1 X + a_2 X^2 + \cdots \mid a_i \in F\}$ );

(5)  $F[X]$  是  $F[[X]]$  的子环.

证 ① 显然  $F$  上序列全体对加法构成 Abel 群: 满足封闭性、结合律、有恒元  $(0, \cdots)$ ,  $(-a_i)$  是  $(a_i)$  的逆元且有交换律(因为  $(a_i) + (b_i) = (b_i) + (a_i)$ ). 对乘法是半群: 满足封闭性、结合律; 且可交换即  $(a_i)(b_i) = (b_i)(a_i)$ , 有单位元  $e = (1, 0, \cdots)$ , 对任意  $f$ , 有  $ef = fe = f$ . 乘法对加法有分配律. 故是含幺交换环.

② 若  $f$  可逆, 设  $f \cdot g = (1, 0, \dots)$ ,  $g = (b_i)$ , 则有  $a_0 b_0 = 1$ , 故  $a_0 \neq 0$ ;

反之, 若  $a_0 \neq 0$ , 则  $a_0$  在域  $F$  中可逆, 故从  $a_0 b_0 = 1, a_0 b_1 + a_1 b_0 = 0, a_0 b_2 + a_1 b_1 + a_2 b_0 = 0, a_0 b_3 + a_1 b_2 + a_2 b_1 + a_3 b_0 = 0, \dots$  中可逐一求出  $b_0, b_1, b_2, b_3$  等等, 即可得序列  $g = (g_i)$  满足  $fg = (1, 0, \dots)$ , 故  $f$  可逆.

③ 由序列乘法的定义, 显然有  $X^2 = (0, 0, 1, 0, \dots)$  等.

④ 若  $\varphi(a) = 0$ , 即  $aX^0 = 0$ , 故知

$$a(1, 0, \dots) = (a, 0, \dots) = (0, 0, \dots),$$

得  $a = 0$ , 于是知  $\varphi$  是单射. 又

$$\begin{aligned}\varphi(a+b) &= (a+b)X^0 = (a+b)(1, 0, \dots) = (a+b, 0, \dots) \\ &= (a, 0, \dots) + (b, 0, \dots) = aX^0 + bX^0 = \varphi(a) + \varphi(b), \\ \varphi(ab) &= (ab)X^0 = (ab, 0, \dots) = (a, 0, \dots)(b, 0, \dots) \\ &= (aX^0)(bX^0) = \varphi(a) \cdot \varphi(b).\end{aligned}$$

⑤ 因为任  $f \in F[X]$ , 有

$$\begin{aligned}f &= a_0 + a_1 X + \dots + a_n X^n \\ &= a_0 + a_1 X + \dots + a_n X^n + 0X^{n+1} + 0X^{n+2} + \dots \\ &\in F[[X]]\end{aligned}$$

所以  $F[X] \subset F[[X]]$

又  $F[X]$  和  $F[[X]]$  中的加法和乘法显然是是一致的.

\* 57. 设  $A$  是  $F[X]$  的非空子集且满足: ① 若  $f, g \in A$ , 则  $f-g \in A$ ; ② 若  $f \in A, h \in F[X]$ , 则  $hf \in A$ . 这样的子集  $A$  称为  $F[X]$  的一个理想. 试证:

(1) 条件①等价于  $A$  是 Abel 群;

(2) 举出  $F[X]$  的两个理想例子;

(3) 对  $F[X]$  中任意多个多项式  $\{f_i\}_{i \in S}$ , 集合

$$\langle f_i \rangle_{i \in S} = \left\{ \sum_{i \in S} h_i f_i \mid h_i \in F[X] \right\}$$

是  $F[X]$  的理想(称为  $\{f_i\}$  生成的理想);

(4)  $F[X]$  的任一理想  $A$  必是某多项式  $d[X]$  的倍式全体:

$$A = \{hd \mid h \in F[X]\} = \langle d \rangle,$$

且  $d(X)$  是  $A$  中多项式的最大公因子.

证 (1) 设条件①成立, 则  $A$  对加法封闭, 因对  $f, g \in A$ ,  $-g \in A$ , 故  $f+g = f-(-g) \in A$ . 又若  $f \in A$ ,  $0 = f-f \in A$ ,  $-f = 0-f \in A$ , 故  $A$  是 Abel 群.

(2)  $A =$  次数大于  $n$  的多项式全体和  $0$ .

$B =$  一个多项式  $f$  的倍式全体, 即

$$B = \{fg \mid g \in F[X]\}.$$

(3) 因为

$$\begin{aligned}\sum h_i f_i - \sum h_i^* f_i &= \sum (h_i - h_i^*) f_i \\ f(\sum h_i f_i) &= \sum (fh_i) f_i,\end{aligned}$$

所以  $\langle f_i \rangle_{i \in S}$  满足①, ②两条件, 故是理想.

(4) 任取  $A$  中一个次数最低的非零多项式  $g(X)$ , 则对任一  $f(X) \in A$ , 设

$$f(X) = g(X)q(X) + r(X), \quad \deg r(X) < \deg g(X),$$

于是  $r(X) = f - gq \in A$ . 如果  $r(X) \neq 0$ , 则与  $g(X)$  是  $A$  中次数最低的非零多项式矛盾, 故  $r(X) = 0, g(X) | f(X)$ . 也就是说  $A$  是  $g(X) = d(X)$  的倍式全体, 从而  $g(X)$  是  $A$  中多项式的因子; 因为  $g(X)$  本身属于  $A$ , 故  $g(X)$  是  $A$  中多项式的最大公因子.

\* 58. 设  $m(X) \in F[X]$  为非 0 多项式,  $f, g \in F[X]$  称为同余 (模  $m(X)$ ) 的意思是指  $m(X) | (f - g)$  (亦即  $f$  和  $g$  被  $m$  除的余式相同), 记为

$$f \equiv g \pmod{m},$$

试证明:

(1) 模  $m(X)$  同余是一种等价关系, 即  $f \equiv f \pmod{m}$ ; 若  $f \equiv g \pmod{m}$ , 则  $g \equiv f \pmod{m}$ ; 若  $f \equiv g, g \equiv h$ , 则  $f \equiv h \pmod{m}$ .

(2) 若  $f \equiv g \pmod{m}, f_1 \equiv g_1 \pmod{m}$ , 则

$$f + f_1 \equiv g + g_1 \pmod{m}, \quad ff_1 \equiv gg_1 \pmod{m}.$$

若  $f \equiv g \pmod{m}, d$  是  $f, g, m$  的公因子则

$$f/d \equiv g/d \pmod{m/d}.$$

若  $f \equiv g \pmod{m}, h$  是  $f, g$  的公因子, 而与  $m$  互素, 则

$$f/h \equiv g/h \pmod{m}.$$

(3) 按照(1),  $F[X]$  中多项式可按模  $m(X)$  同余关系分为若干类 (称为同余类): 同余者在同一类, 不同余者不在同一类. 则每个同余类可写为

$$f(X) + F[X]m(X) = \{f(X) + g(X)m(X) \mid g(X) \in F[X]\}$$

其中  $f(X)$  是该类中任一多项式.

(4) 记  $\bar{f} = f + F[X]m$ , 定义两个同余类的加法和乘法如下:

$$\bar{f} + \bar{g} = \overline{f + g}, \quad \bar{f} \cdot \bar{g} = \overline{f \cdot g}.$$

试证明此定义是合理的, 且  $F[X]$  模  $m(X)$  同余类全体  $F[X]/m(X)$  构成一个环.

(5) 对  $a \in F, a \rightarrow \bar{a} \in F[X]/\langle m(X) \rangle$  是单射. 从而常可记  $\bar{a} = a$ , 即视二者为等同.

(6) 设  $\deg m(X) = n$ , 则

$$F[X]/\langle m(X) \rangle = \{a_0 + a_1 \bar{X} + \cdots + a_{n-1} \bar{X}^{n-1} \mid a_i \in F\}.$$

(7) 当  $m(X) = p(X)$  为不可约多项式时,  $F[X]/\langle p(X) \rangle = E$  是域, 且包含  $F$ .

(8)  $\bar{X} \in E$  是  $p(X)$  的一个根, 记  $\alpha = \bar{X}$ , 则

$$\begin{aligned} E &= \{a_0 + a_1 \alpha + \cdots + a_{n-1} \alpha^{n-1} \mid a_i \in F\} = \{f(\alpha) \mid f(X) \in F[X]\} \\ &= \left\{ \frac{f(\alpha)}{g(\alpha)} \mid f, g \in F[X], g(\alpha) \neq 0 \right\}, \end{aligned}$$

因此  $E$  也称为添加  $p(X)$  的一个根到  $F$  生成.

(9) 对  $F = \mathbf{R}, p(X) = m(X) = X^2 + 1$ , 具体写出(4)至(8).  $E = \mathbf{R}[X]/\langle X^2 + 1 \rangle$  是你熟悉的域吗?

证 (1) ① 由  $m | f - f$ , 即  $m | 0$ , 知  $f \equiv f \pmod{m}$ ,

② 若  $f \equiv g \pmod{m}$ , 则  $m | f - g$ , 故  $m | g - f$ , 即  $g \equiv f \pmod{m}$ .

③ 若  $f \equiv g, g \equiv h$ , 则  $m \mid f-g, m \mid g-h$ . 因  $f-h = (f-g) + (g-h)$ , 故  $m \mid f-h$ , 即  $f \equiv h \pmod{m}$ .

(2) ① 由  $f \equiv g, f_1 \equiv g_1$ , 知  $m \mid f-g, m \mid f_1-g_1$ , 而

$$(f+f_1)-(g+g_1) = (f-g) + (f_1-g_1),$$

故

$$m \mid (f+f_1)-(g+g_1),$$

即

$$f_1+f \equiv g+g_1 \pmod{m}.$$

同样, 因

$$ff_1 - gg_1 = ff_1 - gf_1 + gf_1 - gg_1 = (f-g)f_1 + g(f_1-g_1),$$

故  $m \mid ff_1 - gg_1$ , 即  $ff_1 \equiv gg_1 \pmod{m}$ .

② 若  $d$  是  $f, g, m$  的公因子, 则可设

$$f = f_1d, \quad g = g_1d, \quad m = m_1d,$$

故由  $f \equiv g \pmod{m}$  知  $m \mid f-g$ , 即  $m_1d \mid f_1d - g_1d$ , 故  $m_1 \mid f_1 - g_1$ , 于是  $f_1 \equiv g_1 \pmod{m_1}$  即  $f/d \equiv g/d \pmod{m/d}$ .

③ 若  $h$  是  $f, g$  的公因子, 可设  $f = f_1h, g = g_1h$ , 由  $f \equiv g \pmod{m}$  知  $m \mid (f_1 - g_1)h$ , 且  $h$  与  $m$  互素, 故由定理 1.7 系 2 知  $m \mid f_1 - g_1$ , 即  $f_1 \equiv g_1 \pmod{m}$ , 也就是有  $f/h \equiv g/h \pmod{m}$ .

(3)  $f + F[X]m$  中元素显然属于同一类: 设  $f + g_1m$  和  $f + g_2m$  是其中任二元素, 则

$$(f + g_1m) - (f + g_2m) = (g_1 - g_2)m \text{ 是 } m \text{ 的倍式,}$$

故

$$f + g_1m = f + g_2m \pmod{m}.$$

另一方面, 与  $f$  同类的多项式  $h(X)$  必然在  $f + F[X]m$  中. 事实上, 因  $h$  与  $f$  同类, 故  $m \mid h-f$ , 于是  $h-f = mg$  (对某  $g \in F[X]$ ), 故

$$h = f + gm \in f + F[X]m.$$

(4) 定义的合理性: 设  $\bar{f} = \bar{f}_1$ , 即

$$f + F[X]m = f_1 + F[X]m,$$

只需验证  $\bar{f} + \bar{g} = \overline{f+g}, \bar{f}\bar{g} = \overline{fg}$ , 即要验证

$$\overline{f+g} = \overline{f_1+g_1}, \quad \overline{fg} = \overline{f_1g_1}.$$

由  $\bar{f} = \bar{f}_1$  知  $m \mid f - f_1$ , 故  $m \mid (f+g) - (f_1+g_1)$ ,  $m \mid fg - f_1g_1$ . 这就说明  $\overline{f+g} = \overline{f_1+g_1}$ ,  $\overline{fg} = \overline{f_1g_1}$ .

因为  $F[X]/\langle m(X) \rangle$  对加法封闭 (即  $\bar{f} + \bar{g} = \overline{f+g}$  仍是一个同余类), 满足结合律 (即  $(\bar{f} + \bar{g}) + \bar{h} = \bar{f} + (\bar{g} + \bar{h})$ ) 和交换律, 有零元 (即  $\bar{0} = F[X]m(X)$ ), 任一  $\bar{f}$  有负元  $-\bar{f} = \overline{-f}$ , 故  $F[X]/\langle m \rangle$  是加法 Abel 群. 又它对乘法封闭, 满足结合律, 还满足乘法对加法的分配律, 故是一个环.

(5) 对  $a, b \in F$ , 若  $\bar{a} = \bar{b}$ , 即  $m \mid a-b$ , 则只能是  $a-b=0$ ,  $\rightarrow a=b$ , 故  $a \mapsto \bar{a}$  是单射.

(6) 对任一  $f(X) \in F[X]$ , 设

$$f(X) = m(X)q(X) + r(X), \quad \deg r(X) < \deg m(X) = n \text{ 或 } r(X) = 0.$$

故

$$\bar{f}(X) = \bar{m}(X)\bar{q}(X) + \bar{r}(X) = \bar{r}(X).$$

若



$$r(X) = a_0 + a_1 X + \cdots + a_{n-1} X^{n-1},$$

则

$$\overline{f(X)} = \overline{r(X)} = \bar{a}_0 + \bar{a}_1 \bar{X} + \cdots + \bar{a}_{n-1} \bar{X}^{n-1} = a_0 + a_1 \bar{X} + \cdots + a_{n-1} \bar{X}^{n-1}$$

(因为  $a_i$  与  $\bar{a}_i$  等同).

(7)  $E$  中显然有乘法单位元  $\bar{1}=1$ . 任取  $E$  中一非 0 元  $\beta$ , 则  $\beta$  可写为  $\beta = \overline{r(X)}$ , 其中  $r(X) = a_0 + \cdots + a_{n-1} X^{n-1} \neq 0$ , 因为  $\deg r(X) < \deg p(X) = n$ , 故  $r(X)$  与  $p(X)$  互素, 故存在  $u(X), v(X)$  使

$$u(X)r(X) + v(X)p(X) = 1,$$

即

$$\overline{u(X)} \overline{r(X)} + \overline{v(X)} \overline{p(X)} = \bar{1}.$$

注意  $\overline{p(X)} = \overline{m(X)} = \bar{0} = 0$  ( $E$  中的零元素),  $\bar{1}=1$ . 故  $\overline{u(X)}\beta = 1$ , 即  $\beta$  可逆, 故  $E$  是域.

(8) 设  $p(X) = m(X) = p_0 + p_1 X + \cdots + p_n X^n$ , 则

$$\begin{aligned} p(\alpha) &= p(\bar{X}) = p_0 + p_1 \bar{X} + \cdots + p_n \bar{X}^n \\ &= \overline{p_0 + p_1 X + \cdots + p_n X^n} = \overline{p(X)} = \bar{0} = 0. \end{aligned}$$

故  $\alpha = \bar{X}$  是  $p(X)$  的根. 对任意  $f(X) \in F[X]$ , 设

$$f(X) = p(X)q(X) + r(X),$$

则

$$f(\alpha) = p(\alpha)q(\alpha) + r(\alpha) = r(\alpha),$$

故

$$E = \{f(\alpha) \mid f \in F[X]\}.$$

现设  $t = f(\alpha)/g(\alpha)$ ,  $g(\alpha) \neq 0$ ,  $f, g \in F[X]$ , 因为  $g(\alpha) \neq 0$ , 故  $g(\alpha) \in E$  有逆, 设为  $g(\alpha)^{-1} = h(\alpha)$ , 其中  $h(X) \in F[X]$ ,  $\deg h(X) < n$ . 则

$$t = f(\alpha)/g(\alpha) = f(\alpha)h(\alpha) \in E.$$

故

$$E = \{f(\alpha)/g(\alpha) \mid g(\alpha) \neq 0\}.$$

(9) 当  $F = \mathbf{R}$ ,  $p(X) = m(X) = X^2 + 1$  时,  $E = \mathbf{R}[X]/\langle X^2 + 1 \rangle$  是一个环, 包含  $\mathbf{R}$  (即  $a$  等同于  $\bar{a}$ ), 且

$$E = \{a_0 + a_1 \bar{X} \mid a_i \in \mathbf{R}\} = \{a + b\bar{X} \mid a, b \in \mathbf{R}\},$$

$E$  是一个域. 任一非零  $\beta \in E$  可表为  $\beta = a + b\bar{X} = \overline{a + bX}$ ,  $a + bX \neq 0$ . 因  $a + bX$  与  $X^2 + 1$  互素, 故

$$u(X)(a + bX) + r(X)(X^2 + 1) = 1,$$

故

$$\overline{u(X)} \overline{(a + bX)} = 1,$$

即  $\beta^{-1} = \overline{u(X)}$ . 记  $\bar{X} = i$ , 则知道  $i^2 = \bar{X}^2 = \overline{X^2} = -1$ , 故

$$E = \{a + b\bar{X}\} = \{a + bi \mid a, b \in \mathbf{R}\}, \text{ 即是复数域 } \mathbf{C}.$$

59. 判断下列多项式在  $\mathbf{Q}$  上是否可约 ( $p$  为奇素数):

$$f = X^p + pX + 1, \quad g = X^p - pX + 1.$$

$$\begin{aligned}\text{解 } f(X-1) &= X^p - pX^{p-1} + \frac{p(p-1)}{2}X^{p-2} - \cdots - \frac{p(p-1)}{2}X^2 + pX - 1 \\ &\quad + (pX - p) + 1 \\ &= X^p - pX^{p-1} + \cdots + 2pX - p,\end{aligned}$$

由 Eisenstein 判别法知,  $h(X) = f(X-1) \in \mathbb{Z}[X]$  不可约, 于是  $f(X)$  不可约. 否则由  $f(X) = f_1(X)f_2(X)$  有

$$f(X-1) = f_1(X-1)f_2(X-1), \text{ 即 } h(X) = h_1(X)h_2(X).$$

同理

$$g(X-1) = X^p - pX^{p-1} + \cdots - \frac{p(p-1)}{2}X^2 + p,$$

也不可约.

## 1.4 补充题与解答

1. 求次数最低的多项式  $f(X)$ , 使得  $f(X)$  被  $(X-1)^2$  除时余式为  $2X$ , 被  $(X-2)^3$  除时, 余式为  $3X$ .

解 由已知, 有

$$\begin{aligned}f(X) &= q_1(X-1)^2 + 2X = q_2(X-2)^3 + 3X = q_2[(X-1)-1]^3 + 3X \\ &= q_2[(X-1)^3 - 3(X-1)^2 + 3(X-1) - 1] + 3X.\end{aligned}$$

于是应有  $q_2(3X-4) + X$  是  $(X-1)^2$  的倍式,  $\deg q_2 \geq 1$ , 设  $q_2 = (aX+b)$ , 则  $(3X-4)(aX+b) + X = 3a(X-1)^2$ , 得

$$\begin{cases} -4a + 3b + 1 = -6a \\ -4b = 3a \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 4 \\ b = -3 \end{cases}$$

所以  $f(X) = (X-1)^3(4X-3) + 3X = 4X^4 - 27X^3 + 66X^2 - 65X + 24$ .

2. 设  $f(X) = X^3 + (1+t)X^2 + 2X + 2u$ ,  $g(X) = X^3 + tX^2 + u$  的最大公因式是一个二次多项式, 求  $t, u$  的值.

解 因为  $f(X) - g(X) = X^2 + 2X + u$ , 所以  $X^2 + 2X + u$  为最大公因式. 故  $(X^2 + 2X + u) | g(X)$ . 由长除法得关系式

$$\begin{cases} -u = 2(t-2) \\ u = u(t-2) \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} u = 0 \\ t = 2 \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} u = -2 \\ t = 3 \end{cases}.$$

3. 是否存在正整数  $n$ , 使  $7 | 2^n + 1$ ?

答 不存在. 设  $n = 3q + n_1$ , ( $0 \leq n_1 \leq 2$ ), 则

$$\begin{aligned}2^n + 1 &= 2^{3q+n_1} + 1 = 8^q \cdot 2^{n_1} + 1 \equiv 2^{n_1} + 1, \pmod{7} \\ &\equiv 2, 3, \text{ 或 } 5, \pmod{7} \text{ (当 } n_1 = 0, 1, \text{ 或 } 2 \text{)}.\end{aligned}$$

故  $2^n + 1 \not\equiv 0 \pmod{7}$ , 即  $7 \nmid 2^n + 1$ , (对任意正整数  $n$ ).

4. 是否存在整数  $b$  使  $7 | 2^n + b$  对任意正整数  $n$  成立?

答 不存在. 由 3 题有

$$2^n + b \equiv 2^{n_1} + b = \begin{cases} b+1 & \text{当 } n_1 = 0 \\ b+2 & \text{当 } n_1 = 1 \\ b+4 & \text{当 } n_1 = 2 \end{cases} \pmod{7},$$

故

$$2^n + b \equiv 0 \pmod{7} (\text{对任意正整数 } n) \Leftrightarrow b+1 \equiv b+2 \equiv b+4 \equiv 0 \pmod{7},$$

这不可能.

5. 设  $f(X) = X^5 + 3X^4 + X^3 + X^2 + 3X + 1$ ,  $g(X) = X^4 + 2X^3 + X + 2$ , 试求  $u(X)$ ,  $v(X)$ , 使  $u(X)f(X) + v(X)g(X) = (f(X), g(X))$ .

解 用辗转相除法得

$$(f, g) = X^3 + 1, \quad u(X) = -1, \quad v(X) = X + 1.$$

6. 已知  $f(X), g(X) \in F[X]$ , 且不全为零, 若存在  $u(X), v(X) \in F[X]$ , 使得  $uf + vg = (f, g)$ , 试证  $u(X), v(X)$  必互素.

证 因为  $uf + vg = (f, g)$ , 且  $(f, g) | f$ , 又  $(f, g) | g$ ,

所以 
$$u \frac{f}{(f, g)} + v \frac{g}{(f, g)} = 1,$$

其中  $\frac{f}{(f, g)}, \frac{g}{(f, g)}$  不全为 0, 由 Bezout 等式知  $u(X), v(X)$  互素.

## 第2章

# 行列式

### 2.1 定义与定理

**定义 2.1** 由  $1, 2, \dots, n$  组成的任一个有序数组  $i_1, \dots, i_n$  称为一个  $n$  级排列.

对一个排列  $i_1, \dots, i_n$ , 若  $i_p > i_q$  而  $p < q$ , 则称  $(i_p, i_q)$  为该排列的一个逆序, 排列  $i_1 \dots i_n$  的逆序总数记为  $\tau(i_1 i_2 \dots i_n)$ , 称为此排列的逆序数. 排列  $1 2 \dots n$  的逆序数为 0, 称为自然排列.

若  $\tau(i_1 i_2 \dots i_n)$  为奇数, 则称排列  $i_1 \dots i_n$  为奇排列, 否则称为偶排列.

互换一对数的操作称为对换.

**定理 2.1** 对换一次后, 排列的奇偶性改变.

**定理 2.2** 任一排列  $i_1 i_2 \dots i_n$  都可由自然排列经有限次对换得到, 且对换的次数与  $\tau(i_1 i_2 \dots i_n)$  的奇偶性相同.

**定义 2.2** 由  $m \times n$  个数  $a_{ij}$  (属于域  $F$ ,  $1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n$ ) 排成的数表

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

称为  $F$  上的一个  $m \times n$  矩阵, 也记为  $A = (a_{ij})_{m \times n}$ ,  $a_{ij}$  称为其  $(i, j)$  位置上元素. 有序数组

$(a_{i1}, \dots, a_{in})$  称为其第  $i$  行, 纵列数组  $\begin{pmatrix} a_{1j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{pmatrix}$  称为其第  $j$  列.  $n \times n$  矩阵也称为  $n$  阶方阵,  $a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}$  称为其对角元素.

两个  $m \times n$  矩阵  $A = (a_{ij})$  与  $B = (b_{ij})$  的和定义为  $A + B = (a_{ij} + b_{ij})$ ,  $\lambda \in F$  与  $A = (a_{ij})$  的“数乘”定义为  $\lambda A = (\lambda a_{ij})$ . 以  $M_{m \times n}(F)$  记元素属于  $F$  的  $m \times n$  矩阵全体.  $n$  阶方阵全体记为  $M_n(F)$ .

$1 \times n$  矩阵  $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ , 称为  $F$  上 ( $n$  数组) 行向量, 全体行向量记为  $F^n$ . 行向量的和定义为  $(a_1, \dots, a_n) + (b_1, \dots, b_n) = (a_1 + b_1, \dots, a_n + b_n)$ . 数  $\lambda \in F$  乘行向量定义为  $\lambda(a_1, \dots, a_n) = (\lambda a_1, \dots, \lambda a_n)$ .

**定义 2.3**  $F$  上方阵  $A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$  的行列式定义为  $F$  中数

$$\det A = \sum_{j_1 j_2 \cdots j_n} (-1)^{\tau(j_1 \cdots j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n},$$

其中  $j_1 j_2 \cdots j_n$  过  $1 2 \cdots n$  的所有排列.  $\det A$  称为  $n$  阶行列式. 有时也记为  $|A|$ .

**定理 2.3** (1) 行列式对行有**多线性性**. 也就是说对任意  $i (1 \leq i \leq n)$  及  $\alpha_i, \alpha_i^* \in F^n, \lambda, \mu \in F$ , 总有

$$\det \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_{i-1} \\ \lambda \alpha_i + \mu \alpha_i^* \\ \alpha_{i+1} \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} = \lambda \det \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_{i-1} \\ \alpha_i \\ \alpha_{i+1} \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} + \mu \det \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_{i-1} \\ \alpha_i^* \\ \alpha_{i+1} \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix};$$

(2) 行列式对行有**交错性**, 即若有两行相同, 则行列式值为 0;

(3) (**规范性**)  $\det I = 1$ , 其中  $I$  为单位方阵;

(4) 对换两行, 则行列式变号;

(5) 将一行的倍数加到另一行上去, 行列式值不变;

(6) 把行列式某一行元素皆乘以  $\lambda$ , 则行列式值是原值  $\lambda$  倍, 即

$$\det \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \lambda \alpha_i \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} = \lambda \det \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_i \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix};$$

(7) 若有两行成比例, 则行列式值为 0;

(8)  $\det A = \det A^T$ , 这里  $A^T$  称为  $A$  的**转置**, 即若  $A = (a_{ij})_{n \times n}$ , 则  $A^T = (b_{ij})_{n \times n}$ , 其中  $b_{ij} = a_{ji} (1 \leq i, j \leq n)$ .

性质(8)说明行列式中行与列的地位是相同的, 特别关于行的性质(1)至(7)对于列也都成立.

**定理 2.4** 定义在  $n$  阶方阵集上, 对于方阵的行有多线性、交错性、规范性的函数, 存在且唯一, 它就是行列式.

**推论** 定义于  $n$  阶方阵集上, 对方阵的行有多线性、交错性的函数  $f$  定为行列式的  $f(I)$  倍.

**定义 2.4** 设  $1 \leq i_1 < i_2 < \cdots < i_p \leq n, 1 \leq j_1 < j_2 < \cdots < j_p \leq n$ .  $n$  阶方阵  $A = (a_{ij})$  中位于第  $i_1, \cdots, i_p$  行和第  $j_1, \cdots, j_p$  列交叉处的元素按原序排成的方阵称为  $A$  的一个  $p$  阶子方阵, 记为  $A \begin{pmatrix} i_1 \cdots i_p \\ j_1 \cdots j_p \end{pmatrix}$ , 其行列式称为  $\det A$  的  $p$  阶子式, 记为

$$\det A \begin{pmatrix} i_1 \cdots i_p \\ j_1 \cdots j_p \end{pmatrix}.$$

从  $A$  中删去第  $i_1, \cdots, i_p$  行和第  $j_1, \cdots, j_p$  列所余下的元素按原序排成的  $n-p$  阶方阵称为

$$(-1)^{i_1+\cdots+i_p+j_1+\cdots+j_p} \det A \begin{pmatrix} i_{p+1} & \cdots & i_n \\ j_{p+1} & \cdots & j_n \end{pmatrix}$$

**定理 2.5** (Laplace 展开) 任意取定行列式的  $i_1, \dots, i_p (1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_p \leq n)$  行, 位于这些行上的所有可能的  $C_n^p$  个  $p$  阶子式与各自的代数余子式乘积的和, 等于原行列式. 即

其中  $i_1 \cdots i_n$  与  $j_1 \cdots j_n$  为  $1\ 2\ \cdots\ n$  的排列且  $i_{p+1} < i_{p+2} < \cdots < i_n, j_{p+1} < \cdots < j_n$ .

$$(1) \det(a_{ij}) = \sum_{j=1}^n a_{ij} A_{ij} \text{ (这称为按第 } i \text{ 行展开),}$$

**定理 2.6 (Cramer 法则)** 设  $n$  个变量  $x_1, \dots, x_n$  的线性方程组

的系数方阵  $A=(a_{ij})$  的行列式非 0, 则此方程组有唯一解

其中  $D_j$  是把  $|A|$  的第  $j$  列换为  $(b_1, \dots, b_n)^T$ .

$$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{is}b_{sj}.$$

**定理 2.7** 矩阵的乘法满足结合律,对加法的分配律,与数乘可交换.

**定义 2.6** 对方阵  $A$ , 若存在方阵  $B$  使得

则称  $A$  可逆, 称  $B$  为  $A$  的逆, 记为  $B=A^{-1}$ .

$$A^{-1} = (\det A)^{-1} A^* .$$

其中  $A^* = (A_{ji})$  称为  $A$  的古典伴随方阵,  $A^*$  的  $(i, j)$  位元素是  $a_{ji}$  的代数余子式  $A_{ji}$ .

**定理 2.9** (Binet-Cauchy) 设  $A$  与  $B$  分别为  $n \times s$  与  $s \times n$  矩阵, 则

$$\det AB = \begin{cases} 0, & \text{当 } n > s; \\ \det A \cdot \det B, & \text{当 } n = s; \\ \sum_{1 \leq k_1 < k_2 < \dots < k_n \leq s} \det A \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ k_1 & k_2 & \dots & k_n \end{pmatrix} \cdot \det B \begin{pmatrix} k_1 & k_2 & \dots & k_n \\ 1 & 2 & \dots & n \end{pmatrix}, & \text{当 } n < s. \end{cases}$$

**定理 2.10** 设  $AB=C$ , 其中  $A, B$  分别为  $n \times s, s \times m$  矩阵, 则乘积  $C$  的子式

$$\det C \begin{pmatrix} i_1 & \dots & i_r \\ j_1 & \dots & j_r \end{pmatrix} = \begin{cases} \sum_{1 \leq k_1 < \dots < k_r \leq s} \det A \begin{pmatrix} i_1 & \dots & i_r \\ k_1 & \dots & k_r \end{pmatrix} \cdot \det B \begin{pmatrix} k_1 & \dots & k_r \\ j_1 & \dots & j_r \end{pmatrix}, & \text{当 } r \leq s; \\ 0 & \text{当 } r > s. \end{cases}$$

**定义 2.7** 在方阵  $A = (a_{ij})$  中, ① 若  $i \neq j$  时,  $a_{ij} = 0$ , 则称  $A$  为对角形方阵; ② 若  $i > j$  时,  $a_{ij} = 0$ , 则称  $A$  为上三角形方阵; ③ 若  $i < j$  时,  $a_{ij} = 0$ , 则称  $A$  为下三角形方阵. 即

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & & & \\ & \ddots & & \\ & & a_{nn} & \end{bmatrix} \text{ 或 } A = \begin{bmatrix} a_{11} & \dots & \dots & a_{1n} \\ 0 & \ddots & & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & a_{nn} \end{bmatrix} \text{ 或 } A = \begin{bmatrix} a_{11} & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & 0 \\ a_{n1} & \dots & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

以上均有

$$\det A = a_{11} a_{22} \dots a_{nn}.$$

## 2.2 解题方法介绍

### 2.2.1 行列式计算的一些技巧

(1) 降阶法.

① 利用行(列)初等变换. 1) 交换两行(列); 2) 某行(列)乘以  $k$  倍; 3) 某行(列)的  $k$  倍加到另一行(列)上去.

② 看行和(列和), 如行和相等, 则均可加到某列上去, 然后提出一数.

③ 逐行相减(加).

④ 找递推公式. 注意对称性.

⑤ Laplace 展开.

一个复杂的行列式往往是以上这些步骤的联合使用.

(2) 升阶(加边)法.

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}_n = \begin{vmatrix} 1 & * & \dots & * \\ 0 & a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}_{n+1} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ * & 1 & * & \dots & * \\ * & 0 & a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ * & 0 & a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}_{n+2}.$$

这里升阶是为了降价, 在  $*$  处加上所需要的数, 即刻可以简化  $\det A$  的计算, 用此法时要

注意行列式阶数的变化.

(3) 分项(拆开)找递推公式.

$$|\beta_1 + \beta_1^* \quad \beta_2 \quad \cdots \quad \beta_n| = |\beta_1 \quad \beta_2 \quad \cdots \quad \beta_n| + |\beta_1^* \quad \beta_2 \quad \cdots \quad \beta_n|$$

其中  $\beta_j (j=1, 2, \dots, n)$  为  $n$  维列向量.

(4) 利用公式

$$\det(AB) = (\det A)(\det B)$$

其中  $A, B$  均为  $n$  阶方阵. 此方法关键的一步是能把一个已知矩阵拆成两个(行列式值易算出的)矩阵之积.

(5) 利用公式

$$\det(I_n \mp AB) = \det(I_m \mp BA)$$

其中  $A$  是  $n \times m$  矩阵,  $B$  是  $m \times n$  矩阵.

(6) 若行列式元素含有未定元  $x$ , 则行列式是关于  $x$  的多项式.

$$f(x) = \begin{vmatrix} x & * & \cdots & * \\ * & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & * \\ * & \cdots & * & x \end{vmatrix} = a(x - a_1) \cdots (x - a_n).$$

通过判断  $f(x)$  的根, 并考虑  $x^n$  的系数定出  $a, a_1, \dots, a_n$ .

## 2.2.2 几个重要的行列式

(1) Vandermonde 行列式

$$V_n(x_1, \dots, x_n) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & \cdots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & \cdots & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & & & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{1 \leq j < i \leq n} (x_i - x_j).$$

(2) 三对角线行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} a & b & & & \\ c & a & b & & \\ & c & a & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & b \\ & & & c & a \end{vmatrix} = \begin{cases} \frac{\alpha^{n+1} - \beta^{n+1}}{\alpha - \beta}, & \text{当 } a^2 \neq 4bc \text{ 时} \\ (n+1)a^n/2^n, & \text{当 } a^2 = 4bc \text{ 时} \end{cases}$$

其中  $\alpha, \beta$  是方程  $X^2 - aX + bc = 0$  的两个根.

(3) 循环方阵  $A$  的行列式

$$\det A = \begin{vmatrix} a_0 & a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} \\ a_{n-1} & a_0 & a_1 & \cdots & a_{n-2} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_0 \end{vmatrix} \\ = f(1)f(w) \cdots f(w^{n-1})$$



其中  $f(u) = a_0 + a_1 u + \cdots + a_{n-1} u^{n-1}$ ,  $w = \exp(2\pi i/n)$  为  $n$  次本原单位根.  $1, w, w^2, \cdots, w^{n-1}$  互异且均为单位根.

## 2.3 习题与解答

1. 试计算下列排列的逆序数, 从而决定它们的奇偶性.

(1) 1 3 5 2 4 8 6 7;

(2) 9 5 3 8 4 6 2 1 7;

(3) 7 1 6 2 5 3 4.

答 (1) 5, 奇排列; (2) 24, 偶排列; (3) 12, 偶排列.

2. 由 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 这 9 个自然数组成的 9 级排列中, 选择  $i, k$  使

(1) 1 4 2 5  $i$  7  $k$  9 6 为奇排列;

(2) 3 7 2 9  $i$  1 4  $k$  5 为偶排列;

答 (1)  $i=8, k=3$ ; (2)  $i=8, k=6$ .

3. 在数  $1, 2, \cdots, n$  组成的任一  $n$  级排列中, 逆序数和正序数的和等于多少?

答  $\frac{n(n-1)}{2}$ . 因为自然排列  $1 2 \cdots n$  的正序数为  $\frac{n(n-1)}{2}$ , 逆序数为 0; 任一个  $n$  级排列都可由自然排列经有限次对换得到, 而每经一次对换, 正序数减少的个数恰等于逆序增加的个数, 所以正序数与逆序数的和始终保持不变.

4. 已知排列  $a_1, a_2, \cdots, a_n$  的逆序数等于  $k$ , 问: 排列  $a_n, a_{n-1}, \cdots, a_2, a_1$  的逆序数等于多少?

答  $\frac{n(n-1)}{2} - k$ . 因为  $\tau(a_1, a_2, \cdots, a_n) = k$ , 所以排列  $a_n, a_{n-1}, \cdots, a_2, a_1$  的正序数为  $k$ , 由 3 题立得.

5. 在由自然数  $1, 2, \cdots, n$  组成的所有  $n$  级排列中, 一共有多少个逆序?

答  $\frac{n!}{2} \cdot \frac{n(n-1)}{2}$ . 因为  $n$  级排列共有  $n!$  个, 分为  $\frac{n!}{2}$  对, 其中每对排列为  $i_1, i_2, \cdots, i_n$  和  $i_n, i_{n-1}, \cdots, i_2, i_1$ , 由 4 题可知, 这样两个排列的逆序数之和为  $\frac{n(n-1)}{2}$ .

6. 试证明 在  $n$  级排列中, 奇偶排列各半.

证 设偶排列为  $k$  个, 奇排列为  $l$  个.

方法 1 因为对换一次后排列的奇偶性改变. 所以每个偶排列经过第 1, 2 位数码的对换后成为奇排列, 所以  $k \leq l$ ; 同样可得  $l \leq k$ , 故  $k = l = \frac{n!}{2}$ .

方法 2

$$\text{因为 } \Delta_n = \begin{vmatrix} 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \cdots & 1 \end{vmatrix} = 0,$$

又由行列式定义知  $\Delta_n = \sum_{j_1 \cdots j_n} (-1)^{\tau(j_1, \cdots, j_n)} 1 = k - l = 0$ , 行列式展开为  $n!$  项, 所以得  $k =$

$$l = \frac{n!}{2}.$$

7. 选取  $i, k$  的值使乘积  $a_{62} a_{i5} a_{34} a_{k3} a_{41} a_{26}$  含于 6 阶行列式且带有正号.

解 因为  $a_{62} a_{i5} a_{34} a_{k3} a_{41} a_{26} = a_{41} a_{62} a_{k3} a_{34} a_{i5} a_{26}$

其前的正负号由  $(-1)^{\tau(4\ 6\ k\ 3\ i\ 2)}$  决定, 即  $4\ 6\ k\ 3\ i\ 2$  应为偶排列, 所以  $k=5, i=1$ .

8.  $n$  阶行列式  $\det(a_{ij})$  的反对角线元素之积 (即  $a_{1n} a_{2n-1} \cdots a_{n1}$ ) 一项有怎样的正负号?

答  $(-1)^{\tau(n, n-1, \dots, 2, 1)} = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}.$

9. 如果  $n$  阶行列式中所有元素变号, 则行列式值如何变化?

答 因为  $\Delta_n(-a_{ij}) = (-1)^n \Delta_n(a_{ij})$ , 所以行列式值乘  $(-1)^n$ .

10. 如果行列式中每一个元素  $a_{ik}$  乘以  $c^{i-k}$  ( $c \neq 0$ ), 问行列式值有什么变化?

解 由行列式定义

$$\Delta_n(a_{ij}) = \sum_{(j_1 \cdots j_n)} (-1)^{\tau(j_1 \cdots j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n},$$

于是

$$\Delta_n(c^{i-j} a_{ij}) = \sum_{(j_1 \cdots j_n)} (-1)^{\tau(j_1 \cdots j_n)} c^{1-j_1} a_{1j_1} c^{2-j_2} a_{2j_2} \cdots c^{n-j_n} a_{nj_n}.$$

即每项前乘以  $c^{(1+2+\cdots+n)-(j_1+\cdots+j_n)} = c^0 = 1$ ,

所以行列式值不变.

11. 计算下列行列式:

$$(1) \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & 5 & 6 & 0 & 0 \\ 7 & 8 & 9 & 1 & -2 \\ 10 & 11 & 12 & 3 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \\ 4 & 5 & 6 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = 180.$$

$$(2) \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & n-1 \\ n & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{vmatrix} = (-1)^{\tau(2, 3, \dots, n-1, n, 1)} 1 \cdot 2 \cdots (n-1) \cdot n = (-1)^{n-1} \cdot n!.$$

$$(3) \begin{vmatrix} 0 & \cdots & 0 & 2 & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ n & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & 1 \end{vmatrix} = (-1)^{\tau(n-1, n-2, \dots, 1, n)} 2 \cdot 3 \cdots n \cdot 1 = (-1)^{\frac{(n-1)(n-2)}{2}} \cdot n!.$$

$$(4) \begin{vmatrix} -a_1 & -a_2 & \cdots & \cdots & -a_n \\ 1 & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = (-1)^{\tau(n, 1, 2, \dots, n-1)} (-a_n) = (-1)^n a_n.$$

12. 由行列式定义计算

$$f(x) = \begin{vmatrix} 4x & 3x & 2 & 1 \\ 1 & x & 1 & -1 \\ 3 & 2 & 2x & 1 \\ 1 & 0 & 1 & x \end{vmatrix}$$

中  $x^4, x^3$  的系数.

解 因为  $x^4$  只能由对角线元素之积得到, 其系数为 8;  $x^3$  由  $a_{12}a_{21}a_{33}a_{44}$  得到, 其系数为 -6.

13. 设  $\alpha, \beta, \gamma$  是方程  $x^3 - 1 = 0$  的根, 求行列式

$$\begin{vmatrix} \alpha & \beta & \gamma \\ \gamma & \alpha & \beta \\ \beta & \gamma & \alpha \end{vmatrix}$$

的值.

解 由已知有  $\alpha^3 = \beta^3 = \gamma^3 = 1$ ,  $\alpha\beta\gamma = 1$ ,

所以  $\Delta_3 = \alpha^3 + \beta^3 + \gamma^3 - 3\alpha\beta\gamma = 1 + 1 + 1 - 3 = 0$ .

14. 计算行列式:

$$(1) \begin{vmatrix} a & b & c \\ a & a+b & a+b+c \\ a & 2a+b & 3a+2b+c \end{vmatrix} \xrightarrow[\begin{smallmatrix} -r_2+r_3 \\ -r_1+r_2 \end{smallmatrix}]{\begin{smallmatrix} -r_2+r_3 \\ -r_1+r_2 \end{smallmatrix}} \begin{vmatrix} a & b & c \\ 0 & a & a+b \\ 0 & a & 2a+b \end{vmatrix} = a^3.$$

$$(2) \begin{vmatrix} -3 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & -1 \\ 1 & -2 & 3 \end{vmatrix} = -27 - 1 - 8 - 6 + 6 - 6 = -42.$$

$$(3) \begin{vmatrix} 46 & 24 & 36 \\ 80 & 34 & 70 \\ 124 & 44 & 114 \end{vmatrix} \xrightarrow{-c_3+c_1} \begin{vmatrix} 10 & 24 & 36 \\ 10 & 34 & 70 \\ 10 & 44 & 114 \end{vmatrix} = 10 \begin{vmatrix} 10 & 34 \\ 10 & 44 \end{vmatrix} = 1000.$$

$$(4) \begin{vmatrix} 5 & 6 & 7 & 8 \\ 6 & 7 & 8 & 5 \\ 7 & 8 & 5 & 6 \\ 8 & 5 & 6 & 7 \end{vmatrix} \xrightarrow[\begin{smallmatrix} c_j+c_1 \\ j=3,3,4 \end{smallmatrix}]{c_j+c_1} \begin{vmatrix} 26 & 6 & 7 & 8 \\ 26 & 7 & 8 & 5 \\ 26 & 8 & 5 & 6 \\ 26 & 5 & 6 & 7 \end{vmatrix} = 26 \begin{vmatrix} 1 & 1 & -3 \\ 2 & -2 & -2 \\ -1 & -1 & 1 \end{vmatrix} = 416.$$

$$(5) \begin{vmatrix} (a-1)^2 & a^2 & (a+1)^2 & 1 \\ (b-1)^2 & b^2 & (b+1)^2 & 1 \\ (c-1)^2 & c^2 & (c+1)^2 & 1 \\ (d-1)^2 & d^2 & (d+1)^2 & 1 \end{vmatrix} \xrightarrow[\begin{smallmatrix} c_1+c_3 \\ c_2+c_4 \end{smallmatrix}]{\begin{smallmatrix} c_1+c_3 \\ c_2+c_4 \end{smallmatrix}} \begin{vmatrix} (a-1)^2 & a^2 & 2(a^2+1) & a^2+1 \\ (b-1)^2 & b^2 & 2(b^2+1) & b^2+1 \\ (c-1)^2 & c^2 & 2(c^2+1) & c^2+1 \\ (d-1)^2 & d^2 & 2(d^2+1) & d^2+1 \end{vmatrix} = 0.$$

$$(6) \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & -1 \end{vmatrix} \xrightarrow[\begin{smallmatrix} c_4+c_j \\ j=1,2,3 \end{smallmatrix}]{c_4+c_j} \begin{vmatrix} 2 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & -2 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{vmatrix} = -8.$$

$$(7) \begin{vmatrix} 7 & 6 & 5 \\ 1 & 2 & 1 \\ 3 & -2 & 1 \end{vmatrix} = 14 + 18 - 10 - 30 + 14 - 6 = 0.$$

$$(8) \begin{vmatrix} 2 & 1 & 3 & 2 \\ 3 & 0 & 1 & -2 \\ 1 & -1 & 4 & 3 \\ 2 & 2 & -1 & 1 \end{vmatrix} \xrightarrow[r_1+r_3]{-2r_1+r_4} \begin{vmatrix} 2 & 1 & 3 & 2 \\ 3 & 0 & 1 & -2 \\ 3 & 0 & 7 & 5 \\ -2 & 0 & -7 & -3 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 3 & 1 & -2 \\ 0 & 6 & 7 \\ -2 & -7 & -3 \end{vmatrix} = -55.$$

15. 如果  $\begin{vmatrix} x & y & z \\ 3 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 1$ , 计算下列各行列式之值:

$$(1) \begin{vmatrix} 2x & 2y & 2z \\ \frac{3}{2} & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 2 \cdot \frac{1}{2} \begin{vmatrix} x & y & z \\ 3 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 1.$$

$$(2) \begin{vmatrix} x & y & z \\ 3x+3 & 3y & 3z+2 \\ x+1 & y+1 & z+1 \end{vmatrix} \xrightarrow[r_1+r_3]{-3r_1+r_2} \begin{vmatrix} x & y & z \\ 3 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 1.$$

$$(3) \begin{vmatrix} x-1 & y-1 & z-1 \\ 4 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} \xrightarrow[r_3+r_2]{r_3+r_1} \begin{vmatrix} x & y & z \\ 3 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 1.$$

16. 计算  $n$  阶行列式:

$$(1) \begin{vmatrix} 1 & 2 & \cdots & n-2 & n-1 & n \\ 2 & 3 & \cdots & n-1 & n & n \\ 3 & 4 & \cdots & n & \ddots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & & \vdots & \vdots \\ n & n & \cdots & \cdots & \cdots & n \end{vmatrix} \xrightarrow[i=n-1, \dots, 1]{-r_i+r_{i+1}} \begin{vmatrix} 1 & 2 & \cdots & n-2 & n-1 & n \\ 1 & \cdots & \cdots & \cdots & 1 & 0 \\ \vdots & & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 1 & 0 & \cdots & \cdots & \cdots & 0 \end{vmatrix} = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} \cdot n.$$

$$(2) \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & \cdots & \cdots & 1 \\ b_1 & a_1 & \cdots & \cdots & \cdots & a_1 \\ \vdots & b_2 & a_2 & \cdots & \cdots & a_2 \\ \vdots & \vdots & b_3 & \ddots & & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ b_1 & b_2 & b_3 & \cdots & b_n & a_n \end{vmatrix} \xrightarrow[j=n-1, \dots, 1]{-c_j + c_{j+1}} \begin{vmatrix} 1 & 0 & \cdots & \cdots & \cdots & 0 \\ b_1 & a_1 - b_1 & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ \vdots & b_2 - b_1 & a_2 - b_2 & \ddots & & \vdots \\ \vdots & \vdots & b_3 - b_2 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \ddots & 0 \\ b_1 & b_2 - b_1 & b_3 - b_2 & \cdots & \cdots & a_n - b_n \end{vmatrix} = \prod_{i=1}^n (a_i - b_i).$$

$$(3) \text{ 方法 1 } \begin{vmatrix} \alpha & \beta & \cdots & \beta \\ \beta & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \beta \\ \beta & \cdots & \beta & \alpha \end{vmatrix} \xrightarrow[i=2, \dots, n]{-r_1 + r_i} \begin{vmatrix} \alpha & \beta & \cdots & \beta & \beta \\ \beta - \alpha & \alpha - \beta & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & 0 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ \beta - \alpha & 0 & \cdots & 0 & \alpha - \beta \end{vmatrix} \xrightarrow[j=2, \dots, n]{c_j + c_1} \begin{vmatrix} \alpha + (n-1)\beta & \beta & \cdots & \cdots & \beta \\ 0 & \alpha - \beta & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & 0 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & \alpha - \beta \end{vmatrix} = (\alpha - \beta)[\alpha + (n-1)\beta].$$

方法 2

$$\begin{aligned} \Delta_n &= \det \left[ (\alpha - \beta) I_n + \begin{pmatrix} \beta \\ \vdots \\ \beta \end{pmatrix} (1 \cdots 1) \right] = (\alpha - \beta)^n \det \left[ I_n + \frac{1}{\alpha - \beta} \begin{pmatrix} \beta \\ \vdots \\ \beta \end{pmatrix} (1 \cdots 1) \right] \\ &= (\alpha - \beta)^n \left[ I_1 + \frac{1}{\alpha - \beta} (1 \cdots 1) \begin{pmatrix} \beta \\ \vdots \\ \beta \end{pmatrix} \right] = (\alpha - \beta)^{n-1} [\alpha - \beta + n\beta]. \end{aligned}$$

$$(4) \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n-1 & n \\ 1 & 3 & 3 & \cdots & n-1 & n \\ 1 & 2 & 5 & \cdots & n-1 & n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 1 & 2 & \cdots & \cdots & 2n-3 & n \\ 1 & 2 & 3 & \cdots & n-1 & 2n-1 \end{vmatrix} \xrightarrow[i=2, 3, \dots, n]{-r_1 + r_i} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n-1 & n \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & & & \ddots & n-2 & 0 \\ 0 & \cdots & \cdots & \cdots & 0 & n-1 \end{vmatrix} = (n-1)!$$

17. 如果对从第二列开始的每一列加上它前面的一列,同时对第一列加上原先最后

面的一列,同时对第一列加上原先最后面的一列,问行列式值如何变化?

解 设  $\det A = \det(\beta_1 \beta_2 \cdots \beta_n)$ , 则

$$\Delta_n = \det(\beta_1 + \beta_n, \beta_1 + \beta_2, \beta_2 + \beta_3, \cdots, \beta_{n-1} + \beta_n)$$

按第一列拆开成两个行列式,得

$$\Delta_n = |\beta_1, \beta_1 + \beta_2, \cdots, \beta_{n-1} + \beta_n| + |\beta_n, \beta_1 + \beta_2, \cdots, \beta_{n-1} + \beta_n|$$

把右边第一个行列式逐列相减,即  $-c_i + c_{i+1}$ ,  $i = 1, 2, \cdots, n-1$ ; 第二个行列式中先做  $-c_1 + c_n$  后逐列相减,即  $-c_i + c_{i-1}$ ,  $i = n, \cdots, 3$ , 得

$$\begin{aligned} \Delta_n &= |\beta_1 \beta_2 \beta_3 \cdots \beta_n| + |\beta_n \beta_1 \beta_2 \cdots \beta_{n-1}| \\ &= \det A + (-1)^{n-1} \det A \\ &= [1 + (-1)^{n-1}] \det A. \end{aligned}$$

18. 如果在行列式中,偶数号码各行的和等于奇数号码各行的和,问行列式值等于什么?

解 把偶数号码各行加到第二行,把奇数号码各行加到第一行,则行列式值不变,且第一、二行元素相等,所以行列式值等于 0.

19. 如果除最后一行外,从每一行减去后面的一行,而从最后一行减去原先的第一行,问行列式值如何变化?

解 设原行列式为  $\det A = \det \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{bmatrix}$ , 则新行列式为

$$\Delta_n = \begin{vmatrix} \alpha_1 - \alpha_2 \\ \alpha_2 - \alpha_3 \\ \vdots \\ \alpha_{n-1} - \alpha_n \\ \alpha_n - \alpha_1 \end{vmatrix} \xrightarrow[r_i + r_1]{i=2,3,\cdots,n} \begin{vmatrix} 0 \\ \alpha_2 - \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_{n-1} - \alpha_n \\ \alpha_n - \alpha_1 \end{vmatrix} = 0.$$

20. 证明:对于奇数阶的行列式  $\det(a_{ij})$ , 如果  $a_{ij} = -a_{ji}$  对任意  $i, j$  成立, 则  $\det(a_{ij}) = 0$ .

证 因为  $\det(a_{ij}) = \det(a_{ji}) = \det(-a_{ij}) = (-1)^n \det(a_{ij})$   
 $= -\det(a_{ij})$ ,

故  $\det(a_{ij}) = 0$ .

21. 证明:如果行列式关于主对角线对称的元素是共轭复数,则行列式值是实数.

证 因为  $\det(a_{ij}) = \det(a_{ji}) = \det(\overline{a_{ij}}) = \overline{\det(a_{ij})}$ ,  
 所以  $\det(a_{ij})$  为实数.

22. 一个  $n$  阶行列式的元素由条件  $a_{ij} = \max(i, j)$  给定,试计算此行列式.

解 由已知

$$\Delta_n = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ 2 & 2 & 3 & \cdots & n \\ 3 & 3 & 3 & \ddots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \ddots & n \\ n & \cdots & \cdots & n & n \end{vmatrix} \xrightarrow[r_i + r_1]{i=2,\cdots,n} \begin{vmatrix} 1 & 2 & \cdots & \cdots & n \\ 1 & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ 2 & \ddots & \ddots & & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ n-1 & \cdots & 2 & 1 & 0 \end{vmatrix} = n(-1)^{n-1}.$$

23. 设  $A$  为  $n$  阶方阵,  $\alpha$  为  $n \times 1$  矩阵,  $\beta$  为  $1 \times n$  矩阵, 且  $\begin{vmatrix} A & \alpha \\ \beta & b \end{vmatrix} = 0$ , 求证:  $\begin{vmatrix} A & \alpha \\ \beta & c \end{vmatrix} = (c-b)\det A$ .

$$\text{证} \quad \begin{vmatrix} A & \alpha \\ \beta & c \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A & \alpha \\ \beta & b \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} A & 0 \\ \beta & c-b \end{vmatrix} = (c-b)\det A.$$

24. 计算行列式

$$\begin{aligned} (1) \quad \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 & 1 & -1 \end{vmatrix} &= \begin{vmatrix} 0 & 0 & -2 & -2 & -2 \\ 0 & -2 & -2 & 0 & 0 \\ -2 & -2 & 0 & -2 & 0 \\ -2 & 0 & -2 & 0 & 0 \\ -2 & -2 & 0 & 0 & -2 \end{vmatrix} \\ &= (-2) \begin{vmatrix} 0 & -2 & -2 & -2 \\ -2 & -2 & 0 & 0 \\ 2 & -2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -2 \end{vmatrix} \\ &= (-4) \begin{vmatrix} -2 & 0 & 4 \\ -4 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & -2 \end{vmatrix} = -160. \end{aligned}$$

此题主要反复使用 Laplace 展开公式. 实施的步骤为: 第 1 行乘  $(-1)$  加到其余各行, 再按第一列展开得 5 阶行列式; 第 3 行乘  $(-1)$  分别加到第 4, 5 行上去, 再按第一列展开得 4 阶行列式; 第 3 行加到第 2 行上去, 第 4 行加到第 1 行上去后, 按第 1 列展开得 3 阶行列式.

$$\begin{aligned} (2) \quad \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ a & b & c & d \\ a^2 & b^2 & c^2 & d^2 \\ a^4 & b^4 & c^4 & d^4 \end{vmatrix} &= (b-a)(c-a)(d-a) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ b & c & d \\ b^2(b+a) & c^2(c+a) & d^2(d+a) \end{vmatrix} \\ &= (b-a)(c-a)(d-a) \left[ \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ b & c & d \\ b^3 & c^3 & d^3 \end{vmatrix} + a \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ b & c & d \\ b^2 & c^2 & d^2 \end{vmatrix} \right] \\ &= (a+b+c+d)(b-a)(c-a)(d-a)(c-b)(d-b)(d-c). \end{aligned}$$

这个行列式与 Vandermonde 行列式的区别是  $x_i$  的幂指数跳跃一次. 它有两种解法: ① 仿照 Vandermonde 行列式的计算方法, ② 补上一行一列后, 利用 Vandermonde 行列式的结果, 本题是按①做的, 第 3 行乘  $(-a^2)$  加到 4 行上, 第 2 行乘  $(-a)$  加到第 3 行上, 第 1 行乘  $(-a)$  加到第 2 行上, 然后按第 1 行展开; 将第 3 行拆开成两个行列式.

$$\begin{aligned}
 (3) \quad & \begin{vmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 & \beta_1 \\ 0 & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & \beta_n \\ \alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & \alpha_n & 0 \end{vmatrix}_{n+1} \xrightarrow{\text{按第一行展开}} \Delta_n + (-1)^n \beta_1 \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & 1 \\ \alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & \cdots & \alpha_n \end{vmatrix}_n \\
 & = \Delta_n - \alpha_1 \beta_1 = \cdots \\
 & = \begin{vmatrix} 1 & \beta_n \\ \alpha_n & 0 \end{vmatrix} - \alpha_{n-1} \beta_{n-1} - \cdots - \alpha_2 \beta_2 - \alpha_1 \beta_1 \\
 & = -(\alpha_1 \beta_1 + \cdots + \alpha_n \beta_n).
 \end{aligned}$$

$$(4) \quad \begin{vmatrix} x & y & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & x & y & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & & \ddots & \ddots & y \\ y & 0 & \cdots & 0 & x \end{vmatrix}_{n \times n} \xrightarrow{\text{按第 1 列展开}} x^n + (-1)^{n+1} y^n.$$

$$(5) \quad \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & \cdots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & \cdots & \cdots & x_n^2 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ x_1^{n-2} & x_2^{n-2} & \cdots & \cdots & x_n^{n-2} \\ x_1^n & x_2^n & \cdots & \cdots & x_n^n \end{vmatrix}$$

解 此行列式与 Vandermonde 行列式的区别仅在于最后一行是  $x_j^n$  而不是  $x_j^{n-1}$ , 一个自然的想法是补上一行一列, 再利用 Vandermonde 行列式. 令

$$\begin{aligned}
 V_{n+1}(x_1, \cdots, x_n, z) &= \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n & z \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} & z^{n-1} \\ x_1^n & x_2^n & \cdots & x_n^n & z^n \end{vmatrix} \\
 &= \left( \prod_{1 \leq j < i \leq n} (x_i - x_j) \right) \left( \prod_{j=1}^n (z - x_j) \right) \\
 &= (z - x_1) \cdots (z - x_n) V_n(x_1, \cdots, x_n)
 \end{aligned}$$

另一方面, 把  $V_{n+1}(x_1, \cdots, x_n, z)$  按最后一列进行 Laplace 展开得:

$$V_{n+1}(x_1, \cdots, x_n, z) = \sum_{k=1}^{n+1} (-1)^{n+1+k} M_{k, n+1} z^{k-1},$$

而  $M_{n, n+1}$  即是所求的行列式. 比较上两式中  $z^{n-1}$  的系数得

$$-(x_1 + \cdots + x_n) V_n(x_1, \cdots, x_n) = (-1)^{2n+1} M_{n, n+1},$$

所以

$$M_{n, n+1} = (x_1 + \cdots + x_n) V_n(x_1, \cdots, x_n).$$

此题也可仿照 Vandermonde 行列式的计算过程求解.



$$(6) \begin{vmatrix} a_{11} & 1 & a_{12} & 1 & \cdots & a_{1n} & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & \cdots & 1 & 0 \\ a_{21} & x_1 & a_{22} & x_2 & \cdots & a_{2n} & x_n \\ x_1 & 0 & x_2 & 0 & \cdots & x_n & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & x_1^{n-1} & a_{n2} & x_2^{n-1} & \cdots & a_{nn} & x_n^{n-1} \\ x_1^{n-1} & 0 & x_2^{n-1} & 0 & \cdots & x_n^{n-1} & 0 \end{vmatrix}$$

解 容易看出此行列式的第 2, 4, ..., 2n 列中第 1, 3, ..., 2n-1 行构成的是 Vandermonde 行列式, 记为  $V_n(x_1, \dots, x_n)$ ; 同样第 1, 3, ..., 2n-1 列中第 2, 4, ..., 2n 行也构成  $V_n(x_1, \dots, x_n)$ . 把 2, 4, ..., 2n 列换到第 1, ..., n 列, 符号变化为  $(-1)^{\frac{n(n+1)}{2}}$ , 再把 1, 3, ..., 2n-1 行换到 1, ..., n 行, 符号变化为  $(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}$ , 又  $n^2$  与  $n$  同奇、偶, 所以有

$$\Delta_{2n} = (-1)^{n^2} \begin{vmatrix} V_n & A \\ 0 & V_n \end{vmatrix} = (-1)^n \prod_{1 \leq k < i \leq n} (x_i - x_k)^2.$$

此题也可直接用 Laplace 展开定理; 取行列式的第 2, 4, ..., 2n 列, 则按此  $n$  列的展开中只有一个子式非零, 即第 1, 3, ..., 2n-1 行构成 (其余的子式都会取到一行零, 故为零.), 而此子式的余子式恰为第 1, 3, ..., 2n-1 列, 2, 4, ..., 2n 行交叉处的元素构成.

$$\begin{aligned} \text{所以 } \det M &= \det M \begin{pmatrix} 1 & 3 & \cdots & 2n-1 \\ 2 & 4 & \cdots & 2n \end{pmatrix} \cdot \det M \begin{pmatrix} 2 & 4 & \cdots & 2n \\ 1 & 3 & \cdots & 2n-1 \end{pmatrix} (-1)^{1+3+\cdots+2n-1} \\ &= (-1)^n \cdot V_n \cdot V_n = (-1)^n \prod_{1 \leq k < i \leq n} (x_i - x_k)^2. \end{aligned}$$

25. 设  $n$  阶行列式  $\det A$  的元素  $a_{ij}$  都是变数  $t$  的可微函数. 试证明行列式的微分可作如下计算:

$$(1) \frac{d(\det A)}{dt} = \det A_1 + \cdots + \det A_n,$$

其中  $A_i$  为对  $A$  的第  $i$  行求导, 而其余行不变所得到的方阵 ( $i=1, \dots, n$ ).

$$(2) \frac{d(\det A)}{dt} = \sum_{i,j=1}^n \frac{da_{ij}(t)}{dt} \cdot A_{ij}.$$

证 (1) 由行列式定义

$$\det A = \sum_{j_1 j_2 \cdots j_n} (-1)^{\tau(j_1 \cdots j_n)} a_{1j_1}(t) a_{2j_2}(t) \cdots a_{nj_n}(t),$$

于是

$$\begin{aligned} \frac{d(\det A)}{dt} &= \sum_{j_1 j_2 \cdots j_n} (-1)^{\tau(j_1 \cdots j_n)} [a_{1j_1}(t) a_{2j_2}(t) \cdots a_{nj_n}(t)]', \\ &= \sum_{j_1 j_2 \cdots j_n} (-1)^{\tau(j_1 \cdots j_n)} \sum_{i=1}^n [a_{1j_1}(t) \cdots a'_{ij_i}(t) \cdots a_{nj_n}(t)] \\ &= \sum_{i=1}^n \left( \sum_{j_1 j_2 \cdots j_n} (-1)^{\tau(j_1 \cdots j_n)} a_{1j_1}(t) \cdots a'_{ij_i}(t) \cdots a_{nj_n}(t) \right) \\ &= \sum_{i=1}^n A_i \end{aligned}$$

(2) 把  $A_i$  按  $i$  行作 Laplace 展开得

$$\begin{aligned} A_i &= a'_{i1}(t)A_{i1} + \cdots + a'_{ij}(t)A_{ij} + \cdots + a'_{in}(t)A_{in} \\ &= \sum_{j=1}^n a'_{ij}(t)A_{ij} \end{aligned}$$

故

$$\frac{d(\det A)}{dt} = \sum_{i=1}^n A_i = \sum_{i,j=1}^n a'_{ij}(t)A_{ij}.$$

26. 设

$$\det A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n-1,1} & a_{n-1,2} & \cdots & a_{n-1,n} \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{vmatrix}$$

用  $\det A_j (j=1, 2, \dots, n)$  表示把  $\det A$  中第  $j$  列元素换为  $x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, 1$  后而得的新行列式. 试证:

$$\sum_{j=1}^n \det A_j = \det A.$$

证 方法 1 利用加边的方法,

$$\text{因为 } \Delta_{n+1} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \cdots \cdots 1 \\ x_1 & \\ \vdots & A \\ x_{n-1} & \\ 1 & \end{vmatrix} = 0,$$

然后按第一行展开得:

$$\det A - \det A_1 - \det A_2 - \cdots - \det A_n = 0.$$

方法 2 把所有的  $A_j$  加边, 然后进行  $1, j$  列的对换, 再按第 1 行相加, 即

$$\begin{aligned} \det A_j &= \begin{vmatrix} 1 & 0 \cdots \cdots 0 \\ a_{1j} & \\ \vdots & A_j \\ a_{n-1,j} & \\ 1 & \end{vmatrix} \xrightarrow{c_1 \leftrightarrow c_j} \begin{vmatrix} 0 & \cdots & 1 \cdots 0 \\ x_1 & \\ \vdots & A \\ x_{n-1} & \\ 1 & \end{vmatrix} \\ \text{所以 } \sum_{j=1}^n \det A_j &= - \begin{vmatrix} 0 & 1 & \cdots & \cdots & 1 \\ x_1 & a_{11} & \cdots & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ x_{n-1} & a_{n-1,1} & \cdots & \cdots & a_{n-1,n} \\ 1 & 1 & \cdots & \cdots & 1 \end{vmatrix} \xrightarrow{-r_{n+1} + r_1} \begin{vmatrix} 1 & 0 \cdots \cdots 0 \\ x_1 & \\ \vdots & A \\ x_{n-1} & \\ 1 & \end{vmatrix} \\ &= \det A. \end{aligned}$$

方法 3 把  $A_j$  按第  $j$  列展开, 用  $A_{ij}$  记  $\det A$  中  $(i, j)$  位元素的代数余子式, 于是  $\det A = A_{n1} + A_{n2} + \cdots + A_{nn}$ , 则有

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^n \det A_j &= \sum_{j=1}^n \left( \sum_{i=1}^{n-1} x_i A_{ij} + A_{nj} \right) = \sum_{j=1}^n A_{nj} + \sum_{i=1}^{n-1} x_i \sum_{j=1}^n A_{ij} \\ &= \det A. \end{aligned}$$

这里用到  $\det A = \sum_{j=1}^n A_{nj}$  以及  $\sum_{j=1}^n A_{ij} = 0$ , 后者相当把  $\det A$  的第  $i$  行换成  $1, \dots, 1$  所得行列式按第  $i$  行的展开,  $i = 1, \dots, n-1$ . 这  $n-1$  个行列式值均为 0 (因其都有两行元素对应相等).

27. 如果  $a_{ii} > 0$  ( $i = 1, 2, \dots, n$ ),  $a_{ij} < 0$  ( $i \neq j$ ), 又设  $\sum_{i=1}^n a_{ij} > 0$  ( $j = 1, \dots, n$ ). 试证行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} > 0$$

证 对行列式的阶数用归纳法.  $n=2$  时,  $\Delta_2 = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} > 0$  成立. 今假设  $n-1$  阶时结论成立, 则当  $n$  阶时, 把第一列乘  $(-\frac{a_{1j}}{a_{11}})$  加到第  $j$  列上去 ( $j=2, \dots, n$ ), 于是

$$\det A = \begin{vmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a'_{22} & \cdots & a'_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a'_{n2} & \cdots & a'_{nn} \end{vmatrix} = a_{11} \begin{vmatrix} a'_{22} & \cdots & a'_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ a'_{n2} & \cdots & a'_{nn} \end{vmatrix}_{n-1}$$

其中  $a'_{ij} = a_{ij} - a_{i1}a_{1j}/a_{11}$ , 我们要证明上面这个  $n-1$  阶行列式仍满足已知条件:

$$(1) \quad a'_{ii} = a_{ii} - \frac{a_{i1}a_{1i}}{a_{11}} = \frac{a_{ii}a_{11} - a_{i1}a_{1i}}{a_{11}} > 0, \quad (\text{因为 } a_{ii} > |a_{1i}|, a_{11} > |a_{i1}|).$$

$$(2) \quad a'_{ij} = a_{ij} - \frac{a_{i1}a_{1j}}{a_{11}} < 0, \quad (i \neq j, \text{ 因为 } a_{ij} < 0, -a_{i1}a_{1j} < 0).$$

$$\begin{aligned} (3) \quad \sum_{i=2}^n a'_{ij} &= \sum_{i=2}^n a_{ij} - \sum_{i=2}^n \frac{a_{i1}a_{1j}}{a_{11}} > -a_{1j} - a_{1j} \sum_{i=2}^n \frac{a_{i1}}{a_{11}} \\ &= -a_{1j} \left( 1 + \left( \sum_{i=2}^n a_{i1} \right) / a_{11} \right) \\ &= -a_{1j} (a_{11} + \sum_{i=2}^n a_{i1}) / a_{11} > 0 \end{aligned}$$

所以由归纳假设

$$\begin{vmatrix} a'_{22} & \cdots & a'_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ a'_{n2} & \cdots & a'_{nn} \end{vmatrix} > 0,$$

从而得

$$\det A > 0.$$

28. 用 Cramer 法则解线性方程组

$$(1) \quad \begin{cases} 2x_1 + x_2 - 5x_3 + x_4 = 8 \\ x_1 - 3x_2 - 6x_4 = 9 \\ 2x_2 - x_3 + 2x_4 = -5 \\ x_1 + 4x_2 - 7x_3 + 6x_4 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = 3 \\ x_2 = -4 \\ x_3 = -1 \\ x_4 = 1 \end{cases}$$

$$(2) \left\{ \begin{array}{l} x_2 + x_3 + x_4 = 1 \\ x_1 \quad \quad + x_3 + x_4 = 2 \\ x_1 + x_2 \quad \quad + x_4 = 3 \\ x_1 + x_2 + x_3 \quad = 4 \end{array} \right. ; \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} x_1 = \frac{7}{3} \\ x_2 = \frac{4}{3} \\ x_3 = \frac{1}{3} \\ x_4 = -\frac{2}{3} \end{array} \right.$$

$$(3) \begin{cases} 2x_1 + 3x_2 + 11x_3 + 5x_4 = 2 \\ x_1 + x_2 + 5x_3 + 2x_4 = 1 \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 + 2x_4 = -3 \\ x_1 + x_2 + 3x_3 + 4x_4 = -3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = -2 \\ x_2 = 0 \\ x_3 = 1 \\ x_4 = -1 \end{cases}$$

$$(4) \begin{cases} 3x_1 + 4x_2 + x_3 + 2x_4 + 3 = 0 \\ 3x_1 + 5x_2 + 3x_3 + 5x_4 + 6 = 0 \\ 6x_1 + 8x_2 + x_3 + 5x_4 + 8 = 0 \\ 3x_1 + 5x_2 + 3x_3 + 7x_4 + 8 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = 2 \\ x_2 = -2 \\ x_3 = 1 \\ x_4 = -1 \end{cases}$$

29. 设  $a_1, a_2, \dots, a_n$  是数域  $F$  中互不相同的数,  $b_1, b_2, \dots, b_n$  是数域  $F$  中任一组给定的数, 用 Cramer 法则证明: 存在唯一的数域  $F$  上, 次数小于  $n$  的多项式  $f(X)$ , 使

$$f(a_i) = b_i.$$

**证** 设  $f(X) = c_0 + c_1 X + \cdots + c_{n-1} X^{n-1}$ , 则有

[illegible]

因为  $a_i \neq a_j (i \neq j)$ , 所以系数行列式  $V_n(a_1, a_2, \dots, a_n) \neq 0$ , 于是由 Cramer 法则知, 此线性方程组有唯一解  $c_0, \dots, c_{n-1}$ , 即  $f(X)$  唯一.

30. 用古典伴随矩阵求下列方阵的逆:

$$(1) \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}.$$

$$(2) \begin{bmatrix} -2 & 3 & 2 \\ 6 & 0 & 3 \\ 4 & 1 & -1 \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{72} \begin{bmatrix} -3 & 5 & 9 \\ 18 & -6 & 18 \\ 6 & 14 & -18 \end{bmatrix}.$$

$$(3) \begin{bmatrix} \cos\theta & 0 & -\sin\theta \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin\theta & 0 & \cos\theta \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} \cos\theta & 0 & \sin\theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin\theta & 0 & \cos\theta \end{bmatrix}$$

31. 32. 是矩阵乘法, 直接乘即可, 解答略去.

33. (1) 证明两个上三角形方阵的乘积仍为上三角阵 ( $A = (a_{ij})$  为上三角阵是指当  $i > j$  时  $a_{ij} = 0$ ).

(2) 证明两个下三角形方阵的乘积仍为下三角阵(若当  $i < j$  时  $a_{ij} = 0$ , 则称  $A$  为下三角形).

证 (1) 设  $A = (a_{ij}), B = (b_{ij})$ , 由已知  $i > j$  时, 有  $a_{ij} = 0, b_{ij} = 0$ . 令  $AB = (c_{ij})$ , 则当  $i > j$  时,

$$\begin{aligned} c_{ij} &= \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj} = \sum_{k=1}^j a_{ik} b_{kj} + \sum_{k=j+1}^n a_{ik} b_{kj} \\ &= \sum_{k=1}^j 0 \cdot b_{kj} + \sum_{k=j+1}^n a_{ik} \cdot 0 = 0. \end{aligned}$$

(2) 设  $A = (a_{ij}), B = (b_{ij})$ , 由已知  $i < j$  时,  $a_{ij} = b_{ij} = 0$  记  $AB = (c_{ij})$ , 则当  $i < j$  时有

$$\begin{aligned} c_{ij} &= \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj} = \sum_{k=1}^i a_{ik} b_{kj} + \sum_{k=i+1}^n a_{ik} b_{kj} \\ &= \sum_{k=1}^i a_{ik} \cdot 0 + \sum_{k=i+1}^n 0 \cdot b_{kj} = 0. \end{aligned}$$

34. 计算  $n$  阶行列式  $\det(a_{ij})$ , 它的元素由条件  $a_{ij} = |i-j|$  所给定.

解 由已知

$$\begin{aligned} \det(a_{ij}) &= \begin{vmatrix} 0 & 1 & \cdots & n-1 \\ 1 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 1 \\ n-1 & \cdots & 1 & 0 \end{vmatrix} \xrightarrow[i=n-1, \dots, 1]{-r_i + r_{i+1}} \begin{vmatrix} 0 & 1 & \cdots & n-1 \\ 1 & -1 & \cdots & -1 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 1 & \cdots & 1 & -1 \end{vmatrix} \\ &\xrightarrow[j=1, \dots, n-1]{c_n + c_j} \begin{vmatrix} n-1 & \cdots & \cdots & n-1 \\ 0 & -2 & & -1 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & -2 \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & -1 \end{vmatrix} = (-1)^{n-1} (n-1) \cdot 2^{n-2}. \end{aligned}$$

35. 设  $n$  阶方阵  $A$  的元素全为 1 或  $-1$ , 求证  $\det A$  被  $2^{n-1}$  整除.

证 把第一列中元素为  $-1$  的行都乘  $-1$  后, 第一行的  $-1$  倍加到各行上去得

$$\det A = \begin{vmatrix} 1 & * & \cdots & * \\ 0 & & & \\ \vdots & & A_{n-1} & \\ 0 & & & \end{vmatrix} = \det A_{n-1} = 2^{n-1} \det B_{n-1}$$

其中  $A_{n-1}$  的元素由  $2, -2, 0$  组成,  $B_{n-1}$  的元素由  $1, -1, 0$  组成, (若  $A$  的第一行与某行成比例, 则  $A_{n-1}$  有一行全为  $0$ , 此时  $\det A = 0$ , 也看成可被  $2^{n-1}$  整除) 故证得  $\det A$  被  $2^{n-1}$  整除.

36. 计算  $n$  阶行列式

$$(1) \begin{vmatrix} 2n & n & 0 & \cdots & 0 \\ n & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & n \\ 0 & \cdots & 0 & n & 2n \end{vmatrix} = n^n \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 1 \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & 2 \end{vmatrix} = (n+1)n^n$$

此题是三对角线行列式, 提出  $n$  后相当  $a=2, b=c=1$  (见几个重要的行列式中结论).

$$\begin{aligned}
 (2) \quad & \begin{vmatrix} \alpha+\beta & \alpha\beta & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \alpha\beta \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & \alpha+\beta \end{vmatrix} \\
 &= \begin{vmatrix} \alpha & \alpha\beta & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & \alpha+\beta & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \alpha\beta \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & \alpha+\beta \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \beta & \alpha\beta & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \alpha+\beta & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 1 & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \alpha\beta \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & \alpha+\beta \end{vmatrix} \\
 &= \alpha \begin{vmatrix} 1 & \beta & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \alpha & \alpha\beta & & \vdots \\ 0 & 1 & \alpha+\beta & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \alpha\beta \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & \alpha+\beta \end{vmatrix} + \beta \Delta_{n-1} = \alpha^n + \beta \Delta_{n-1}
 \end{aligned}$$

由  $\alpha, \beta$  的对称性, 又有  $\Delta_n = \beta^n + \alpha \Delta_{n-1}$

$$\text{所以} \quad \Delta_{n-1} = \frac{\alpha^n - \beta^n}{\alpha - \beta} \Rightarrow \Delta_n = \frac{\alpha^{n+1} - \beta^{n+1}}{\alpha - \beta} \quad (\alpha \neq \beta).$$

注 上面第一个等号是按第一列分项; 第二个等号是第一个行列式中第一行提出  $\alpha$  后, 再乘  $(-1)$  加到第二行上去.

$$\begin{aligned}
 (3) \quad & \begin{vmatrix} 1+x_1 & 1+x_1^2 & \cdots & 1+x_1^n \\ 1+x_2 & 1+x_2^2 & \cdots & 1+x_2^n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1+x_n & 1+x_n^2 & \cdots & 1+x_n^n \end{vmatrix} \xrightarrow{\text{加边}} \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 1+x_1 & 1+x_1^2 & \cdots & 1+x_1^n \\ \vdots & 1+x_2 & 1+x_2^2 & \cdots & 1+x_2^n \\ \vdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & 1+x_n & 1+x_n^2 & \cdots & 1+x_n^n \end{vmatrix}_{n+1} \\
 & \xrightarrow{j=2, \dots, n} \begin{vmatrix} 1 & -1 & -1 & \cdots & -1 \\ 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^n \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \cdots & x_2^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^n \end{vmatrix} \\
 & \xrightarrow{\text{按第一行拆开}} \begin{vmatrix} 2 & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^n \\ \vdots & x_2 & x_2^2 & \cdots & x_2^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^n \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 1 & \cdots & \cdots & \cdots & 1 \\ \vdots & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^n \\ \vdots & x_2 & x_2^2 & \cdots & x_2^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^n \end{vmatrix} \\
 &= 2x_1x_2\cdots x_n V_n(x_1, x_2, \dots, x_n) - V_{n+1}(1, x_1, \dots, x_n)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \left[ 2 \prod_{i=1}^n x_i - \prod_{i=1}^n (x_i - 1) \right] \prod_{1 \leq k < i \leq n} (x_i - x_k). \\
(4) \quad &\begin{vmatrix} \lambda & & & -a_{n-1} \\ -1 & \ddots & & \vdots \\ & \ddots & \lambda & -a_1 \\ & & -1 & \lambda - a_0 \end{vmatrix} \xrightarrow[i=n, \dots, 2]{r_i \times \lambda + r_{i-1}} \begin{vmatrix} 0 & \cdots & 0 & f(\lambda) \\ -1 & \ddots & & \vdots \\ & \ddots & 0 & \vdots \\ & & -1 & \lambda - a_0 \end{vmatrix} = f(\lambda) \\
&= \lambda^n - a_0 \lambda^{n-1} - \cdots - a_{n-1}. \\
(5) \quad &\begin{vmatrix} C_0^m & C_1^m & \cdots & C_{n-1}^m \\ C_0^{m+1} & C_1^{m+1} & \cdots & C_{n-1}^{m+1} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ C_0^{m+n-1} & C_1^{m+n-1} & \cdots & C_{n-1}^{m+n-1} \end{vmatrix} \xrightarrow[i=n-1, \dots]{-r_i + r_{i+1}} \begin{vmatrix} 1 & C_1^m & \cdots & C_{n-1}^m \\ 0 & C_0^m & \cdots & C_{n-2}^m \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & C_0^{m+n-2} & \cdots & C_{n-2}^{m+n-2} \end{vmatrix}_n
\end{aligned}$$

这里利用了公式  $C_n^m + C_{n-1}^m = C_n^{m+1}$  即  $C_n^{m+1} - C_n^m = C_{n-1}^m$  及  $C_0^m = C_0^{m+1} = \cdots = C_0^{m+n-1} = 1$ .

所以  $\det A(m, n) = \det A(m, n-1) = \cdots = \det A(m, 1) = |C_0^m| = 1$ .

$$\begin{aligned}
(6) \quad &\begin{vmatrix} a_1 b_1 & a_1 b_2 & a_1 b_3 & \cdots & a_1 b_n \\ a_1 b_2 & a_2 b_2 & a_2 b_3 & \cdots & a_2 b_n \\ a_1 b_3 & a_2 b_3 & a_3 b_3 & \cdots & a_3 b_n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_1 b_n & a_2 b_n & a_3 b_n & \cdots & a_n b_n \end{vmatrix} \xrightarrow[\frac{c_1}{a_1}, \frac{r_n}{b_n}]{a_1 b_n} \begin{vmatrix} b_1 & a_1 b_2 & a_1 b_3 & \cdots & a_1 b_n \\ b_2 & a_2 b_2 & a_2 b_3 & \cdots & a_2 b_n \\ b_3 & a_2 b_3 & a_3 b_3 & \cdots & a_3 b_n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \end{vmatrix} \\
&\xrightarrow[i=1, \dots, n-1]{-b_i r_n + r_i} a_1 b_n \begin{vmatrix} 0 & a_1 b_2 - a_2 b_1 & a_1 b_3 - a_3 b_1 & \cdots & a_1 b_n - a_n b_1 \\ 0 & 0 & a_2 b_3 - a_3 b_2 & \cdots & a_2 b_n - a_n b_2 \\ 0 & 0 & 0 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \cdots & 0 & a_{n-1} b_n - a_n b_{n-1} \\ 1 & a_2 & a_3 & \cdots & \cdots & a_n \end{vmatrix} \\
&= a_1 b_n \prod_{i=1}^{n-1} (a_{i+1} b_i - a_i b_{i+1}).
\end{aligned}$$

37. Fibonacci 数(费波那奇数)  $F_i$  由条件  $F_0 = F_1 = 1, F_2 = 2, F_n = F_{n-1} + F_{n-2} (n \geq 3)$  所定义, 求证:

$$F_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \ddots & \ddots & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{vmatrix}_{n \times n}, \quad (n \geq 1)$$

证 按第一行展开, 得

$$F_n = F_{n-1} + F_{n-2}.$$

38. 计算  $n$  阶行列式

$$\Delta_n = \begin{vmatrix} 1 & a_1 & \cdots & a_1^k & a_1^{k+3} & \cdots & a_1^{n+1} \\ 1 & a_2 & \cdots & a_2^k & a_2^{k+3} & \cdots & a_2^{n+1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & a_n & \cdots & a_n^k & a_n^{k+3} & \cdots & a_n^{n+1} \end{vmatrix}$$

解 把  $\Delta_n$  添加两行两列得到一个  $n+2$  个变元的 Vandermonde 行列式.

$$\begin{aligned} \Delta_{n+2} &= \begin{vmatrix} 1 & a_1 & \cdots & a_1^k & a_1^{k+1} & a_1^{k+2} & a_1^{k+3} & \cdots & a_1^{n+1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & a_n & \cdots & a_n^k & a_n^{k+1} & a_n^{k+2} & a_n^{k+3} & \cdots & a_n^{n+1} \\ 1 & z_1 & \cdots & z_1^k & z_1^{k+1} & z_1^{k+2} & z_1^{k+3} & \cdots & z_1^{n+1} \\ 1 & z_2 & \cdots & z_2^k & z_2^{k+1} & z_2^{k+2} & z_2^{k+3} & \cdots & z_2^{n+1} \end{vmatrix} \\ &= V_{n+2}(a_1, \cdots, a_n, z_1, z_2) \end{aligned}$$

显然  $\Delta_n$  是  $\Delta_{n+2}$  中子式  $\begin{vmatrix} z_1^{k+1} & z_1^{k+2} \\ z_2^{k+1} & z_2^{k+2} \end{vmatrix}$  的余子式, 也是  $z_1^{k+1} z_2^{k+2}$  的系数.

再看等式右边  $z_1^{k+1} z_2^{k+2}$  的系数, 为此把右边写成如下形式

$$\begin{aligned} V_{n+2}(a_1, \cdots, a_n, z_1, z_2) &= (z_2 - z_1)(z_2 - a_n)(z_2 - a_{n-1}) \cdots (z_2 - a_1) \\ &\quad \cdot (z_1 - a_n)(z_1 - a_{n-1}) \cdots (z_1 - a_1) \\ &\quad \cdot V_n(a_1, \cdots, a_n) \end{aligned}$$

(1) 若  $z_1^{k+1}$  全由第 2 行取, 则系数为  $V_n \cdot \sigma_{n-k-1} \cdot \sigma_{n-k-1} (-1)^{2(n-k-1)}$

(2) 若  $z_1^{k+1}$  在第 1 行取  $z_1$ , 则系数为  $V_n \cdot \sigma_{n-k-2} \cdot \sigma_{n-k} (-1)^{(n-k)+(n-k-2)+1}$

所以在右边的乘积中  $z_1^{k+1} z_2^{k+2}$  的系数为  $V_n [\sigma_{n-k-1}^2 - \sigma_{n-k} \sigma_{n-k-2}]$

所以  $\Delta_n = [\sigma_{n-k-1}^2 - \sigma_{n-k} \sigma_{n-k-2}] V_n(a_1, \cdots, a_n)$ .

其中  $\sigma_k = \sum_{1 \leq i_1 < \cdots < i_k \leq n} a_{i_1} \cdots a_{i_k}$  是  $a_1, \cdots, a_n$  的初等对称多项式.

39. 设  $a_{ij}, b_{ij}$  分别为  $n$  阶行列式  $\det A, \det B$  的元素, 且满足  $b_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} - a_{ij} (i = 1, \cdots, n, j = 1, \cdots, n)$ , 试证:  $\det B = (-1)^{n-1} (n-1) \det A$ .

证 方法 1 记  $s_i = \sum_{k=1}^n a_{ik}$ , 则  $b_{ij} = s_i - a_{ij}$ , 于是

$$\begin{aligned} \det B &\stackrel{\text{加边}}{=} \begin{vmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ s_1 & s_1 - a_{11} & \cdots & s_1 - a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ s_n & s_n - a_{n1} & \cdots & s_n - a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -1 & \cdots & -1 \\ s_1 & -a_{11} & \cdots & -a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ s_n & -a_{n1} & \cdots & -a_{nn} \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} -(n-1) & -1 & \cdots & -1 \\ 0 & -a_{11} & \cdots & -a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & -a_{n1} & \cdots & -a_{nn} \end{vmatrix} \\ &= -(n-1)(-1)^n \det A. \end{aligned}$$



方法 2 利用矩阵乘法和公式  $\det(I_n - \alpha\alpha^T) = \det(1 - \alpha^T\alpha)$ .

$$\begin{aligned}\det B = \det(s_i - a_{ij}) &= \left| A \begin{bmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix} (1 \cdots 1) - A \right| \\ &= (\det A)(-1)^n \left| I - \begin{bmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix} (1 \cdots 1) \right| \\ &= \det A \cdot (-1)^n \cdot \left| 1 - (1 \cdots 1) \begin{bmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix} \right| \\ &= (-1)^n (1 - n) \cdot \det A.\end{aligned}$$

40. 设  $n$  阶行列式  $\det A$  的元素为  $a_{ij}$ , 行列式

$$\det D = \begin{vmatrix} a_{11} + x & a_{12} + x & \cdots & a_{1n} + x \\ a_{21} + x & a_{22} + x & \cdots & a_{2n} + x \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} + x & a_{n2} + x & \cdots & a_{nn} + x \end{vmatrix}.$$

试证  $\det D = \det A + x \sum_{i,j=1}^n A_{ij}$ , 其中  $A_{ij}$  为  $a_{ij}$  在  $\det A$  中的代数余子式.

证 把  $\det D$  升阶得到

$$\begin{aligned}\det D &= \begin{vmatrix} 1 & -x & \cdots & -x \\ 0 & & & \\ \vdots & & D & \\ 0 & & & \end{vmatrix}_{n+1} \xrightarrow[r_1 + r_i]{i=2, \cdots, n+1} \begin{vmatrix} 1 & -x & \cdots & -x \\ 1 & & & \\ \vdots & & A & \\ 1 & & & \end{vmatrix} \\ &\xrightarrow[\text{按第 1 列展开}]{\det A} - \begin{vmatrix} -x & \cdots & \cdots & -x \\ a_{21} & \cdots & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & \cdots & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} + \cdots + \begin{vmatrix} -x & \cdots & \cdots & -x \\ a_{11} & \cdots & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n-11} & \cdots & \cdots & a_{n-1n} \end{vmatrix} (-1)^n \\ &= \det A + x \sum_{j=1}^n A_{1j} + \cdots + x \sum_{j=1}^n A_{nj} \\ &= \det A + x \sum_{i,j=1}^n A_{ij}.\end{aligned}$$

41. 设  $A = (a_{ij})$ ,  $A_{ij}$  是  $a_{ij}$  在  $\det A$  中的代数余子式, 求证

$$\begin{vmatrix} a_{11} - a_{12} & a_{12} - a_{13} & \cdots & a_{1n-1} - a_{1n} & 1 \\ a_{21} - a_{22} & a_{22} - a_{23} & \cdots & a_{2n-1} - a_{2n} & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n1} - a_{n2} & a_{n2} - a_{n3} & \cdots & a_{nn-1} - a_{nn} & 1 \end{vmatrix} = \sum_{i,j=1}^n A_{ij}.$$

证

$$\text{左边} \xrightarrow{\text{升阶}} \begin{vmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ a_{1n} & a_{11} - a_{12} & \cdots & a_{1n-1} - a_{1n} & 1 \\ a_{2n} & a_{21} - a_{22} & \cdots & a_{2n-1} - a_{2n} & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{nn} & a_{n1} - a_{n2} & \cdots & a_{nn-1} - a_{nn} & 1 \end{vmatrix}_{n+1} = \begin{vmatrix} 1 & \cdots & \cdots & 1 & 0 \\ a_{1n} & a_{11} & \cdots & a_{1n-1} & 1 \\ a_{2n} & a_{21} & \cdots & a_{2n-1} & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{nn} & a_{n1} & \cdots & a_{nn-1} & 1 \end{vmatrix}_{n+1},$$

上述第二个等号实行的操作是:  $c_1 + c_n, c_n + c_{n-1}, \cdots, c_3 + c_2$ . 下面把最后一个行列式先按第一行展开, 得  $n$  个  $n$  阶行列式, 然后再把每个  $n$  阶行列式按第  $n$  列展开即得结论.

#### 42. 计算 $n$ 阶行列式

$$\begin{aligned} (1) D_n &= \begin{vmatrix} a_1 + b_1 & a_1 + b_2 & \cdots & a_1 + b_n \\ a_2 + b_1 & a_2 + b_2 & \cdots & a_2 + b_n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_n + b_1 & a_n + b_2 & \cdots & a_n + b_n \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} a_1 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ a_2 & \vdots & \vdots & & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_n & 1 & 0 & \cdots & 0 \end{vmatrix} \times \begin{vmatrix} 1 & \cdots & \cdots & \cdots & 1 \\ b_1 & b_2 & \cdots & \cdots & b_n \\ 0 & \cdots & \cdots & \cdots & 0 \\ \vdots & & & & \vdots \\ 0 & \cdots & \cdots & \cdots & 0 \end{vmatrix} \\ &= \begin{cases} 0, & n \geq 3 \\ a_1 + b_1, & n = 1 \\ (a_1 - a_2)(b_2 - b_1), & n = 2 \end{cases} \\ (2) & \begin{vmatrix} \sin 2\alpha & \sin(\alpha_1 + \alpha_2) & \cdots & \sin(\alpha_1 + \alpha_n) \\ \sin(\alpha_2 + \alpha_1) & \sin 2\alpha_2 & \cdots & \sin(\alpha_2 + \alpha_n) \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \sin(\alpha_n + \alpha_1) & \sin(\alpha_n + \alpha_2) & \cdots & \sin 2\alpha_n \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} \sin \alpha_1 & \cos \alpha_1 & 0 & \cdots & 0 \\ \sin \alpha_2 & \cos \alpha_2 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ \sin \alpha_n & \cos \alpha_n & 0 & \cdots & 0 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} \cos \alpha_1 & \cos \alpha_2 & \cdots & \cdots & \cos \alpha_n \\ \sin \alpha_1 & \sin \alpha_2 & \cdots & \cdots & \sin \alpha_n \\ 0 & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \cdots & 0 \end{vmatrix} = 0, \quad (n > 2). \\ (3) & \begin{vmatrix} \lambda & 2 & 3 & \cdots & n \\ 1 & \lambda + 1 & 3 & \cdots & n \\ 1 & 2 & \lambda + 2 & \cdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & n \\ 1 & 2 & \cdots & \cdots & \lambda + n - 1 \end{vmatrix} = \left| (\lambda - 1)I_n + \begin{bmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix} (1, 2, \cdots, n) \right| \\ &= (\lambda - 1)^n \left| 1 + \frac{1}{\lambda - 1} (1, 2, \cdots, n) \begin{bmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix} \right| \end{aligned}$$

$$(4) \quad \begin{vmatrix} a_0 & a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} \\ \mu a_{n-1} & a_0 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & a_2 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & a_1 \\ \mu a_1 & \cdots & \cdots & \mu a_{n-1} & a_0 \end{vmatrix} = \det A$$

$$A \begin{bmatrix} 1 \\ u \\ u^2 \\ \vdots \\ u^{n-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_0 + a_1 u + \cdots + a_{n-1} u^{n-1} \\ a_{n-1} \mu + a_0 u + \cdots + a_{n-2} u^{n-1} \\ \dots\dots\dots \\ \mu a_1 + \mu a_2 u + \cdots + a_0 u^{n-1} \end{bmatrix} = f(u) \begin{bmatrix} 1 \\ u \\ u^2 \\ \vdots \\ u^{n-1} \end{bmatrix}$$

我们设  $\omega = \exp(2\pi i/n)$  为  $n$  次本原单位根 ( $\omega^n = 1, \omega^k \neq 1, 0 < k < n$ ), 于是对任意取定的一个  $\alpha = \sqrt[n]{\mu} \in \mathbf{C}$ ,  $\alpha, \omega\alpha, \omega^2\alpha, \dots, \omega^{n-1}\alpha$  互异且均为  $\mu$  的  $n$  次根. 记

$$W_j = \begin{bmatrix} 1 \\ \omega^j \alpha \\ \omega^{2j} \alpha^2 \\ \vdots \\ \omega^{(n-1)j} \alpha^{n-1} \end{bmatrix}, \quad \text{方阵 } W = (W_0, W_1, \dots, W_{n-1})$$

$$\begin{aligned} AW &= (AW_0, AW_1, \dots, AW_{n-1}) \\ &= (f(\alpha)W_0, f(\omega\alpha)W_1, \dots, f(\omega^{n-1}\alpha)W_{n-1}) \\ &= (W_0, W_1, \dots, W_{n-1}) \begin{bmatrix} f(\alpha) & & \\ & \ddots & \\ & & f(\omega^{n-1}\alpha) \end{bmatrix} \\ &= W \cdot \text{diag}\{f(\alpha), f(\omega\alpha), \dots, f(\omega^{n-1}\alpha)\} \end{aligned}$$
$$\det A = f(\alpha) f(\omega \alpha) \cdots f(\omega^{n-1} \alpha).$$

$$(5) \quad \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ -a_n & a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \ddots & a_2 \\ -a_2 & -a_3 & \cdots & -a_n & a_1 \end{vmatrix}$$

43. 设  $S_k = \lambda_1^k + \lambda_2^k + \cdots + \lambda_n^k (k=1, 2, \cdots)$ , 求证

$$\begin{vmatrix} n & S_1 & S_2 & \cdots & S_{n-1} \\ S_1 & S_2 & S_3 & \cdots & S_n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ S_{n-1} & S_n & S_{n+1} & \cdots & S_{2n-2} \end{vmatrix} = \prod_{1 \leq j < i \leq n} (\lambda_i - \lambda_j)^2.$$

证明 把左边拆成两个行列式之积, 即有

$$\begin{aligned} \text{左边} &= \begin{vmatrix} 1 & \cdots & \cdots & \cdots & 1 \\ \lambda_1 & \cdots & \cdots & \cdots & \lambda_n \\ \lambda_1^2 & \cdots & \cdots & \cdots & \lambda_n^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \lambda_1^{n-1} & \cdots & \cdots & \cdots & \lambda_n^{n-1} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 1 & \lambda_1 & \cdots & \cdots & \lambda_1^{n-1} \\ \vdots & \vdots & & & \vdots \\ \vdots & \vdots & & & \vdots \\ \vdots & \vdots & & & \vdots \\ 1 & \lambda_n & \cdots & \cdots & \lambda_n^{n-1} \end{vmatrix} \\ &= (V_n(\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n))^2 = \text{右边}. \end{aligned}$$

## 2.4 补充题与解答

### 1. 计算行列式

$$\begin{vmatrix} 1+a_1+b_1 & a_1+b_2 & \cdots & a_1+b_n \\ a_2+b_1 & 1+a_2+b_2 & \cdots & a_2+b_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_n+b_1 & a_n+b_2 & \cdots & 1+a_n+b_n \end{vmatrix}$$

方法 1

$$\begin{aligned} \Delta_n &= \left| I + \begin{bmatrix} a_1+b_1 & a_1+b_2 & \cdots & a_1+b_n \\ a_2+b_1 & a_2+b_2 & \cdots & a_2+b_n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_n+b_1 & a_n+b_2 & \cdots & a_n+b_n \end{bmatrix} \right| \\ &= \left| I_n + \begin{bmatrix} a_1 & 1 \\ a_2 & 1 \\ \vdots & \vdots \\ a_n & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ b_1 & b_2 & \cdots & b_n \end{bmatrix} \right| = I_2 + \left| \begin{bmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ b_1 & b_2 & \cdots & b_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 & 1 \\ a_2 & 1 \\ \vdots & \vdots \\ a_n & 1 \end{bmatrix} \right| \\ &= \left| I_2 + \begin{bmatrix} \sum_{k=1}^n a_k & n \\ \sum_{k=1}^n a_k b_k & \sum_{k=1}^n b_k \end{bmatrix} \right| = (1 + \sum_{k=1}^n a_k)(1 + \sum_{k=1}^n b_k) - n \sum_{k=1}^n a_k b_k. \end{aligned}$$

方法 2(加边)

$$\Delta_n \xrightarrow{\text{加边}} \begin{vmatrix} 1 & -b_1 & -b_2 & \cdots & -b_n \\ 0 & 1+a_1+b_1 & a_1+b_2 & \cdots & a_1+b_n \\ 0 & a_2+b_1 & 1+a_2+b_2 & \cdots & a_2+b_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & a_n+b_1 & a_n+b_2 & \cdots & 1+a_n+b_n \end{vmatrix}_{n+1}$$

$$\begin{array}{c} \hline \hline r_1 + r_i \\ i = 2, \dots, n+1 \end{array} \left| \begin{array}{ccccc} 1 & -b_1 & -b_2 & \cdots & -b_n \\ 1 & 1+a_1 & a_1 & \cdots & a_1 \\ 1 & a_2 & 1+a_2 & \cdots & a_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & a_n & a_n & \cdots & 1+a_n \end{array} \right|_{n+1}$$

$$\begin{array}{c} \hline \hline \text{加边} \end{array} \left| \begin{array}{cccccc} 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & -b_1 & -b_2 & \cdots & -b_n \\ -a_1 & 1 & 1+a_1 & a_1 & \cdots & a_1 \\ -a_2 & 1 & a_2 & 1+a_2 & \cdots & a_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -a_n & 1 & a_n & a_n & \cdots & 1+a_n \end{array} \right|_{n+2}$$

$$\begin{array}{c} \hline \hline c_1 + c_j \\ j = 3, \dots, n+2 \end{array} \left| \begin{array}{cccccc} 1 & 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & 1 & -b_1 & -b_2 & \cdots & -b_n \\ -a_1 & 1 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ -a_2 & 1 & 0 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ -a_n & 1 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{array} \right|_{n+2}$$

$$\begin{array}{c} \hline \hline \begin{array}{l} -c_j + c_2 \rightarrow c_2 \\ a_{j-2}c_j + c_1 \rightarrow c_1 \end{array} \\ j = 3, \dots, n+2 \end{array} \left| \begin{array}{cccccc} 1 + \sum_{i=1}^n a_i & -n & 1 & \cdots & \cdots & 1 \\ -\sum_{i=1}^n a_i b_i & 1 + \sum_{i=1}^n b_i & -b_1 & \cdots & \cdots & -b_n \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & 0 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{array} \right|_{n+2}$$

$$= (1 + \sum_{k=1}^n a_k)(1 + \sum_{k=1}^n b_k) - n \sum_{k=1}^n a_k b_k.$$

$$\begin{array}{c} \hline \hline \text{2. 方法 1} \end{array} \left| \begin{array}{cccc} 1+a_1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1+a_2 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 1 \\ 1 & \cdots & 1 & 1+a_n \end{array} \right|_n \xrightarrow{\text{加边}} \left| \begin{array}{ccccc} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & 1+a_1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & 1 & 1+a_2 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & 1 \\ 0 & 1 & \cdots & 1 & 1+a_n \end{array} \right|_{n+1}$$

$$\begin{array}{c} \hline \hline -r_1 + r_i \\ i = 2, \dots, n+1 \end{array} \left| \begin{array}{ccccc} 1 & 1 & \cdots & \cdots & 1 \\ -1 & a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & 0 & a_2 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ -1 & 0 & \cdots & 0 & a_n \end{array} \right|_{n+1}$$

$$\frac{\frac{1}{a_j}c_{j+1} + c_1}{j=1, \dots, n} \begin{vmatrix} 1 + \sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i} & 1 & \cdots & \cdots & 1 \\ 0 & a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & 0 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & a_n \end{vmatrix}_{n+1}$$

$$= \left(1 + \sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i}\right) \prod_{i=1}^n a_i.$$

$$\text{方法 2} \quad \Delta_n = \begin{vmatrix} \begin{bmatrix} a_1 & & \\ & a_2 & \\ & & \ddots \\ & & & a_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & \cdots & \cdots & 1 \end{bmatrix} \end{vmatrix}$$

记  $A = \text{diag}\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ ,  $\alpha = (1, 1, \dots, 1)^T$ , 则有

$$\begin{aligned} \Delta_n &= \det(A + \alpha\alpha^T) = (\det A) \det(I_n + A^{-1}\alpha \cdot \alpha^T) \\ &= (\det A) \det(I_1 + \alpha^T \cdot A^{-1}\alpha) \\ &= \left(\prod_{i=1}^n a_i\right) \left(1 + \sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i}\right). \end{aligned}$$

3. 设  $A$  是  $n$  阶方阵, 满足  $AA^T = I$ ,  $|A| < 0$ , 求  $|A + I|$ .

解 由已知  $(\det A)^2 = 1$ , 且  $|A| < 0$ , 所以  $\det A = -1$ . 又因为

$$|A + I| = |A + AA^T| = |A| |I + A^T| = -|(I + A)^T| = -|I + A|,$$

所以  $|A + I| = 0$ .

4. 设  $A, B$  均为  $n$  阶方阵,  $|A| = 2$ ,  $|B| = -3$ , 试求  $|2A^* B^{-1}| = ?$

解 因为  $A^{-1} = \frac{1}{\det A} A^*$ , 所以  $A^* = |A| \cdot A^{-1} = 2A^{-1}$ . 又由  $AA^{-1} = I$ ,  $BB^{-1} = I$ . 取

行列式知  $|B^{-1}| = \frac{1}{|B|} = -\frac{1}{3}$ ,  $|A^{-1}| = \frac{1}{|A|} = \frac{1}{2}$ , 故知

$$|2A^* B^{-1}| = |2 \cdot 2A^{-1} B^{-1}| = 4^n |A^{-1}| |B^{-1}| = -\frac{1}{3} \cdot 2^{2n-1}.$$

5. 已知  $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ , 且  $A^2 - AB = I_3$ , 求矩阵  $B$ .

解 由已知  $\det A = -1$ , 故  $A$  可逆. 用  $A^{-1}$  左乘方程  $A^2 - AB = I_3$  两边得

$$A - B = A^{-1} \longrightarrow B = A - A^{-1}$$

又

$$A^{-1} = \frac{1}{-1} \begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} & A_{31} \\ A_{12} & A_{22} & A_{32} \\ A_{13} & A_{23} & A_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

故

$$B = A - A^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

6. 设三阶方阵  $A, B$  满足:  $A^{-1}BA = 6A + BA$ , 且  $A = \text{diag}\left\{\frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{7}\right\}$ , 试求  $B$ .

解 因为  $A$  可逆, 所以在已给矩阵方程两边右乘  $A^{-1}$  得:

$$A^{-1}B = 6I + B \longrightarrow (A^{-1} - I)B = 6I,$$

所以 
$$B = 6(A^{-1} - I)^{-1} = 6 \left( \begin{bmatrix} 3 & & \\ & 4 & \\ & & 7 \end{bmatrix} - I_3 \right)^{-1} = \begin{bmatrix} 3 & & \\ & 2 & \\ & & 1 \end{bmatrix}.$$

## 第3章

# 线性方程组

### 3.1 定义与定理

**定义 3.1** 设  $F$  为任一域, 方程组

[illegible]

称为域  $F$  上的  $n$ (变)元  $m$  个方程的方程组.  $m \times n$  矩阵  $A = (a_{ij})$  称为系数矩阵. 此方程组也可以用矩阵乘法写为

$$Ax = b$$

其中  $x=(x_1, \cdots, x_n)^T$  为未知元列,  $b=(b_1, \cdots, b_n)^T$  为常数项列,  $m \times (n+1)$  矩阵  $(A, b)$  称为增广矩阵.

当  $b=0$  时, 方程组

$$Ax = 0$$

称为齐次线性方程组.

**定义 3.2** 对方程组的初等变换是指

- (1) 交换两个方程的位置;
- (2) 用非零常数  $\lambda \in F$  乘某方程的两边;
- (3) 把一个方程的常数倍加到另一方程上去. 显然这三种变换都是可逆的.

**定义 3.3** 形如

$$\left\{ \begin{array}{l} x_{i_1} + a'_{1(i_1+1)} x_{i_1+1} + \dots + 0x_{i_2} + \dots + 0x_{i_r} + \dots + a'_{1n} x_n = b'_1, \\ \phantom{x_{i_1} + a'_{1(i_1+1)} x_{i_1+1} + \dots + } x_{i_2} + \dots + 0x_{i_r} + \dots + a'_{2n} x_n = b'_2, \\ \phantom{x_{i_1} + a'_{1(i_1+1)} x_{i_1+1} + \dots + } \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \\ \phantom{x_{i_1} + a'_{1(i_1+1)} x_{i_1+1} + \dots + } \phantom{x_{i_2} + \dots + } x_{i_r} + \dots + a'_{rn} x_n = b'_r, \\ \phantom{x_{i_1} + a'_{1(i_1+1)} x_{i_1+1} + \dots + } \phantom{x_{i_2} + \dots + } \phantom{x_{i_r} + \dots + } 0 = b'_{r+1} \end{array} \right. \quad (2)$$

的方程组称为(既约)阶梯形方程组.

**定理 3.1 (Gauss 消元法)**  $n$  元线性方程组(1)经过初等变换可化为同解的阶梯形方程组(2). 此时若  $b'_{r+1} \neq 0$  (即存在着未知元系数全为 0 而常数项非 0 的方程), 则方程组(1)无解; 若  $b'_{r+1} = 0$ , 则方程组有解, 且恰有  $n-r$  个自由未知元 ( $r$  为非 0 方程个数).

**系** 当  $n$ (未知元个数) $>m$ (方程的个数)时,齐次线性方程组定有非 0 解.

**定义 3.4** 以下三种变换称为对矩阵的初等行变换:



- (1) 交换矩阵的两行;
- (2) 以非零常数乘以矩阵某行;
- (3) 把矩阵某行的非 0 常数倍加到另一行上去.

**定理 3.2** 每个矩阵均可经行的初等变换化为行既约阶梯形:

$$\begin{bmatrix} 0 & \cdots & 0 & 1 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & * & \cdots & * \\ & & & & & 1 & \cdots & 0 & * & \cdots & * \\ & & & & & & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ & & & & & & & 1 & * & \cdots & * \\ & & & & & & & & & 0 & \end{bmatrix}$$

其特点为:

- (1) 非 0 行的最左非 0 元素为 1, 且此 1 所在列的其余元素为 0.
- (2) 各非 0 行最左非 0 元素 1 的位置, 随行号增加而右移, 若有零行均排在最后.

最后的 0 可能是子方阵, 也可能没有.

**定义 3.5** 矩阵  $M$  的秩即其最高阶非 0 子式的阶数, 记为  $\text{rank}M$  或  $r(M)$ .

**定理 3.3** 行的初等变换不改变矩阵的秩.

**定理 3.4**  $n$  元线性方程组  $Ax=b$  有解的充分必要条件是系数矩阵与增广矩阵的秩相同, 即  $r(A)=r(A,b)$ , 而且当方程组  $Ax=b$  有解时, 解由  $n-r(A)$  个自由未知元决定.

**系**  $n$  元齐次线性方程组  $Ax=0$  有非 0 解的充分必要条件是  $n-r(A)>0$ .

**定义 3.6** 设  $A$  为方阵, 如果存在方阵  $B$  使

$$AB = BA = I$$

则称  $A$  是可逆的(或非奇异的, 或满秩的), 此时称  $B$  为  $A$  的逆, 记为  $B=A^{-1}$ .

**定理 3.5**  $n$  阶方阵  $A$  可逆的充分必要条件为  $\det A \neq 0$ , (即  $r(A)=n$ ) 且当  $A$  可逆时有  $A^{-1}=(\det A)^{-1}A^*$ , 是唯一的.

逆方阵有如下性质:

- (1)  $(A^{-1})^{-1}=A$ ; (2)  $(A^T)^{-1}=(A^{-1})^T$ ;
- (3)  $(AB)^{-1}=B^{-1}A^{-1}$ ; (4)  $(\lambda A)^{-1}=\lambda^{-1}A^{-1}$  ( $\lambda \in F, \lambda \neq 0$ );
- (5)  $\det A^{-1}=(\det A)^{-1}$ ;
- (6) 如果  $A$  可逆, 那么  $Ax=b$  有唯一解  $x=A^{-1}b$ .
- (7) 设  $A$  是  $m \times n$  矩阵,  $P$  是  $m$  阶可逆方阵,  $Q$  是  $n$  阶可逆阵, 则有

$$r(A) = r(PA) = r(AQ) = r(PAQ).$$

**定义 3.7** 设  $F$  为任一域,  $F$  中的  $n$  个数组成的有序数组

$$(a_1, a_2, \cdots, a_n) \quad (a_i \in F, \quad 1 \leq i \leq n)$$

称为  $F$  上的一个  $n$  数组行向量,  $a_i$  称为其第  $i$  分量 ( $1 \leq i \leq n$ ). 全体  $n$  数组行向量记为  $F^n$ . 规定两行向量  $(a_1, \cdots, a_n)$  与  $(b_1, \cdots, b_n)$  相等意义为  $a_i=b_i$  ( $1 \leq i \leq n$ ).

**定义 3.8** 行向量间的加法定义为

$$(a_1, \cdots, a_n) + (b_1, \cdots, b_n) = (a_1 + b_1, \cdots, a_n + b_n),$$

域  $F$  的元素也称为常数.  $\lambda \in F$  与行向量的乘法称为数乘, 定义为

$$\lambda(a_1, \cdots, a_n) = (\lambda a_1, \cdots, \lambda a_n).$$

$F^n$  中行向量的加法和数乘满足如下规律:

(1) 行向量集  $F^n$  对加法成 Abel 群, 即满足:

- ① 加法交换律  $\alpha + \beta = \beta + \alpha, \quad \forall \alpha, \beta \in F^n,$
- ② 加法结合律  $(\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma),$
- ③ 存在零元素  $0 = (0, \dots, 0),$  使  $0 + \alpha = \alpha,$
- ④ 任一向量  $\alpha = (a_1, \dots, a_n)$  有负元  $-\alpha = (-a_1, \dots, -a_n)$  使  $-\alpha + \alpha = 0.$

(2) 数乘满足(与域  $F$  的运算及向量加法的协合性):

- ①  $\lambda(\alpha + \beta) = \lambda\alpha + \lambda\beta,$
- ②  $(\lambda_1 + \lambda_2)\alpha = \lambda_1\alpha + \lambda_2\alpha,$
- ③  $(\lambda_1\lambda_2)\alpha = \lambda_1(\lambda_2\alpha),$
- ④  $1\alpha = \alpha.$

(对任意  $\lambda_1, \lambda_2, \lambda \in F, \alpha, \beta, \gamma \in F^n$ ).

**定义 3.9** 域  $F$  上  $n$  数组行向量集合  $F^n$  对于上述定义的加法和数乘(及其满足的 8 条性质)称为域  $F$  上的  $n$  数组行向量空间(或  $n$  维行向量空间).

类似地, 可以定义  $n$  数组列向量空间  $F^{(n)}$ , 即

$$F^{(n)} = \{(a_1, \dots, a_n)^T \mid a_1, \dots, a_n \in F\}.$$

**定义 3.10** (1) 行向量  $\beta \in F^n$  称为是  $F^n$  中行向量  $\alpha_1, \dots, \alpha_s$  的线性组合, 是指存在常数  $\lambda_1, \dots, \lambda_s \in F$  使

$$\beta = \lambda_1\alpha_1 + \dots + \lambda_s\alpha_s,$$

此时也称  $\beta$  可由  $\alpha_1, \dots, \alpha_s$  线性表出.

(2) 行向量组  $\{\beta_1, \dots, \beta_t\} \subset F^n$  称为可由向量组  $\{\alpha_1, \dots, \alpha_s\} \subset F^n$  线性表出, 是指每个  $\beta_i (1 \leq i \leq t)$  均可由  $\alpha_1, \dots, \alpha_s$  线性表出.

(3) 若两个行向量组  $S_1$  与  $S_2$  可以互相线性表出, 则称二者等价或线性等价, 记为  $S_1 \sim S_2$ .

显然零向量可由任一组向量线性表出. 单位向量组  $\epsilon_1 = (1, 0, \dots, 0), \dots, \epsilon_n = (0, \dots, 0, 1)$  可以线性表出任一向量.

**定义 3.11** 向量组  $\alpha_1, \dots, \alpha_s \in F^n (s \geq 1)$  称为线性相关的, 如果存在不全为 0 的常数  $\lambda_1, \dots, \lambda_s \in F$  使

$$\lambda_1\alpha_1 + \dots + \lambda_s\alpha_s = 0;$$

否则称  $\alpha_1, \dots, \alpha_s$  是线性无关的或线性独立的.

所以  $\alpha_1, \dots, \alpha_s$  线性无关意味着: 若  $\lambda_1\alpha_1 + \dots + \lambda_s\alpha_s = 0$ , 则必有  $\lambda_1 = \dots = \lambda_s = 0$ .

**引理 1** 向量组  $\alpha_1, \dots, \alpha_s \in F^n$  线性相关当且仅当其中某一个向量可表为该组其余向量的线性组合.

**引理 2** (1) 若向量组  $\alpha_i = (a_{i1}, \dots, a_{in}) \in F^n (1 \leq i \leq s)$  线性无关, 则“接长”的向量组  $\tilde{\alpha}_i = (a_{i1}, \dots, a_{in}, a_{in+1}, \dots, a_{im}) \in F^m (1 \leq i \leq s)$  仍线性无关.

(2) 若向量组  $\beta_i = (b_{i1}, \dots, b_{in}) \in F^n (1 \leq i \leq s)$  线性相关, 则“截短”的向量组  $\beta_i^* = (b_{i1}, \dots, b_{ik}) \in F^k$  (这里  $k < n$ ) ( $1 \leq i \leq s$ ) 也线性相关.

**定理 3.6** 若  $t$  个向量  $\alpha_1, \dots, \alpha_t$  可由个数比  $t$  少的向量构成的向量组线性表出, 则

$\alpha_1, \dots, \alpha_t$  线性相关.

**系 1** 若线性无关的向量组  $\alpha_1, \dots, \alpha_t$  可由  $\beta_1, \dots, \beta_s$  线性表出, 则  $t \leq s$ .

**系 2**  $F^n$  中任意  $n+1$  个向量必定线性相关.

**系 3** 两个等价的线性无关的向量组具有相同的向量个数.

**定义 3.12** 设  $S$  是一个向量组,  $T$  是  $S$  的子集. 如果  $T$  是线性无关的, 且  $S$  中没有包含  $T$  的更大的线性无关子集, 则称  $T$  是  $S$  的极大无关组或极大线性无关组.

**定理 3.7** 一个向量组  $S$  的各个极大线性无关组相互等价, 含有向量的个数相同 (此个数称为向量组  $S$  的秩, 记为  $r(S)$ ).

**定义 3.13** 矩阵  $A$  的行秩即为  $A$  的行向量全体组成的向量组的秩, 记为  $\text{rankr}(A)$  或  $r_r(A)$ . 同样矩阵  $A$  的列秩  $r_c(A)$  即为  $A$  的列向量组的秩.

**定理 3.8** 行的初等变换不改变矩阵的行秩, 也不改变矩阵的列秩. 更进一步, 行的初等变换不改变矩阵任意列间的线性相关性, 即若矩阵的第  $j_1, \dots, j_s$  列原是线性无关 (或相关的), 则行初等变换后这些列仍是线性无关 (或相关的).

由此定理得到求向量组  $\alpha_1, \dots, \alpha_s \in F^n$  的极大线性无关组的方法.

把  $\alpha_i^T$  作为矩阵的第  $i$  列, 即令  $A = (\alpha_1^T, \dots, \alpha_s^T)$ , 对  $A$  做初等行变换化为既约阶梯形  $\tilde{A}$ , 设  $\tilde{A}$  的列向量组的极大线性无关组为  $\tilde{\alpha}_{i_1}, \dots, \tilde{\alpha}_{i_r}$ , 则  $\alpha_{i_1}, \dots, \alpha_{i_r}$  就是  $\alpha_1, \dots, \alpha_s$  的极大线性无关组.

**定理 3.9** 矩阵的秩、行秩和列秩三者相等.

**系**  $\det A = 0$  当且仅当  $A$  的行向量组线性相关.

**定义 3.14** 设  $W$  是  $F^n (= \{(a_1, \dots, a_n) \mid a_i \in F\})$  的一个非空子集且对  $F^n$  中的加法及数乘封闭, 则称  $W$  是  $F^n$  的子空间.  $W$  的极大线性无关组称为  $W$  的基,  $W$  的秩称为  $W$  的维数, 记为  $\dim(W)$ .

**定理 3.10** (1) 设  $Ax=0$  为域  $F$  上  $n$  元齐次线性方程组,  $W_A$  为其解 (列) 向量全体, 则  $W_A$  是列向量空间  $F^{(n)}$  的  $n-r(A)$  维子空间, 称为解 (子) 空间.

(2) 设  $Ax=b$  为域  $F$  上  $n$  元非齐次线性方程组, 则其解 (列) 向量全体为

$$x_0 + W_A = \{x_0 + x \mid x \in W_A\},$$

其中  $x_0$  是  $Ax=b$  的任一固定解 (称为特解),  $W_A$  是相应齐次方程组  $Ax=0$  的解子空间 ( $x_0 + W_A$  称为  $Ax=b$  的解陪集).

**求  $W_A$  的方法:** 用 Gauss 消元法化  $Ax=0$  为阶梯形方程组, 设  $r(A)=r$ , 且设  $x_{r+1}, \dots, x_n$  为自由未知元, 分别令

$$\begin{bmatrix} x_{r+1} \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, \dots, \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix},$$

得  $Ax=0$  的  $n-r$  个特殊解

$$\eta_1 = \begin{bmatrix} b_{11} \\ \vdots \\ b_{r1} \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, \eta_2 = \begin{bmatrix} b_{12} \\ \vdots \\ b_{r2} \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, \dots, \eta_{n-r} = \begin{bmatrix} b_{1n-r} \\ \vdots \\ b_{rn-r} \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

称为  $Ax=0$  的基础解系,  $\eta_1, \dots, \eta_{n-r}$  就是  $W_A$  的基, 即

$$W_A = c_1 \eta_1 + c_2 \eta_2 + \dots + c_{n-r} \eta_{n-r}, \quad (c_1, \dots, c_{n-r} \in F)$$

**定义 3.15** 若矩阵  $C$  的列向量组线性无关, 则称  $C$  为列独立阵(或列满秩阵). 若矩阵  $R$  的行向量组线性无关, 则称  $R$  为行独立阵(或行满秩阵).

**定理 3.11** (1)  $Cx=0$  只有零解  $\Leftrightarrow C$  为列独立阵.

(2)  $Rx=b$  总有解(对任意  $b$ )  $\Leftrightarrow R$  为行独立阵.

**引理 3.3** 域  $F$  上两个非零多项式

$$f(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \dots + a_n,$$

$$g(x) = b_0 x^m + b_1 x^{m-1} + \dots + b_m, \quad (a_0, b_0 \text{ 不全为 } 0),$$

不互素(即有非常数公因子)的充分必要条件为: 存在不全为 0 的两多项式  $u(x), v(x) \in F[x]$  使得

$$u(x)f(x) = v(x)g(x),$$

其中

$$\deg u(x) < m, \quad \deg v(x) < n.$$

**定义 3.16** 设  $f(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \dots + a_n$ ,  $g(x) = b_0 x^m + b_1 x^{m-1} + \dots + b_m$  为  $F$  上两非 0 多项式, 记

$$A = \begin{bmatrix} a_0 & a_1 & \cdots & a_n & & \\ & a_0 & \cdots & & a_n & \\ & & \ddots & & & \ddots \\ & & & a_0 & \cdots & a_n \end{bmatrix}_{m \times (m+n)}$$

$$B = \begin{bmatrix} b_0 & \cdots & b_m & & \\ & b_0 & \cdots & b_m & \\ & & \ddots & & \ddots \\ & & & b_0 & \cdots & b_m \end{bmatrix}_{n \times (m+n)}$$

则  $\det \begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix}$  称为  $f(x)$  与  $g(x)$  的结式, 记为  $R(f, g)$ .

**定理 3.12** 域  $F$  上两非 0 多项式  $f(x) = a_0 x^n + \dots + a_n$ ,  $g(x) = b_0 x^m + \dots + b_m$  ( $a_0, b_0$  不全为 0) 不互素的充分必要条件是

$$R(f, g) = \det \begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix} = 0.$$

**定理 3.13** 两多项式  $f(x) = a_0(x-x_1)\cdots(x-x_n)$ ,  $g(x) = b_0(x-y_1)\cdots(x-y_m)$  的

结式

$$R(f, g) = a_0^m b_0^n \prod_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq m}} (x_i - y_j) = a_0^m \prod_{i=1}^n g(x_i) = (-1)^{mn} b_0^n \prod_{j=1}^m f(y_j).$$

**定义 3.17** 多项式  $f(x) = (x - x_1) \cdots (x - x_n)$  的判别式定义为

$$\text{disc}(f) = a_0^{2n-2} \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_i - x_j)^2.$$

**定理 3.14**  $f(x) \in F[x]$  的判别式是  $F$  中元素, 且

$$\text{disc}(f) = R(f, f') / a_0 (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}.$$

**系** 对  $f(x), g(x) \in \mathbb{C}[X]$ , 方程组  $\begin{cases} f(x) = 0 \\ g(x) = 0 \end{cases}$  有复数解当且仅当结式  $R(f, g) = 0$ .

**定理 3.15** 复数域上二元高次方程组  $\begin{cases} f(x, y) = 0 \\ g(x, y) = 0 \end{cases}$  的求解问题归结为其结式

$R_x(f, g) = 0$  的求解 (变元为  $y$ ), 即  $y_0$  是结式的零点当且仅当  $\begin{cases} f(x, y_0) = 0 \\ g(x, y_0) = 0 \end{cases}$  有解  $x_0$  或者

$a_0(y_0) = b_0(y_0) = 0$ , 这里  $a_0(y), b_0(y)$  是  $f(x, y)$  和  $g(x, y)$  作为  $x$  多项式的首项.

## 3.2 解题方法介绍

### 3.2.1 判断行向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 线性无关的方法

(1) 用定义, 即若  $k_1 \alpha_1 + \cdots + k_s \alpha_s = 0$ , 则必有  $k_1 = k_2 = \cdots = k_s = 0$ .

(2) 令  $A = (\alpha_1^T, \dots, \alpha_s^T)$ , 对矩阵  $A$  做初等行变换化为阶梯形  $\tilde{A} = (\tilde{\alpha}_1^T, \dots, \tilde{\alpha}_s^T)$ , 若  $r(\tilde{A}) = s$  (即  $\tilde{A}$  列满秩), 则  $\alpha_1, \dots, \alpha_s$  线性无关.

(3) 对于  $n$  个  $F^n$  中向量所构成的向量组 (即向量的个数等于分量的个数), 则  $A = (\alpha_1^T, \dots, \alpha_n^T)$  是方阵, 于是可计算  $A$  的行列式:

$$\det A \neq 0 \Leftrightarrow r_c(A) = n \Leftrightarrow \alpha_1^T, \dots, \alpha_n^T \text{ 线性无关} \Leftrightarrow \alpha_1, \dots, \alpha_n \text{ 线性无关}.$$

(4) 若  $m$  个  $F^n$  中向量所构成的向量组, 则

① 当  $m > n$  时, 必线性相关

② 当  $m = n$  时,  $\det A \neq 0 \Leftrightarrow \alpha_1, \dots, \alpha_n$  线性无关

③ 当  $m < n$  时, 则截短为  $F^m$  中向量 (即在  $\alpha_i$  中选取  $m$  个分量), 记为  $\beta_1^T, \dots, \beta_m^T$ , 若  $\det B = \det(\beta_1^T, \dots, \beta_m^T) \neq 0$ , 则  $\alpha_1, \dots, \alpha_m$  线性无关.

此时  $A = (\alpha_1^T, \dots, \alpha_m^T)$  是  $n \times m$  矩阵, 上法意即只要  $A$  有一个  $m$  阶子式  $\neq 0$  则  $r(A) = r_c(A) = m$ , 于是  $A$  列满秩, 即  $\alpha_1, \dots, \alpha_m$  线性无关.

### 3.2.2 关于求多项式的结式和判别式的方法

(1) 结式

设  $f(x) = a_0(x - x_1) \cdots (x - x_n) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_{n-1} x + a_n$   
 $g(x) = b_0(x - y_1) \cdots (x - y_m) = b_0 x^m + b_1 x^{m-1} + \cdots + b_{m-1} x + b_m$

其中  $a_0 b_0 \neq 0$ , 则定义

$$R(f, g) = \left| \begin{array}{cccc} a_0 & a_1 & \cdots & a_n \\ & \ddots & & \ddots \\ & & a_0 & \cdots & \cdots & a_n \\ b_1 & \cdots & \cdots & b_m \\ & \ddots & & \ddots \\ & & b_1 & \cdots & \cdots & b_m \end{array} \right| \begin{array}{l} \left. \vphantom{\begin{array}{c} a_0 \\ \vdots \\ a_0 \end{array}} \right\} m \text{ 行} \\ \left. \vphantom{\begin{array}{c} b_1 \\ \vdots \\ b_1 \end{array}} \right\} n \text{ 行} \end{array}$$

具体计算时, 要注意  $a_i, b_i$  的位置. 此定义可以用来计算, 但在某些情况下是不方便的, 所以我们又有计算公式

$$R(f, g) = a_0^m b_0^n \prod_{j=1}^n \prod_{k=1}^m (x_j - y_k) \quad (1)$$

$$= a_0^m \prod_{j=1}^n g(x_j) \quad (2)$$

$$= (-1)^{mn} a_0^m b_0^n \prod_{j=1}^n \prod_{k=1}^m (y_k - x_j) = (-1)^{mn} b_0^n \prod_{k=1}^m f(y_k) \quad (3)$$

(上面实际是 3 个公式) 还有如下结论:

- ①  $f, g$  不互素  $\Leftrightarrow R(f, g) = 0$ ;
- ②  $R(f, g_1 g_2) = R(f, g_1) \cdot R(f, g_2)$ ;
- ③  $R(f, f+g) = \begin{cases} R(f, g), & \text{若 } m > n, \\ a_0^{n-m} R(f, g), & m < n. \end{cases}$

③的证明如下: 由公式(2)有

$$R(f, f+g) = \begin{cases} a_0^m \prod_{j=1}^n (f+g)(x_j) = a_0^m \prod_{j=1}^n g(x_j) = R(f, g), & m > n \\ a_0^n \prod_{j=1}^n (f+g)(x_j) = a_0^{n-m} a_0^m \prod_{j=1}^n g(x_j) = a_0^{n-m} R(f, g), & m < n. \end{cases}$$

- ④ 若  $g = q_1(x)f + r_1, f = q_2 r_1 + r_2$  则

$$R(f, g) = a_0^{m-\deg r_1} R(f, r_1) = a_0^{m-\deg r_1} c_0^{n-\deg r_2} R(r_2, r_1).$$

其中  $c_0$  为  $r_1$  的首项系数,  $\deg r_1, \deg r_2$  分别为  $r_1$  与  $r_2$  的次数. 第 1 个等号是因为当  $m = \deg g > \deg f = n$  时

$$\begin{aligned} R(f, g) &= R(f, q_1 f + r_1) = a_0^m \prod_{j=1}^n (q_1 f + r_1)(x_j) = a_0^m \prod_{j=1}^n r_1(x_j) \\ &= a_0^{m-\deg r_1} a_0^{\deg r_1} \prod_{j=1}^n r_1(x_j) \\ &= a_0^{m-\deg r_1} R(f, r_1). \end{aligned}$$

同理得第 2 个等号.

(2) 判别式 定义:

$$\text{disc}(f) = a_0^{-1} \cdot (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} R(f, f') = a_0^{2n-2} \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_i - x_j)^2$$

$$= a_0^{2n-2} \begin{vmatrix} n & s_1 & \cdots & s_{n-1} \\ s_1 & s_2 & \cdots & s_n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ s_{n-1} & s_n & \cdots & s_{2n-2} \end{vmatrix}.$$

其中  $s_k = x_1^k + x_2^k + \cdots + x_n^k$  ( $k=1, 2, \cdots$ ). 关于判别式的定义有些书上定义为: 1)  $R(f, f')$ ; 或 2)  $(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} R(f, f')$ , 我们分别记之为  $\Delta(f)$  和  $D(f)$ , 则显然有我们给出的定义与 1), 2) 的关系如下:

$$\text{disc}(f) = a_0^{-1} (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} \Delta(f),$$

$$\text{disc}(f) = a_0^{-1} D(f).$$

请读者注意它们的差异. 关于判别式我们给出以下重要结论和性质:

①  $f$  有重根 (即  $f, f'$  不互素)  $\Leftrightarrow R(f, f') = 0 \Leftrightarrow \text{disc}(f) = 0$ ;

② 设  $f(x) = g(h(x))$ , 则

$$\Delta(f) = [\Delta(g)]^m \cdot \prod_{j=1}^n \Delta(h(x) - x_j)$$

证 ② 由已知有  $f(x) = \prod_{j=1}^n (h(x) - x_j)$ , 则

$$f'(x) = \sum_{i=1}^n \left[ \prod_{k \neq i} (h(x) - x_k) \right] h'(x).$$

故

$$\begin{aligned} \Delta(f) &= R\left(\prod_{j=1}^n [h(x) - x_j], \sum_{i=1}^n \left[ \prod_{k \neq i} (h(x) - x_k) \right] h'(x)\right) \\ &= \prod_{j=1}^n R(h(x) - x_j, h'(x) \sum_{i=1}^n \prod_{k \neq i} (h(x) - x_k)) \\ &= \prod_{j=1}^n R(h(x) - x_j, h'(x)) \cdot R(h(x) - x_j, \sum_{i=1}^n \prod_{k \neq i} (h(x) - x_k)) \\ &= \left\{ \prod_{j=1}^n \prod_{k \neq j} R(h(x) - x_j, h(x) - x_k) \right\} \left\{ \prod_{j=1}^n \Delta(h(x) - x_j) \right\} \\ &= \prod_{j=1}^n \prod_{k \neq j} (x_j - x_k)^m \left\{ \prod_{j=1}^n \Delta(h(x) - x_j) \right\} \\ &= [\Delta(g(x))]^m \cdot \prod_{j=1}^n \Delta(h(x) - x_j). \end{aligned}$$

倒数第二个等号是由于: 设  $h(x) - x_j$  的根为  $\xi_1, \cdots, \xi_m$ , 则  $h(x) - x_k = h(x) - x_j + x_j - x_k$ , 故

$$R(h(x) - x_j, h(x) - x_k) = \prod_{j=1}^m (x_j - x_k) = (x_j - x_m)^m.$$

此性质的两个特例: 1) 若  $f(x) = g(x^2)$ , 则

$$\Delta(f) = [\Delta(g(x))]^2 \cdot \prod_{j=1}^n 2^2 (-x_j) = 2^{2n} a_n [\Delta(g(x))]^2;$$

2) 若  $f(x)=g(x^m)$ , 则

$$\Delta(f) = [\Delta(g(x))]^m \cdot \prod_{j=1}^n m^m (-x_j)^{m-1} = (-1)^{m+n-1} \cdot m^{mn} \cdot a_n^{m-1} [\Delta(g(x))]^m.$$

$$\textcircled{3} \Delta((x-a)f(x)) = (-1)^n \Delta(f(x)) \cdot (f(a))^2$$

$$\text{证 左} = a_0^{2n+1} [\prod_{j \neq k} (x_j - x_k)] (-1)^n (a - x_1)^2 \cdots (a - x_n)^2 = \text{右}.$$

②, ③两条性质是用  $\Delta(f)$  的关系式给出的, 很容易把它们转化成关于  $\text{disc}(f)$  或  $D(f)$  的关系式, 请读者自己给出.

### 3.3 习题与解答

1. 用 Gauss 消元法解下列方程组.

$$(1) \begin{cases} 2x_1 + x_2 + x_3 = 2, \\ x_1 + 3x_2 + x_3 = 5, \\ x_1 + x_2 + 5x_3 = -7, \\ 2x_1 + 3x_2 - 3x_3 = 14. \end{cases}$$

解 用初等行变换将增广矩阵化为阶梯形

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 1 & 5 \\ 1 & 1 & 5 & -7 \\ 2 & 3 & -3 & 14 \end{bmatrix} &\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 5 & -7 \\ 0 & -1 & -9 & 16 \\ 0 & 2 & -4 & 12 \\ 0 & 1 & -13 & 28 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 5 & -7 \\ 0 & -1 & -9 & 16 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \\ &\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \text{所以} \begin{cases} x_1 = 1 \\ x_2 = 2 \\ x_3 = -2. \end{cases} \end{aligned}$$

$$(2) \begin{cases} 6x_1 + 6x_2 + 5x_3 + 18x_4 + 20x_5 = 14, \\ 10x_1 + 9x_2 + 7x_3 + 24x_4 + 30x_5 = 18, \\ 12x_1 + 12x_2 + 13x_3 + 27x_4 + 35x_5 = 32, \\ 8x_1 + 6x_2 + 6x_3 + 15x_4 + 20x_5 = 16, \\ 4x_1 + 5x_2 + 4x_3 + 15x_4 + 15x_5 = 11. \end{cases}$$

解

$$(A \ b) \xrightarrow{\begin{matrix} -r_2+r_3 \rightarrow r_3 \\ -r_4+r_2 \rightarrow r_2 \\ -r_1+r_4 \rightarrow r_4 \\ -r_5+r_1 \rightarrow r_1 \end{matrix}} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 & 3 & 5 & 3 \\ 2 & 3 & 1 & 9 & 10 & 2 \\ 2 & 3 & 6 & 3 & 5 & 14 \\ 2 & 0 & 1 & -3 & 0 & 2 \\ 4 & 5 & 4 & 15 & 15 & 11 \end{bmatrix}$$



$$\begin{aligned} &\rightarrow \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 & -3 & 0 & 2 \\ 0 & 3 & 0 & 12 & 10 & 0 \\ 0 & 3 & 5 & 6 & 5 & 12 \\ 0 & 1 & 0 & 6 & 5 & 1 \\ 0 & 3 & 2 & 9 & 5 & 5 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 & -3 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 6 & 5 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -6 & -5 & -3 \\ 0 & 0 & 5 & -12 & -10 & 9 \\ 0 & 0 & 2 & -9 & -10 & 2 \end{bmatrix} \\ &\rightarrow \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 & -3 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 6 & 5 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 6 & 10 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & -3 & -15 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 25 & -5 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & -3 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 5 & -1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

所以  $x_1 = \frac{1}{2}, x_2 = -2, x_3 = 3, x_4 = \frac{2}{3}, x_5 = -\frac{1}{5}$ .

注 当方程组的系数是较大的数字时,直接消元计算较繁,可先做一些初等变换,再消元,以简化计算.

$$(3) \begin{cases} 2x_1 + 7x_2 + 3x_3 + x_4 = 5, \\ x_1 + 3x_2 + 5x_3 - 2x_4 = 3, \\ x_1 + 5x_2 - 9x_3 + 8x_4 = 1, \\ 5x_1 + 18x_2 + 4x_3 + 5x_4 = 12. \end{cases}$$

解

$$\begin{bmatrix} 2 & 7 & 3 & 1 & 5 \\ 1 & 3 & 5 & -2 & 3 \\ 1 & 5 & -9 & 8 & 1 \\ 5 & 18 & 4 & 5 & 12 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 & -2 & 3 \\ 0 & 1 & -7 & 5 & -1 \\ 0 & 2 & -14 & 10 & -2 \\ 0 & 3 & -21 & 15 & -3 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 & -2 & 3 \\ 0 & 1 & -7 & 5 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

分别令

$$(x_3, x_4)^T = (1, 0)^T; (0, 1)^T; (0, 0)^T,$$

得  $W_A$  的基  $\eta_1, \eta_2$  及  $Ax=b$  的一个特解  $\eta_0$ :

$$\eta_1 = (-26, 7, 1, 0)^T; \quad \eta_2 = (17, -5, 0, 1)^T; \quad \eta_0 = (6, -1, 0, 0)^T.$$

$$\text{所以 } \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = c_1 \begin{bmatrix} -26 \\ 7 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} 17 \\ -5 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 6 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad (\text{任 } c_1, c_2 \in \mathbf{R}).$$

$$(4) \begin{cases} 2x_1 - x_2 + x_3 - x_4 = 3, \\ 4x_1 - 2x_2 - 2x_3 + 3x_4 = 2, \\ 2x_1 - x_2 + 5x_3 - 6x_4 = 1, \\ 2x_1 - x_2 - 3x_3 + 4x_4 = 5. \end{cases}$$

解

$$\begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 & -1 & 3 \\ 4 & -2 & -2 & 3 & 2 \\ 2 & -1 & 5 & -6 & 1 \\ 2 & -1 & -3 & 4 & 5 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & -4 & 5 & -4 \\ 0 & 0 & 4 & -5 & -2 \\ 0 & 0 & -4 & 5 & 2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & -4 & 5 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

所以无解. (因为  $r(A) \neq r(A, b)$ )

2.  $a, b$  取什么值时, 下面方程组有解, 并求出它的解.

$$\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 - 3x_5 = a, \\ 5x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 3x_4 - x_5 = b, \\ x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 1, \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 + 6x_5 = 3. \end{cases}$$

解 为简化计算, 先  $-r_3 + r_2 \rightarrow r_2$  再  $r_1 \leftrightarrow r_3$  后消元.

$$(A \ b) \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 & 2 & 2 & b-a \\ 3 & 2 & 1 & 1 & -3 & a \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 6 & 3 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & b-a-2 \\ 0 & -1 & -2 & -2 & -6 & a-3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & a \end{bmatrix},$$

显见, 要方程组有解必须  $a=0, b=2$ . 分别取

$$(x_3, x_4, x_5)^T = (1, 0, 0); (0, 1, 0); (0, 0, 1); (0, 0, 0),$$

得  $W_A$  的基  $\eta_1, \eta_2, \eta_3$  及非齐次的一个特解  $\eta_0$ :

$$\begin{aligned} \eta_1 &= (1, -2, 1, 0, 0)^T, & \eta_2 &= (1, -2, 0, 1, 0)^T, \\ \eta_3 &= (5, -6, 0, 0, 1)^T, & \eta_0 &= (-2, 3, 0, 0, 0)^T, \end{aligned}$$

则方程组的全部解为

$$(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5)^T = c_1 \eta_1 + c_2 \eta_2 + c_3 \eta_3 + \eta_0,$$

其中  $c_1, c_2, c_3$  为任实数.

3. 对下列各矩阵, 求  $\lambda$  的值, 使矩阵秩最小.

$$(1) \begin{bmatrix} 3 & 1 & 1 & 4 \\ \lambda & 4 & 10 & 1 \\ 1 & 7 & 17 & 3 \\ 2 & 2 & 4 & 3 \end{bmatrix}; \quad (2) \begin{bmatrix} 1 & \lambda & -1 & 2 \\ 2 & -1 & \lambda & 5 \\ 1 & 10 & -6 & 1 \end{bmatrix}$$

解 (1)

$$A \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 7 & 17 & 3 \\ 0 & -12 & -30 & -3 \\ 0 & -20 & -50 & -5 \\ 0 & 4-7\lambda & 10-17\lambda & 1-3\lambda \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 7 & 17 & 3 \\ 0 & -4 & -10 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 7\lambda & 17\lambda & 3\lambda \end{bmatrix}$$

所以  $\lambda=0, \text{rank} A=2$ . ( $\lambda \neq 0, \text{rank} A=3$ )

(2)

$$B \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & \lambda & -1 & 2 \\ 0 & -1-2\lambda & \lambda+2 & 1 \\ 0 & 10-\lambda & -5 & -1 \end{bmatrix} \Rightarrow \lambda \text{ 需满足方程 } \begin{cases} \lambda+2=5 \\ 1+2\lambda=10-\lambda \end{cases}$$

所以  $\lambda=3$ ,  $\text{rank}A=2$  ( $\lambda \neq 3$ ,  $\text{rank}A=3$ )

4. 证明: 如果矩阵包含  $m$  行并且秩为  $r$ , 则它的任何  $s$  行组成一个秩不小于  $r+s-m$  的矩阵.

证 记矩阵  $A$  的行向量为  $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ , 由已知秩  $(A)=r$ , 不妨设  $\alpha_1, \dots, \alpha_r$  为行向量组的极大线性无关组, 于是  $\alpha_{r+1}, \dots, \alpha_m$  均可由  $\alpha_1, \dots, \alpha_r$  线性表出. 任取  $A$  的  $s$  行, 即使  $\alpha_{r+1}, \dots, \alpha_m$  全被取到, 则它至少包含  $\alpha_1, \dots, \alpha_r$  中  $s-(m-r)$  个向量, 所以在  $s$  行中至少有  $s-(m-r)=r+s-m$  个线性无关, 所以其秩不小于  $r+s-m$ .

5. 用行的初等变换把下列矩阵化为既约阶梯形并求矩阵的秩.

$$(1) \begin{bmatrix} 25 & 31 & 17 & 43 \\ 75 & 94 & 53 & 132 \\ 75 & 94 & 54 & 134 \\ 25 & 32 & 20 & 48 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 25 & 31 & 17 & 43 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 3 & 5 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 25 & 31 & 17 & 43 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

所以  $\text{rank}A=3$ .

$$(2) \begin{bmatrix} 24 & 19 & 36 & 72 & -38 \\ 25 & 21 & 37 & 75 & -42 \\ 73 & 59 & 98 & 219 & -118 \\ 47 & 36 & 71 & 141 & -72 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 24 & 19 & 36 & 72 & -38 \\ 1 & 2 & 1 & 3 & -4 \\ 1 & 2 & -10 & 3 & -4 \\ -1 & -2 & -1 & -3 & 4 \end{bmatrix},$$

所以  $\text{rank}A=3$ .

$$(3) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & -1 & 2 \\ -1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & -1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & -1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

所以  $\text{rank}A=2$ .

6. 举出一个无解的线性方程组的例子, 并化为阶梯形(要求 3 个变元以上).

解 利用题 5. (3) 构造线性方程组如下

$$\begin{cases} x_1 + x_3 = 1 \\ 3x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 = 2 \\ x_1 + 2x_2 - x_3 + 2x_4 = 1 \\ -x_2 + x_3 - x_4 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & 2 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & -2 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

因为  $r(A, b) \neq r(A)$ , 所以无解.

7. 研究下列方程组的相容性并求其通解和一个特解.

$$(1) \begin{cases} 3x_1 + 4x_2 + x_3 + 2x_4 = 3, \\ 6x_1 + 8x_2 + 2x_3 + 5x_4 = 7, \\ 9x_1 + 12x_2 + 3x_3 + 10x_4 = 13. \end{cases}$$

解

$$(A, b) \rightarrow \begin{bmatrix} 3 & 4 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

分别令  $(x_2, x_3)^T = (1, 0)^T; (0, 1)^T; (0, 0)^T$ ,

则得  $Ax=0$  的基础解系和  $Ax=b$  的一个特解,

$$\eta_1 = \left(-\frac{4}{3}, 1, 0, 0\right)^T; \quad \eta_2 = \left(-\frac{1}{3}, 0, 1, 0\right)^T; \quad \eta_0 = \left(\frac{1}{3}, 0, 0, 1\right)^T.$$

于是

$$(x_1, x_2, x_3, x_4)^T = c_1 \eta_1 + c_2 \eta_2 + \eta_0, \quad (c_1, c_2 \in \mathbf{R}).$$

$$(2) \begin{cases} 3x_1 - 5x_2 + 2x_3 + 4x_4 = 2, \\ 7x_1 - 4x_2 + x_3 + 3x_4 = 5, \\ 5x_1 + 7x_2 - 4x_3 - 6x_4 = 3. \end{cases}$$

解

$$(A, b) \xrightarrow{\substack{-2r_1 + r_2 \rightarrow r_1 \\ -3r_1 + r_2 \\ -5r_1 + r_3}} \begin{bmatrix} 1 & 6 & -3 & -5 & 1 \\ 0 & -23 & 11 & 19 & -1 \\ 0 & -23 & 11 & 19 & -2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 6 & -3 & -5 & 1 \\ 0 & -23 & 11 & 19 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

因为  $r(A, b) \neq r(A)$ , 所以无解.

$$(3) \begin{cases} 2x_1 + 5x_2 - 8x_3 = 8, \\ 4x_1 + 3x_2 - 9x_3 = 9, \\ 2x_1 + 3x_2 - 5x_3 = 7, \\ x_1 + 8x_2 - 7x_3 = 12. \end{cases}$$

解

$$(A, b) \xrightarrow{\substack{r_1 \leftrightarrow r_4 \\ -2r_3 + r_2 \\ -r_3 + r_4 \\ -2r_1 + r_3}} \begin{bmatrix} 1 & 8 & -7 & 12 \\ 0 & -3 & 1 & -5 \\ 0 & -13 & 9 & -17 \\ 0 & 2 & -3 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\substack{-3r_2 + 2r_4 + r_3 \\ r_4 + r_2 \\ 2r_2 + r_4 \rightarrow r_3}} \begin{bmatrix} 1 & 8 & -7 & 12 \\ 0 & -1 & -2 & -4 \\ 0 & 0 & -7 & -7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

所以有唯一解  $(x_1, x_2, x_3)^T = (3, 2, 1)^T$ .

8. 求方程组

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 + 3x_3 + 4x_4 = 5, \\ 4x_1 - 2x_2 + 5x_3 + 6x_4 = 7, \\ 6x_1 - 3x_2 + 7x_3 + 8x_4 = 9, \\ \lambda x_1 - 4x_2 + 9x_3 + 10x_4 = 11, \end{cases}$$

依赖于参数  $\lambda$  的通解.

解

$$(A, b) \rightarrow \begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & -1 & -2 & -3 \\ \lambda - 8 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

对任意  $\lambda$  有解,  $\lambda \neq 8$  时

$$(x_1, x_2, x_3, x_4)^T = c(0, -2, -2, 1)^T + (0, 4, 3, 0)^T; \quad c \in \mathbf{R}$$

当  $\lambda = 8$  时

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix}. \quad c_1, c_2 \in \mathbf{R}$$

9. 设  $A$  为实矩阵, 试证:  $r(A^T A) = r(A)$ .

证 首先证明  $A^T A x = 0$  与  $A x = 0$  是同解方程组. 显然, 由  $A x = 0$ , 两边左乘  $A^T$  得  $A^T A x = 0$ , 所以  $W_A \subseteq W_{A^T A}$ ; 又由  $A^T A x = 0$ , 两边左乘  $x^T$  得  $x^T A^T A x = (A x)^T A x = 0$ , 设  $A x = (y_1, \dots, y_n)^T$ , 则由

$$(A x)^T (A x) = y_1^2 + \dots + y_n^2 = 0, \text{ 知 } y_1 = \dots = y_n = 0,$$

即  $A x = 0$ , 所以  $W_{A^T A} \subseteq W_A$ . 故  $W_A = W_{A^T A}$

又因为  $\dim W_A = n - r(A) = \dim W_{A^T A} = n - r(A^T A)$ ,

所以  $r(A^T A) = r(A)$ .

10. 举出矩阵  $A, B$  的例子, 分别使

(1)  $r(AB) < \min\{r(A), r(B)\}$ ,

(2)  $r(AB) = \min\{r(A), r(B)\}$ .

解 (1)  $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ ,  $B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ , 则  $r(AB) = 0$ .

(2)  $A = I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ ,  $B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ , 则  $r(AB) = r(B)$ .

11. 判断下列行向量组是否线性相关.

(1)  $(1, 2, 3), (4, 8, 12), (3, 0, 1), (4, 5, 8)$ .

解 线性相关(因为  $F^3$  中 4 个向量必定线性相关).

(2)  $(1, 2, 3, 4, 5, 6), (1, 0, 1, 0, 1, 0), (-1, 1, 1, -1, 1, 1), (-2, 3, 2, 3, 4, 7)$ .

解 为了简化计算, 把已知向量组的排序改变一个(这不影响它们的线性相(无)关性). 于是

$$A = (\alpha_2^T, \alpha_3^T, \alpha_4^T, \alpha_1^T) = \begin{bmatrix} 1 & -1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & 3 & 4 \\ 1 & 1 & 4 & 5 \\ 0 & 1 & 7 & 6 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

所以  $r_c(A)=3$ ,  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$  线性相关.

(3)  $(1, 2, 3, 4), (1, 0, 1, 0), (-1, 1, 1, -1), (-2, 3, 2, 3)$ .

解 线性相关(这是(2)中向量组的“截短”向量,由上题结果显然其前4个分量排成的矩阵列秩也为3).

(4)  $(1, 0, 0, 2, 3, 1), (0, 1, 0, 4, 6, 2), (0, 0, 1, -2, -3, -1)$ .

解 因为这三个向量的“截短”向量(只取前三个分量)是线性无关的,所以这三个向量也线性无关.

(5)  $(2, -3, 1), (3, -1, 5), (1, -4, 3)$ .

解

$$\text{因为 } \det \begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 \\ -3 & -1 & -4 \\ 1 & 5 & 3 \end{bmatrix} = \det \begin{bmatrix} 0 & -7 & -5 \\ 0 & 7 & 0 \\ 1 & 5 & 3 \end{bmatrix} = 35 \neq 0$$

所以  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性无关.

(6)  $(4, -5, 2, 6), (2, -2, 1, 3), (6, -3, 3, 9), (4, -1, 5, 6)$ .

解

$$\text{因为 } \det \begin{bmatrix} 4 & 2 & 6 & 4 \\ -5 & -2 & -3 & -1 \\ 2 & 1 & 3 & 5 \\ 6 & 3 & 9 & 6 \end{bmatrix} \xrightarrow[-r_3+r_4]{-r_1+r_4} \det \begin{bmatrix} 4 & 2 & 6 & 4 \\ -5 & -2 & -3 & -1 \\ 2 & 1 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = 0,$$

所以  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$  线性相关.

(7)  $(1, 0, 0, 2, 5), (0, 1, 0, 3, 4), (0, 0, 1, 4, 7), (2, -3, 4, 11, 12)$ .

解 考虑各向量只取前4个分量的向量组,有

$$\det \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \\ 2 & 3 & 0 & 11 \end{bmatrix} = 11 - 4 = 7 \neq 0$$

故“截短”的向量组线性无关,于是原向量组亦线性无关(短无关,长亦无关).

12. 对上题中每组向量,求出一个极大线性无关组.

$$\text{解 (1)} \quad \begin{bmatrix} 1 & 4 & 3 & 4 \\ 2 & 8 & 0 & 5 \\ 3 & 12 & 1 & 8 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 4 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & -6 & -3 \\ 0 & 0 & -8 & -4 \end{bmatrix}$$

所以  $\alpha_1, \alpha_3$  为极大线性无关组.

(2)  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ ;

(3)  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ ;

(4) 自身;

(5) 自身;

(6)  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ ;

(7) 自身.

13. 求满足下列等式的行向量  $x$ .

(1)  $\alpha_1 + 2\alpha_2 + 3\alpha_3 + 4x = 0$

其中  $\alpha_1 = (5, -8, -1, 2)$ ,  $\alpha_2 = (2, -1, 4, -3)$ ,  $\alpha_3 = (-3, 2, -5, 4)$ .

$$\begin{aligned}\text{解 } x &= -\frac{1}{4}(\alpha_1 + 2\alpha_2 + 3\alpha_3) \\ &= -\frac{1}{4}(0, -4, -8, 8) = (0, 1, 2, -2).\end{aligned}$$

$$(2) \quad 3(\alpha_1 - x) + 2(\alpha_2 + x) = 5(\alpha_3 + x)$$

其中  $\alpha_1 = (2, 5, 1, 3)$ ,  $\alpha_2 = (10, 1, 5, 10)$ ,  $\alpha_3 = (4, 1, -1, 1)$ .

解 由已知得  $3\alpha_1 + 2\alpha_2 - 5\alpha_3 = 6x$ ,

$$\begin{aligned}\text{所以 } x &= \frac{1}{6}(3\alpha_1 + 2\alpha_2 - 5\alpha_3) \\ &= \frac{1}{6}(6 + 20 - 20, 15 + 2 - 5, 3 + 10 + 5, 9 + 20 - 5) \\ &= (1, 2, 3, 4).\end{aligned}$$

14. 证明向量组  $S$  的极大线性无关组可这样选取: 先任取非 0 向量  $\alpha_i \in S$ ; 次取  $\alpha_2$  使之非  $\alpha_1$  的线性组合; 再取  $\alpha_3$ , 使之非  $\alpha_1, \alpha_2$  的线性组合; 如此下去, 直到取得了  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ , 而不再能取得  $\alpha_{s+1}$  非  $\alpha_1, \dots, \alpha_s$  的线性组合, 则  $\alpha_1, \dots, \alpha_s$  即为  $S$  的极大线性无关组.

证 首先  $\alpha_1, \dots, \alpha_s$  线性无关. 否则,  $\exists$  不全为 0 的数  $k_1, \dots, k_s$  使

$$k_1\alpha_1 + \dots + k_s\alpha_s = 0,$$

从后往前数, 设第一个不为 0 的为  $k_i$ , 则有

$$k_1\alpha_1 + \dots + k_{i-1}\alpha_{i-1} + k_i\alpha_i = 0$$

于是有  $\alpha_i = -\frac{1}{k_i}(k_1\alpha_1 + \dots + k_{i-1}\alpha_{i-1})$  与已知  $\alpha_i$  非  $\alpha_1, \dots, \alpha_{i-1}$  的线性组合矛盾;

其次, 任  $\alpha \in S$ , 则或  $\alpha \in \{\alpha_1, \dots, \alpha_s\}$ , 或  $\alpha \notin \{\alpha_1, \dots, \alpha_s\}$ . 然都有  $\alpha$  是  $\alpha_1, \dots, \alpha_s$  的线性组合, 即  $\alpha$  都可由  $\alpha_1, \dots, \alpha_s$  线性表出.

所以  $\alpha_1, \dots, \alpha_s$  是  $S$  的极大线性无关组.

15. 设有  $s$  个行向量  $\alpha_i = (a_{i1}, \dots, a_{in})$  ( $1 \leq i \leq s, s \leq n$ ), 其分量满足  $|a_{jj}| > \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq j}}^s |a_{ij}|$

( $1 \leq j \leq s$ ), 则这  $s$  个向量线性无关.

证 取

$$B = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1s} \\ \vdots & & \\ a_{s1} & \cdots & a_{ss} \end{bmatrix}, \text{ 我们要证 } \det B \neq 0,$$

若不然, 则由  $\det B = 0$  可知  $B^T x = 0$  有非 0 解,  $x = (x_1, \dots, x_s)^T$ , 设  $|x_k| = \max_{1 \leq i \leq s} |x_i|$ , 则由

$$a_{1k}x_1 + a_{2k}x_2 + \dots + a_{kk}x_k + \dots + a_{sk}x_s = 0$$

得

$$|a_{kk}x_k| = \left| \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq k}}^s a_{ik}x_i \right| \leq \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq k}}^s |a_{ik}| |x_k| \leq |x_k| \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq k}}^s |a_{ik}|$$

即

$$|a_{kk}| \leq \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq k}}^s |a_{ik}|, \text{与已知矛盾.}$$

所以  $\det B \neq 0$ , 即知  $B$  的各行线性无关, 于是得其“加长”向量  $\alpha_1, \dots, \alpha_s$  线性无关(短无关, 长亦无关).

16. 若向量组  $\alpha_1, \dots, \alpha_k$  线性无关, 而  $\alpha_1, \dots, \alpha_k, \alpha_{k+1}$  线性相关, 则  $\alpha_{k+1}$  可由  $\alpha_1, \dots, \alpha_k$  线性表出.

证 由已知  $\alpha_1, \dots, \alpha_k, \alpha_{k+1}$  线性相关, 所以存在不全为 0 的数  $\lambda_1, \dots, \lambda_k, \lambda_{k+1}$  使

$$\lambda_1 \alpha_1 + \dots + \lambda_k \alpha_k + \lambda_{k+1} \alpha_{k+1} = 0$$

而  $\lambda_{k+1} \neq 0$  (否则  $\alpha_1, \dots, \alpha_k$  线性相关)

于是得 
$$\alpha_{k+1} = -\frac{1}{\lambda_{k+1}}(\lambda_1 \alpha_1 + \dots + \lambda_k \alpha_k).$$

17. 如果在有序线性无关向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$  的前面再添写一个向量  $\beta$ , 则在所得到的组中, 能用其前面向量线性表示的向量不多于一个.

证 用反证法. 设有两个向量  $\alpha_i, \alpha_j$  (不妨设  $j > i$ ) 可用其前面向量表示:

$$\alpha_i = \lambda \beta + \lambda_1 \alpha_1 + \dots + \lambda_{i-1} \alpha_{i-1} \quad (1)$$

$$\alpha_j = \mu \beta + \mu_1 \alpha_1 + \dots + \mu_{i-1} \alpha_{i-1} + \dots + \mu_{j-1} \alpha_{j-1} \quad (2)$$

因为  $\alpha_1, \dots, \alpha_i$  线性无关, 所以  $\lambda \neq 0$ ;  $\alpha_1, \dots, \alpha_j$  线性无关, 所以  $\mu \neq 0$ . 于是  $(1) \times \mu - (2) \times \lambda$  得:

$$\mu \alpha_i - \lambda \alpha_j = (\lambda_1 \mu - \mu_1 \lambda) \alpha_1 + \dots + (\lambda_{i-1} \mu - \lambda \mu_{i-1}) \alpha_{i-1} - \lambda \mu_i \alpha_i - \dots - \lambda \mu_{j-1} \alpha_{j-1},$$

因为  $\mu \neq 0, \lambda \neq 0$ , 所以上式说明  $\alpha_1, \dots, \alpha_i, \dots, \alpha_j$  线性相关, 与已知矛盾, 故必不多于一个.

18. 证明: 如果三向量  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性相关, 且向量  $\alpha_3$  不能用向量  $\alpha_1$  和  $\alpha_2$  线性表示, 则向量  $\alpha_1$  和  $\alpha_2$  仅差一数值因子.

证 由已知, 存在不全为 0 的数  $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$  使得

$$\lambda_1 \alpha_1 + \lambda_2 \alpha_2 + \lambda_3 \alpha_3 = 0,$$

而  $\lambda_3 \neq 0$ , (否则,  $\alpha_3$  可以用  $\alpha_1$  和  $\alpha_2$  线性表出) 所以  $\lambda_1, \lambda_2$  中至少有一个不等于 0, 于是其中一个为另一个的倍.

19. 证明: 若向量  $a, b, c$  线性无关, 则向量  $a+b, b+c, c+a$  也线性无关.

证 若有线性组合

$$k_1(a+b) + k_2(b+c) + k_3(c+a) = 0$$

整理得

$$(k_1 + k_3)a + (k_1 + k_2)b + (k_2 + k_3)c = 0$$

由已知  $a, b, c$  线性无关, 所以必有  $k_1 + k_3 = k_1 + k_2 = k_2 + k_3 = 0$ , 解得  $k_1 = k_2 = k_3 = 0$ , 所以  $a+b, b+c, c+a$  线性无关.

20. 若向量组  $\alpha_1, \dots, \alpha_s$  的秩为  $r$ , 证明其中任意  $r$  个线性无关向量都构成它的一个极大无关组.

证 设  $\alpha_{i_1}, \dots, \alpha_{i_r}$  为向量组中任意  $r$  个线性无关向量, 则有 (1) 它们本身线性无关; (2) 任取  $\alpha \in \{\alpha_1, \dots, \alpha_s\}$ , 因为秩  $(\alpha_1, \dots, \alpha_s) = r$ , 所以都有  $\alpha_{i_1}, \dots, \alpha_{i_r}, \alpha$  线性相关, 于是  $\alpha$  可由  $\alpha_{i_1}, \dots, \alpha_{i_r}$  线性表出. 由定义知  $\alpha_{i_1}, \dots, \alpha_{i_r}$  是极大线性无关组.



21. 对第 1 题中每个线性方程组的增广矩阵, 求出其列向量组的两个极大无关组, 再求出其行向量组的一个极大无关组.

解 记第 1 题中各增广矩阵的列向量组为  $\beta_1, \dots, \beta_s$ , 行向量组为  $\alpha_1, \dots, \alpha_k$ . 则由 1 题所化的阶梯形矩阵, 很容易看出

(1)  $\beta_1, \beta_2, \beta_3$  和  $\beta_1, \beta_2, \beta_4$  为列的极大无关组;  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  为行向量组的极大无关组.

(2)  $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$  和  $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_6$  为列的极大无关组;  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$  为行的极大无关组.

(3)  $\beta_1, \beta_2$  和  $\beta_1, \beta_5$ ;  $\alpha_1, \alpha_2$ .

(4)  $\beta_1, \beta_3, \beta_5$  和  $\beta_2, \beta_3, \beta_5$ ;  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ .

22. 证明: 矩阵的非 0 子式所在的行向量组和列向量组均是线性无关的.

证 设  $A = (a_{ij})$ , 其  $r$  阶子式  $\det A \begin{pmatrix} i_1 & \dots & i_r \\ j_1 & \dots & j_r \end{pmatrix} \neq 0$ . 于是子方阵

$$B = \begin{bmatrix} a_{i_1 j_1} & \dots & a_{i_1 j_r} \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{i_r j_1} & \dots & a_{i_r j_r} \end{bmatrix}$$

的行向量组和列向量组均是线性无关向量组(因为  $Bx=0$  和  $B^T x=0$  只有 0 解).

而  $A$  的  $i_1, \dots, i_r$  行是  $B$  的行向量“接长”, 所以仍线性无关, 同理  $A$  的  $j_1, \dots, j_r$  列是  $B$  的列的“接长”, 所以也线性无关.

23. 第 22 题的逆命题是否成立, 即位于线性无关行向量组及线性无关列向量交叉处的子式是否一定非 0? 证明之.

证 不成立. (1) 线性无关行(列)的个数  $< r(A)$  时, 该子式不一定非 0. 例如

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$A$  的 1, 2 行线性无关且 2, 3 列线性无关而交叉处的子式  $\begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = 0$ .

(2) 线性无关行(列)的个数  $= r(A)$  时, 子式定非 0. 证明如下: 记  $r(A) = r$ .

不妨设  $A$  的前  $r$  行及前  $r$  列线性无关, 记

$$A = \begin{bmatrix} A_1 & A_2 \\ A_3 & A_4 \end{bmatrix},$$

其中  $A_1$  为  $r$  阶方阵, 由于  $r(A) = r$ , 所以  $\begin{bmatrix} A_2 \\ A_4 \end{bmatrix}$  的列向量均可由  $\begin{bmatrix} A_1 \\ A_3 \end{bmatrix}$  的列向量线性表出,

即  $A_2$  的列可由  $A_1$  的列线性表出, 故  $r_c(A_1) = r_c(A_1, A_2) = r_r(A_1, A_2) = r$ , 于是  $r(A_1) = r$ , 故  $\det A_1 \neq 0$ .

24. 设法运用“矩阵的行秩、列秩、秩三者相等”这一事实, 尽量清楚地解释线性方程组解的理论.

解 首先, 对方程组  $Ax=b$  考虑  $A$  的列向量  $\beta_1, \dots, \beta_n$ . 由矩阵乘法知  $Ax=b$  当且仅

当  $x_1\beta_1 + \cdots + x_n\beta_n = b$ . 因此,  $Ax=b$  有解当且仅当  $b$  可表为  $A$  的各列的线性组合, 这相当于

$$r_c(A) = r_c(A, b),$$

特别  $Ax=0$  有非 0 解当且仅当  $A$  的列线性相关即  $r_c(A) < n$ . 由于列秩 = 秩, 故  $Ax=b$  有解当且仅当  $r(A) = r(A, b)$ ;  $Ax=0$  有非零解当且仅当  $r(A) < n$ .

其次, 考虑  $A$  的行向量  $\alpha_1, \cdots, \alpha_m$ , 记  $\alpha_i = (a_{i1}, \cdots, a_{in})$ , 则  $Ax=0$  相当于

$$\alpha_i x = a_{i1}x_1 + \cdots + a_{in}x_n = 0 \quad (i = 1, \cdots, m).$$

注意  $\alpha_i x$  是  $\alpha_i$  与  $x$  的内积,  $\alpha_i x = 0$  相当于  $\alpha_i$  与  $x$  正交. 故  $x$  是  $Ax=0$  的解相当于  $x$  与  $A$  的行向量均正交, 假定  $\alpha_1, \cdots, \alpha_r$  是  $\alpha_1, \cdots, \alpha_m$  的极大线性无关组, 注意  $x$  与  $\alpha_1, \cdots, \alpha_m$  均正交当且仅当  $x$  与  $\alpha_1, \cdots, \alpha_r$  均正交, 而“与  $\alpha_1, \cdots, \alpha_r$  正交的  $x$  全体是  $n - r_r(A)$  维子空间”, 这相当于说  $Ax=0$  的解集合是  $n - r_r(A)$  维子空间, 由于行秩 = 列秩即得解空间是  $n - r(A)$  维子空间.

再考虑  $A$  的子式. 不妨设其  $r = r(A)$  阶非 0 子式在左上角. 此时  $A$  的后  $m - r$  个方程可以删去(因为  $r(A) = r_r(A)$ ,  $r(A, b) = r_r(A, b)$ , 故后  $m - r$  个方程可由前  $r$  个方程线性组合得出), 故  $Ax=b$  与下列方程组同解

$$(A_1, A_2)x = b^*, \quad (\text{即 } Ax = b \text{ 的前 } r \text{ 个方程}),$$

记  $x = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}$ , 则有

$$A_1 y_1 + A_2 y_2 = b^*$$

即得

$$y_1 = A_1^{-1}(b^* - A_2 y_2).$$

$y_2$  的分量是自由未知元, 任意取值后由上式算出  $y_1$ , 从而得出解  $x = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}$ .

25. 写出通过点  $(1, 1, 1), (1, 1, -1), (1, -1, 1), (-1, 0, 0)$  的球面方程并求其中心和半径.

解 设球面方程为  $x^2 + y^2 + z^2 + ax + by + cz + d = 0$ , 把已知条件代入得关于  $a, b, c, d$  的线性方程组

$$\begin{cases} a + b + c + d = -3 \\ a + b - c + d = -3 \\ a - b + c + d = -3 \\ -a + d = -1 \end{cases} \quad \text{解得} \quad \begin{cases} a = -1 \\ b = 0 \\ c = 0 \\ d = -2 \end{cases}$$

所以球面方程为  $x^2 + y^2 + z^2 - x - 2 = 0$ , 中心坐标为  $(\frac{1}{2}, 0, 0)$ , 半径为  $R = \frac{3}{2}$ .

26. 写出通过 5 点  $M_1(0, 1), M_2(2, 0), M_3(-2, 0), M_4(1, -1), M_5(-1, -1)$  的二次曲线的方程并确定其位置和大小范围.

解 设二次曲线的方程为  $Ax^2 + By^2 + Cx + D = E$ , 因  $M_1, M_2, M_3, M_4, M_5$  在曲线上, 所以有

$$\begin{cases} B+D=E \\ 4A+2C=E \\ 4A-2C=E \\ A+B+C-D=E \\ A+B-C-D=E \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A=\frac{1}{4}E \\ B=\frac{7}{8}E \\ C=0 \\ D=\frac{1}{8}E \end{cases}$$

所求方程为  $2x^2 + 7y^2 + y - 8 = 0$ , 即  $2x^2 + 7\left(y + \frac{1}{14}\right)^2 = \left(\frac{15}{2\sqrt{7}}\right)^2$  是椭圆, 中心为  $\left(0, -\frac{1}{14}\right)$ , 长轴平行  $x$  轴, 短轴在  $y$  轴上, 半长轴长  $\frac{15}{28}\sqrt{14}$ , 半短轴长  $\frac{15}{14}$ .

27. 怎样的线性方程组, 给出空间中三个没有公共点但两两相交的平面?

解 空间中平面的方程为  $Ax + By + Cz = D$ , 要三张平面没有公共点, 即是下线性方程组

$$\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z = D_1 \\ A_2x + B_2y + C_2z = D_2 \\ A_3x + B_3y + C_3z = D_3 \end{cases} \quad \text{无解} \Leftrightarrow \text{rank} A < \text{rank}(A, b)$$

于是或  $r(A)=1, r(A, b)=2$ , 或  $r(A)=2, r(A, b)=3$ , 但若  $r(A)=1$ , 则三平面平行, 所以必为  $r(A)=2, r(A, b)=3$ , 且  $A$  的任两行线性无关(因为任两平面不平行).

28. 给出以下事实的几何解释: 在三个未知量四个方程的某一线性方程组中, 任三个方程未知量的系数所组成的矩阵的秩, 以及增广矩阵的秩都等于 3.

解 设此线性方程组的系数矩阵为  $A$ , 增广矩阵为  $(A, b)$ . 由已知,  $r(A, b)=3$ , 而  $A$  为  $4 \times 3$  矩阵, 所以  $r(A) \leq 3$ , 又因  $A$  中任三行的秩为 3, 所以  $r(A)=3$ , 即有  $r(A)=r(A, b)=3$ , 于是知线性方程组

$$\begin{cases} a_1x + b_1y + c_1z = d_1 \\ a_2x + b_2y + c_2z = d_2 \\ a_3x + b_3y + c_3z = d_3 \\ a_4x + b_4y + c_4z = d_4 \end{cases} \quad \text{有解,}$$

这就是说, 空间四平面共点(因为每个方程代表一张平面). 又  $A$  的任三行秩为 3, 所以任三张平面有唯一交点, 如  $\Pi_1, \Pi_2, \Pi_3$  的交点为

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} d_1 \\ d_2 \\ d_3 \end{bmatrix}.$$

29. 求四张平面

$$\begin{aligned} a_1x + b_1y + c_1z + d_1 &= 0 \\ a_2x + b_2y + c_2z + d_2 &= 0 \\ a_3x + b_3y + c_3z + d_3 &= 0 \\ a_4x + b_4y + c_4z + d_4 &= 0 \end{aligned}$$

共点的充分必要条件.

解 四张平面共点的充要条件为已知的四个方程所构成的线性方程组有唯一解. 记

$$A = \begin{bmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \\ a_4 & b_4 & c_4 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} -d_1 \\ -d_2 \\ -d_3 \\ -d_4 \end{bmatrix}.$$

则线性方程组可写为  $Ax=b$ , 它有解  $\Leftrightarrow r(A)=r(A, b)$ . 又  $r(A) \leq 3$ , 当  $r(A)=1$ , 则  $\dim W_A=2$ , 此时四张平面重合; 当  $r(A)=2$ , 则  $\dim W_A=1$ , 此时四张平面相交于一条直线;

所以有唯一交点(共点)  $\Leftrightarrow r(A)=r(A, b)=3$ .

30. 在  $\mathbf{R}^2$  和  $\mathbf{R}^3$  中画出下列方程组的解子空间或解陪集.

$$\begin{aligned} (1) \quad & \begin{cases} x-2y=0 \\ -3x+6y=0 \end{cases}; & (2) \quad & \begin{cases} 2x-3y=1 \\ -6x+9y=-3 \end{cases}; \\ (3) \quad & \begin{cases} x-y+2z=0 \\ 4x+y-5z=0 \\ 3x+2y-7z=0 \end{cases}; & (4) \quad & \begin{cases} 2x-y-2z=1 \\ -6x+3y+6z=-3 \\ -8x+4y+8z=-4 \end{cases} \end{aligned}$$

解 (1)  $x-2y=0 \rightarrow x=2y$ , 是过原点的直线,

所以 
$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = c \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad c \in \mathbf{R},$$




图 3-1




图 3-2

(2)  $2x-3y=1$ ,  $x=\frac{3}{2}y+\frac{1}{2}$ , 是过  $(\frac{1}{2}, 0)$  的直线,

所以 
$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = c \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ 0 \end{bmatrix}, \quad c \in \mathbf{R},$$

(3)  $A \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 5 & -13 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ , 所以  $\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = c \begin{bmatrix} 3 \\ 13 \\ 5 \end{bmatrix}, \quad c \in \mathbf{R},$

是过  $(0,0,0)$  和  $(3,13,5)$  两点的直线, 也即两过原点的平面  $x-y+2z=0$  和  $5y-13z=0$  的交线.

$$(4) (A, b) \rightarrow \begin{bmatrix} 2 & -1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \text{ 所以 } \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

其中  $c_1, c_2$  为任实数.  $W_A$  是过原点的平面 (法向量为  $-\vec{i} + \frac{1}{2}\vec{j} + \vec{k}$ ), 解陪集  $\eta_0 + W_A$  是过点  $(\frac{1}{2}, 0, 0)$  平行  $W_A$  的平面.

31. 设  $\alpha_1 = (1, 1, 0), \alpha_2 = (2, 1, 2), \alpha_3 = (3, 2, 2)$ ,

(1) 求出并画出  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  在  $\mathbf{R}^3$  中生成的子空间  $W$ .

(2) 求出并画出陪集  $x_0 + W$ , 其中  $x_0 = (2, 1, 0)$ .

解 (1) 因为  $\alpha_3 = \alpha_1 + \alpha_2$ , 所以  $W = c_1\alpha_1 + c_2\alpha_2 (c_1, c_2 \in \mathbf{R})$  是过原点, 法向量为  $\vec{n} = 2\vec{i} - 2\vec{j} - \vec{k}$  的平面.

$$(2) x_0 + W = c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

是过点  $x_0$  且法向量为  $(2, -2, -1)$  的平面 (即平行  $W$ ).

32. 设

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -6 & 2 & -1 \\ -2 & 4 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 & 0 \end{bmatrix},$$

对于什么样的  $b = (b_1, b_2, b_3, b_4)^T$ ,  $Ax = b$  有解?

解

$$\begin{bmatrix} 3 & -6 & 2 & -1 & b_1 \\ -2 & 4 & 1 & 3 & b_2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & b_3 \\ 1 & -2 & 1 & 0 & b_4 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 & 0 & b_4 \\ 0 & 0 & 3 & 3 & b_2 + 2b_4 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & b_3 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & b_1 - 3b_4 \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 & 0 & b_4 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & b_3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & b_2 + 2b_4 - 3b_3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & b_1 - 3b_4 + b_3 \end{bmatrix}$$

要  $Ax = b$  有解,  
必  $r(A) = r(A, b)$ .

所以

$$\begin{cases} b_1 - 3b_4 + b_3 = 0 \\ b_2 + 2b_4 - 3b_3 = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} b_1 = -b_3 + 3b_4 \\ b_2 = 3b_3 - 2b_4 \end{cases}$$




图 3-3

故 
$$\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ b_4 \end{bmatrix} = c_1 \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad c_1, c_2 \in \mathbf{R}.$$

33. 试证明,若  $C$  为实数列独立阵,则  $\det C^T C > 0$ .

证 设

$$C = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1r} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ c_{n1} & c_{n2} & \cdots & c_{nr} \end{bmatrix}, \quad r \leq n.$$

则

$$\begin{aligned} \det C^T C &= \sum_{1 \leq k_1 < \cdots < k_r \leq n} \det C^T \begin{pmatrix} 1 \cdots r \\ k_1 \cdots k_r \end{pmatrix} \cdot \det C \begin{pmatrix} k_1 \cdots k_r \\ 1 \cdots r \end{pmatrix} \\ &= \sum_{1 \leq k_1 < \cdots < k_r \leq n} \left( \det C \begin{pmatrix} k_1 \cdots k_r \\ 1 \cdots r \end{pmatrix} \right)^2 \geq 0 \end{aligned}$$

又因为  $C$  为列独立阵,  $r(C) = r$ , 所以至少有一个  $r$  阶子式  $\neq 0$ , 因此  $>$  号成立.

34. 试证明若  $C$  为  $n \times r$  列独立阵, 则存在列独立阵  $X$  使  $C^T X = 0$  且  $X$  列数  $\leq n - r$ .

证 因为  $\text{rank} C^T = r$ , 所以线性方程组  $C^T x = 0$  的解空间  $W_C$  的维数为  $n - r$ . 取一个基础解系  $x_1, \cdots, x_{n-r}$ , 则有

$$C^T (x_1, \cdots, x_{n-r}) = 0$$

于是可知取  $W_C$  中任  $k$  个线性无关的解做矩阵  $X$  的列向量, 均有

$$C^T X = 0, \text{ 且 } X \text{ 为列独立阵.}$$

(因为  $\dim W_C = n - r$ , 所以  $k \leq n - r$ ).

35. 试证明, 若  $C$  为列独立矩阵,  $CA = B$ , 则  $B$  的第  $j_1, \cdots, j_s$  列线性相关(或无关)当且仅当  $A$  的第  $j_1, \cdots, j_s$  列线性相关(或无关), 特别  $A$  与  $B$  的列向量组的极大线性无关组相互对应,  $A$  与  $B$  的秩相同.

证 设  $C_{n \times r}$ ,  $A_{r \times m}$ ,  $B_{n \times m}$ , 记  $A = (A_1, \cdots, A_m)$ ,  $B = (B_1, \cdots, B_m)$ , 则有  $B_j = CA_j$ ,  $j = 1, 2, \cdots, m$ .

因为  $C$  为列独立阵, 则  $Cx = 0 \Leftrightarrow x = 0$ , 又

$$\lambda_1 B_{j_1} + \cdots + \lambda_s B_{j_s} = \lambda_1 CA_{j_1} + \cdots + \lambda_s CA_{j_s} = C(\lambda_1 A_{j_1} + \cdots + \lambda_s A_{j_s})$$

所以

$$\lambda_1 B_{j_1} + \cdots + \lambda_s B_{j_s} = 0 \Leftrightarrow \lambda_1 A_{j_1} + \cdots + \lambda_s A_{j_s} = 0,$$

即  $B_{j_1}, \cdots, B_{j_s}$  与  $A_{j_1}, \cdots, A_{j_s}$  同时线性相关(或无关), 由此当前者为  $B$  的极大线性无关组时, 后者亦为  $A$  的极大线性无关组. 于是  $\text{rank} A = \text{rank} B$ .

36. 试证明:  $r(AB) = r(B)$  当且仅当方程组  $ABx = 0$  的解均为  $Bx = 0$  的解.

证  $\Leftarrow$  当  $ABx = 0$  的解都是  $Bx = 0$  的解时, 由于  $Bx = 0$  的解也都是  $ABx = 0$  的解. 所以两方程组是同解的, 于是其系数矩阵的秩相同.

$\Rightarrow$ 当  $r(AB)=r(A)$  时,

$$\dim W_{AB} = n - r(AB) = n - r(B) = \dim W_B,$$

又  $W_B \subseteq W_{AB}$ , 所以必有  $W_{AB} = W_B$  (即  $ABx=0$  的解均为  $Bx=0$  的解).

37. 设  $r(AB)=r(B)$ , 试证明对任意可乘的矩阵  $C$ , 均有  $r(ABC)=r(BC)$ .

证 由 36 题, 只需证明: 方程组  $ABCx=0$  的解均为  $BCx=0$  的解. 事实上, 若有  $y_0$  适合  $ABCy_0=0$ , 记  $Cy_0=x_0$ , 此即是  $ABx_0=0$ , 也就是说  $x_0$  是  $ABx=0$  的解, 又由已知  $r(AB)=r(B)$ , 及 36 题的必要性知,  $x_0$  也是  $Bx=0$  的解, 即有  $Bx_0=0$  也即是  $BCy_0=0$ , 所以  $y_0$  是  $BCx=0$  的解. (由 36 题的充分性即知有  $r(ABC)=r(BC)$ ).

38. 试证明: 若有正整数  $k$  使  $r(A^k)=r(A^{k+1})$  则  $r(A^k)=r(A^{k+j})$  ( $j=1, 2, 3, \dots$ ).

证 用归纳法证明  $r(A^k)=r(A^{k+j})$  对  $j=1, 2, \dots$  成立.

当  $j=1$  时为  $r(A^k)=r(A^{k+1})$ , 由已知成立. 设当  $j=n$  时成立, 即有  $r(A^k)=r(A^{k+n})$ , 则当  $j=n+1$  时, 由 37 题, 取  $C=A$ , 则  $r(A^k \times A)=r(A^{k+n} \times A)$ , 即  $r(A^{k+n+1})=r(A^{k+n})=r(A^k)$ , 所以当  $j=n+1$  时也成立, 于是对任  $j$ ,  $r(A^{k+j})=r(A^k)$  成立.

39. 设矩阵  $A_{n \times r}$  的列向量空间是某齐次线性方程组的解子空间. 试证明:  $C_{n \times r}$  的列向量空间也为该向量组的解子空间的充分必要条件为  $C=AB$  ( $B$  为某  $r$  阶可逆方阵, 其中  $r=r(A)=r(C)$ ).

证  $\Leftarrow$  由  $C=AB=(A_1, \dots, A_r)B$ , 知  $C$  的列是  $A$  的列的线性组合, 所以也是该方程组的解, 且线性无关, 又  $r_c(C)=r=r_c(A)$ , 所以  $C$  的列也是该方程组的一个基础解系, 由此得证.

$\Rightarrow$  由  $C$  的列可由  $A$  的列线性表出, 设  $C_j=b_{1j}A_1+\dots+b_{rj}A_r$ ,  $j=1, 2, \dots, r$ . 得

$$(C_1, \dots, C_r) = (A_1, \dots, A_r) \begin{bmatrix} b_{11} & \dots & b_{1r} \\ \vdots & \dots & \vdots \\ b_{r1} & \dots & b_{rr} \end{bmatrix}$$

记  $B=(b_{ij})_{r \times r}$ , 有  $C=AB$ , 又因为  $r(A)=r(C)=r$ , 而  $r(C) \leq \min r(B, A)$ , 所以  $r(B)=r$ , 即  $B$  可逆.

40. 设向量组  $\{\beta_1, \dots, \beta_m\}$  线性无关且可由向量组  $\{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$  线性表出, 则存在  $\alpha_k$  ( $1 \leq k \leq n$ ) 使  $\{\alpha_k, \beta_2, \dots, \beta_m\}$  线性无关.

证 反证法. 若对所有的  $\alpha_k$  都有  $\alpha_k, \beta_2, \dots, \beta_m$  线性相关, 即存在一组不全为 0 的数  $\lambda_k, \mu_2, \dots, \mu_m$  使

$$\lambda_k \alpha_k + \mu_2 \beta_2 + \dots + \mu_m \beta_m = 0,$$

由已知  $\beta_2, \dots, \beta_m$  线性无关, 所以必  $\lambda_k \neq 0$ , 即  $\alpha_k$  可由  $\beta_2, \dots, \beta_m$  线性表出. 又因  $\beta_1$  可由  $\{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$  线性表出, 从而  $\beta_1$  可由  $\{\beta_2, \dots, \beta_m\}$  线性表出. 这与已知  $\{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m\}$  线性无关矛盾, 所以必有某个  $\alpha_k$  使  $\{\alpha_k, \beta_2, \dots, \beta_m\}$  线性无关.

41. 试证明斜对称方阵的秩是偶数 (斜对称方阵是指满足  $A^T = -A$  的方阵, 又称反对称方阵).

证 设  $\text{rank} A = r$ , 则若  $A$  的第  $i_1, \dots, i_r$  行线性无关, 由反对称性知  $A$  的第  $i_1, \dots, i_r$

列也线性无关 (因为记  $A = \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{bmatrix}$ , 则  $A = (-\alpha_1^T, \dots, -\alpha_n^T)$ ). 于是由 23 题知

$$\det A \begin{pmatrix} i_1, \dots, i_r \\ i_1, \dots, i_r \end{pmatrix} \neq 0.$$

又  $A$  的所有主子式均为反对称阵, 而奇数阶的反对称阵的行列式值均为 0 (见第 2 章的第 20 题), 所以  $r$  为偶数.

42. 求证对两个二次多项式的结式  $R$ , 有

$$4R = (2a_0b_2 - a_1b_1 + 2a_2b_0)^2 - (4a_0a_2 - a_1^2)(4b_0b_2 - b_1^2).$$

解 设  $f(x) = a_0x^2 + a_1x + a_2$ ,  $g(x) = b_0x^2 + b_1x + b_2$ ,

$$\begin{aligned} 4R(f, g) &= \begin{vmatrix} 2a_0 & a_1 & a_2 & 0 \\ 0 & 2a_0 & a_1 & a_2 \\ 2b_0 & b_1 & b_2 & 0 \\ 0 & 2b_0 & b_1 & b_2 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 2a_0 & a_1 & a_2 \\ 2b_0 & b_1 & b_2 \\ a_0 & a_1 & 2a_2 \\ b_0 & b_1 & 2b_2 \end{vmatrix} \\ &= - \begin{vmatrix} 2a_0 & a_1 \\ 2b_0 & b_1 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} a_1 & 2a_2 \\ b_1 & 2b_2 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 2a_0 & a_2 \\ 2b_0 & b_2 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} a_0 & 2a_2 \\ b_0 & 2b_2 \end{vmatrix} \\ &= - (2a_0b_1 - 2b_0a_1)(2a_1b_2 - 2b_1a_2) + (2a_0b_2 - 2a_2b_0)^2 \\ &= - 4a_0b_2a_1b_1 + 4a_1^2b_0b_2 + 4a_0a_2b_1^2 - 4b_0a_2a_1b_1 + (2a_0b_2 + 2a_2b_0)^2 - 16a_0b_2a_2b_0 \\ &= (2a_0b_2 - a_1b_1 + 2a_2b_0)^2 - a_1^2b_1^2 + 4a_0a_2b_1^2 + 4b_0b_1a_1^2 - 16a_0a_2b_0b_2 \\ &= (2a_0b_2 - a_1b_1 + 2a_2b_0)^2 - (4a_0a_2 - a_1^2)(4b_0b_2 - b_1^2). \end{aligned}$$

43. 若  $y_1, \dots, y_{n-1}$  是  $f(x)$  的微商  $f'(x)$  的零点, 则

$$\text{disc}(f) = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} n^n a_0^{n-1} \prod_{k=1}^{n-1} f(y_k)$$

解 设  $f(x) = a_0x^n + \dots + a_{n-1}x + a_n$ , 则  $f'(x) = na_0x^{n-1} + \dots + a_{n-1} = b_0x^{n-1} + \dots$ ,  
又  $\text{disc}(f) = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} a_0^{-1} R(f, f')$ , 由定理 3.13 知有

$$\begin{aligned} R(f, f') &= (-1)^{n(n-1)} b_0^n \prod_{k=1}^{n-1} f(y_k) \quad (\text{而 } b_0 = na_0) \\ &= n^n a_0^n \prod_{k=1}^{n-1} f(y_k). \text{ 所以得证.} \end{aligned}$$

44. (1) 求  $f(x) = x^n + ax + b$  的判别式.

解 因为  $f'(x) = nx^{n-1} + a$ , 故  $f'(x) = 0$  的根为

$$y_k = \sqrt[n-1]{-\frac{a}{n}\epsilon^k}, k = 0, 1, \dots, n-2, \text{ 其中 } \epsilon = e^{\frac{2\pi i}{n-1}}.$$

于是

$$\begin{aligned} R(f, f') &= (-1)^{n(n-1)} n^n \prod_{k=0}^{n-2} (y_k^n + ay_k + b) \\ &= n^n \prod_{k=0}^{n-2} \left( b + \frac{n-1}{n} a \sqrt[n-1]{-\frac{a}{n}\epsilon^k} \right) = n^n \left[ b^{n-1} - \frac{(1-n)^{n-1}}{n^{n-1}} a^{n-1} \left( -\frac{a}{n} \right) \right] \\ &= n^n \left[ b^{n-1} + (-1)^{n-1} \frac{(n-1)^{n-1}}{n^n} a^n \right] = n^n b^{n-1} + (1-n)^{n-1} a^n, \end{aligned}$$

故  $\text{disc}(f) = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} R(f, f') = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} [n^n b^{n-1} + (1-n)^{n-1} a^n]$ .



(2) 求  $f(x) = x^n + ax^k + b$  的判别式 ( $n > k$ ).

解 设  $(n, k) = d$ , 则  $n = n_1 d, k = k_1 d$ ,

因为  $f'(x) = nx^{n-1} + kax^{k-1} = nx^{k-1} \left[ x^{n-k} - \frac{-ka}{n} \right]$

所以  $f'(x)$  的根为  $\xi_1 = \xi_2 = \cdots = \xi_{k-1} = 0$ , 及  $\xi_{k+l} = \sqrt[n-k]{\frac{-ka}{n}} \epsilon^l = \xi_k \epsilon^l, l = 0, 1, \cdots, n-k-1$ .

其中  $\epsilon^{n-k} = 1$ ,

又因为  $\epsilon^{lk} = 1^{\frac{lk}{n-k}} = 1^{\frac{lk_1 d}{(n_1 - k_1)d}} = \eta^{lk_1}$  (即  $\eta^{n_1 - k_1} = 1$ )

$$\begin{aligned} \text{所以 } R(f, f') &= n^n \prod_{j=1}^{n-1} (f(\xi_j)) = n^n b^{k-1} \prod_{l=0}^{n-k-1} f(\xi_{k+l}) \\ &= n^n b^{k-1} \prod_{l=0}^{n-k-1} (\xi_k^n \epsilon^{ln} + a \xi_k^k \epsilon^{lk} + b) \\ &= n^n b^{k-1} \prod_{l=0}^{n-k-1} \left[ b + \frac{(n-k)a}{n} \xi_k^k \epsilon^{lk} \right] \\ &= n^n b^{k-1} \prod_{l=0}^{n_1 - k_1 - 1} \left[ b + \frac{(n-k)a}{n} \xi_k^k \eta^{lk_1} \right]^d \\ &= n^n b^{k-1} \left[ b^{n_1 - k_1} - \frac{(-(n-k)a)^{n_1 - k_1}}{n^{n_1 - k_1}} \cdot \frac{(-ka)^{k_1}}{n^{k_1}} \right]^d \\ &= b^{k-1} [n^{n_1} b^{n_1 - k_1} + (-1)^{n_1 - 1} (n-k)^{n_1 - k_1} k^{k_1} a^{n_1}]^d \end{aligned}$$

以上化简过程还用到  $\xi_k^k = \left(-\frac{ka}{n}\right)^{\frac{k}{n-k}} = \left(\frac{-ka}{n}\right)^{\frac{k_1}{n_1 - k_1}}$  及  $\eta^{lk_1(n_1 - k_1)} = 1, (\xi_k \epsilon^l)^{n-k} = \frac{-ka}{n}$  等.

于是得:

$$\text{disc}(f) = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} b^{k-1} [n^{n_1} b^{n_1 - k_1} + (-1)^{n_1 - 1} (n-k)^{n_1 - k_1} k^{k_1} a^{n_1}]^d.$$

45. 求结式: (1)  $x^n + x + 1$  与  $x^2 - 3x + 2$ .

解 因为  $g(x) = x^2 - 3x + 2$  的根为  $y_1 = 1, y_2 = 2$ ,

$$\begin{aligned} \text{所以 } R(f, g) &= (-1)^{2n} \cdot 1^n \cdot \prod_{j=1}^2 (f(y_j)) = (1 + 1 + 1)(2^n + 2 + 1) \\ &= 3(2^n + 3). \end{aligned}$$

(2)  $x^n + 1$  与  $(x-1)^n$ .

解 因为 1 是  $g(x) = (x-1)^n$  的  $n$  重根,

$$\text{所以 } R(f, g) = (-1)^{n \cdot n} \prod_{j=1}^n f(y_j) = (-1)^{n^2} \cdot 2^n = (-1)^n 2^n$$

(因为  $n$  与  $n^2$  同奇、偶).

(3)  $x^n - 1$  与  $x^m - 1$ .

解 因为  $(x^n - 1, x^m - 1) = (x-1)$ , 即  $f, g$  有公因子,

所以  $R(f, g) = 0$ .

46. 解方程组:

$$(1) \begin{cases} x^3 + y^3 = 7(x + y) \\ x^2 + y^2 = 13 \end{cases}.$$

解

$$\begin{aligned} R_x(f, g) &= \begin{vmatrix} 1 & 0 & -7 & -7y + y^3 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -7 & -7y + y^3 \\ 1 & 0 & -13 + y^2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -13 + y^2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -13 + y^2 \end{vmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & -7 & y^3 - 7y & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -7 & y^3 - 7y \\ 0 & 0 & y^2 - 6 & 7y - y^3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & y^2 - 6 & 7y - y^3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & y^2 - 13 \end{bmatrix} \\ &= (y^2 - 6)^2(y^2 - 13) + (7y - y^3)^2 = 2y^6 - 39y^4 + 241y^2 - 468, \end{aligned}$$

令  $y^2 = z$ , 求三次方程

$$z^3 - \frac{39}{2}z^2 + \frac{241}{2}z - 234 = (z - 4)\left(z^2 - \frac{31}{2}z + \frac{117}{2}\right) = 0$$

的根, 知  $y^2 = 4, 9, \frac{13}{2}$  即  $y = \pm 2, \pm 3, \pm\sqrt{\frac{13}{2}}$ , 代入原方程组, 由  $x, y$  的对称性知  $x = \pm 3,$

$\pm 2, \pm\sqrt{\frac{13}{2}}$ . 故原方程组的解为

$$(\pm 2, \pm 3); (\pm 3, \pm 2); \left(\pm\sqrt{\frac{13}{2}}, \mp\sqrt{\frac{13}{2}}\right).$$

$$(2) \begin{cases} -ay + x(1 - x^2 - y^2) = 0 \\ ax + y(1 - x^2 - y^2) = a \end{cases},$$

解

$$\begin{aligned} R_x(f, g) &= \begin{bmatrix} -1 & 0 & (1 - y^2) & -ay & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 - y^2 & -ay \\ -y & a & y(1 - y^2) - a & 0 & 0 \\ 0 & -y & a & y(1 - y^2) - a & 0 \\ 0 & 0 & -y & a & y(1 - y^2) - a \end{bmatrix} \\ &\xrightarrow[\text{按第 1 列展开}]{(-y) \times r_1 + r_3 \text{ 后}} \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 - y^2 & -ay \\ a & -a & ay^2 & 0 \\ -y & a & y(1 - y^2) - a & 0 \\ 0 & -y & a & y(1 - y^2) - a \end{bmatrix} \\ &\xrightarrow[\text{按第 1 列展开}]{ar_1 + r_2 \atop ar_1 + r_3} \begin{bmatrix} -a & a & -a^2y \\ a & -a & ay^2 \\ -y & a & y(1 - y^2) - a \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$= -a^2 y(a-y)^2$$

故  $y_1 = 0$  或  $y_2 = a$ , 代入解得  $x_1 = 1, x_2 = \frac{1 \pm \sqrt{1-4a^2}}{2}$ . 故原方程的解为  $(1, 0)$ ;

$$\left( \frac{1 \pm \sqrt{1-4a^2}}{2}, a \right).$$

$$(3) \begin{cases} x^3 - y^3 - z^3 = 3xyz \\ x^2 = 2(y^2 + z^2) \end{cases}, \quad (\text{仅求正整数解})$$

解

$$R_x(f, g) = \begin{vmatrix} 1 & 0 & -3yz & -y^3 - z^3 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -3yz & -y^3 - z^3 \\ 1 & 0 & -2(y^2 + z^2) & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -2(y^2 + z^2) & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -2(y^2 + z^2) \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow[-\text{按第1列展开}]{-r_1 + r_3 \text{ 后}} \begin{vmatrix} 1 & 0 & -3yz & -y^3 - z^3 & 0 \\ 0 & 3yz - 2(y^2 + z^2) & y^3 + z^3 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -2(y^2 + z^2) & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -2(y^2 + z^2) & 0 \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow[-\text{按第1列展开}]{-r_1 + r_3 \text{ 后}} \begin{vmatrix} 3yz - 2(y^2 + z^2) & y^3 + z^3 & 0 & 0 \\ 0 & 3yz - 2(y^2 + z^2) & y^3 + z^3 & 0 \\ 1 & 0 & -2(y^2 + z^2) & 0 \end{vmatrix}$$

$$= 7y^6 - 24y^5z + 42y^4z^2 - 50y^3z^3 + 42y^2z^4 - 24yz^5 + 7z^6$$

$$= (y-z)^2(7y^4 - 10y^3z + 15y^2z^2 - 10yz^3 + 7z^4) = 0$$

①  $y=z$ , 代入原方程组第2个方程中得  $x^2 = 4y^2$ , 所以  $x = \pm 2y, x = -2y$  不满足原方程组第1个方程, 所以舍去. 故得方程组的全部解为  $t(2, 1, 1), t \in N$ .

或②  $7u^4 - 10u^3 + 15u^2 - 10u + 7 = 0, u = \frac{y}{z}$  为正整数之商, 所以  $u$  为正有理数,  $u$  的可能值为  $1, \frac{1}{7}, 7$ .  $1$  显然不是根,  $7$  代入只要看个位数即可.  $(7-0+5-0+7) \neq 0$ , 所以  $7$  不是根, 于是  $\frac{1}{7}$  也不是根 (因为  $v = \frac{z}{y}$  的方程与关于  $u$  的方程同, 而  $v=7$  不是根, 所以  $\frac{1}{7}$  不是根), 故此时单方程组无解.

$$47. \text{ 试判定方程组 } \begin{cases} y^2 + 2x^2y - 1 = 0 \\ 6x^2 - y^2 - 3y = 0 \end{cases} \text{ 无有理数解.}$$

解

$$R_x(f, g) = \begin{vmatrix} 2y & 0 & y^2 - 1 & 0 \\ 0 & 2y & 0 & y^2 - 1 \\ 6 & 0 & -y^2 - 3y & 0 \\ 0 & 6 & 0 & -y^3 - 3y \end{vmatrix} \xrightarrow[-\text{展开}]{\text{按1,3行}} \begin{vmatrix} 2y & y^2 - 1 \\ 6 & -y^3 - 3y \end{vmatrix}$$

$$=2^2(y^4+6y^2-3)^2=0,$$

因为  $y^4+6y^2-3=0$  的根满足  $y^2=-3\pm 2\sqrt{3}$  不是有理数,故原方程组无有理数解.

### 3.4 补充题与解答

1.

$$(1) \text{ 已知线性方程组 } \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & \lambda+2 \\ 1 & \lambda & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ 无解, 则 } \lambda = ?$$

(2) 若上述方程组有唯一解, 则  $\lambda = ?$ .

解 对增广矩阵做初等行变换得

$$(A, b) \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & \lambda+2 & 3 \\ 1 & \lambda & -2 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & (\lambda+1)(\lambda-3) & \lambda-3 \end{bmatrix}$$

(1)  $Ax=b$  无解  $\Leftrightarrow r(A) < r(A \cdot b) \Leftrightarrow \lambda = -1$ ,

(2) 由  $Ax=b$  有唯一解  $\Leftrightarrow \det A \neq 0$  (此时当然有  $r(A) = r(A \cdot b)$ ). 故知有  $\lambda \neq 3, -1$ , 即对任  $3, -1$  以外的数, 方程组均有唯一解.

$$2. \text{ 设 } A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 4 & t & 3 \\ 3 & -1 & 1 \end{bmatrix}, B \text{ 为三阶非零矩阵, 且 } AB=0, \text{ 则 } t = ?$$

解 由  $AB=0$ , 知  $B$  的列均为齐次线性方程组  $Ax=0$  的解; 由  $B \neq 0$ , 知  $Ax=0$  有非零解, 故其系数行列式必为 0.

$$\det A = t + 18 + 8 + 6t + 3 - 8 = 0 \rightarrow t = -3.$$

3. 试计算多项式  $f(x)$  的判别式:

$$(1) f(x) = x^n + a;$$

$$(2) f(x) = \frac{x^n - 1}{x - 1};$$

$$(3) f(x) = x^n + ax^{n-1} + ax^{n-2} + \cdots + a.$$

解 (1) 方法 1 因为  $f(x) = x^n + a$ , 所以  $f'(x) = nx^{n-1}$ , 即 0 为  $f'$  的  $n-1$  重根.

$$\text{所以 } \Delta(f) = R(f, f') = (-1)^{n(n-1)} n^n \prod_{j=1}^{n-1} f(0) = n^n a^{n-1}.$$

方法 2 用行列式算

$$\Delta(f) = \begin{vmatrix} 1 & & 0 & a & & \\ & \ddots & \vdots & & \ddots & \\ & & 1 & 0 & & \\ n & & & & & a \\ & \ddots & & & & \\ & & n & & & \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & & 0 & a & & \\ & \ddots & \vdots & & \ddots & \\ & & 1 & 0 & & a \\ & & 0 & -na & & \\ & & & \ddots & \ddots & \\ & & & & \ddots & -na \\ & & n & & & 0 \end{vmatrix}$$

$$=(-1)^n n(-na)^{n-1} = a^{n-1} n^n.$$

其中第二个等号是对行列式做了如下运算:  $i$  行的  $(-n)$  倍加到  $(n-1)+i$  行上,  $(i=1, \dots, n-1)$ , 故行列式值不变. 于是得:  $\text{disc}(f) = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} a^{n-1} \cdot n^n$ .

$$(2) \text{ 由 } f(x) = \frac{x^n - 1}{x - 1} \rightarrow (x-1)f(x) = x^n - 1,$$

$$\begin{aligned} \text{因为} \quad \Delta((x-1)(f(x))) &= (-1)^{n-1} \Delta(f(x)) \cdot n^2, \\ \Delta(x^n - 1) &= (-1)^{n-1} n^n, \end{aligned}$$

$$\text{所以} \quad \Delta(f(x)) = n^{n-2}, \rightarrow \text{disc}(f) = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} n^{n-2}.$$

(3) 由  $f(x) = x^n + ax^{n-1} + ax^{n-2} + \dots + a$ , 易知

$$(x-1)f(x) = x^{n+1} + (a-1)x^n - a,$$

左边的判别式为  $(1+na)^2$ , 而右边的多项式相当于习题 44(2) 中  $n$  取  $n+1$ ,  $k$  取  $n$ ,  $a$  取  $a-1$ ,  $b$  取  $-a$ , 故有

$$\begin{aligned} (1+na)^2 \Delta(f(x)) &= (-a)^{n-1} [(n+1)^{n+1}(-a) + (-1)^n n^n (a-1)^{n+1}] \\ &= (-1)^n a^{n-1} [(n+1)^{n+1} a + n^n (1-a)^{n+1}] \end{aligned}$$

$$\text{所以} \quad \Delta(f(x)) = (-1)^n a^{n-1} [(n+1)^{n+1} a + n^n (1-a)^{n+1}] / (1+na)^2.$$

$$\text{故} \quad \text{disc}(f(x)) = a^{n-1} \frac{(n+1)^{n+1} a + n^n (1-a)^{n+1}}{(1+na)^2}.$$

## 第4章

### 矩阵的运算与相抵

#### 4.1 定义与定理

**定义 4.1** 设  $F$  为域,  $M_{m \times n}(F)$  为  $F$  上的  $m \times n$  矩阵全体.

(1) 两个  $m \times n$  矩阵  $A = (a_{ij}), B = (b_{ij})$  的加法, 定义为

$$A + B = (a_{ij} + b_{ij}).$$

$M_{m \times n}(F)$  对此加法成 Abel 群,  $A = (a_{ij})$  的负元为  $-A = (-a_{ij})$ , 加法恒元为零矩阵.

(2) 域  $F$  中元素  $\lambda$  与矩阵  $A = (a_{ij})$  的乘法(数乘)定义为

$$\lambda A = (\lambda a_{ij}).$$

对任意  $\lambda_1, \lambda_2, \lambda \in F$  及  $A, B \in M_{m \times n}(F)$  有

$$\lambda(A + B) = \lambda A + \lambda B, \quad (\lambda_1 \lambda_2)A = \lambda_1(\lambda_2 A),$$

$$(\lambda_1 + \lambda_2)A = \lambda_1 A + \lambda_2 A, \quad 1A = A.$$

$M_{m \times n}(F)$  对加法与数乘运算像行向量空间一样满足 8 条性质, 它也是向量空间. (与  $F^{m \times n}$  写法不同).

**定义 4.2** 设  $A = (a_{ij}) \in M_{m \times s}(F), B = (b_{ij}) \in M_{s \times n}(F)$ , 则  $AB = C = (c_{ij}) \in M_{m \times n}(F)$  由下式定义:

$$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{is}b_{sj} = \sum_{k=1}^s a_{ik}b_{kj}$$

( $1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n$ ).

矩阵乘法无交换律, 有零因子(即当  $A \neq 0, B \neq 0$  时可能  $AB = 0$ ), 无消去律(即  $AB = AC$  并不能推出  $B = C$ ).

**定理 4.1** 域  $F$  上  $n$  阶方阵全体  $M_n(F)$  对方阵加法和乘法是一个环(称为  $n$  阶全方阵环).

**定义 4.3** 设  $A = (a_{ij}) \in M_{m \times n}(F)$ , 则矩阵

$$A^T = (b_{ij}) \in M_{n \times m}(F), \quad b_{ij} = a_{ji},$$

称为矩阵  $A$  的转置.

转置有性质:  $(AB)^T = B^T A^T, (A^{-1})^T = (A^T)^{-1}, (A+B)^T = A^T + B^T, (\lambda A)^T = \lambda A^T$  等.

**定义 4.4** 方阵  $A = (a_{ij}) \in M_n(F)$  的迹即为其主对角线上元素之和

$$\text{tr}(A) = a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn}.$$

**定理 4.2** 设  $A, B \in M_n(F), \lambda \in F$ , 则

$$(1) \text{tr}(A+B) = \text{tr}(A) + \text{tr}(B), \text{tr}(\lambda A) = \lambda \text{tr}(A), \text{tr}(A^T) = \text{tr} A,$$

$$(2) \text{tr}(AB) = \text{tr}(BA),$$

(3)  $\text{tr}(A\bar{A}^T)=0$  当且仅当  $A=0$  (设  $F=\mathbb{C}$ ,  $\bar{a}$  是  $a$  的复共轭,  $\overline{(a_{ij})}=(\bar{a}_{ij})$ ).

**定义 4.5** 设  $A=(a_{ij})$  为  $m \times n$  矩阵, 设想在  $A$  的某些行间和列间插入若干直线, 把  $A$  分割为许多子矩阵(称为  $A$  的块), 这样对  $A$  的分割称为对  $A$  分块, 把  $A$  表为由块构成的矩阵时, 称为分块矩阵.

**定理 4.3** 设  $A=(a_{ij})$ ,  $B=(b_{ij})$  分别为  $m \times s$  和  $s \times n$  矩阵, 把  $A$  和  $B$  分块为  $A=(A_{uv})$ ,  $B=(B_{wx})$  且  $A$  的列与  $B$  的行分割方式相同(即分组数相同, 各组成员数依次相同) ( $1 \leq u \leq p, 1 \leq v \leq q, 1 \leq w \leq q, 1 \leq x \leq r$ ), 则  $A, B$  的积  $C=(C_{ux})$ , 其中

$$C_{ux} = \sum_{k=1}^q A_{uk} B_{kx} \quad (1 \leq u \leq p, 1 \leq x \leq r).$$

系 (1) 矩阵  $A$  与列向量  $y$  的积, 是  $A$  的各列的线性组合, 组合系数为  $y$  的各分量.

(2) 行向量  $x$  与矩阵  $B$  的积是  $B$  的各行的线性组合, 组合系数为  $x$  的各分量.

(3)  $AB$  的第  $j$  列是  $A$  的各列的线性组合, 组合系数是  $B$  的第  $j$  列元素.

(4)  $AB$  的第  $i$  行是  $B$  的各行的线性组合, 组合系数是  $A$  的第  $i$  行元素.

即

$$Ay = (A_1, \dots, A_n) \begin{bmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} = y_1 A_1 + \dots + y_n A_n;$$

$$xB = (x_1, \dots, x_m) \begin{bmatrix} \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_n \end{bmatrix} = x_1 \beta_1 + \dots + x_n \beta_n;$$

$$AB = A(B_1, \dots, B_n) = (AB_1, \dots, AB_n);$$

$$AB = \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_m \end{bmatrix} B = \begin{bmatrix} \alpha_1 B \\ \vdots \\ \alpha_m B \end{bmatrix}.$$

**定义 4.6** 由单位方阵  $I$  经过一次初等变换而得到的方阵称为初等方阵.

(1) 把  $I$  的  $i, j$  行互换得

$$P_{ij} = \begin{matrix} & & i & & j & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ i & & & & & & \\ & & & & & & \\ j & & & & & & \end{matrix} \begin{bmatrix} 1 & & & & & & \\ & \ddots & & & & & \\ & & 1 & & & & \\ & & & 0 & & & 1 \\ & & & & 1 & & \\ & & & & & \ddots & \\ & & & & & & 1 \\ & & & 1 & & & 0 \\ & & & & & & & 1 & \ddots \\ & & & & & & & & & 1 \end{bmatrix} \quad (\text{第 1 种});$$

(2) 用非零数乘  $I$  的第  $i$  行得

$$P_i(c) = \begin{bmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 1 & & \\ & & & c & \\ & & & & 1 & \ddots \\ & & & & & \ddots & 1 \end{bmatrix} \quad (\text{第 2 种});$$

(3) 把  $I$  的第  $j$  行的  $c$  倍加到第  $i$  行上去得

$$P_{ij}(c) = \begin{bmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 1 & & \\ & & & \ddots & \\ & & & & 1 & c \\ & & & & & \ddots & 1 \end{bmatrix} \quad (\text{第 3 种}).$$

初等方阵都是可逆的, 它们的逆矩阵还是初等方阵. 即有

$$P_{ij}^{-1} = P_{ij}; P_i(c)^{-1} = P_i\left(\frac{1}{c}\right); P_{ij}(c)^{-1} = P_{ij}(-c).$$

**引理 4.1** 初等方阵左乘矩阵  $A$  相当对  $A$  作初等行变换; 初等方阵右乘  $A$  相当对  $A$  作初等列变换.

(1)  $P_{ij}A$ , 把  $A$  的  $i, j$  行互换; (2)  $P_i(c)A$ , 把  $A$  的  $i$  行乘  $c$  倍; (3)  $P_{ij}(c)A$ , 把  $A$  的第  $j$  行的  $c$  倍加到第  $i$  行上去.

**定义 4.7** 矩阵  $A$  与  $B$  相抵是指存在初等方阵  $P_1, \dots, P_s, Q_1, \dots, Q_t$ , 使得

$$P_s \cdots P_1 A Q_1 \cdots Q_t = B.$$

(意即对  $A$  作行和列的初等变换可得到  $B$ ).

**定理 4.4** 任一矩阵  $A$  相抵于

$$\begin{bmatrix} I_r & O \\ O & O \end{bmatrix},$$

称为  $A$  的相抵标准形,  $r = \text{rank} A$ .

**系 1** 域  $F$  上方阵  $A$  可逆当且仅当  $A$  是初等方阵之积.

**系 2** 对任一矩阵  $A$ , 存在可逆阵  $P, Q$  使得

$$PAQ = \begin{bmatrix} I_r & O \\ O & O \end{bmatrix}.$$

**系 3** 任一可逆方阵  $A$  经有限次行的初等变换能够化为单位方阵.

**系 4** 设  $A$  为  $n$  阶可逆方阵, 对  $n \times 2n$  阶方阵  $(A, I)$  作初等行变换化  $A$  为  $I_n$ , 则右边单位阵同时化为  $A^{-1}$ . (因为  $A^{-1}(A, I_n) = (I_n, A^{-1})$ ), 此即初等变换求  $A^{-1}$  的方法.

**定义 4.8** 设映射

$$\begin{aligned} \varphi_A: F^{(n)} &\rightarrow F^{(m)}, \\ x &\mapsto Ax. \end{aligned}$$

显然它有如下性质:

$$\begin{aligned} \varphi_A(x_1 + x_2) &= \varphi_A(x_1) + \varphi_A(x_2) & (x_1, x_2 \in F^{(n)}), \\ \varphi_A(\lambda x) &= \lambda \varphi_A(x) & (\lambda \in F, x \in F^{(n)}). \end{aligned}$$



满足这样性质的映射称为线性映射.

$$\ker(A) = \{x \in F^{(n)} \mid Ax = 0\},$$

称为映射  $\varphi_A$  的核, 就是线性方程组  $Ax=0$  的解子空间.  $\dim(\ker A) = n - r(A)$  称为  $A$  的零度, 记为  $\text{null}A$ .

$$\text{Im}(A) = \{Ax \mid x \in F^{(n)}\},$$

称为映射  $\varphi_A$  的像, 是  $F^{(m)}$  的子空间. 因为  $Ax = (\beta_1, \dots, \beta_n)x = \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \dots + x_n \beta_n$ , 所以像  $Ax$  是  $A$  的列的线性组合. 由  $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$  生成的子空间称为  $A$  的列空间, 于是有

$$\text{Im}(A) = \langle \beta_1, \dots, \beta_n \rangle = F\beta_1 + \dots + F\beta_n,$$

$$\dim(\text{Im}(A)) = r\{\beta_1, \dots, \beta_n\} = r(A),$$

$$\text{故 } \dim(\text{Im}(A)) + \dim(\ker(A)) = n.$$

又  $\forall y \in \text{Im}A$  的原像全体

$$\varphi_A^{-1}(y) = \{x \in F^{(n)} \mid Ax = y\} = x_0 + \ker(A),$$

其中  $x_0$  是  $y$  的任一个原像.

**定理 4.5** 记  $\varphi_A$  为“乘  $A$  映射”:  $F^{(n)} \rightarrow F^{(m)}, x \mapsto Ax$ , 则

- (1)  $\varphi_A$  为单射当且仅当  $A$  为列独立阵;
- (2)  $\varphi_A$  为满射当且仅当  $A$  为行独立阵;
- (3)  $\varphi_A$  为双射当且仅当  $A$  为可逆方阵.

**定义 4.9**  $F^{(n)}$  到自身的线性映射  $\varphi_A: F^{(n)} \rightarrow F^{(n)}, x \mapsto Ax$ , 称为线性变换. 此时  $\varphi_A$  是单射  $\Leftrightarrow \varphi_A$  是满射  $\Leftrightarrow \varphi_A$  是双射  $\Leftrightarrow \det A \neq 0$ .

**定理 4.6** 设  $V$  是  $F^{(n)}$  的一个子空间,  $\varphi_A: x \mapsto Ax$  是  $F^{(n)}$  到  $F^{(m)}$  的线性映射, 将  $\varphi_A$  限制到  $V$  上给出映射

$$\begin{aligned} \psi_A: V &\rightarrow F^{(m)}, \\ x &\mapsto Ax, \end{aligned}$$

则有维数公式:  $\dim(\ker \psi_A) + \dim(\text{Im} \psi_A) = \dim V$ .

**定义 4.10** 设  $A$  为矩阵, 满足  $AXA = A$  的矩阵  $X$  称为  $A$  的广义逆, 记为  $A^-$  (若  $A$  为  $m \times n$  阵, 则  $A^-$  为  $n \times m$  阵).

**定理 4.7** 任意矩阵  $A$  的广义逆  $A^-$  总存在, 事实上, 若有可逆阵  $P, Q$  使  $A = P \begin{pmatrix} I_r & O \\ O & O \end{pmatrix} Q$ , 则  $A^-$  能且只能为

$$A^- = Q^{-1} \begin{bmatrix} I_r & Y_2 \\ Y_3 & Y_4 \end{bmatrix} P^{-1},$$

其中  $Y_2, Y_3, Y_4$  的元素是任意的.

**定义 4.11** 矩阵  $A$  的 Moore-Penrose 广义逆  $A^+$  是指同时满足下列等式的矩阵  $X$ :

$$\begin{cases} AXA = A, \\ XAX = X \end{cases} \quad (\text{即 } A, X \text{ 互为广义逆})$$

$$\begin{cases} (AX)^T = AX \\ (XA)^T = XA \end{cases} \quad (\text{即 } AX, XA \text{ 为 Hermite 阵}).$$

**定理 4.8** 任意矩阵  $A$  的 Moore-Penrose 广义逆  $A^+$  存在且唯一,事实上,若  $A=CR$ , 其中  $C, R$  分别为列、行独立阵,则

$$A^+ = \bar{R}^T (R \bar{R}^T)^{-1} (\bar{C}^T C)^{-1} \bar{C}^T.$$

**引理 4.2** (1)  $(A^+)^+ = A$ ; (2)  $r(A) = r(A^+) = r(A^+ A) = r(AA^+)$ .

**定理 4.9** (1) 齐次线性方程组  $Ax=0$  的解全体为

$$x = (I - A^- A)z,$$

其中  $A^-$  为  $A$  的广义逆,  $z$  为列向量.

(2) 非齐次线性方程组  $Ax=b$  有解当且仅当  $b=AA^-b$  ( $A^-$  为某广义逆); 有解时解全体为  $A^-b$ ,  $A^-$  为  $A$  的广义逆.

**定理 4.10** 对于线性方程组  $Ax=b$ , 当  $Ax=b$  无解时, 若有分解式  $A=CR$  (其中  $C, R$  为列、行独立阵) 则

$$\bar{X} = A^+ b = \bar{R}^T (R \bar{R}^T)^{-1} (\bar{C}^T C)^{-1} \bar{C}^T b$$

是最优最小二乘解.

## 4.2 解题方法介绍

### 4.2.1 方阵求逆的方法

(1) 用定义. 若存在方阵  $B$ , 使  $AB=BA=I$ , 则  $B=A^{-1}$ . 此法要求对矩阵乘法比较熟练, 对于元素比较特殊的矩阵, 可直观看出满足条件的  $B$ . (只验证  $AB=I$ , 或  $BA=I$  一个即可).

(2) 用公式

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} A^*.$$

其中  $A^* = (A_{ji})$  是  $A$  的古典伴随方阵.

(3) 初等变换法. 因为  $A^{-1}(A, I) = (I, A^{-1})$ , 故得: 把  $(A, I)$  同时做初等行变换, 当  $A$  处变为  $I$  时,  $I$  处得到  $A^{-1}$ .

(4) 公式 
$$\begin{bmatrix} A & C \\ O & B \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} A^{-1} & -A^{-1}CB^{-1} \\ O & B^{-1} \end{bmatrix}.$$

(5) 设  $M = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}$ , 其中  $A$  为  $r$  阶方阵,  $r(A)=r$ ,

因为 
$$\begin{bmatrix} I_r & O \\ -CA^{-1} & I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & B \\ O & D - CA^{-1}B \end{bmatrix},$$

所以 
$$M^{-1} = \begin{bmatrix} A & B \\ O & D - CA^{-1}B \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} I_r & O \\ -CA^{-1} & I \end{bmatrix}.$$

### 4.2.2 关于矩阵的秩的几个公式

(1) 设  $A$  为  $m \times n$ ,  $B$  为  $n \times q$  矩阵, 则

$$r(A) + r(B) - n \leq r(AB) \leq \min(r(A), r(B)).$$

(2) 设  $A_{m \times n}$ ,  $B_{n \times p}$ ,  $C_{p+q}$  为矩阵, 则

$$r(AB) + r(BC) \leq r(ABC) + r(B).$$

(3) 设  $A, B$  行数相同, 则

$$\max(r(A), r(B)) \leq r(A, B) \leq r(A) + r(B).$$

(4) 设  $A, B$  均为  $m \times n$  矩阵, 则

$$r(A+B) \leq r(A) + r(B).$$

(5) 设  $A$  为  $m \times n$ ,  $B$  为  $n \times q$  矩阵,  $AB=0$ , 则

$$r(A) + r(B) \leq n.$$

(6) 设  $A$  是  $n$  阶方阵 ( $n \geq 2$ ),  $A^*$  为其古典伴随方阵, 则

$$\text{rank}(A^*) = \begin{cases} n, & \text{当 } r(A) = n \\ 1, & \text{当 } r(A) = n-1 \\ 0 & \text{当 } r(A) < n-1. \end{cases}$$

### 4.3 习题与解答

1. 设

$$(1) A = \begin{bmatrix} -1 & -2 & -4 \\ -1 & -2 & -4 \\ 1 & 2 & 4 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & 9 \end{bmatrix};$$

$$(2) A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \\ -1 & 2 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 3 & 1 & -2 \\ 3 & -2 & 4 \\ -3 & 5 & -1 \end{bmatrix}.$$

计算  $AB, BA$ .

解

$$(1) AB = \begin{bmatrix} -17 & -34 & -51 \\ -17 & -34 & -51 \\ 17 & 34 & 51 \end{bmatrix}, \quad BA = 0;$$

$$(2) AB = BA = 9I.$$

2. 设  $A = (a_{ij})_{3 \times 3}$ ,

$$N = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad P_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad P_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad P_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & c \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

计算  $P_1A, P_2A, P_3A, NA, AN$ .

解  $P_1A$  把  $A$  的 2, 3 行互换;  $P_2A$  把  $A$  的第 2 行乘上 2 倍;  $P_3A$  把  $A$  的第 3 行的  $c$  倍加到第 2 行上去;  $NA$  把  $A$  的各行上移, 第 3 行补入 0;  $AN$  是把  $A$  的各列向后移, 第 1 列为 0.

### 3. 计算

$$(1) \begin{bmatrix} \cos\varphi & -\sin\varphi \\ \sin\varphi & \cos\varphi \end{bmatrix}^n; \quad (2) \begin{bmatrix} 1 & \alpha & \beta \\ 0 & 1 & \alpha \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^{n+1};$$

$$(3) \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}^3; \quad (4) \begin{bmatrix} \lambda & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda \end{bmatrix}^n.$$

解

$$(1) \begin{bmatrix} \cos n\varphi & -\sin n\varphi \\ \sin n\varphi & \cos n\varphi \end{bmatrix}; \quad (2) \begin{bmatrix} 1 & (n+1)\alpha & \frac{n(n+1)}{2}\alpha^n + (n+1)\beta \\ 0 & 1 & (n+1)\alpha \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix};$$

$$(3) \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}; \quad (4) \begin{bmatrix} \lambda^n & n\lambda^{n-1} & \frac{n(n-1)}{2}\lambda^{n-2} & \frac{n(n-1)(n-2)}{3!}\lambda^{n-3} \\ 0 & \lambda^n & n\lambda^{n-1} & \frac{n(n-1)}{2}\lambda^{n-2} \\ 0 & 0 & \lambda^n & n\lambda^{n-1} \\ 0 & 0 & 0 & \lambda^n \end{bmatrix}.$$

4. 证明: 如果  $A$  是对角形阵且其主对角线上的元素各不相同, 则任一与  $A$  乘法可交换的矩阵也是对角形阵.

证 设  $A = \text{diag}(a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn})$ ,  $B = (b_{ij})$ , 则  $AB = (a_{ii}b_{ij})$ ,  $BA = (b_{ij}a_{jj})$ , 要  $AB = BA$ , 必有

$$a_{ii}b_{ij} = b_{ij}a_{jj};$$

又当  $i \neq j$  时,  $a_{ii} \neq a_{jj}$ , 所以必  $b_{ij} = 0$ ,

所以  $B = \text{diag}(b_{11}, b_{22}, \dots, b_{nn})$ .

5. 求平方等于单位阵的所有二阶方阵.

解 设  $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ , 由  $A^2 = I$  知有

$$\begin{cases} a^2 + bc = 1, \\ ab + bd = ac + cd = 0 \Rightarrow a^2 = d^2, \\ bc + d^2 = 1 \end{cases}$$

所以当  $a = d$  时,  $b = c = 0$ ;  $a = -d$  时,  $b, c$  任意但要求  $bc = 1 - a^2$ . 即  $A = \pm I$ , 或  $\begin{bmatrix} a & b \\ c & -a \end{bmatrix}$ ,

其中  $a, b, c$ , 为满足  $a^2 = 1 - bc$  的任值.

6. 设  $A = (a_{ij})$  为上三角形方阵且对角线元素均为 0, 求  $A^{n-1}, A^n$ .

解 设  $A = (a_{ij})$ , 由已知当  $i \geq j$  时,  $a_{ij} = 0$ , 记  $A^2 = (\tilde{a}_{ij})$ , 则当  $i \geq j - 1$  时有

$$\tilde{a}_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik}a_{kj} = \sum_{k=1}^{j-1} a_{ik}a_{kj} + \sum_{k=j}^n a_{ik}a_{kj} = 0 + 0 = 0,$$

所以

$$A^2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & * & \cdots & * \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & \ddots & * \\ & & & \ddots & 0 \\ & & & & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow A^{n-1} = \begin{bmatrix} 0 & \cdots & 0 & * \\ \vdots & \ddots & & 0 \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 \end{bmatrix}$$

故

$$A^n = 0.$$

7. 证明: 对任意  $n$  阶方阵  $A, B$ , 等式  $AB - BA = I_n$  都不成立.

证 首先证  $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$ . 设  $A = (a_{ij}), B = (b_{ij}), AB = (c_{ij}), BA = (d_{ij})$  则有

$$c_{ii} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{ki}, \quad d_{kk} = \sum_{i=1}^n b_{ki} a_{ik},$$

于是得

$$\text{tr}(AB) = \sum_{i=1}^n c_{ii} = \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{ki} = \sum_{k=1}^n \sum_{i=1}^n b_{ki} a_{ik} = \sum_{k=1}^n d_{kk} = \text{tr}(BA).$$

由上知

$$\text{tr}(AB - BA) = \text{tr}(AB) - \text{tr}(BA) = 0, \text{ 而 } \text{tr} I = n,$$

所以

$$AB - BA \neq I_n.$$

8. 求  $A^{-1}$

$$(1) A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 7 \\ -1 & 4 & 5 \\ 3 & 1 & 2 \end{bmatrix}; \quad (2) A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -5 & 7 \\ 0 & 1 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix};$$

$$(3) \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{bmatrix}; \quad (4) A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}, \text{ 其中 } ad - bc = 1;$$

$$(5) \begin{bmatrix} 1 & a & a^2 & \cdots & a^n \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & a^2 \\ \vdots & & \ddots & \ddots & a \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & 1 \end{bmatrix}; \quad (6) \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ 0 & 1 & 2 & \cdots & n-1 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \ddots & 2 \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

解

$$(1) A^{-1} = -\frac{1}{85} \begin{bmatrix} 3 & 7 & -28 \\ 17 & -17 & -17 \\ -13 & -2 & 8 \end{bmatrix}; \quad (2) A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 11 & -38 \\ 0 & 1 & -2 & 7 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix};$$

(3) 此题由矩阵乘法很容易看出  $A^2 = 4I$ , 所以易知  $A^{-1} = \frac{1}{4}A$ .

(4) 由公式  $A^{-1} = \frac{1}{\det A} A^*$  立得:  $A^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}.$

(5) 因为  $A$  的第  $i$  行的  $(-a)$  倍加到第  $(i-1)$  行上去  $(i=2, \dots, n)$  则得单位方阵. 这相当于在  $A$  的左边乘一系列初等方阵  $P_1, \dots, P_{n-1}$ , 于是知

$$A^{-1} = P_{n-1} \cdot \dots \cdot P_2 \cdot P_1 = \begin{bmatrix} 1 & -a & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & -a \\ & & & 1 \end{bmatrix}.$$

(6) 用初等变换求逆法知

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & 1 \\ & & & \ddots & -2 \\ & & & & 1 \end{bmatrix}.$$

9. 解下列矩阵方程

$$(1) X \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 5 \\ 0 & 3 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & -3 & 1 \\ 3 & -4 & 1 \end{bmatrix}; \quad (2) \begin{bmatrix} 4 & 6 \\ 6 & 9 \end{bmatrix} X = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix};$$

$$(3) \begin{bmatrix} 2 & -3 & 1 \\ 4 & -5 & 2 \\ 5 & -7 & 3 \end{bmatrix} X \begin{bmatrix} 9 & 7 & 6 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & -2 \\ 18 & 12 & 9 \\ 23 & 15 & 11 \end{bmatrix};$$

$$(4) \begin{bmatrix} 1 & \cdots & \cdots & 1 \\ 0 & \ddots & & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 1 \end{bmatrix} X = \begin{bmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \\ 0 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 2 \\ 0 & \cdots & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

解

$$(1) X = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & -3 & 1 \\ 3 & -4 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 5 \\ 0 & 3 & 8 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -11 & 7 \\ 1 & -27 & 17 \\ \frac{3}{2} & -35 & 22 \end{bmatrix}.$$

(2) 记  $A = \begin{bmatrix} 4 & 6 \\ 6 & 9 \end{bmatrix}$ ,  $b = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ , 则所求矩阵  $X$  的列应为线性方程组  $Ax = b$  的解. 但因为  $r(A) \neq r(A, b)$ , 所以方程组  $Ax = b$  无解, 于是此矩阵方程亦无解.

$$(3) X = \begin{bmatrix} 2 & -3 & 1 \\ 4 & -5 & 2 \\ 5 & -7 & 3 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 2 & 0 & -2 \\ 18 & 12 & 9 \\ 23 & 15 & 11 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 9 & 7 & 6 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix}.$$

(4) 由于矩阵方程两边同时左乘可逆阵, 相当对方程两边各自第一个矩阵做初等行变换. 又显见本题中,  $X$  前的方阵经初等变换“第  $i$  行乘  $(-1)$  加到第  $(i-1)$  行上去”  $(i=2, 3, \dots, n)$  后得单位方阵  $I_n$ , 所以只要将右边的方阵做同样变换即可. 用矩阵乘法写

出就是

$$X = \begin{bmatrix} 1 & -1 & & & \\ & \ddots & \ddots & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & \ddots & -1 \\ & & & & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & \cdots & \cdots & n \\ 0 & 1 & \cdots & \cdots & n-1 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \ddots & 2 \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & \cdots & \cdots & \cdots & 1 \\ 0 & \ddots & & & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

10. 求所有与下列方阵  $A$  可交换的矩阵  $B$  (即满足  $AB=BA$ ):

$$(1) A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}; \quad (2) A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix};$$

$$(3) A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}; \quad (4) A = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & 2 & \\ & & & 2 \end{bmatrix}.$$

解 (1) 设  $B = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ , 由  $AB=BA$  知  $\begin{bmatrix} c & d \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & a \\ 0 & c \end{bmatrix}$ . 所以  $c=0, a=d$ , 即

$$B = \begin{bmatrix} a & b \\ 0 & a \end{bmatrix}, \text{ 其中 } a, b \text{ 任意.}$$

(2) 设  $B = (b_{ij})$ , 则由  $AB=BA$  得:

$$\begin{bmatrix} b_{21} & b_{22} & b_{23} & b_{24} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} & b_{34} \\ b_{41} & b_{42} & b_{43} & b_{44} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ 0 & b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ 0 & b_{31} & b_{32} & b_{33} \\ 0 & b_{41} & b_{42} & b_{43} \end{bmatrix}.$$

于是有

$$b_{11} = b_{22} = b_{33} = b_{44}, b_{12} = b_{23} = b_{24}, b_{13} = b_{24}, b_{ij} = 0 (i > j),$$

所以

$$B = \begin{bmatrix} b_1 & b_2 & b_3 & b_4 \\ & b_1 & b_2 & b_3 \\ & & b_1 & b_2 \\ & & & b_1 \end{bmatrix}, \quad b_1, b_2, b_3, b_4 \in \mathbb{C}.$$

(3) 记  $A_1 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ , 于是  $A = \begin{bmatrix} A_1 & \\ & A_1 \end{bmatrix}$ , 设  $B = \begin{bmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{bmatrix}$ , 由  $AB=BA$  知有

$A_1 B_{ij} = B_{ij} A_1$ , 而  $A_1 = I + \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ , 所以由(1)知  $B_{ij}$  形如  $\begin{bmatrix} a & b \\ 0 & a \end{bmatrix}$ . 即

$$B = \begin{bmatrix} a_1 & b_1 & a_2 & b_2 \\ 0 & a_1 & 0 & a_2 \\ a_3 & b_3 & a_4 & b_4 \\ 0 & a_3 & 0 & a_4 \end{bmatrix} \quad \text{其中 } a_i, b_i \in \mathbb{C}.$$

(4) 因为  $A = \begin{bmatrix} I_2 & O \\ O & 2I_2 \end{bmatrix}$ , 设  $B = \begin{bmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{bmatrix}$ , 由  $AB = BA$  得

$$B = \begin{bmatrix} B_{11} & O \\ O & B_{22} \end{bmatrix}, \text{ 其中 } B_{11}, B_{22} \in M_2(F).$$

11. 设多项式  $f(\lambda) = a_n \lambda^n + \cdots + a_1 \lambda + a_0$ , 对任意方阵  $A$ , 定义  $f(A) = a_n A^n + \cdots + a_1 A + a_0 I$ , 对下列  $f(\lambda)$  和  $A$ , 求  $f(A)$ :

$$(1) f(\lambda) = \lambda^2 + 3\lambda + 2, \quad A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \end{bmatrix};$$

答  $f(A) = \begin{bmatrix} 12 & 11 & -5 \\ 18 & 19 & 5 \\ 3 & 8 & 21 \end{bmatrix}.$

$$(2) f(\lambda) = \lambda^7 + 8\lambda^6 + 9\lambda^5 + \lambda^3 + \lambda^2 - \lambda + 1, \quad A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix};$$

解 因为  $A^k = 0 \quad (k \geq 3)$

所以  $f(A) = A^2 - A + I = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$

$$(3) f(\lambda) = 4\lambda^3 + 2\lambda^2 - \lambda - 1, \quad A = \begin{bmatrix} c & 1 & 0 \\ 0 & c & 1 \\ 0 & 0 & c \end{bmatrix}.$$

解 记  $A = cI + N$ , 则  $N^3 = 0$ ,

$$\begin{aligned} f(A) &= 4(cI + N)^3 + 2(cI + N)^2 - (cI + N) - I \\ &= (4c^3 + 2c^2 - c - 1)I + (12c^2 + 4c - 1)N + (12c + 2)N^2 \\ &= \begin{bmatrix} f(c) & f'(c) & \frac{1}{2}f''(c) \\ 0 & f(c) & f'(c) \\ 0 & 0 & f(c) \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

12. 设  $E_{ij}$  为  $(i, j)$  位元素为 1, 而其余元素均为 0 的  $n$  阶方阵, 求所有与  $E_{ij}$  可交换的方阵  $B$ .

解 设  $B = (b_{ij})$ , 则由  $E_{ij}B = BE_{ij}$  得



$$i \text{ 行 } [a_{j1} \quad a_{j2} \quad \cdots \quad a_{jn}] = \begin{bmatrix} a_{1i} \\ a_{2i} \\ \vdots \\ a_{ni} \end{bmatrix},$$

$j \text{ 列}$

于是知

$b_{ki}=0 (k \neq i), b_{jk}=0 (k \neq j), b_{ii}=b_{jj}$ , 其余元素任意.

13. 设  $A = \begin{bmatrix} \lambda_1 I & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_s I \end{bmatrix}$ ,  $\lambda_1, \dots, \lambda_s$  互异, 求与  $A$  可交换的所有方阵  $B$ .

解 设  $B = (B_{ij})$ , 其中分块方法以使  $AB, BA$  可乘. 于是由  $AB=BA$  知有

$$\lambda_i B_{ij} = B_{ij} \lambda_j, \text{ 因为 } \lambda_i \neq \lambda_j, \text{ 所以 } B_{ij} = 0 (i \neq j),$$

所以  $B = \text{diag}(B_{11}I, B_{22}I, \dots, B_{ss}I)$ .

14. 证明: 与所有  $n$  阶方阵均可交换的方阵必为纯量方阵.

证 首先由第 12 题, 要  $AE_{ij} = E_{ij}A, i, j=1, \dots, n$ , 知

$$a_{11} = a_{22} = \cdots = a_{nn} = a,$$

所以  $A$  为纯量方阵, 而纯量方阵与一切方阵均可交换, 故得证.

15. 证明: 如果  $A$  为实对称阵, 且  $A^2=0$ , 那么  $A=0$ .

证 设  $A = (a_{ij})$ , 因为  $B = A^2 = (b_{ij})$ , 所以  $b_{ii} = \sum_{k=1}^n a_{ik}a_{ki} = \sum_{k=1}^n a_{ik}^2 = 0$ , 故  $a_{ik} = 0, k, i=1, 2, \dots, n$ .

16. 证明: 若  $A^2=I$ , 且  $A \neq I$ , 则  $A+I$  非可逆阵.

证 方法 1 由  $A^2=I \rightarrow (A+I)(A-I)=0$ , 若  $A+I$  为可逆阵, 则前式左乘  $(A+I)^{-1}$  得  $A=I$ , 与已知  $A \neq I$  矛盾.

方法 2 由  $(A-I)(A+I)=0$ , 知  $(A+I)$  的列是线性方程组  $(A-I)x=0$  的解. 又因为  $A \neq I$ , 所以  $A-I \neq 0$ , 故  $\text{rank}(A-I) \geq 1$ . 设  $A$  是  $n$  阶方阵, 则由线性方程组的理论知

$$\dim W_{(A-I)} = n - \text{rank}(A-I) \leq n-1.$$

而  $(A+I)$  的列是  $W_{(A-I)}$  的部分解,

$$\text{所以 } r_c(A+I) \leq \dim W_{(A-I)} \leq n-1.$$

故  $A+I$  非可逆阵.

17. 设  $A$  是  $n$  阶方阵,  $A^*$  为其古典伴随方阵, 试证明:

1) 当  $A$  可逆时,  $A^T$  和  $A^*$  都是可逆阵, 且

$$(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T, \quad (A^*)^{-1} = (A^{-1})^*;$$

2)  $(A^*)^T = (A^T)^*$ .

证 1) 因为  $\det A^T = \det A \neq 0, \det A^* = |(\det A)A^{-1}| \neq 0$ , 所以  $A^T$  和  $A^*$  都是可逆阵.

又因为  $(AB)^T = B^T A^T$ ,

$$(A^{-1})^T A^T = (AA^{-1})^T = I, \quad A^T (A^{-1})^T = I, \text{ 所以 } (A^T)^{-1} = (A^{-1})^T.$$

由公式

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} A^*$$

知有

$$A = \det A \cdot (A^*)^{-1} = \frac{1}{\det A^{-1}} (A^{-1})^* = \det A \cdot (A^{-1})^*,$$

故

$$(A^*)^{-1} = (A^{-1})^*.$$

$$2) (A^*)^T = (A_{ji})^T = (A_{ij}), (A^T)^* = (a_{ji})^* = (A_{ij}), \text{ 所以 } (A^*)^T = (A^T)^*.$$

18. 设  $A, B$  都是  $n$  阶对称方阵, 证明:  $AB$  也是对称方阵的充分必要条件是  $A, B$  可交换.

证 因为

$$(AB)^T = B^T A^T = BA,$$

所以

$$(AB)^T = AB \Leftrightarrow BA = AB.$$

19. 令  $R = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}$  是分块矩阵, 其中  $A$  是非奇异  $n$  阶方阵. 证明:  $R$  的秩等于  $n$  当且仅当  $D = CA^{-1}B$ .

证 由  $\begin{bmatrix} I & O \\ -CA^{-1} & I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & B \\ O & D - CA^{-1}B \end{bmatrix}$ , 则

$$r \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} = r \begin{bmatrix} A & B \\ O & D - CA^{-1}B \end{bmatrix} = r(A) \Leftrightarrow D - CA^{-1}B = 0.$$

20. 设  $A$  是秩为 1 的  $n \times m$  矩阵, 证明: 存在  $n$  维列向量  $\alpha$ , 和  $m$  维行向量  $\beta$ , 使得  $A = \alpha\beta$ .

证 因为  $r(A) = 1$ , 所以  $\exists$  可逆阵  $P = (p_{ij})$  ( $n$  阶),  $Q = (q_{ij})$  ( $m$  阶) 使

$$A = P \begin{bmatrix} I_1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} Q = P \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} (1, 0, \dots, 0) Q = \begin{bmatrix} p_{11} \\ \vdots \\ p_{n1} \end{bmatrix} (q_{11}, \dots, q_{1m}) = \alpha\beta.$$

21. 方阵  $A$  称为幂等方阵, 如果  $A^2 = A$ ; 方阵  $B$  称为对合方阵, 如果  $B^2 = I$ , 证明:  $A$  是幂等方阵的充要条件是  $B = 2A - I$  为对合方阵.

证 因为  $A^2 = A \Leftrightarrow 4A^2 - 4A + I = I \Leftrightarrow (2A - I)^2 = I \Leftrightarrow B^2 = I$ .

$$22. \text{ 设 } A = \begin{bmatrix} 0 & \cdots & 0 & a_n \\ a_1 & \ddots & & 0 \\ & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & a_{n-1} & 0 \end{bmatrix}, \quad a_i \neq 0, \quad i = 1, \dots, n, \text{ 求 } A^{-1}.$$

解 记  $A = \begin{bmatrix} 0 & a_{nn} \\ A_{n-1} & 0 \end{bmatrix}$ , 因为  $\begin{bmatrix} 0 & I_{n-1} \\ 1 & 0 \end{bmatrix} A = \begin{bmatrix} A_{n-1} & \\ & a_{nn} \end{bmatrix}$ , 两边取逆得

$$A^{-1} \begin{bmatrix} 0 & I_{n-1} \\ 1 & 0 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} A_{n-1} & \\ & a_{nn} \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} A_{n-1}^{-1} & \\ & a_{nn}^{-1} \end{bmatrix},$$

$$\text{所以 } A^{-1} = \begin{bmatrix} A_{n-1}^{-1} & \\ & a_{nn}^{-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & I_{n-1} \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & A_{n-1}^{-1} \\ a_{nn}^{-1} & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & a_1^{-1} & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & a_{n-1}^{-1} \\ a_{nn}^{-1} & & & 0 \end{bmatrix}.$$

23. 设  $\alpha = (a_1, \dots, a_n)$ ,  $0 \neq a_i \in \mathbf{R} (1 \leq i \leq n)$ ,  $A = \text{diag}\{a_1, \dots, a_n\}$ ; 试求  $\det(A - \alpha^T \alpha)$ .

$$\begin{aligned} \text{解 } \det(A - \alpha^T \alpha) &= \det[A(I_n - A^{-1} \alpha^T \alpha)] = (\det A) \det(I_n - A^{-1} \alpha^T \alpha) \\ &= (\det A) \det(I_1 - \alpha A^{-1} \alpha^T) \\ &= \left(1 - \sum_{i=1}^n a_i\right) \prod_{i=1}^n a_i. \end{aligned}$$

24. 计算行列式

$$\begin{vmatrix} 1+x_1 y_1 & x_1 y_2 & \cdots & x_1 y_n \\ x_2 y_1 & 1+x_2 y_2 & \cdots & x_2 y_n \\ \cdots & \cdots & \ddots & \cdots \\ x_n y_1 & x_n y_2 & \cdots & 1+x_n y_n \end{vmatrix}.$$

解

$$\begin{aligned} \det A &= \det \left[ I_n + \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} (y_1, \dots, y_n) \right] \\ &= 1 + (y_1, \dots, y_n) \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = 1 + \sum_{k=1}^n x_k y_k. \end{aligned}$$

25. 设  $A$  为  $n$  阶可逆阵,  $\alpha = (a_1, \dots, a_n)^T$ , 证明:

$$\det(A - \alpha \alpha^T) = (1 - \alpha^T A^{-1} \alpha) \cdot \det A.$$

证 因为

$$\begin{aligned} \det(A - \alpha \alpha^T) &= \det[A(I_n - A^{-1} \alpha \alpha^T)] = (\det A) \cdot \det(I_n - A^{-1} \alpha \alpha^T) \\ &= (1 - \alpha^T A^{-1} \alpha) \cdot \det A. \end{aligned}$$

以上 3 题都用了公式  $\det(I_n - AB) = \det(I_m - BA)$ , 其中  $A, B$  分别为  $n \times m, m \times n$  矩阵.

26. 试求第 1 题中四个方阵的相抵标准形.

$$\text{解 (1) 因为 } r(A) = r(B) = 1, \text{ 所以 } A, B \text{ 的相抵标准形均为 } \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix};$$

(2) 因为  $r(A) = r(B) = 3$ , 所以  $A, B$  均相抵于  $I_3$ .

27. 试求可逆方阵  $P, Q$  使  $PAQ$  为  $A$  的相抵标准形, 其中

$$(1) A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 3 & -6 & 9 \\ 2 & 1 & 5 \end{bmatrix}; (2) A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

$$\text{解 (1) 因为 } A \xrightarrow[-2r_1+r_3]{-3r_1+r_2} \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & -1 \end{bmatrix} \xrightarrow[-3c_1+c_3]{2c_1+c_2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & -1 \end{bmatrix} \xrightarrow[-c_3]{5c_3+c_2}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow[r_2 \leftrightarrow r_3]{c_2 \leftrightarrow c_3} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

因为对  $A$  做初等行变换可通过左乘可逆阵  $P_i$  实现, 对  $A$  做初等列变换可通过右乘可逆阵  $Q_i$  实现. 由上述初等变换过程可知:

$$P_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{bmatrix}, Q_1 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, Q_2 = \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & 5 & -1 \end{bmatrix},$$

$$P_2 = Q_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

所以  $P = P_2 P_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \\ -3 & 1 & 0 \end{bmatrix}, Q = Q_1 Q_2 Q_3 = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -13 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 5 \end{bmatrix},$

则

$$PAQ = \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 0 \end{bmatrix}.$$

(2) 因为  $A \xrightarrow{c_1 \leftrightarrow c_3} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow[-r_2+r_3]{-r_1+r_3} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$

由上知

$$Q = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 1 \end{bmatrix},$$

且有

$$PAQ = \begin{bmatrix} I_2 & O \\ O & O \end{bmatrix}.$$

28. 设  $A, B$  为同阶实方阵, 求证:

(1)  $\begin{vmatrix} A & B \\ B & A \end{vmatrix} = |A+B| |A-B|$ ; (2)  $\begin{vmatrix} A & -B \\ B & A \end{vmatrix} = |\det(A + \sqrt{-1}B)|^2$ .

解 (1)

因为  $\begin{bmatrix} I & I \\ O & I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A & B \\ B & A \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I & -I \\ O & I \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A+B & O \\ B & A-B \end{bmatrix}$

两边取行列式即得.

(2)  $\begin{bmatrix} I & iI \\ O & I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A & -B \\ B & A \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I & -iI \\ O & I \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A+iB & O \\ B & A-iB \end{bmatrix}$

两边取行列式得:

$$\det \begin{bmatrix} A & -B \\ B & A \end{bmatrix} = \det(A + iB) \cdot \det(A - iB) = |\det(A + iB)|^2.$$

最后一个等号是因为  $\det(A - iB) = \det \overline{(A + iB)} = \overline{\det(A + iB)}$ .

29. 设  $A_{n \times n} = (B_{n \times k}, C)$  为实方阵, 求证  $|A|^2 \leq |B^T B| |C^T C|$

证 把  $|A|$  按前  $k$  列展开,

$$|A| = \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n} B \begin{pmatrix} i_1 & \dots & i_k \\ 1 & \dots & k \end{pmatrix} A \begin{pmatrix} i_{k+1} & \dots & i_n \\ k+1 & \dots & n \end{pmatrix},$$

于是

$$\begin{aligned} |A|^2 &= \left( \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n} B \begin{pmatrix} i_1 & \dots & i_k \\ 1 & \dots & k \end{pmatrix} C \begin{pmatrix} i_{k+1} & \dots & i_n \\ 1 & \dots & n-k \end{pmatrix} \right)^2 \\ &\leq \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n} \left( B \begin{pmatrix} i_1 & \dots & i_k \\ 1 & \dots & k \end{pmatrix} \right)^2 \cdot \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n} \left( C \begin{pmatrix} i_{k+1} & \dots & i_n \\ 1 & \dots & n-k \end{pmatrix} \right)^2 \\ &= |B^T B| \cdot |C^T C|. \end{aligned}$$

“ $\leq$ ”成立是由于  $(\sum_{i=1}^n a_i b_i)^2 \leq (\sum_{i=1}^n a_i^2)(\sum_{i=1}^n b_i^2)$ , 即 Cauchy 不等式(其证法很多, 之一见《高等代数学》例 2.13). 最后一个等号是根据定理 2.9(即设  $A_{k \times n}, B_{n \times k}, k < n$ , 则

$$\det AB = \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n} A \begin{pmatrix} 1 & \dots & k \\ i_1 & \dots & i_k \end{pmatrix} \cdot B \begin{pmatrix} i_1 & \dots & i_k \\ 1 & \dots & k \end{pmatrix}.$$

30. 设  $B$  和  $C$  为  $n \times k$  和  $n \times (n-k)$  实矩阵, 求证:

$$\begin{vmatrix} B^T B & B^T C \\ C^T B & C^T C \end{vmatrix} \leq |B^T B| |C^T C|.$$

证 作矩阵  $A = (B \ C)$ , 则

$$\text{左边} = |A^T A| = |A|^2 = |A^2| \leq |B^T B| |C^T C|$$

最后的  $\leq$  是利用上题的结论.

31. 证明: 任一秩为  $r$  的矩阵可以表为  $r$  个秩为 1 的矩阵的和, 但不能表为少于  $r$  个这种矩阵的和.

证 设  $r(A) = r$ , 则  $\exists$  可逆阵  $P, Q$  使

$$\begin{aligned} A &= P \begin{bmatrix} I_r & O \\ O & O \end{bmatrix} Q = P \begin{bmatrix} 1 & & & \\ & 0 & & \\ & & \ddots & \\ & & & 0 \end{bmatrix} Q + P \begin{bmatrix} 0 & & & \\ & 1 & & \\ & & 0 & \\ & & & \ddots \\ & & & & 0 \end{bmatrix} Q + \dots + P \begin{bmatrix} & & & \\ & & 0 & \\ & & & 1 \\ & & & & 0 \\ & & & & & \ddots \end{bmatrix} Q \\ &= A_1 + A_2 + \dots + A_r, \quad \text{且 } r(A_i) = 1, \quad i = 1, \dots, r. \end{aligned}$$

若  $A$  可表为少于  $r$  个秩为 1 的矩阵之和, 由 20 题知每个秩为 1 的矩阵可写为  $\alpha\beta$  (其中  $\alpha$  为列阵  $\beta$  为行阵), 所以有

$$A = \alpha_1 \beta_1 + \dots + \alpha_k \beta_k = (\alpha_1, \dots, \alpha_k) \begin{bmatrix} \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_k \end{bmatrix},$$

于是  $\text{rank} A \leq k < r$  矛盾.

32. 设  $A, B$  为  $n$  阶方阵, 证明: 如果  $AB=0$ , 则  $\text{rank}(A) + \text{rank}(B) \leq n$ .

证 方法 1 设  $r(A)=r, r(B)=s$ , 则  $\exists$  可逆阵  $P, Q$  使  $PAQ = \begin{pmatrix} I_r & O \\ O & O \end{pmatrix}$ . 由已知  $AB=0$  知  $PAB=0$  进而有  $PAQQ^{-1}B=0$ , 记  $Q^{-1}B=B_1$ , 显然  $r(B_1)=r(B)$ , 于是有

$$\begin{bmatrix} I_r & O \\ O & O \end{bmatrix} B_1 = 0,$$

所以  $B_1$  的前  $r$  行均为 0, 则  $r(B_1)=s \leq n-r$ , 即

$$r(A) + r(B) \leq n.$$

证 方法 2 记  $B=(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n)$ , 由

$$AB = (A\beta_1, A\beta_2, \dots, A\beta_n) = 0,$$

知  $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$  是方程组  $Ax=0$  的解. 因为  $\dim(W_A)=n-r(A)$ ,

所以  $r(B)=\text{秩}(\beta_1, \dots, \beta_n) \leq \dim W_A = n-r(A)$ .

33. 设  $A$  是  $n$  阶方阵 ( $n \geq 2$ ),  $A^*$  为其古典伴随方阵, 证明:

$$\text{rank}(A^*) = \begin{cases} n, & \text{当 } r(A) = n; \\ 1, & \text{当 } r(A) = n-1; \\ 0, & \text{当 } r(A) < n-1. \end{cases}$$

证 (1) 当  $\text{rank} A = n$ , 有  $\det A \neq 0$ , 由  $AA^* = (\det A)I$  知  $\det A^* = (\det A)^{n-1} \neq 0$ , 所以  $r(A^*) = n$ .

(2) 因为当  $r(A)=n-1$  时,  $\det A=0$ , 从而  $AA^*=0$  由 32 题知有  $r(A)+r(A^*) \leq n$ , 所以  $r(A^*) \leq 1$ , 又因为  $r(A)=n-1$ , 所以  $A^*$  中至少有一个  $A_{ij} \neq 0$ , 所以  $r(A^*)=1$ .

(3) 因为  $r(A) < n-1$ , 所以  $A$  的所有  $n-1$  阶子式全为 0, 故  $A_{ij}=0, A^*=(A_{ji})=0, r(A^*)=0$ .

34. 证明: (1)  $\text{rank}(AB) \leq \min(\text{rank} A, \text{rank} B)$ ;

(2)  $\text{rank}(A, B) \leq \text{rank} A + \text{rank} B$ ;

(3)  $\text{rank}(A+B) \leq \text{rank} A + \text{rank} B$ .

证 (1) 设  $A_{m \times l}, B_{l \times n}, r(A)=r, r(B)=s$ . 因为  $r(A)=r$ , 所以存在可逆阵  $P, Q$  使得

$$PAQ = \begin{bmatrix} I_r & O \\ O & O \end{bmatrix},$$

于是

$$r(AB) = r(PAB) = r(PAQQ^{-1}B) = \text{rank} \begin{bmatrix} I_r & O \\ O & O \end{bmatrix} B_1,$$

其中

$$B_1 = Q^{-1}B = (b'_{ij}),$$

$$\text{所以 } r(AB) = \text{rank} \begin{bmatrix} I_r & O \\ O & O \end{bmatrix} (b'_{ij}) = \text{rank} \begin{bmatrix} b'_{11} & \cdots & \cdots & b'_{1n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ b'_{r1} & \cdots & \cdots & b'_{rn} \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 \end{bmatrix}_{m \times n} \quad \bullet (*)$$

显然最右边一个矩阵的秩不超过它的非 0 行数(=r), 也不超过  $B_1$  的秩(=s),

所以  $r(AB) \leq \min(r(A), r(B))$ .

注 从(\*)式也很容易得出最后一个矩阵的秩  $\geq r+s-l$ . (因为  $r(B_1)=r(B)$ ,  $B_1$  的行向量中有  $s$  个线性无关, 而其余行均可由它们线性表出. 假设这  $s$  个向量位于  $B_1$  的后  $s$  行, 则前  $r$  行中至少仍有  $s-(l-r)$  个线性无关) 由此得出

$$r(AB) \geq r(A) + r(B) - s.$$

(2) 设  $A_1, A_2, \dots, A_r$  为  $A$  的列向量的极大线性无关组,  $B_1, B_2, \dots, B_s$  为  $B$  的列向量的极大线性无关组. 则  $(A, B)$  的列向量均可由  $\{A_1, \dots, A_r, B_1, \dots, B_s\}$  线性表出,

所以  $\text{rank}(A, B) \leq \text{秩}\{A_1, \dots, A_r, B_1, \dots, B_s\}$ .

而  $A_1, \dots, A_r, B_1, \dots, B_s$  中线性无关的向量一定不超过  $r+s$  个. 所以

$$\text{rank}(A, B) \leq r(A) + r(B).$$

注 因为  $A$  的列均可由  $(A, B)$  的列线性表出,  $B$  的列均可由  $(A, B)$  的列线性表出, 所以  $r(A) \leq r(A, B)$ ,  $r(B) \leq r(A, B)$ . 于是有  $\max(r(A), r(B)) \leq \text{rank}(A, B)$ .

(3) 方法 1 设  $A, B$  均为  $m \times n$  矩阵, 则

$$\begin{aligned} \text{rank}(A+B) &= \text{rank}(AI+BI) = \text{rank}\left((A, B) \begin{pmatrix} I \\ I \end{pmatrix}\right) \leq \min(r(A, B), n) \leq \text{rank}(A, B) \\ &\leq r(A) + r(B). \end{aligned}$$

方法 2 因为  $A+B$  的列均可由  $(A, B)$  的列线性表出, 所以  $r(A+B) \leq r(A, B) \leq r(A) + r(B)$ .

**35.** 设  $A$  是  $n$  阶方阵, 证明:

(1) 如果  $A^2=I$ , 则  $\text{rank}(A+I) + \text{rank}(A-I) = n$ ;

(2) 如果  $A^2=A$ , 则  $\text{rank}(A) + \text{rank}(A-I) = n$ .

证 (1) 由  $A^2=I$  知  $A^2-I=(A+I)(A-I)=0$ , 由 32 题得

$$r(A+I) + r(A-I) \leq n$$

又由 34 题(3)知  $r(A+I) + r(A-I) \geq r(A+I+A-I) = r(A) = n$ , (因为  $\det A \neq 0$ ) 所以有

$$r(A+I) + r(A-I) = n.$$

(2) 因为  $A^2=A$ , 所以  $0=A^2-A=A(A-I)$ , 故  $r(A) + r(A-I) \leq n$ , 又  $r(A-I) = r(I-A)$ , 所以  $r(A) + r(A-I) \geq r(A+I-A) = r(I) = n$ ,

于是  $r(A) + r(A-I) = n$ .

**36.** 设  $A$  是  $n$  阶方阵, 且  $r(A)=r$ , 证明: 存在  $n$  阶可逆矩阵  $P$  使  $PAP^{-1}$  的后  $n-r$  行全为零.

证 因为  $r(A)=r$ , 所以  $\exists$  可逆阵  $P, Q$  使得

$$PAQ = \begin{bmatrix} I_r & O \\ O & O \end{bmatrix}, \quad \text{设 } Q^{-1}P^{-1} = \begin{bmatrix} C_1 & C_2 \\ C_3 & C_4 \end{bmatrix},$$

则有

$$PAP^{-1} = PAQQ^{-1}P^{-1} = \begin{bmatrix} I_r & O \\ O & O \end{bmatrix} \begin{bmatrix} C_1 & C_2 \\ C_3 & C_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C_1 & C_2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \} r \text{ 行}.$$

37. 求下列矩阵  $A$  的广义逆  $A^-$  和  $A^+$ :

$$(1) \text{ 因为 } (a, b, c) = (1, 0, 0) \begin{bmatrix} a & b & c \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = (1, 0, 0)Q,$$

$$\text{所以 } (a, b, c)^- = Q^{-1} \begin{bmatrix} 1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{a} & -\frac{b}{a} & -\frac{c}{a} \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{a} - \frac{b}{a}y_2 - \frac{c}{a}y_3 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix};$$

其中  $y_2, y_3$  任取. 又因为

$$(a, b, c) = 1 \cdot (a, b, c) = CR,$$

所以

$$\begin{aligned} (a, b, c)^+ &= \bar{R}^T (R\bar{R}^T)^{-1} (\bar{C}^T C)^{-1} \bar{C}^T \\ &= \begin{bmatrix} \bar{a} \\ \bar{b} \\ \bar{c} \end{bmatrix} \frac{1}{|a|^2 + |b|^2 + |c|^2} \cdot 1 \\ &= \frac{1}{|a|^2 + |b|^2 + |c|^2} \begin{bmatrix} \bar{a} \\ \bar{b} \\ \bar{c} \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

$$(2) \text{ 因为 } \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & 0 & 0 \\ b & 1 & 0 \\ c & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = P \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix},$$

$$\begin{aligned} \text{所以 } \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}^- &= (1, y_2, y_3)P^{-1} = (1, y_2, y_3) \begin{bmatrix} \frac{1}{a} & 0 & 0 \\ -\frac{b}{a} & 1 & 0 \\ -\frac{c}{a} & 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \left( \frac{1}{a} - \frac{b}{a}y_2 - \frac{c}{a}y_3, y_2, y_3 \right); \end{aligned}$$

其中  $y_2, y_3$  任取.

又

$$\begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} \cdot 1 = CR,$$



所以 
$$\begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}^+ = 1 \cdot (\bar{C}^T C)^{-1} \bar{C}^T = \left[ (\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}) \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} \right]^{-1} (\bar{a}, \bar{b}, \bar{c})$$
  

$$= \frac{1}{|a|^2 + |b|^2 + |c|^2} (\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}).$$

(3) 因为 
$$\begin{bmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_2 & O \\ O & O \end{bmatrix} Q,$$

所以 
$$A^- = Q^{-1} \begin{bmatrix} I_2 & Y_2 \\ Y_3 & Y_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{a} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{b} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_2 & Y_2 \\ Y_3 & Y_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{a} & 0 & \frac{1}{a} y_{12} \\ 0 & \frac{1}{b} & \frac{1}{b} y_{22} \\ y_{31} & y_{32} & y_{33} \end{bmatrix};$$

其中  $y_{12}, y_{22}, y_{31}, y_{32}, y_{33}$  任取. 又

因为 
$$A = \begin{bmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & b \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} = CR,$$

所以 
$$A^+ = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} |a|^2 & 0 \\ 0 & |b|^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{a} & 0 & 0 \\ 0 & \bar{b} & 0 \end{bmatrix}$$
  

$$= \begin{bmatrix} |a|^2 \bar{a} & 0 & 0 \\ 0 & |b|^2 \bar{b} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

(4) 因为 
$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ 2a & 2b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = P \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} Q,$$

所以 
$$A^- = Q^{-1} \begin{bmatrix} 1 & y_2 \\ y_3 & y_4 \end{bmatrix} P^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{a} & -\frac{b}{a} \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & y_2 \\ y_3 & y_4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$$
  

$$= \begin{bmatrix} \frac{1}{a} - \frac{2}{a} y_2 - \frac{b}{a} y_3 + \frac{2b}{a} y_4 & \frac{y_2}{a} - \frac{b}{a} y_4 \\ y_3 - 2y_4 & y_4 \end{bmatrix},$$

其中  $y_2, y_3, y_4$  任取.

又因为 
$$A = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} (a, b) = CR,$$

所以 
$$A^+ = \begin{bmatrix} \bar{a} \\ \bar{b} \end{bmatrix} (|a|^2 + |b|^2)^{-1} \left[ (1, 2) \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \right]^{-1} (1, 2)$$
  

$$= \frac{1}{5(|a|^2 + |b|^2)} \begin{bmatrix} \bar{a} & 2\bar{a} \\ \bar{b} & 2\bar{b} \end{bmatrix}.$$

$$\begin{aligned}
 (5) \quad \begin{bmatrix} a & b & c \\ e & f & g \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -\frac{e}{a} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{a}, & -\frac{b}{af-eb}, & \frac{b(ag-ec)}{(af-eb)a} - \frac{c}{a} \\ 0 & \frac{a}{af-eb}, & -\frac{ag-ec}{af-eb} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \\
 &= P \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} Q,
 \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned}
 A^{-} &= Q^{-1} \begin{bmatrix} I_2 & Y_2 \\ Y_3 & Y_4 \end{bmatrix} P^{-1} = Q^{-1} \begin{bmatrix} 1 & 0 & y_{13} \\ 0 & 1 & y_{23} \\ y_{31} & y_{32} & y_{33} \end{bmatrix} P^{-1} \\
 &= \frac{1}{af-eb}
 \end{aligned}$$

$$\begin{bmatrix} f+(bg-cf)\left(y_{31}-\frac{e}{a}y_{32}\right), & y_{33}(bg-cf)-b, & \left(f-\frac{eb}{a}\right)y_{13}-by_{23}+(bg-cf)y_{33} \\ -e-(ag-ec)\left(y_{31}-\frac{e}{a}y_{32}\right), & a-y_{32}(ag-ec), & ay_{23}-(ag-ec)y_{33} \\ (af-eb)\left(y_{31}-\frac{e}{a}y_{32}\right), & y_{32}(af-eb), & y_{33}(af-eb) \end{bmatrix}.$$

又

因为

$$A = \begin{bmatrix} a & b & c \\ e & f & g \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b & c \\ e & f & g \end{bmatrix} = CR,$$

所以

$$A^{+} = \begin{bmatrix} \bar{a} & \bar{e} \\ \bar{b} & \bar{f} \\ \bar{c} & \bar{g} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} |a|^2+|b|^2+|c|^2, & a\bar{e}+b\bar{f}+c\bar{g} \\ e\bar{a}+f\bar{b}+g\bar{c}, & |e|^2+|f|^2+|g|^2 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} = \frac{1}{d} \begin{bmatrix} \bar{a}(|f|^2+|g|^2)-\bar{e}(f\bar{b}+g\bar{c}), & \bar{e}(|b|^2+|c|^2)-\bar{a}(b\bar{f}+c\bar{g}), & 0 \\ \bar{b}(|e|^2+|g|^2)-\bar{f}(e\bar{a}+g\bar{c}), & \bar{f}(|a|^2+|c|^2)-\bar{b}(a\bar{e}+c\bar{g}), & 0 \\ \bar{c}(|e|^2+|f|^2)-\bar{g}(e\bar{a}+f\bar{b}), & \bar{g}(|a|^2+|b|^2)-\bar{c}(a\bar{e}+b\bar{f}), & 0 \end{bmatrix},$$

其中  $d = (|a|^2+|b|^2+|c|^2)(|e|^2+|f|^2+|g|^2) - (a\bar{e}+b\bar{f}+c\bar{g})(e\bar{a}+f\bar{b}+g\bar{c})$ .

$$\begin{aligned}
 (6) \quad \begin{bmatrix} a & e & 0 \\ b & f & 0 \\ c & g & 0 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} \frac{1}{a}, & 0, & 0 \\ -\frac{b}{af-eb}, & \frac{a}{af-eb}, & 0 \\ \frac{bg-fc}{af-eb}, & \frac{ec-ag}{af-eb}, & 1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -\frac{e}{a} & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \\
 &= P \begin{bmatrix} I_2 & O \\ O & 0 \end{bmatrix} Q,
 \end{aligned}$$

所以

$$A^{-} = Q^{-1} \begin{bmatrix} 1 & 0 & y_{13} \\ 0 & 1 & y_{23} \\ y_{31} & y_{32} & y_{33} \end{bmatrix} P^{-1}$$

$$= \frac{1}{af - eb}$$

$$\begin{bmatrix} f + (bg - fc)(y_{13} - \frac{e}{a}y_{23}), & -e + (ec - ag)(y_{13} - \frac{e}{a}y_{23}), & (af - eb)(y_{13} - \frac{e}{a}y_{23}) \\ (bg - fc)y_{23} - b, & a - (ec - ag)y_{23}, & (af - eb)y_{23} \\ (f - \frac{eb}{a})y_{31} - by_{32} + (bg - cf)y_{33}, & ay_{32} + (ec - ag)y_{33}, & (af - eb)y_{33} \end{bmatrix}.$$

又因为

$$A = \begin{bmatrix} a & e & 0 \\ b & f & 0 \\ c & g & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & e \\ b & f \\ c & g \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} = CR,$$

所以

$$A^+ = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1}$$

$$= \frac{1}{d} \begin{bmatrix} |a|^2 + |b|^2 + |c|^2 & \bar{a}e + \bar{b}f + \bar{c}g \\ \bar{e}a + \bar{f}b + \bar{g}c & |e|^2 + |f|^2 + |g|^2 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} \bar{a} & \bar{b} & \bar{c} \\ \bar{e} & \bar{f} & \bar{g} \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{d} \begin{bmatrix} \bar{a}(|f|^2 + |g|^2) - \bar{e}(f\bar{b} + g\bar{c}), & \bar{b}(|e|^2 + |g|^2) - \bar{f}(e\bar{a} + g\bar{c}), & \bar{c}(|e|^2 + |f|^2) - \bar{g}(e\bar{a} + f\bar{b}) \\ \bar{e}(|b|^2 + |c|^2) - \bar{a}(b\bar{f} + c\bar{g}), & \bar{f}(|a|^2 + |c|^2) - \bar{b}(a\bar{e} + c\bar{g}), & \bar{g}(|a|^2 + |b|^2) - \bar{c}(a\bar{e} + b\bar{f}) \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

其中  $d$  同(5)中表达式.

(7) 因为  $A = \begin{bmatrix} a & b & c \\ 2a & 2b & 2c \\ 3a & 3b & 3c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b & c \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = P \begin{bmatrix} I_1 & O \\ O & O \end{bmatrix} Q,$

所以  $A^- = Q^{-1} \begin{bmatrix} I_1 & Y_2 \\ Y_3 & Y_4 \end{bmatrix} P^{-1}$

$$= \begin{bmatrix} \frac{1}{a} & -\frac{b}{a} & -\frac{c}{a} \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & y_{12} & y_{13} \\ y_{21} & y_{22} & y_{23} \\ y_{31} & y_{32} & y_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ -3 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \frac{1}{a}(1 - by_{21} - cy_{31}) - 2u - 3v & u & v \\ y_{21} - 2y_{22} - 3y_{23} & y_{22} & y_{23} \\ y_{31} - 2y_{32} - 3y_{33} & y_{32} & y_{33} \end{bmatrix}$$

其中  $y_{ij}$  任取,  $u = \frac{1}{a}(y_{12} - by_{22} - cy_{32})$ ,  $v = \frac{1}{a}(y_{13} - by_{23} - cy_{33})$ . 又

因为

$$A = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} (a, b, c) = CR,$$

$$\text{所以 } A^+ = \begin{bmatrix} \bar{a} \\ \bar{b} \\ \bar{c} \end{bmatrix} (|a|^2 + |b|^2 + |c|^2)^{-1} \begin{bmatrix} (1,2,3) \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} \end{bmatrix}^{-1} (1,2,3) \\ = \frac{1}{14(|a|^2 + |b|^2 + |c|^2)} \begin{bmatrix} \bar{a} & 2\bar{a} & 3\bar{a} \\ \bar{b} & 2\bar{b} & 3\bar{b} \\ \bar{c} & 2\bar{c} & 3\bar{c} \end{bmatrix}.$$

$$(8) \text{ 因为 } A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} O & I_{n-1} \\ O & O \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_{n-1} & O \\ O & O \end{bmatrix} \begin{bmatrix} O & I_{n-1} \\ 1 & O \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_{n-1} & O \\ O & O \end{bmatrix} Q,$$

$$\text{所以 } A^- = \begin{bmatrix} O & I_{n-1} \\ 1 & O \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} I_{n-1} & Y_2 \\ Y_3 & y_{nn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} O & 1 \\ I_{n-1} & O \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_{n-1} & Y_2 \\ Y_3 & y_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y_3 & y_{nn} \\ I_{n-1} & Y_2 \end{bmatrix},$$

其中  $Y_2, Y_3, y_{nn}$  任意. 又

$$\text{因为 } A = \begin{bmatrix} I_{n-1} \\ O \end{bmatrix} (O \quad I_{n-1}) = CR,$$

$$\text{所以 } A^+ = \begin{bmatrix} O \\ I_{n-1} \end{bmatrix} \cdot I_{n-1}^{-1} \cdot I_{n-1}^{-1} \cdot (I_{n-1} \quad O) = \begin{bmatrix} O & 0 \\ I_{n-1} & O \end{bmatrix}.$$

$$(9) A = \begin{bmatrix} 0 & \cdots & 0 & 1 \\ \vdots & \ddots & & 0 \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} O & 1 \\ O_{n-1} & O \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_1 & O \\ O & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} O & I_{n-1} \\ 1 & O \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} I_1 & O \\ O & 0 \end{bmatrix} Q$$

$$\text{所以 } A^- = \begin{bmatrix} O & I_{n-1} \\ 1 & O \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & Y_2 \\ Y_3 & Y_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y_3 & Y_4 \\ 1 & Y_2 \end{bmatrix}, Y_2, Y_3, Y_4 \text{ 任取.}$$

又因为

$$A = \begin{bmatrix} O & 1 \\ O_{n-1} & O \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} (0, \cdots, 0, 1) = CR,$$

$$\text{所以 } A^+ = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \cdot 1 \cdot 1 \cdot (1, 0, \cdots, 0) = \begin{bmatrix} O & O_{n-1} \\ 1 & O \end{bmatrix}.$$

#### 4.4 补充题与解答

1. 交换  $n$  阶单位方阵  $I$  的两行得到的方阵称为对换方阵, 对换方阵的乘积称为置换矩阵. 试证明对于任意  $n$  阶可逆阵  $A$ , 存在置换矩阵  $P$ , 使得  $PA=LU$ , 其中  $L$  是对角元都

是 1 的下三角阵,  $U$  是上三角阵.

证 因为  $A$  可逆, 所以  $A$  的第一列中必至少有一个元素非零, 设为  $a_{i1}$ , 则通过做第一行与第  $i$  行的对换可以使  $(1,1)$  位非零, 然后把第一列中  $(1,1)$  位以下的元素打成 0. 这可以通过左乘第一, 三种初等方阵实现. 即  $\exists P_{1i}, Q_1$  使

$$Q_1 P_{1i} A = \begin{bmatrix} a'_{11} & \beta \\ O & A_{n-1} \end{bmatrix}, \quad \text{其中 } Q_1 = \begin{bmatrix} 1 & O \\ \alpha & I_{n-1} \end{bmatrix}$$

因为  $A_{n-1}$  是  $n-1$  阶方阵, 由归纳假设命题对  $A_{n-1}$  成立, 记  $P_{n-1} A_{n-1} = L_{n-1} U_{n-1}$ , 其中  $P_{n-1}, L_{n-1}, U_{n-1}$  满足题设要求, 于是有

$$\begin{bmatrix} 1 & \\ & P_{n-1} \end{bmatrix} Q_1 P_{1i} A = \begin{bmatrix} a'_{11} & \beta \\ O & P_{n-1} A_{n-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a'_{11} & \beta \\ O & L_{n-1} U_{n-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \\ & L_{n-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a'_{11} & \beta \\ O & U_{n-1} \end{bmatrix}$$

因为  $L_{n-1}$  是下三角阵(对角元均为 1),  $U_{n-1}$  是上三角阵, 所以上式右边已满足题目要求, 再看左边, 两个置换方阵(因为  $P_{n-1}$  是置换阵, 所以最左边一个也是置换阵)中间是  $Q_1$ , 它是一个对角线元都是 1 的下三角阵, 若能把它换到最左边后在矩阵等式两边乘其逆即可得证, 但  $Q_1$  与其左边的矩阵乘法不可交换, 所以不能直接换位, 但我们有

$$\begin{bmatrix} 1 & O \\ O & P_{n-1} \end{bmatrix} Q_1 = \begin{bmatrix} 1 & O \\ P_{n-1}\alpha & P_{n-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & O \\ P_{n-1}\alpha & I_{n-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & O \\ O & P_{n-1} \end{bmatrix},$$

于是得

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} 1 & O \\ O & P_{n-1} \end{bmatrix} P_{1i} A &= \begin{bmatrix} 1 & O \\ P_{n-1}\alpha & I_{n-1} \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} a'_{11} & \beta \\ O & L_{n-1} U_{n-1} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1 & O \\ -P_{n-1}\alpha & I_{n-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & \\ & L_{n-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a'_{11} & \beta \\ O & U_{n-1} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1 & O \\ -P_{n-1}\alpha & L_{n-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a'_{11} & \beta \\ O & U_{n-1} \end{bmatrix} = LU, \end{aligned}$$

令  $P = \begin{bmatrix} 1 & O \\ O & P_{n-1} \end{bmatrix} P_{1i}$ , 则  $P$  为置换阵, 且有

$$PA = LU.$$

讲评 此题曾是清华大学一年级学生的期末考试题. 乍看有点难, 但其中的教学思想其实很简单: 因为  $A$  是可逆阵, 所以  $A$  可仅用第一, 三种初等行变换化为上三角阵. 即存在  $P_{1i_1}, \dots, P_{s i_s}, Q_1, \dots, Q_s$  使

$$Q_s P_{s i_s} \cdots Q_2 P_{2 i_2} Q_1 P_{1 i_1} A = U,$$

其中  $P_{1 i_1}, \dots, P_{s i_s}$  为对换方阵,  $Q_1, \dots, Q_s$  均为对角线元素为 1 的下三角阵. 剩下的问题是怎样把  $P_{1 i_1}, \dots, P_{s i_s}$  移到一起(同时  $Q_1, \dots, Q_s$  也连到了一起), 这是关键的一步, 我们以  $P_{2 i_2} Q_1$  为例, 说明如何把  $P_{2 i_2}$  换到右边. 因为显然  $P_{2 i_2} Q_1 \neq Q_1 P_{2 i_2}$ , 所以不能直接做乘法交换, 但我们有  $P_{2 i_2} Q_1 = Q_1^{(1)} P_{2 i_2}$ , 其中  $Q_1^{(1)} \neq Q_1$ , 其仍是对角线元为 1 的下三角阵. 事实上, 记

$$Q_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ \lambda_2 & 1 & \ddots & & \vdots \\ \vdots & 0 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ \lambda_n & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

则

$$P_{2i_2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ \lambda_2 & 1 & \ddots & & \vdots \\ \vdots & 0 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ \lambda_n & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & & & & \\ \lambda_{i_2} & \ddots & & & \\ \vdots & & \ddots & & \\ \lambda_2 & & & \ddots & \\ \vdots & & & & \ddots \\ \lambda_n & & & & & 1 \end{bmatrix} P_{2i_2} = Q_1^{(1)} P_{2i_2},$$

这样就把  $P_{2i_2} P_{1i_1}$  连到一起, 接下来  $Q_1^{(1)}$  还要与  $P_{3i_3}, \dots, P_{si_s}$  换, 我们把换  $s-1$  次后的矩阵记为  $Q^{(s-1)}$ , 于是得

$$Q_1 Q_1^{(1)} \cdots Q_2^{(s-2)} Q_1^{(s-1)} P_{si_s} \cdots P_{2i_2} P_{1i_1} A = U,$$

记  $P = P_{si_s} \cdots P_{1i_1}$  (则  $P$  为置换矩阵),  $L^{-1} = Q_1 \cdots Q_2^{(s-2)} Q_1^{(s-1)}$ , (则  $L^{-1}$  为对角线元素为 1 的下三角阵), 由  $L^{-1} PA = U$ ,  $\rightarrow PA = LU$ .

2. 设  $A$  为  $n$  阶方阵, 试证若有  $r(A) + r(A - I) = n$ , 则  $A$  必为幂等方阵 (即满足  $A^2 = A$ ).

$$\begin{aligned} \text{证} \quad \text{因为 } n = r(A) + r(A - I) &= r \begin{bmatrix} A & O \\ O & A - I \end{bmatrix} = r \begin{bmatrix} A & O \\ A & -A + I \end{bmatrix} \\ &= r \begin{bmatrix} A & A \\ A & I \end{bmatrix} = r \begin{bmatrix} A - A^2 & O \\ A & I \end{bmatrix} = r \begin{bmatrix} A - A^2 & O \\ O & I \end{bmatrix} = r(A - A^2) + r(I), \end{aligned}$$

所以  $r(A - A^2) = 0$ , 故  $A^2 = A$ .

上面恒等变形中第 3, 4, 5, 6 个等号分别做了以下矩阵运算: 左乘可逆阵  $\begin{bmatrix} I_n & O \\ I & -I_n \end{bmatrix}$ ; 右乘

可逆阵  $\begin{bmatrix} I_n & I \\ O & I_n \end{bmatrix}$ ; 左乘可逆阵  $\begin{bmatrix} I_n & -A \\ O & I_n \end{bmatrix}$ , 右乘可逆阵  $\begin{bmatrix} I_n & O \\ -A & I_n \end{bmatrix}$ .

3. 设  $n$  阶方阵  $A$  满足  $r(A + I) + r(A - I) = n$ , 则  $A$  必为对合方阵 (即有  $A^2 = I$ ).

$$\begin{aligned} \text{证} \quad \text{因 } n = r(A + I) + r(A - I) &= r \begin{bmatrix} A + I & O \\ O & A - I \end{bmatrix} = r \begin{bmatrix} A + I & O \\ A + I & I - A \end{bmatrix} \\ &= r \begin{bmatrix} A + I & A + I \\ A + I & 2I \end{bmatrix} = r \begin{bmatrix} \frac{1}{2}(I - A^2) & O \\ A + I & 2I \end{bmatrix} = r \begin{bmatrix} \frac{1}{2}(I - A^2) & O \\ O & 2I \end{bmatrix} \\ &= r(I - A^2) + r(I), \end{aligned}$$

又

$$r(I) = n,$$

所以

$$r(I - A^2) = 0, \rightarrow A^2 = I.$$

4. 试证: 对任意秩为  $r$  的矩阵  $A$  均有分解式  $A = CR$ , 其中  $C, R$  分别为列, 行独立阵,

且  $r(C)=r(R)=r(A)$ .

证 由定理 4 系 2 知存在可逆方阵  $P, Q$  使

$$A = P \begin{bmatrix} I_r & O \\ O & O \end{bmatrix} Q = P \begin{bmatrix} I_r \\ O \end{bmatrix} (I_r, O) Q = C R,$$

其中  $C = P \begin{bmatrix} I_r \\ O \end{bmatrix}$ ,  $R = (I_r, O) Q$  分别为可逆方阵  $P$  的前  $r$  列,  $Q$  的前  $r$  行, 所以它们分别为列, 行独立阵, (因为可逆阵的列、行均线性无关) 又显然有  $r(C)=r$ ,  $r(R)=r$ .

5. 设矩阵  $C_{m \times n}$  为列独立阵, 试证存在可逆阵  $P$  使得  $C = P \begin{bmatrix} I_n \\ O \end{bmatrix}$ .

证 因为  $r(C)=n$ , 所以  $\exists$  可逆阵  $P_1$  ( $m$  阶),  $Q_1$  ( $n$  阶) 使

$$C = P_1 \begin{bmatrix} I_n \\ O \end{bmatrix} Q_1 = P_1 \begin{bmatrix} Q_1 \\ O \end{bmatrix} = P_1 \begin{bmatrix} Q_1 & \\ & I_{m-n} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_n \\ O \end{bmatrix} = P \begin{bmatrix} I_n \\ O \end{bmatrix},$$

其中  $P = P_1 \begin{bmatrix} Q_1 & \\ & I_{m-n} \end{bmatrix}$  为可逆阵.

6. (Frobenius 不等式) 设  $A, B, C$  分别为  $m \times n, n \times p, p \times q$  矩阵, 则

$$r(AB) + r(BC) \leq r(ABC) + r(B).$$

证 因为  $\begin{bmatrix} I & -A \\ O & I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} AB & O \\ B & BC \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I & -C \\ O & I \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} O & -ABC \\ B & O \end{bmatrix}$ ,

$$\begin{aligned} \text{所以 } r(AB) + r(BC) &= r \begin{bmatrix} AB & O \\ O & BC \end{bmatrix} \leq r \begin{bmatrix} AB & O \\ B & BC \end{bmatrix} = r \begin{bmatrix} O & -ABC \\ B & O \end{bmatrix} \\ &= r(ABC) + r(B). \end{aligned}$$

其中“ $\leq$ ”是由于  $r(AB) \leq r(B)$ ,  $r(BC) \leq r(B)$ , 所以  $B$  可以既不能用  $AB$  也不能用  $BC$  线性表出.

7. 设  $A$  为  $n$  阶方阵, 且  $r(A)=r(A^2)$ , 试证: 对任自然数  $k$ , 有  $r(A^k)=r(A)$ .

证 方法 1 因为  $r(A^2)+r(A^2)=r \begin{bmatrix} A^2 & O \\ O & A^2 \end{bmatrix} \leq r \begin{bmatrix} A^2 & O \\ A & A^2 \end{bmatrix} = r \begin{bmatrix} A^2 & -A^3 \\ A & O \end{bmatrix}$   
 $= r \begin{bmatrix} O & -A^3 \\ A & O \end{bmatrix} = r(A) + r(A^3).$

又由已知  $r(A)=r(A^2)$ , 所以有  $r(A^2) \leq r(A^3)$ ; 另外显然有  $r(A^3)=r(A^2 \cdot A) \leq r(A^2)$ , 于是得

$$r(A^2) = r(A^3).$$

由此式可推得  $r(A^3)=r(A^4), \dots$ , 所以有  $r(A^k)=r(A)$ .

方法 2 设

$$\begin{aligned} \varphi_A: F^{(n)} &\rightarrow F^{(n)}, \\ x &\mapsto Ax, \end{aligned}$$

则  $r(A) = \dim(I_m A)$ , 又  $r(A^2) = r(A) = \dim(I_m A)$ , 所以  $\varphi_A$  在  $I_m A$  上是满射, 即  $\varphi_A(I_m A) = I_m A$ , 于是知  $r(A^3) = \dim(I_m A) = r(A)$ , 同理得  $r(A^k) = r(A)$ .

8. 设  $A$  为对合方阵(即  $A^2 = I$ ), 则存在可逆阵  $P$ , 使  $P^{-1}AP = \begin{bmatrix} I_r & O \\ O & -I_s \end{bmatrix}$ .

证 令  $B = A + I$ , 由相抵标准形知存在可逆阵  $P_1, Q_1$ , 使

$$B = P_1 \begin{bmatrix} I_r & O \\ O & O \end{bmatrix} Q_1,$$

由  $B^2 = A^2 + 2A + I = 2B$  可知

$$P_1 \begin{bmatrix} I_r & O \\ O & O \end{bmatrix} Q_1 P_1 \begin{bmatrix} I_r & O \\ O & O \end{bmatrix} Q_1 = 2P_1 \begin{bmatrix} I_r & O \\ O & O \end{bmatrix} Q_1$$

记

$$Q_1 P_1 = R = \begin{bmatrix} R_1 & R_2 \\ R_3 & R_4 \end{bmatrix},$$

则由

$$\begin{bmatrix} I_r & O \\ O & O \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R_1 & R_2 \\ R_3 & R_4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_r & O \\ O & O \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2I_r & O \\ O & O \end{bmatrix},$$

所以  $R_1 = 2I_r$ . 注意  $Q_1 = RP_1^{-1}$ ,

于是得  $B = P_1 \begin{bmatrix} I_r & O \\ O & O \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2I_r & R_2 \\ R_3 & R_4 \end{bmatrix} P_1^{-1} = P_1 \begin{bmatrix} 2I_r & R_2 \\ O & O \end{bmatrix} P_1^{-1}$ .

再令  $S = \begin{bmatrix} I_r & -\frac{1}{2}R_2 \\ O & I \end{bmatrix}$ , 则由

$$S^{-1}P_1^{-1}BP_1S = \begin{bmatrix} 2I_r & O \\ O & O \end{bmatrix},$$

记  $P = P_1S$ ,

即得

$$P^{-1}AP = \begin{bmatrix} I_r & O \\ O & -I_s \end{bmatrix}.$$

9. 设  $A$  为二次幂零方阵(即  $A^2 = 0$ ), 则存在可逆阵  $P$ , 使  $P^{-1}AP = \begin{bmatrix} O & I_r & O \\ O & O & O \end{bmatrix}$ .

证 设  $r(A) = r$ , 由相抵标准形知存在可逆阵  $P_1, Q_1$ , 使

$$A = P_1 \begin{bmatrix} I_r & O \\ O & O \end{bmatrix} Q_1,$$

因为

$$A^2 = P_1 \begin{bmatrix} I_r & O \\ O & O \end{bmatrix} Q_1 P_1 \begin{bmatrix} I_r & O \\ O & O \end{bmatrix} Q_1 = 0,$$

记

$$Q_1 P_1 = R = \begin{bmatrix} R_1 & R_2 \\ R_3 & R_4 \end{bmatrix},$$

知有



$$\begin{bmatrix} I_r & O \\ O & O \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R_1 & R_2 \\ R_3 & R_4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_r & O \\ O & O \end{bmatrix} = 0, \rightarrow R_1 = 0.$$

又

$$Q_1 = RP_1^{-1},$$

所以

$$\begin{aligned} A &= P_1 \begin{bmatrix} I_r & O \\ O & O \end{bmatrix} \begin{bmatrix} O & R_2 \\ R_3 & R_4 \end{bmatrix} P_1^{-1} \\ &= P_1 \begin{bmatrix} O & R_2 \\ O & O \end{bmatrix} P_1^{-1}, \end{aligned}$$

显然  $r(R_2) = r(A) = r$ , 所以  $R_2$  为行满秩, 于是存在可逆阵  $S_1, S_2$  使,  $S_1 R_2 S_2 = (I_r, O)$ , 令

$$P = P_1 \begin{bmatrix} S_1^{-1} & \\ & S_2 \end{bmatrix},$$

则有

$$\begin{aligned} P^{-1}AP &= \begin{bmatrix} S_1 & \\ & S_2^{-1} \end{bmatrix} P_1^{-1}AP \begin{bmatrix} S_1^{-1} & \\ & S_2 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} O & I_r & O \\ O & O & O \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

10. 设  $A, B$  分别为  $m \times n, n \times m$  矩阵, 试证:

$$\det(I_m - AB) = \det(I_n - BA).$$

证 因为  $\begin{bmatrix} I_m & O \\ -B & I_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_m & A \\ B & I_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_m & A \\ O & I_n - BA \end{bmatrix},$

$$\begin{bmatrix} I_m & A \\ B & I_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_m & O \\ -B & I_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_m - AB & A \\ O & I_n \end{bmatrix},$$

上两式两端取行列式, 立得

$$\det(I_m - AB) = \det(I_n - BA).$$

注 此公式用得巧, 可大大简化行列式的计算. 又

$$\begin{aligned} \text{因为 } \det(\lambda I_m - AB) &= \lambda^m \det\left(I_m - \frac{1}{\lambda}AB\right) = \lambda^m \det\left(I_n - \frac{1}{\lambda}BA\right) \\ &= \lambda^{m-n} \det(\lambda I_n - BA), \end{aligned}$$

此即是

$$\lambda^n |\lambda I_m - AB| = \lambda^m |\lambda I_n - BA|.$$

因此只须记住题目中要求的公式, 其他的可由其推出, 更繁杂一些的也可类似推导. 另外, 由公式  $\lambda^n \det(\lambda I_m - AB) = \lambda^m \det(\lambda I_n - BA)$  还可看出

$$\det(\lambda I_m - AB) = 0 \Leftrightarrow \det(\lambda I_n - BA) = 0,$$

这就是说  $AB$  与  $BA$  的特征值相同. 这一结论在以后的解题中很有用.

11. 设  $A$  是  $n$  阶方阵, 且满足  $A^3 = 2I$ , 又  $B = A^2 - 2A + I$ , 试证  $B$  可逆, 并求  $B^{-1}$ .

证 由已知  $A^3 = 2I$  可得  $A^3 - I = I$ , 于是有

$$A^3 - I = (A - I)(A^2 + A + I) = I,$$

故  $(A-I)$  可逆, 且  $(A-I)^{-1} = A^2 + A + I$ .

又

$$B = A^2 - 2A + I = (A-I)^2,$$

所以  $|B| = (|A-I|)^2 \neq 0$ , 故  $B$  可逆, 且

$$B^{-1} = (A-I)^{-1} \cdot (A-I)^{-1} = (A^2 + A + I)^2 = 3A^2 + 4A + 5I.$$

12. 设  $A, B$  是  $n$  阶方阵, 且  $r(A) = r(BA)$ , 证明  $r(A^2) = r(BA^2)$ .

证 因为  $r(A) = r(BA)$ , 所以  $Ax=0$  与  $BAx=0$  同解 (因为解空间维数同, 且  $Ax=0$  的解都是  $BAx=0$  的解).

下证  $A^2x=0$  (1) 与  $BA^2x=0$  (2) 是同解方程组: 显然 (1) 的解都是 (2) 的解; 又设  $x_0$  为  $BA^2x=0$  的任一解, 即有  $BA^2x_0=0$ . 令  $y_0 = Ax_0$ , 则有  $BAy_0=0$ , 所以  $y_0$  是  $BAx=0$  的解, 由已知,  $y_0$  也是  $Ax=0$  的解, 故  $Ay_0 = A^2x_0=0$ , 故  $x_0$  也是  $A^2x=0$  的解, 所以 (2) 的解均为 (1) 的解.

所以  $\dim W_{A^2} = \dim W_{BA^2} \rightarrow r(A^2) = r(BA^2)$ .

注 本题是第 3 章 37 题的特殊情况, 因是一道考试题, 所以这里直接写出解法.

13. 求平方为零的所有三阶方阵.

解 因为  $A^2=0$ , 故  $2\text{rank} A \leq 3$  (利用 32 题), 所以  $r(A)=1$  或  $0$ .

当  $r(A)=1$  时, 有

$$A = \begin{bmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \lambda_3 \end{bmatrix} (\mu_1, \mu_2, \mu_3), \text{ 其中 } \begin{cases} \lambda_i \text{ 不全为 } 0 \\ \mu_i \text{ 不全为 } 0 \end{cases}$$

(利用补充题 4), 又

$$0 = A^2 = \begin{bmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \lambda_3 \end{bmatrix} (\mu_1, \mu_2, \mu_3) \begin{bmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \lambda_3 \end{bmatrix} (\mu_1, \mu_2, \mu_3) = (\lambda_1\mu_1 + \lambda_2\mu_2 + \lambda_3\mu_3)A.$$

因为  $A \neq 0$ , 所以必  $\lambda_1\mu_1 + \lambda_2\mu_2 + \lambda_3\mu_3 = 0$ .

于是得满足已知条件的三阶方阵为:

$$A = 0, \text{ 或 } A = \begin{bmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \lambda_3 \end{bmatrix} (\mu_1, \mu_2, \mu_3), \text{ 其中 } \begin{cases} \lambda_i \text{ 不全为 } 0 \\ \mu_i \text{ 不全为 } 0, \end{cases} \text{ 且 } \sum_{i=1}^3 \lambda_i \mu_i = 0.$$

$$14. \text{ 设矩阵 } A \text{ 的伴随矩阵 } A^* = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 0 & 8 \end{bmatrix}, \text{ 且 } ABA^{-1} = BA^{-1} + 3I, \text{ 求矩阵 } B.$$

解 由  $AA^* = (\det A)I$ , 因为  $|A^*| = 8 = |A|^3$ , 所以  $|A| = 2$ . 因  $A$  可逆, 故在矩阵方程

$$ABA^{-1} = BA^{-1} + 3I$$

的两边左乘  $A^{-1}$ , 右乘  $A$  得

$$B = A^{-1}B + 3I.$$

即

$$B(I - A^{-1}) = 3I.$$

所以

$$B = 3(I - A^{-1})^{-1} = 3\left(I - \frac{A^*}{|A|}\right)^{-1} = 6(2I - A^*)^{-1}$$

$$= 6 \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & -6 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} 6 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 & 0 \\ 6 & 0 & 6 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & -1 \end{bmatrix}.$$

## 第5章

### 线性(向量)空间

#### 5.1 定义与定理

**定义 5.1** 设  $F$  是域,  $V$  是一个集合, 如果  $V$  中定义了一种运算称为加法 (即对  $\forall x, y \in V, V$  中有唯一的  $z$  与之对应, 记为  $z = x + y$ ),  $F$  与  $V$  之间定义了一种运算称为数乘 (即对任  $\lambda \in F, x \in V, V$  中有唯一的  $y$  与之对应, 记为  $y = \lambda x$ ), 且满足如下性质, 则称  $V$  是域  $F$  上的线性空间或向量空间.

(1)  $V$  对加法成 Abel 群, 即满足

- ① (交换律)  $x + y = y + x$ ;
- ② (结合律)  $(x + y) + z = x + (y + z)$ ;
- ③ (零元素) 存在元素  $0 \in V$ , 使对任意  $x \in V$  均有  $0 + x = x$ ;
- ④ (负元素) 对任意  $x \in V$ , 存在  $y \in V$  使  $y + x = 0$ ;

(2) 数乘满足

- ①  $\lambda(x + y) = \lambda x + \lambda y$ ;
- ②  $(\lambda + \mu)x = \lambda x + \mu x$ ;
- ③  $(\lambda\mu)x = \lambda(\mu x)$ ;
- ④  $1x = x$ ;

其中  $x, y, z$  为  $V$  中任意元素,  $\lambda, \mu$  为  $F$  中任意元素,  $1$  是  $F$  的乘法单位元.

域  $F$  称为向量空间  $V$  的系数域或基域,  $F$  中元素称为纯量或数量,  $V$  中元素称为向量.

**定义 5.2** (1) 设  $V$  是线性空间,  $\alpha, \alpha_1, \dots, \alpha_r$  是  $V$  中向量, 若有  $\lambda_1, \dots, \lambda_r \in F$ , 使得

$$\alpha = \lambda_1 \alpha_1 + \dots + \lambda_r \alpha_r$$

则称  $\alpha$  可由  $\alpha_1, \dots, \alpha_r$  线性表出, 或称  $\alpha$  为向量  $\alpha_1, \dots, \alpha_r$  的线性组合 ( $\lambda_1, \dots, \lambda_r$  称为组合系数).

(2) 设  $S_1, S_2$  是线性空间  $V$  的两个向量组, 若  $S_2$  中任一向量均可由  $S_1$  线性表出, 则称  $S_2$  可由  $S_1$  线性表出, 若  $S_1$  与  $S_2$  可相互线性表出, 则称  $S_1$  与  $S_2$  等价或线性等价.

(3) 若线性空间  $V$  可由其向量组  $S$  线性表出, 则称  $S$  为  $V$  的一个生成元系, 若  $V$  有一个有限生成元系, 则称  $V$  为有限生成的.

**定义 5.3** 线性空间  $V$  中的向量  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$  称为线性相关是指存在不全为 0 的  $\lambda_1, \dots, \lambda_r \in F$ , 使

$$\lambda_1 \alpha_1 + \dots + \lambda_r \alpha_r = 0;$$

若  $\alpha_1, \dots, \alpha_r$  不线性相关, 则称为线性无关 (或线性独立). 即  $\lambda_1 \alpha_1 + \dots + \lambda_r \alpha_r = 0$  仅当

$\lambda_1 = \cdots = \lambda_r = 0$  时成立.

**定义 5.4** (1) 一个向量组  $S$  的极大线性无关组  $S_M$  是  $S$  的一个子集, 满足: ①  $S_M$  是线性无关的, ②  $S$  可由  $S_M$  线性表出.  $S_M$  的元素个数称为  $S$  的秩, 记为  $r(S)$ .

(2) 线性空间  $V$  的一个基是  $V$  中一个向量组, 它线性无关并且可以线性表出  $V$ , 基中向量的个数称为  $V$  的维数. 记为  $\dim V$ .

**引理 5.1** 设  $V$  是  $n$  维线性空间, (1)  $V$  中任意  $n$  个线性无关的向量必构成基. (2)  $V$  中任意能线性表出  $V$  的  $n$  个向量必构成基.

**定义 5.5** 设  $\alpha_1, \cdots, \alpha_n$  是  $F$  上线性空间  $V$  的基,  $\alpha \in V$ , 若有

$$\alpha = a_1\alpha_1 + \cdots + a_n\alpha_n, \quad (a_1, \cdots, a_n \in F)$$

则  $a_1, \cdots, a_n$  称为  $\alpha$  在基  $\alpha_1, \cdots, \alpha_n$  下的坐标.  $(a_1, \cdots, a_n)$  和  $(a_1, \cdots, a_n)^T$  分别称为坐标行和坐标列.

在  $F$  上的  $n$  维线性空间  $F^n$  中, 显然  $\varepsilon_1 = (1, 0, \cdots, 0), \cdots, \varepsilon_n = (0, \cdots, 0, 1)$  是一基, 称为自然基.

**定义 5.6** 设  $V$  是  $F$  上线性空间,  $W$  是  $V$  的子集合, 若  $W$  在  $V$  中定义的加法和数乘运算下是  $F$  上线性空间, 则称  $W$  是  $V$  的子空间.  $0$  和  $V$  称为  $V$  的平凡子空间, 其他子空间称为真子空间.

任给  $\alpha_1, \cdots, \alpha_s \in V$ , 则  $\alpha_1, \cdots, \alpha_s$  的所有可能的线性组合是  $V$  的一个子空间, 称为  $\alpha_1, \cdots, \alpha_s$  生成的 (或张成的) 子空间, 记为  $\langle \alpha_1, \cdots, \alpha_s \rangle$  或  $L(\alpha_1, \cdots, \alpha_s)$ , 即

$$\langle \alpha_1, \cdots, \alpha_s \rangle = \{ \lambda_1\alpha_1 + \cdots + \lambda_s\alpha_s \mid \lambda_1, \cdots, \lambda_s \in F \} = F\alpha_1 + \cdots + F\alpha_s.$$

**引理 5.2**  $F$  上线性空间  $V$  的非空子集合  $W$  是  $V$  的子空间的充分必要条件是  $W$  对加法和数乘封闭, 即对  $\forall \alpha, \beta \in W, \lambda \in F$ , 总有

$$\alpha + \beta \in W, \quad \lambda\alpha \in W.$$

**定义 5.7** 设  $V_1$  和  $V_2$  是域  $F$  上的两个线性空间, 若映射

$$\varphi: V_1 \rightarrow V_2$$

满足: (1)  $\varphi(\alpha + \beta) = \varphi(\alpha) + \varphi(\beta)$ , (2)  $\varphi(\lambda\alpha) = \lambda\varphi(\alpha)$  (对任意  $\alpha, \beta \in V_1, \lambda \in F$ ), 则称  $\varphi$  为线性映射 (当  $V_2 = F$  时,  $\varphi$  称为线性函数;  $V_2 = V_1$  时,  $\varphi$  称为线性变换).

**定义 5.8** (1)  $\ker \varphi = \{ \alpha \in V_1 \mid \varphi\alpha = 0 \}$  称为  $\varphi$  的核, 它是  $V_1$  的子空间.  $\dim(\ker \varphi)$  称为  $\varphi$  的零度.

(2)  $I_m \varphi = \varphi V_1 = \{ \varphi\alpha \mid \alpha \in V_1 \}$  称为  $\varphi$  的象集合, 它是  $V_2$  的子空间.  $\dim(I_m \varphi)$  称为  $\varphi$  的秩. 若  $\alpha_1, \cdots, \alpha_n$  是  $V_1$  的基, 则  $I_m \varphi = \langle \varphi\alpha_1, \cdots, \varphi\alpha_n \rangle$ .

**定义 5.9** 设  $\varphi: V_1 \rightarrow V_2$  是域  $F$  上线性空间  $V_1$  到  $V_2$  的线性映射, 若  $\varphi$  是双射, 则称  $\varphi$  为同构 (映射), 且称  $V_1$  与  $V_2$  是同构的, 记为  $V_1 \cong V_2$ . 当  $V_2 = V_1$  时,  $\varphi$  称为自同构映射.

**定理 5.1** 设  $\varphi: V_1 \rightarrow V_2$  是线性空间的同构映射,  $\alpha_1, \cdots, \alpha_s$  是  $V_1$  中任意向量, 则  $\varphi\alpha_1, \cdots, \varphi\alpha_s$  线性相关当且仅当  $\alpha_1, \cdots, \alpha_s$  线性相关.

**系** 设  $\varphi: V_1 \rightarrow V_2$  是线性空间的同构映射, 则

(1) 当  $\alpha_1, \cdots, \alpha_n$  是  $V_1$  的基时,  $\varphi\alpha_1, \cdots, \varphi\alpha_n$  是  $V_2$  的基.

(2)  $\dim V_1 = \dim V_2$ .

**定理 5.2** 域  $F$  上任意  $n$  维线性空间  $V$  均同构于  $F^n$  ( $n$  维行向量空间). 特别知

$$V_1 \cong V_2 \Leftrightarrow \dim V_1 = \dim V_2.$$

**定义 5.10** 设  $\epsilon_1, \dots, \epsilon_n$  是  $V$  的一个基,  $\eta_1, \dots, \eta_n$  是  $V$  的另一个基. 且设

$$\eta_i = a_{i1}\epsilon_1 + \dots + a_{in}\epsilon_n = \sum_{k=1}^n a_{ki}\epsilon_k, \quad i = 1, \dots, n.$$

则  $A = (a_{ij})$  称为由基  $\epsilon_1, \dots, \epsilon_n$  到  $\eta_1, \dots, \eta_n$  的过渡矩阵. 即  $A$  的第  $j$  列是  $\eta_j$  在  $\epsilon_1, \dots, \epsilon_n$  上的坐标. 形式地记为

$$(\eta_1, \dots, \eta_n) = (\epsilon_1, \dots, \epsilon_n)A.$$

任  $\alpha \in V$ , 设  $\alpha$  在基  $\epsilon_1, \dots, \epsilon_n$  下的坐标列为  $x = (x_1, \dots, x_n)^T$ ,  $\alpha$  在基  $\eta_1, \dots, \eta_n$  下的坐标列为  $y = (y_1, \dots, y_n)^T$ , 则有如下的坐标变换公式:

$$y = A^{-1}x.$$

**注** 数学是要理解的, 理解地记住一些公式是有意义的. 这里的坐标变换公式不需死记硬背: 由  $y = A^{-1}x \rightarrow Ay = x$ , 当  $y = (1, 0, \dots, 0)^T$  时,  $x = (a_{11}, \dots, a_{n1})^T$ , 所以  $A$  的第一列为  $\eta_1$  在基  $\epsilon_1, \dots, \epsilon_n$  下的坐标列.

**定义 5.11** 设  $V$  是域  $F$  上线性空间,  $W_1$  和  $W_2$  是  $V$  的两个子空间,  $W_1$  与  $W_2$  的交为

$$W_1 \cap W_2 = \{\alpha \mid \alpha \in W_1, \alpha \in W_2\}.$$

$W_1$  与  $W_2$  的和为

$$W_1 + W_2 = \{\alpha_1 + \alpha_2 \mid \alpha_1 \in W_1, \alpha_2 \in W_2\}.$$

**引理 5.3** 两个子空间的交与和均为线性子空间.

**定理 5.3** 设  $V_1, V_2$  是线性空间  $V$  的两个子空间, 则

$$\dim(V_1 + V_2) = \dim(V_1) + \dim(V_2) - \dim(V_1 \cap V_2).$$

**定义 5.12** 设  $W = W_1 + W_2$  是线性空间  $V$  的子空间  $W_1$  与  $W_2$  的和, 若  $W$  中每个元素  $\alpha$  表为  $W_1$  与  $W_2$  中元素的和的方法是唯一的, 即若

$$\alpha = \alpha_1 + \alpha_2 = \beta_1 + \beta_2 \quad (\alpha_1, \beta_1 \in W_1; \alpha_2, \beta_2 \in W_2)$$

则必有  $\alpha_1 = \beta_1, \alpha_2 = \beta_2$ , 那么  $W$  称为  $W_1$  与  $W_2$  的直和或内直和. 记为

$$W = W_1 \oplus W_2.$$

**定理 5.4** 设  $W = W_1 + W_2$  是线性空间  $V$  的子空间  $W_1$  与  $W_2$  的和, 则以下四个命题等价:

- (1)  $W = W_1 \oplus W_2$ ;
- (2)  $0$  表为  $W_1$  与  $W_2$  中元素和的方法唯一 (即  $0 = 0 + 0$ );
- (3)  $W_1 \cap W_2 = 0$ ;
- (4)  $\dim(W) = \dim(W_1) + \dim(W_2)$ .

**定义 5.13** 对线性空间  $V$  的任一子空间  $W$ , 总存在子空间  $W^*$ , 使  $V = W \oplus W^*$ ,  $W^*$  称为  $W$  在  $V$  中的补子空间, 其不唯一.

**定义 5.14** 设  $W = W_1 + \dots + W_s, W_i$  是线性空间  $V$  的子空间 ( $i = 1, 2, \dots, s$ ).  $W$  称为是  $W_1, \dots, W_s$  的直和或内直和, 如果每个  $\alpha \in W$  表为  $W_1, \dots, W_s$  中元素和的方法是唯一的. 记为  $W = W_1 \oplus \dots \oplus W_s = \bigoplus_{i=1}^s W_i$ .

**定理 5.5** 设  $W_1, \dots, W_s$  是线性空间  $V$  的子空间,  $W = W_1 + \dots + W_s$ , 则  $W = W_1 \oplus \dots \oplus W_s$  的充分必要条件是:

(1)  $0$  表为  $W_1, \dots, W_s$  中元素和的方法唯一 (即  $0 = 0 + \dots + 0$ );

(2)  $W_i \cap \sum_{j \neq i} W_j = 0 \quad (1 \leq i \leq s)$ ;

(3)  $\dim(W) = \sum_{i=1}^s \dim(W_i)$ .

**定理 5.6** 设  $V_1$  与  $V_2$  是域  $F$  上两个线性空间, 令

$$V = \{(\alpha, \beta) \mid \alpha \in V_1, \beta \in V_2\}$$

且定义

$$(\alpha_1, \beta_1) + (\alpha_2, \beta_2) = (\alpha_1 + \alpha_2, \beta_1 + \beta_2),$$

$$\lambda(\alpha, \beta) = (\lambda\alpha, \lambda\beta) \quad (\alpha_i \in V_1, \beta_i \in V_2, \lambda \in F),$$

则  $V$  是  $F$  上线性空间 (称为  $V_1$  与  $V_2$  的外直和, 记为  $V = V_1 \oplus V_2$ ). 且若  $\alpha_1, \dots, \alpha_m$  是  $V_1$  的基,  $\beta_1, \dots, \beta_n$  是  $V_2$  的基, 则  $(\alpha_1, 0), \dots, (\alpha_m, 0), (0, \beta_1), \dots, (0, \beta_n)$  是  $V$  的基, 特别

$$\dim(V) = \dim(V_1) + \dim(V_2).$$

**定义 5.15** 设  $W_i (i=1, \dots, s)$  是线性空间  $V$  的子空间, 且  $V = W_1 \oplus \dots \oplus W_s$ , 于是任  $\alpha \in V$ , 有唯一分解式  $\alpha = \alpha_1 + \dots + \alpha_s$ , 其中  $\alpha_i \in W_i, i=1, \dots, s$ . 作线性映射

$$\pi_i: V \rightarrow V$$

$$\alpha \mapsto \alpha_i$$

则  $\text{Im}\pi_i = W_i, \ker\pi_i = W_1 \oplus \dots \oplus W_{i-1} \oplus W_{i+1} \oplus \dots \oplus W_s$ , 且  $\pi_i \circ \pi_i = \pi_i$  (记为  $\pi_i^2 = \pi_i$ ). 这  $s$  个线性映射  $\pi_i$  称为关于直和  $V = W_1 \oplus \dots \oplus W_s$  的典型 (正则) 投射 (投影).

**定义 5.16** 设  $W$  是  $F$  上的线性空间  $V$  的子空间, 如  $\alpha, \beta \in V$ , 满足  $\alpha - \beta \in W$ , 则称  $\alpha$  与  $\beta$  模  $W$  同余, 记作  $\alpha \equiv \beta \pmod{W}$ .

(这时可把  $V$  中向量分类:  $\alpha$  与  $\beta$  同属一类  $\Leftrightarrow \alpha - \beta \in W$ ).

$V$  的子集合

$$\bar{\alpha} = \alpha + W = \{\alpha + \omega \mid \omega \in W\}$$

称为模  $W$  的一个同余类,  $\alpha$  称为此类的代表元.

**定理 5.7** 设  $W$  是域  $F$  上线性空间  $V$  的子空间,  $V/W$  是  $V$  对模  $W$  的同余类全体. 则

(1)  $V/W$  是域  $F$  上线性空间 (称为商空间)

(2) 设  $\epsilon_1, \dots, \epsilon_r$  是  $W$  的基, 扩展为  $V$  的基  $\epsilon_1, \dots, \epsilon_n$ , 则  $\bar{\epsilon}_{r+1}, \dots, \bar{\epsilon}_n$  是  $V/W$  的基, 特别知

$$\dim V/W = \dim V - \dim W$$

(3) 映射

$$\varphi: V \rightarrow V/W$$

$$\alpha \mapsto \bar{\alpha}$$

是满线性映射, 且

$$\ker \varphi = W.$$

**定理 5.8** (线性映射基本定理) 设有域  $F$  上线性空间  $V_1$  到  $V_2$  的线性映射

$$\phi: V_1 \rightarrow V_2$$

则  $\phi$  决定了线性空间的同构

$$\begin{aligned}\bar{\phi}: V_1/\ker\phi &\xrightarrow{\cong} \text{Im}\phi \\ \bar{\alpha} &\rightarrow \phi(\alpha).\end{aligned}$$

系 1 设  $\phi: V_1 \rightarrow V_2$  是线性映射, 则

$$\dim V_1 = \dim(\ker\phi) + \dim(\text{Im}\phi).$$

系 2 设  $W_1, W_2$  是  $V$  的子空间, 则

$$(W_1 \oplus W_2)/W_2 \cong W_1.$$

## 5.2 解题方法介绍

### 5.2.1 求过渡矩阵的方法

1. 用定义 由定义 5.10, 求从基  $\epsilon_1, \dots, \epsilon_n$  到基  $\eta_1, \dots, \eta_n$  的过渡矩阵  $T$ , 只要直接计算  $\eta_j (j=1, \dots, n)$  在  $\epsilon_1, \dots, \epsilon_n$  下的坐标列 (也即  $\eta_j$  关于  $\epsilon_1, \dots, \epsilon_n$  的线性组合系数), 作为  $T$  的第  $j$  列. 形式地记为

$$(\eta_1, \dots, \eta_n) = (\epsilon_1, \dots, \epsilon_n) T.$$

2. 用公式  $(\eta_1, \dots, \eta_n) = (\epsilon_1, \dots, \epsilon_n) T$ .

(1) 当  $V$  是  $n$  维列向量空间 (记为  $F^{(n)}$ ) 时,  $(\eta_1, \dots, \eta_n)$  与  $(\epsilon_1, \dots, \epsilon_n)$  均可看成方阵, 于是上式可按通常矩阵乘法进行, 又因为  $\epsilon_1, \dots, \epsilon_n$  线性无关, 所以方阵  $(\epsilon_1, \dots, \epsilon_n)$  可逆, 于是

$$T = (\epsilon_1, \dots, \epsilon_n)^{-1} (\eta_1, \dots, \eta_n),$$

此时, 坐标变换矩阵

$$T^{-1} = (\eta_1, \dots, \eta_n)^{-1} (\epsilon_1, \dots, \epsilon_n).$$

(2) 对于任意的  $n$  维线性空间  $V_n(F)$ , 若知道  $\epsilon_1, \dots, \epsilon_n, \eta_1, \dots, \eta_n$  在某组基下的坐标列, 则仍可用 (1) 的方法计算过渡矩阵  $T$ , 只不过  $(\epsilon_1, \dots, \epsilon_n), (\eta_1, \dots, \eta_n)$  不是由两组基向量排成的, 而是由两组基向量的坐标列排成. (见 27 题)

3. 用坐标变换公式  $Y = T^{-1}X$ .

由于若从基  $\epsilon_1, \dots, \epsilon_n$  到基  $\eta_1, \dots, \eta_n$  的过渡矩阵为  $T$ , 则任一向量  $\alpha$  在两组基下的坐标之间有关系

$$Y = T^{-1}X,$$

其中  $X, Y$  分别为  $\alpha$  在基 I 与基 II 下的坐标列. 所以, 若知道  $n$  个向量  $\alpha_1, \dots, \alpha_n$  在两组基下的坐标列分别为  $X_1, \dots, X_n$  及  $Y_1, \dots, Y_n$ , 则应有

$$Y_1 = T^{-1}X_1, \quad Y_2 = T^{-1}X_2, \quad \dots, \quad Y_n = T^{-1}X_n,$$

于是得

$$(Y_1, \dots, Y_n) = T^{-1}(X_1, \dots, X_n),$$

所以

$$T = (X_1, \dots, X_n)^{-1}(Y_1, \dots, Y_n).$$

4.  $F^{(n)}$  ( $n$  维列向量空间) 中, 已知向量  $\alpha_1, \dots, \alpha_n$  在基  $\eta_1, \dots, \eta_n$  下的坐标为  $\beta_1, \dots, \beta_n$ ,



则从自然基到基  $\eta_1, \dots, \eta_n$  的过渡矩阵  $T$  由下式给出:

$$T = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)^{-1}(\beta_1, \dots, \beta_n),$$

数组向量  $\alpha_1, \dots, \alpha_n$  在自然基下的坐标就是其自身(各分量排成的列向量), 由 3 立得结论.

若是  $n$  维行向量空间, 也按一般线性空间考虑, 取坐标列即可.

### 5.2.2 求 $A^{-1}B$ 或 $AB^{-1}$ 的方法

在计算过渡矩阵及解矩阵方程的问题中, 经常需要计算形如  $A^{-1}B$  (或  $AB^{-1}$ ) 的矩阵. 如果先求  $A^{-1}$ , 再做矩阵乘法, 计算量较大. 这里给出用初等变换法直接得出结果的方法.

因为

$$A^{-1}(A, B) = (I, A^{-1}B),$$

所以

$$(A, B) \xrightarrow[\text{行变换}]{\text{做初等}} (I, A^{-1}B)$$

即对  $n \times 2n$  阶方阵  $(A, B)$  做初等行变换, 当  $A$  处变成  $I$  时,  $B$  处得到的方阵就是  $A^{-1}B$ . 同理

$$\begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix} \xrightarrow[\text{列变换}]{\text{初等}} \begin{bmatrix} AB^{-1} \\ I \end{bmatrix}.$$

### 5.2.3 求两个子空间 $W_1$ 与 $W_2$ 的和与交(的维数与基)的方法

设  $W_1 = \langle \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s \rangle \in V_n(F)$ ,  $W_2 = \langle \beta_1, \dots, \beta_t \rangle \in V_n(F)$ , 则

$$W_1 + W_2 = \langle \alpha_1, \dots, \alpha_s, \beta_1, \dots, \beta_t \rangle.$$

为求  $W_1 + W_2$  的维数和基, 需要求向量组  $\alpha_1, \dots, \alpha_s, \beta_1, \dots, \beta_t$  的极大线性无关组: 把这  $s+t$  个向量的坐标列排成一个  $n \times (s+t)$  矩阵, (仍用原符号记各坐标列), 对  $(\alpha_1, \dots, \alpha_s, \beta_1, \dots, \beta_t)$  做初等行变换化为阶梯型  $(\alpha_1^*, \dots, \alpha_{s_1}^*, \beta_1^*, \dots, \beta_{t_1}^*)$ . 易判断此阶梯型的秩, 设为  $r$ , 则  $\dim(W_1 + W_2) = r$ . 且  $r$  阶  $\neq 0$  的子式所在的列向量, 即是  $W_1 + W_2$  的基(如  $r$  阶子式所在的列为  $1, 2, s+1$ , 则知  $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1$  为基).

利用阶梯型  $(\alpha_1^*, \dots, \alpha_{s_1}^*, \beta_1^*, \dots, \beta_{t_1}^*)$  也可以得到  $W_1$  与  $W_2$  的维数和基: 不妨设  $\dim W_1 = s_1$ ,  $\dim W_2 = t_1$ , 且  $W_1$  的基为  $\alpha_1, \dots, \alpha_{s_1}$ ,  $W_2$  的基为  $\beta_1, \dots, \beta_{t_1}$ . 则任  $\alpha \in W_1 \cap W_2$ , 有  $\alpha \in W_1$  且  $\alpha \in W_2$ , 于是有

$$\alpha = \lambda_1 \alpha_1 + \dots + \lambda_{s_1} \alpha_{s_1} = \mu_1 \beta_1 + \dots + \mu_{t_1} \beta_{t_1}$$

求解以  $\lambda_1, \dots, \lambda_{s_1}, -\mu_1, \dots, -\mu_{t_1}$  为未知元的线性方程组

$$\lambda_1 \alpha_1 + \dots + \lambda_{s_1} \alpha_{s_1} - \mu_1 \beta_1 - \dots - \mu_{t_1} \beta_{t_1} = 0$$

(仍可利用上述阶梯型——划去  $(s-s_1) + (t-t_1)$  列)

这个线性方程组的解空间的维数就是  $\dim(W_1 \cap W_2)$ . 以其基础解系  $\{\eta_i\}$  为组合系数得到的  $\{r_i\}$ , 就是  $W_1 \cap W_2$  的基. 如  $\eta_0 = (\lambda_1^0, \dots, \lambda_{s_1}^0, -\mu_1^0, \dots, -\mu_{t_1}^0)$ , 则  $r_0 = \lambda_1^0 \alpha_1 + \dots + \lambda_{s_1}^0 \alpha_{s_1} + \mu_1^0 \beta_1 + \dots + \mu_{t_1}^0 \beta_{t_1} \in W_1 \cap W_2$  (见 29 题).

## 5.3 习题与解答

1. (1) 不利用向量空间中加法的可交换性, 证明: 左逆元和左零元也是右逆元和右

零元; (2) 利用(1)证明: 向量加法的可交换性可从线性空间的其他公理推出.

证 (1) 由已知, 任  $x \in V$  有

$$\begin{aligned}0 + x &= x \\ (-x) + x &= 0\end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned}x + (-x) &= 0 + x + (-x) = (-(-x)) + (-x) + x + (-x) \\ &= (-(-x)) + (-x) = 0,\end{aligned}$$

$$x + 0 = x + (-x) + x = 0 + x = x.$$

(2)  $\forall x, y \in V$  有

$$\begin{aligned}(1+1)(x+y) &= x+y+x+y \\ &= (1+1)x + (1+1)y = x+x+y+y\end{aligned}$$

即有

$$x+y+x+y = x+x+y+y$$

两边左加  $-x$ , 右加  $-y$  得

$$x+y = y+x.$$

2. 令  $\mathbf{R}$  是实数域, 而  $V$  是定义于区间  $[a, b]$  上取正值的所有函数的集合, 我们定义

$$f \oplus g = fg, \quad \lambda \odot f = f^\lambda, \quad (f, g \in V, \lambda \in \mathbf{R});$$

(1) 证明: 在上述运算下,  $V$  是  $\mathbf{R}$  上的线性空间;

(2) 证明: 空间  $V$  同构于空间  $V'$ , 其中  $V'$  是定义于区间  $[a, b]$  上的所有的实函数, 其函数加法及数乘如常;

(3) 求空间  $V$  的维数.

解 (1) 因为加法封闭.  $\forall f, g \in V, fg$  仍为  $[a, b]$  上的正值函数, 且满足:

- ①  $f \oplus g = fg = g \oplus f$ ;
- ②  $(f \oplus g) \oplus h = (fg)h = fgh = f \oplus (g \oplus h)$ ;
- ③ 零元为常值函数 1,  $1 \oplus f = f$ ;
- ④  $\forall f \in V$  的负元为  $\frac{1}{f}$ ,  $\frac{1}{f} \oplus f = 1$ .

数乘封闭.  $\forall f \in V, f^\lambda$  是  $[a, b]$  上的正值函数, 且数乘运算满足:

- ①  $1 \odot f = f^1 = f$ ;
- ②  $\lambda \odot (\mu \odot f) = \lambda \odot f^\mu = f^{\lambda\mu} = \lambda\mu \odot f$ ;
- ③  $(\lambda + \mu) \odot f = f^{(\lambda+\mu)} = f^\lambda \cdot f^\mu = f^\lambda \oplus f^\mu = \lambda \odot f \oplus \mu \odot f$ ;
- ④  $\lambda \odot (f \oplus g) = \lambda \odot fg = (fg)^\lambda = f^\lambda \cdot g^\lambda = f^\lambda \oplus g^\lambda = \lambda \odot f \oplus \lambda \odot g$ .

所以  $V$  是  $\mathbf{R}$  上的线性空间.

(2) 设

$$\begin{aligned}\varphi: V &\rightarrow V' \\ f &\mapsto \ln f\end{aligned}$$

则显然  $\varphi$  是  $V$  到  $V'$  的 1-1 对应, 且满足:

$$\begin{aligned}\ln(f \oplus g) &= \ln f + \ln g & (\text{对任 } f, g \in V) \\ \ln(\lambda \odot f) &= \lambda \ln f & (\forall f \in V, \lambda \in \mathbf{R})\end{aligned}$$

于是  $\varphi$  是同构映射,  $V$  同构于  $V'$ .

(3) 空间  $V$  是无限维的.

3. 判断下列集合是否为相应向量空间的线性子空间.

(1)  $n$  维向量空间中, 坐标是整数的所有向量.

解 不是. 因为数乘不封闭.

(2) 三维空间中, 终点不位于一给定直线上的所有向量.

解 不是子空间, 因为加法与数乘运算均不封闭.

(3) 平面上, 终点位于第一象限的所有向量.

解 不是. 因为没有负元. 数乘运算不封闭.

(4)  $\mathbf{R}^n$  中坐标满足方程  $x_1 + x_2 + \cdots + x_n = 0$  的所有向量.

解 是子空间(因其对加法和数乘均封闭). 是  $n-1$  维子空间.

(5)  $\mathbf{R}^n$  中坐标满足方程  $x_1 + x_2 + \cdots + x_n = 1$  的所有向量.

解 不是子空间. 因为加法, 数乘均不封闭.

4. 证明: 函数组  $e^{\lambda_1 x}, \cdots, e^{\lambda_n x}$  是线性无关的, 其中  $\lambda_1, \cdots, \lambda_n$  是互不相同的实数, 线性空间定义如: 连续实变函数全体按函数的加法和数与函数的乘法是  $\mathbf{R}$  上线性空间.

证 设有  $k_1 e^{\lambda_1 x} + \cdots + k_n e^{\lambda_n x} = 0$ , 依次求导  $1, \cdots, n-1$  次得关于未知量  $k_1, k_2, \cdots, k_n$  的线性方程组

$$\begin{cases} k_1 e^{\lambda_1 x} + \cdots + k_n e^{\lambda_n x} = 0, \\ k_1 \lambda_1 e^{\lambda_1 x} + \cdots + k_n \lambda_n e^{\lambda_n x} = 0, \\ \cdots \cdots \cdots \cdots \cdots \cdots \cdots \cdots, \\ k_1 \lambda_1^{n-1} e^{\lambda_1 x} + \cdots + k_n \lambda_n^{n-1} e^{\lambda_n x} = 0 \end{cases}$$

由于系数矩阵行列式为

$$V_n(\lambda_1, \cdots, \lambda_n) \cdot e^{\lambda_1 x + \cdots + \lambda_n x} \neq 0$$

所以

$$k_1 = k_2 = \cdots = k_n = 0,$$

故

$$e^{\lambda_1 x}, \cdots, e^{\lambda_n x} \text{ 线性无关.}$$

5. 证明  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  为  $\mathbf{R}^3$  的一组基, 并求向量  $x$  在该组基下的坐标:

(1)  $\alpha_1 = (1, 1, 1), \alpha_2 = (1, 1, 2), \alpha_3 = (1, 2, 3); x = (6, 9, 14);$

解 令  $A = (\alpha_1^T, \alpha_2^T, \alpha_3^T)$ , 则因为  $\det A \neq 0$ , 所以  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  为  $\mathbf{R}^3$  的一组基.

又设

$$x = x_1 \alpha_1 + x_2 \alpha_2 + x_3 \alpha_3 = (x_1, x_2, x_3) \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \end{bmatrix}$$

所以

$$\begin{aligned} (x_1, x_2, x_3) &= x \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \end{bmatrix}^{-1} \\ &= (6, 9, 14) \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}^{-1} = (1, 2, 3) \end{aligned}$$

所以  $x$  在基  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  下的坐标为  $(1, 2, 3)^T$ .

也可以这样求  $x$  的坐标: 设  $\mathbf{R}^3$  的自然基为  $e_1, e_2, e_3$ , 则有

$$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = (e_1, e_2, e_3)B$$

其中  $B$  是从基  $e_1, e_2, e_3$  到基  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  的过渡矩阵, 由过渡矩阵的定义知

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

于是  $x$  在基  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  下的坐标为

$$y = B^{-1} \begin{bmatrix} 6 \\ 9 \\ 14 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & -2 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 6 \\ 9 \\ 14 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

(2)  $\alpha_1 = (2, 1, -3)$ ,  $\alpha_2 = (3, 2, -5)$ ,  $\alpha_3 = (1, -1, 1)$ ;  $x = (6, 2, -7)$ .

解 因为  $\det(\alpha_1^T, \alpha_2^T, \alpha_3^T) \neq 0$ , 所以  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  是  $\mathbf{R}^3$  的基. 从自然基  $e_1, e_2, e_3$  到基  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  的过渡矩阵为

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \\ -3 & -5 & 1 \end{bmatrix}$$

于是  $x$  在基  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  下的坐标为

$$y = A^{-1}x^T = \begin{bmatrix} -3 & -8 & -5 \\ 2 & 5 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 6 \\ 2 \\ -7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

6. 试证明域  $F$  上形式幂级数全体  $F[[x]]$  是  $F$  上线性空间.

证 任  $f \in F[[x]]$ , 有  $f = \sum_{i=0}^{\infty} a_i x^i$ , 其中  $x$  为不定元. 加法和数乘分别定义为:

$$f + g = \sum_{i=0}^{\infty} (a_i + b_i) x^i, \quad \lambda f = \sum_{i=0}^{\infty} \lambda a_i x^i,$$

则加法封闭, 有零元, 负元. 数乘封闭, 所以是  $F$  上线性空间 (运算满足其他性质显然).

基为  $1, x, x^2, \dots, x^n, \dots$ .

7. 设  $V$  由实数对  $(x, y)$  全体构成, 定义

$$(x, y) + (x_1, y_1) = (x + y_1, y + y_1), \quad \lambda(x, y) = (\lambda x, y),$$

那么  $V$  对此二运算是否是  $\mathbf{R}$  上的线性空间.

答 不是线性空间 (因交换律不成立, 没左零元, 也没负元).

8. 在  $n$  维行向量空间  $\mathbf{R}^n$  中另外定义运算

$$\alpha \oplus \beta = \alpha - \beta, \quad \lambda * \alpha = -\lambda \alpha$$

(等式右方为通常运算), 那么  $(\mathbf{R}^n, \oplus, *)$  满足向量空间定义中的哪几条公理?

解 只满足数乘运算的第一条公理, 即对任  $x, y \in \mathbf{R}^n$ ,  $\lambda \in \mathbf{R}$  有  $\lambda(x + y) = \lambda x + \lambda y$ .

9. 设  $V$  由实数对  $(x, y)$  全体构成, 定义

$$(x, y) + (x_1, y_1) = (x + x_1, 0), \quad \lambda(x, y) = (\lambda x, 0),$$

对此二运算  $V$  是否是  $\mathbf{R}$  上线性空间?

解 不是线性空间(因为无零元).

10. 试证明线性空间  $V$  的任意多个子空间的交仍为子空间.

证 任  $\alpha, \beta \in \bigcap V_i$ , 则  $\alpha, \beta \in V_i, i \in I$  ( $I$  为指标集), 所以  $\alpha + \beta \in V_i$  (因为  $V_i$  为子空间),  $\alpha + \beta \in \bigcap V_i$ ; 同理因为  $\lambda\alpha \in V_i$ , 所以  $\lambda\alpha \in \bigcap V_i$ . 即交对加法和数乘封闭, 所以是子空间.

11. 设  $W_1, W_2$  是线性空间  $V$  的两个子空间.

(1)  $W_1 \cup W_2$  是否为  $V$  的子空间, 举数例说明.

解 设  $\epsilon_1, \dots, \epsilon_n$  为  $V$  的基. 显然  $W_1 = \langle \epsilon_1 \rangle, W_2 = \langle \epsilon_2 \rangle$  均是  $V$  的子空间, 但  $W_1 \cup W_2$  不是子空间; 又若取  $W_1 = \langle \epsilon_1 \rangle, W_2 = \langle \epsilon_1, \epsilon_2 \rangle$ , 则  $W_1 \cup W_2 = W_2$  是子空间.

可以证明  $W_1 \cup W_2$  仍为子空间  $\Leftrightarrow W_1 \supseteq W_2$  或  $W_1 \subseteq W_2$ . 其证法如下:

$\Leftarrow$  显然.

$\Rightarrow$  若  $W_1$  与  $W_2$  互不包含, 则一定  $\exists \alpha_1 \in W_1$ , 但  $\alpha_1 \notin W_2$  及  $\alpha_2 \in W_2$ , 但  $\alpha_2 \notin W_1$ , 而  $\alpha_1, \alpha_2 \in W_1 \cup W_2$ , 又已知  $W_1 \cup W_2$  为子空间, 所以  $\alpha_1 + \alpha_2 \in W_1 \cup W_2$ . 由并集的定义有: 或  $\alpha_1 + \alpha_2 \in W_1$  或  $\alpha_1 + \alpha_2 \in W_2$ , 不妨设为  $\alpha_1 + \alpha_2 \in W_1$ , 又  $\alpha_1 \in W_1$ , 由  $W_1$  为子空间知有

$$\alpha_1 + \alpha_2 + (-\alpha_1) = \alpha_2 \in W_1$$

与  $\alpha_2 \notin W_1$  矛盾, 所以  $W_1$  与  $W_2$  必有一个包含于另一个中.

(2) 证明包含  $W_1$  和  $W_2$  的最小子空间为

$$W_1 + W_2 = \{\alpha_1 + \alpha_2 \mid \alpha_1 \in W_1, \alpha_2 \in W_2\};$$

证 因为  $W_1 + W_2$  为子空间, 且  $W_1 \cup W_2 \subset W_1 + W_2$ , 下面只要证明任包含  $W_1$  和  $W_2$  的子空间  $V_1$  都包含  $W_1 + W_2$ .

任取  $\alpha_1 \in W_1 \subset V_1, \alpha_2 \in W_2 \subset V_1$ , 因为  $V_1$  为子空间, 所以  $\alpha_1 + \alpha_2 \in V_1$  即集合

$$\{\alpha_1 + \alpha_2 \mid \alpha_1 \in W_1, \alpha_2 \in W_2\} \subset V_1$$

而左边恰为  $W_1 + W_2$ . 所以  $W_1 + W_2$  为包含  $W_1 \cup W_2$  的最小子空间. 于是得出:

$$W_1 \cup W_2 \text{ 为子空间 } \Leftrightarrow W_1 \cup W_2 = W_1 + W_2.$$

(3) 设  $W_1 \cap W_2 = \{0\}$ , 证明  $W_1 + W_2$  中任一向量  $\alpha$  表为  $\alpha = \alpha_1 + \alpha_2$  ( $\alpha_1 \in W_1, \alpha_2 \in W_2$ ) 的方法是唯一的.

证 设有

$$\alpha = \alpha_1 + \alpha_2 = \beta_1 + \beta_2, \quad \alpha_1, \beta_1 \in W_1, \alpha_2, \beta_2 \in W_2,$$

则有

$$\alpha_1 - \beta_1 = \beta_2 - \alpha_2,$$

又

$$\alpha_1 - \beta_1 \in W_1, \beta_2 - \alpha_2 \in W_2,$$

于是

$$\alpha_1 - \beta_1 = \beta_2 - \alpha_2 \in W_1 \cap W_2 = \{0\}$$

所以

$$\alpha_1 = \beta_1, \quad \alpha_2 = \beta_2, \text{ 即分解式唯一.}$$

12. 设  $V$  是迹为 0 的二阶复方阵全体.

(1) 证明  $V$  是  $\mathbf{R}$  上线性空间(对通常矩阵加法与数乘).

证 任  $A = (a_{ij}) \in V$ , 由已知  $\text{tr}A = 0$ , 所以  $a_{11} + a_{22} = 0$ , 于是可设

$$A = \begin{bmatrix} a+ib & a_{12} \\ a_{21} & -a-ib \end{bmatrix}$$

容易看出  $V$  对加法, 数乘封闭, 所以是  $\mathbf{R}$  上线性空间.

(2) 求  $V$  在  $\mathbf{R}$  上的一个基

解 设  $a_{12}=a_1+ib_1$ ,  $a_{21}=a_2+ib_2$ , 则由(1)知, 对任  $A \in V$  有

$$\begin{aligned} A &= \begin{bmatrix} a+ib & a_1+ib_1 \\ a_2+ib_2 & -a-ib \end{bmatrix} \\ &= a \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} + b \begin{bmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{bmatrix} + a_1 \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + b_1 \begin{bmatrix} 0 & i \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \\ &\quad + a_2 \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} + b_2 \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ i & 0 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

所以  $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} i & 0 \\ 0 & i \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & i \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ i & 0 \end{bmatrix}$  为基.

(3) 设  $W = \{(a_{ij}) \in V \mid a_{21} = -\bar{a}_{12}\}$ , 证明  $W$  是  $V$  的子空间, 并求出  $W$  的一个基.

解 任  $B \in W$ , 由已知条件知

$$B = \begin{bmatrix} a+ib & c+id \\ -c+id & -a-ib \end{bmatrix}$$

于是知  $W$  对加法和数乘封闭 (任  $B_1, B_2 \in W, \lambda \in \mathbf{R}, B_1+B_2 \in W, \lambda B_1 \in W$ ), 即任两形如上式的二阶复方阵之和还是形如上式的方阵; 乘  $\lambda$  后仍为上述形式的复方阵.

因为  $B = a \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} + b \begin{bmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{bmatrix} + c \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} + d \begin{bmatrix} 0 & i \\ -i & 0 \end{bmatrix}$

所以  $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & i \\ -i & 0 \end{bmatrix}$  为  $W$  的基.

13. 设域  $E$  包含域  $F$ ,  $E$  作为  $F$  上的线性空间有一基  $x_1, \dots, x_m$ , 设  $V$  是  $E$  上线性空间, 在  $E$  上有基  $y_1, \dots, y_n$ , 证明  $V$  是  $F$  上线性空间, 维数是  $mn$ , 基为  $\{x_i y_j\} (1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n)$ .

证 先证  $V$  是  $F$  上线性空间: 定义加法, 数乘同前 (因为  $V$  是  $E$  上的线性空间), 于是加法四条公理均满足, 封闭性也满足; 数乘的四条因为当  $\lambda \in F$  时,  $\lambda \in E$ , 所以也满足. 故得证.

再证基为  $x_i y_j (1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n)$ : ① 设有

$$\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n \lambda_{ij} x_i y_j = 0,$$

于是

$$\sum_{j=1}^n \left( \sum_{i=1}^m \lambda_{ij} x_i \right) y_j = 0,$$

其中  $\sum_{i=1}^m \lambda_{ij} x_i \in E$ , 因为  $y_1, \dots, y_n$  线性无关, 则必有

$$\sum_{i=1}^m \lambda_{ij} x_i = 0, \quad \text{对 } j = 1, 2, \dots, n \text{ 同时成立.}$$

又因为  $x_1, \dots, x_m$  线性无关, 所以必

$$\lambda_{ij} = 0, i = 1, \dots, m, j = 1, \dots, n.$$

故  $x_i y_j$  线性无关 ( $1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n$ ).

②  $\forall \alpha \in V$ , 有

$$\begin{aligned} \alpha &= \sum_{j=1}^n \lambda_j y_j \quad (\lambda_j \in E, \text{所以又有 } \lambda_j = \sum_{i=1}^m k_{ij} x_i) \\ &= \sum_{j=1}^n \left( \sum_{i=1}^m k_{ij} x_i \right) y_j = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^m k_{ij} x_i y_j \end{aligned}$$

于是得

$$\left\{ x_i y_j \mid \begin{matrix} 1 \leq i \leq m \\ 1 \leq j \leq n \end{matrix} \right\} \text{ 为基, 空间为 } mn \text{ 维的.}$$

例如:

$F$  为  $\mathbf{R}$ ,  $E$  为  $\mathbf{C}$ ,  $E$  作为  $F$  上的线性空间是 2 维的, 基为  $1, i$ ;  $V = \mathbf{C}^{(n)}$ ,  $V$  作为  $E$  上的线性空间是  $n$  维的, 基为  $e_1, \dots, e_n$ , 即  $e_1 = (1, 0, \dots, 0)^T, \dots, e_n = (0, \dots, 0, 1)^T$ . 则  $V$  作  $\mathbf{R}$  上的线性空间是  $2n$  维的. 基为  $e_1, ie_1, \dots, e_n, ie_n$  即

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} i \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, \dots, \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ i \end{bmatrix}.$$

14. 证明: 如果  $n$  维线性空间的两个线性子空间的维数之和大于  $n$ , 则这两个子空间有公共的非零向量.

证 设  $W_1 = \langle \alpha_1, \dots, \alpha_r \rangle$ ,  $W_2 = \langle \beta_1, \dots, \beta_s \rangle$ , 则

$$W_1 + W_2 = \langle \alpha_1, \dots, \alpha_r, \beta_1, \dots, \beta_s \rangle$$

记  $\dim W_1 = r$ , ( $\alpha_1, \dots, \alpha_r$  线性无关),  $\dim W_2 = s$ , ( $\beta_1, \dots, \beta_s$  线性无关) 则由维数公式有

$$\begin{aligned} \dim(W_1 \cap W_2) &= \dim W_1 + \dim W_2 - \dim(W_1 + W_2) \\ &= r + s - \dim(W_1 + W_2) \\ &> n - \dim(W_1 + W_2) \geq 1 \end{aligned}$$

所以  $W_1 \cap W_2 \neq \{0\}$ . 故  $W_1$  与  $W_2$  有公共的非零向量.

15. 证明:  $\mathbf{R}^n$  中下列向量集合组成它的线性子空间, 并分别求出一个基和维数.

(1) 第一个和最后一个坐标相等的所有  $n$  维向量.

证 任  $\alpha, \beta \in W_1$ , 设  $\alpha = (a_1, \dots, a_n)$ ,  $\beta = (b_1, \dots, b_n)$  由已知  $a_1 = a_n, b_1 = b_n$ , 则

$$\alpha + \beta = (a_1 + b_1, a_2 + b_2, \dots, a_n + b_n) \in W_1,$$

$$\lambda \alpha = (\lambda a_1, \dots, \lambda a_n) \in W_1,$$

故  $W_1$  对加法和数乘运算封闭, 所以  $W_1$  是子空间. 基为

$$(1, 0, \dots, 0, 1), (0, 1, 0, \dots, 0), \dots, (0, \dots, 0, 1, 0)$$

$$\dim W_1 = n - 1.$$

(2) 偶数号码坐标等于零的所有  $n$  维向量.

解 因为此集合对  $\mathbf{R}^n$  中加法和数乘运算封闭, 所以它是  $\mathbf{R}^n$  的子空间. 基为:

$(1, 0, \dots, 0), (0, 0, 1, 0, \dots, 0), \dots, (0, \dots, 0, 1, 0)$  ( $n$  为偶数) 或  $(0, \dots, 0, 1)$  ( $n$  为

奇数),

$$\dim W_2 = \left[ \frac{n+1}{2} \right].$$

(3) 偶数号码的坐标相等的所有  $n$  维向量;

解 设此子集为  $W_3$ , 因为  $W_3$  对加法和数乘封闭, 所以是  $\mathbf{R}^n$  的子空间.  $W_3$  的基是:  $W_2$  的基 +  $(0, 1, 0, 1, \dots, 0, 1)$  ( $n$  为偶) 或  $(0, 1, \dots, 0, 1, 0)$  ( $n$  为奇),

$$\dim W_3 = 1 + \left[ \frac{n+1}{2} \right].$$

(4) 形如  $(a, b, a, b, a, b, \dots)$  的所有  $n$  维向量, 其中  $a, b$  为任意实数.

解 因为  $W_4$  对加法和数乘封闭, 所以是子空间. 任  $\alpha \in W_4$ , 有

$$\alpha = (a, b, a, b, a, b, \dots) = a(1, 0, 1, 0, \dots) + b(0, 1, 0, 1, \dots),$$

于是知  $W_4$  的基为

$$(1, 0, 1, 0, 1, 0, \dots) \text{ 和 } (0, 1, 0, 1, 0, 1, \dots)$$

所以

$$\dim W_4 = 2,$$

16. 证明: 所有  $n$  阶对称方阵构成  $n$  阶方阵空间的一个线性子空间, 求这子空间的一组基和维数.

证 设对称方阵的全体为集合  $W$ . 任  $A, B \in W$ , 记  $A = (a_{ij}), B = (b_{ij})$  且有  $a_{ij} = a_{ji}, b_{ij} = b_{ji}$ , 则

$$A + B = (c_{ij}) = (a_{ij} + b_{ij}) \in W,$$

$$\lambda A = (d_{ij}) = (\lambda a_{ij}) \in W,$$

前一式由于  $c_{ij} = a_{ij} + b_{ij} = a_{ji} + b_{ji} = c_{ji}$ , 后一式是因  $\lambda a_{ij} = \lambda a_{ji}$ . 所以  $W$  是  $M_n(F)$  的子空间.

记  $E_{ij}$  是  $(i, j)$  位元素为 1, 而其余元素为 0 的  $n$  阶方阵, 则  $W$  的基为

$$F_{ij} = \begin{cases} E_{ii} & i = j \\ E_{ij} + E_{ji} & i < j \end{cases} \quad j = 1, 2, \dots, n, i = 1, 2, \dots, j$$

于是知

$$\dim W = \frac{1}{2}n(n+1).$$

17. 证明: 所有  $n$  阶斜对称方阵  $A$  (即  $A^T = -A$ ) 组成  $n$  阶方阵空间的一个线性子空间, 求它的一组基和维数.

证 与 16 题类似易证对加法和数乘封闭, 所以所有  $n$  阶斜对称方阵按通常矩阵的加法和数乘构成一个  $M_n(F)$  的子空间. 基为

$$G_{ij} = E_{ij} - E_{ji}, \quad 1 \leq i < j \leq n.$$

$$\text{维数} = \frac{1}{2}n(n-1).$$

18. 设  $L$  是由其坐标满足方程  $x_1 + x_2 + \dots + x_n = 0$  的向量所组成的  $\mathbf{R}^n$  的子空间, 试求它的一组基和维数.

解 因为  $x_2, x_3, \dots, x_n$  为自由未知量, 分别取



$$\begin{bmatrix} x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \end{bmatrix}, \dots, \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix},$$

可得基础解系为

$$\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \end{bmatrix}, \dots, \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

此即为解子空间的基. 维数是  $n-1$ .

19. 求线性方程组, 使得它的解是由下列向量组所张成的线性子空间.

(1)  $\alpha_1 = (1, -1, 1, 0)^T, \alpha_2 = (1, 1, 0, 1)^T, \alpha_3 = (2, 0, 1, 1)^T$ ;

解 因为  $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 2$ , 所以线性方程组的系数矩阵的秩为 2, 于是可设方程组为

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + a_{14}x_4 = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + a_{24}x_4 = 0 \end{cases},$$

记  $A = (a_{ij})$ , 由已知有  $A(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 0$ , 转置得:

$$\begin{bmatrix} \alpha_1^T \\ \alpha_2^T \\ \alpha_3^T \end{bmatrix} A^T = 0, \quad \text{记 } B = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)^T,$$

于是  $A^T$  的列(即  $A$  的行)是线性方程组  $BY=0$  的解, 也即

$$\begin{cases} y_1 - y_2 + y_3 = 0 \\ y_1 + y_2 + y_4 = 0 \\ 2y_1 + y_3 + y_4 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y_1 - y_2 + y_3 = 0 \\ y_1 + y_2 + y_4 = 0 \end{cases}$$

的解, 选  $y_1, y_2$  为自由未知量, 分别令

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

得解  $(y_1, y_2, y_3, y_4)^T = (1, 0, -1, -1)^T, (0, 1, 1, -1)^T$ , 则  $A$  的行可选为

$$c_1(1, 0, -1, -1) + c_2(0, 1, 1, -1), \quad c_1, c_2 \in \mathbf{R},$$

中任两个线性无关的向量, 例如线性方程组

$$\begin{cases} x_1 - x_3 - x_4 = 0 \\ x_2 + x_3 - x_4 = 0 \end{cases} \quad \text{即为所求.}$$

(2)  $\alpha_1 = (1, -1, 1, -1, 1)^T, \alpha_2 = (1, 1, 0, 0, 3)^T, \alpha_3 = (3, 1, 1, -1, 7)^T, \alpha_4 = (0, 2, -1, 1, 2)^T$ .

解 设所求线性方程组为  $Ax=0$ , 则  $W_A = \langle \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 \rangle$ , 所以

$$A(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) \begin{bmatrix} k_1 \\ k_2 \\ k_3 \\ k_4 \end{bmatrix} = 0,$$

转置得

$$(k_1, k_2, k_3, k_4) \begin{bmatrix} \alpha_1^T \\ \alpha_2^T \\ \alpha_3^T \\ \alpha_4^T \end{bmatrix} A^T = 0,$$

由于  $(k_1, k_2, k_3, k_4)^T \in \mathbb{C}^4$ , 分别选取为  $(1, 0, 0, 0), (0, 1, 0, 0), (0, 0, 1, 0), (0, 0, 0, 1)$  知有

$$\begin{bmatrix} \alpha_1^T \\ \alpha_2^T \\ \alpha_3^T \\ \alpha_4^T \end{bmatrix} A^T = 0, \quad \text{记 } B = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)^T,$$

上式说明  $A^T$  的列 ( $A$  的行) 恰为线性方程组  $BY=0$  的解. 求解方程组

$$\begin{cases} y_1 - y_2 + y_3 - y_4 + y_5 = 0 \\ y_1 + y_2 + \quad \quad + 3y_5 = 0 \\ 3y_1 + y_2 + y_3 - y_4 + 7y_5 = 0 \\ \quad \quad 2y_2 - y_3 + y_4 + 2y_5 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y_1 - y_2 + y_3 - y_4 + y_5 = 0 \\ \quad \quad 2y_2 - y_3 + y_4 + 2y_5 = 0 \end{cases}$$

得基础解系

$$\eta_1 = \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1, 0, 0\right)^T, \quad \eta_2 = \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 0, 1, 0\right)^T, \quad \eta_3 = (-2, -1, 0, 0, 1)^T.$$

于是所求线性方程组可选为

$$\begin{cases} x_1 - x_2 - 2x_3 = 0 \\ x_1 - x_2 + 2x_4 = 0 \\ 2x_1 + x_2 - x_5 = 0 \end{cases}$$

20. 设  $P_{m \times m}, Q_{n \times n}$  是域  $F$  上固定方阵,  $M_{m \times n}(F)$  是  $F$  上  $m \times n$  矩阵全体, 对其中任一矩阵  $A$ , 定义  $\varphi(A) = PAQ$ , 试证明  $\varphi$  是  $F$  上线性空间  $M_{m \times n}(F)$  到自身的线性映射,  $\varphi$  是否为同构?

证 对任  $A, B \in M_{m \times n}(F)$ , 及  $\lambda \in F$ , 有

$$\varphi(A+B) = P(A+B)Q = PAQ + PBQ = \varphi(A) + \varphi(B),$$

$$\varphi(\lambda A) = P\lambda A Q = \lambda PAQ = \lambda \varphi(A),$$

所以是线性映射.

当  $P, Q$  为可逆阵时,  $\varphi$  还是双射, 于是  $\varphi$  为同构映射 (因为  $PAQ=B \rightarrow A=P^{-1}BQ^{-1}$ , 所以是 1-1 对应). 否则, 可能有  $A \neq C$ , 但  $PAQ=PCQ$  (即  $P(A-C)Q=0$ , 在  $A \neq C$  时成立, 因为矩阵乘法有零因子).

21. 设  $V$  是连续实函数全体, 看作  $\mathbb{R}$  上线性空间, 对  $f \in V$ , 令

$$(\varphi f)(x) = \int_0^x f(t) dt,$$

试证明  $\varphi$  是  $V$  到自身的线性映射.

证  $\forall f, g \in V, \lambda \in \mathbb{R}$  有

$$(\varphi(f+g))(x) = \int_0^x (f+g)(t) dt$$

$$= \int_0^x f(t) dt + \int_0^x g(t) dt = (\varphi f)(x) + (\varphi g)(x),$$

于是知

$$\varphi(f+g) = \varphi(f) + \varphi(g),$$

又由于

$$(\varphi(\lambda f))(x) = \int_0^x \lambda f(t) dt = \lambda \int_0^x f(t) dt = \lambda(\varphi f)(x),$$

所以  $\varphi(\lambda f) = \lambda\varphi(f)$ , 故  $\varphi$  是线性映射.

**22. 求线性空间的同构映射:**

(1)  $\varphi: F^n \rightarrow F^{(n)}$ .

**解** 任  $\alpha = (a_1, \dots, a_n) \in F^n$ , 定义  $\varphi(\alpha) = (a_1, \dots, a_n)^T \in F^{(n)}$ . 可以验证  $\varphi$  是线性映射, 且是双射(1-1 对应), 所以  $\varphi$  是同构映射.

(2)  $\varphi: M_{m \times n}(F) \rightarrow F^{m \times n}$ ;

**解** 任  $A = (a_{ij})_{m \times n} \in M_{m \times n}(F)$ , 定义

$$\varphi(A) = (a_{11}, \dots, a_{1n}, a_{21}, \dots, a_{2n}, \dots, a_{m1}, \dots, a_{mn}) \in F^{m \times n}.$$

易知  $\varphi$  是线性映射, (设  $B = (b_{ij}) \in M_{m \times n}(F)$ ,  $\lambda \in F$ , 有  $\varphi(A+B) = \varphi(A) + \varphi(B)$ ,  $\varphi(\lambda A) = \lambda\varphi(A)$ ), 是单射(若  $A \neq B$ , 则  $\varphi(A) \neq \varphi(B)$ ), 是满射(任  $\beta \in F^{m \times n}$ , 有  $A \in M_{m \times n}(F)$ , 使  $\varphi(A) = \beta$ ), 所以是同构映射.

(3)  $\varphi: M_{2 \times 2}(\mathbf{C}) \rightarrow M_{2 \times 4}(\mathbf{R})$ .

**解** 定义  $\varphi$ :

$$\forall A = \begin{bmatrix} a_1 + ib_1 & a_2 + ib_2 \\ a_3 + ib_3 & a_4 + ib_4 \end{bmatrix} \in M_{2 \times 2}(\mathbf{C})$$

$$\varphi(A) = \begin{bmatrix} a_1 & b_1 & a_2 & b_2 \\ a_3 & b_3 & a_4 & b_4 \end{bmatrix} \in M_{2 \times 4}(\mathbf{R}).$$

显然  $\varphi$  是线性映射, 且是双射, 所以是同构映射.

**23. 对于下列线性映射  $\varphi: \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}^4$ , 求  $\varphi(x_1, x_2, x_3)$ :**

(1)  $\varphi(1, 0, 0) = (1, 0, 0, 0), \varphi(0, 1, 0) = (0, 0, 1, 0), \varphi(0, 0, 1) = (0, 0, 0, 1);$

(2)  $\varphi(1, 0, 0) = (1, 1, 1, 1), \varphi(0, 1, 0) = (4, 2, 1, 1), \varphi(0, 0, 1) = (3, 1, 0, 0);$

(3)  $\varphi(1, 1, 1) = (1, 2, 3, 1), \varphi(1, 2, 1) = (0, 1, 2, 1), \varphi(1, 1, 0) = (1, 1, 1, 0);$

**解** (1)  $\varphi(x_1, x_2, x_3) = (x_1, 0, x_2, x_3).$

(2)  $\varphi(x_1, x_2, x_3) = x_1(1, 1, 1, 1) + x_2(4, 2, 1, 1) + x_3(3, 1, 0, 0)$   
 $= (x_1 + 4x_2 + 3x_3, x_1 + 2x_2 + x_3, x_1 + x_2, x_1 + x_2).$

(3) 记  $e_1 = (1, 1, 1), e_2 = (1, 2, 1), e_3 = (1, 1, 0)$ , 则

因为  $(x_1, x_2, x_3) = (x_1 - x_2 + x_3)e_1 + (x_2 - x_1)e_2 + (x_1 - x_3)e_3$ ,

所以  $\varphi(x_1, x_2, x_3) = (x_1 - x_2 + x_3)\varphi(e_1) + (x_2 - x_1)\varphi(e_2) + (x_1 - x_3)\varphi(e_3)$   
 $= (2x_1 - x_2, 2x_1 - x_2 + x_3, 2x_1 - x_2 + 2x_3, x_3).$

**24. 证明如下映射是线性映射, 并求出其核与象:**

(1)  $\varphi: \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^1, (x, y) \rightarrow x;$

(2)  $\varphi: \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^1, (x, y) \rightarrow x - y;$

(3)  $\varphi: \mathbf{R}^{(2)} \rightarrow \mathbf{R}^{(3)}, (x, y)^T \rightarrow (x + y, x - y, 2x + 3y)^T;$

(4) 设  $W$  是  $\mathbf{R}^{(3)}$  中点  $(x_1, y_1, z_1)$  和  $(x_2, y_2, z_2)$  决定的过原点  $(0, 0, 0)$  的平面, 对任一

点  $\alpha = (x, y, z)$ , 记过  $\alpha$  而平行  $W$  的平面交  $X$  轴于  $\bar{\alpha} \in \mathbf{R}$ , 作映射  $\varphi: \mathbf{R}^{(3)} \rightarrow \mathbf{R}, \alpha \rightarrow \bar{\alpha}$ .

解 (1) 任  $(x_1, y_1), (x_2, y_2) \in \mathbf{R}^2, \lambda \in \mathbf{R}$ , 有

$$\varphi((x_1, y_1) + (x_2, y_2)) = \varphi(x_1 + x_2, y_1 + y_2) = x_1 + x_2 = \varphi(x_1, y_1) + \varphi(x_2, y_2),$$

$$\varphi(\lambda(x_1, y_1)) = \varphi(\lambda x_1, \lambda y_1) = \lambda x_1 = \lambda \varphi(x_1, y_1).$$

所以  $\varphi$  是线性映射.

$$\ker \varphi = \{(0, y) \mid y \in \mathbf{R}\}, \operatorname{Im} \varphi = \mathbf{R}, \text{是满射}.$$

(2)  $\ker \varphi = \{(x, y) \mid y = x, x, y \in \mathbf{R}\}, \operatorname{Im} \varphi = \mathbf{R}$  是满射.

(3) 任  $(x_1, y_1)^T, (x_2, y_2)^T \in \mathbf{R}^{(2)}, \lambda \in \mathbf{R}$ , 有

$$\begin{aligned} \varphi((x_1, y_1) + (x_2, y_2)) &= \varphi(x_1 + x_2, y_1 + y_2) \\ &= (x_1 + x_2 + y_1 + y_2, x_1 + x_2 - y_1 - y_2, 2x_1 + 2x_2 + 3y_1 + 3y_2) \\ &= (x_1 + y_1, x_1 - y_1, 2x_1 + 3y_1) + (x_2 + y_2, x_2 - y_2, 2x_2 + 3y_2) \\ &= \varphi(x_1, y_1) + \varphi(x_2, y_2), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \varphi(\lambda(x_1, y_1)) &= \varphi(\lambda x_1, \lambda y_1) = (\lambda x_1 + \lambda y_1, \lambda x_1 - \lambda y_1, 2\lambda x_1 + 3\lambda y_1) \\ &= \lambda(x_1 + y_1, x_1 - y_1, 2x_1 + 3y_1) = \lambda \varphi(x_1, y_1). \end{aligned}$$

所以  $\varphi$  是线性映射.

$$\ker \varphi = \{0\}, \operatorname{Im} \varphi = \left\{ (a, b, c)^T \mid \frac{5}{2}a - \frac{1}{2}b = c \right\}.$$

(因要求  $x + y = a, x - y = b, 2x + y = c$ , 有解  $(x, y)$ ).

(4) 设  $X$  轴不在  $W$  上.  $\forall \alpha, \beta \in \mathbf{R}^3$ , 有  $\alpha = \bar{\alpha} + \alpha_1, \beta = \bar{\beta} + \beta_1$ , 其中  $\bar{\alpha}, \bar{\beta} \in \mathbf{R}(X \text{ 轴}), \alpha_1, \beta_1 \in W$ , 于是

$$\begin{aligned} \varphi(\alpha + \beta) &= \varphi(\bar{\alpha} + \alpha_1 + \bar{\beta} + \beta_1) = \varphi(\bar{\alpha} + \bar{\beta} + \alpha_1 + \beta_1) \\ &= \bar{\alpha} + \bar{\beta} = \varphi(\alpha) + \varphi(\beta) \\ \varphi(\lambda \alpha) &= \varphi(\lambda \bar{\alpha} + \lambda \alpha_1) = \lambda \bar{\alpha} = \lambda \varphi(\alpha), (\lambda \in \mathbf{R}) \end{aligned}$$

所以  $\varphi$  是线性映射.

$$\ker \varphi = W, \quad \operatorname{Im} \varphi = \mathbf{R}(X \text{ 轴}).$$

(以上, 把以原点为起点, 终点为  $(x, y, z)$  的向量分解为分别在  $X$  轴上和平面  $W$  上的两个向量之和).

25. 设  $W$  是  $V = \mathbf{R}^{(3)}$  中过原点  $(0, 0, 0)$  的一平面, 平行于  $W$  的平面全体记为  $\bar{V}_W$ , 对  $\pi_1, \pi_2 \in \bar{V}_W, k \in \mathbf{R}$ , 任取点  $\alpha_1 \in \pi_1, \alpha_2 \in \pi_2$ , 若  $\alpha_1 + \alpha_2 \in \pi_3, k\alpha_1 \in \pi_4$ , 则定义,  $\pi_1 + \pi_2 = \pi_3, k\pi_1 = \pi_4$ , 证明  $\bar{V}_W$  是  $\mathbf{R}$  上的线性空间. 再证明  $\bar{V}_W \cong \mathbf{R}^{(1)}$ , 并给出同构映射.

解 不妨设  $W$  与  $X$  轴只相交于  $(0, 0, 0)$ .

任  $\pi_i, \pi_j \in \bar{V}_W$ , 取  $\alpha_i \in \pi_i, \alpha_j \in \pi_j$ , 则

$$\pi_i = \alpha_i + W, \pi_j = \alpha_j + W,$$

且有

$$\pi_i + \pi_j = \alpha_i + W + \alpha_j + W = \alpha_i + \alpha_j + W = \pi_{ij} \in \bar{V}_W,$$

$$\lambda \pi_i = \lambda(\alpha_i + W) = \lambda \alpha_i + W = \pi_{\lambda i} \in \bar{V}_W,$$

所以  $\bar{V}_W$  对加法, 数乘封闭,  $0$  元是  $W$ , 每个元素的负元是这个平面关于  $W$  对称的另

一个平面,例如  $\pi_i = \alpha_i + W$  的负元为  $-\alpha_i + W$ . 易验证其他几条性质,所以  $\bar{V}_W$  是线性空间.

定义  $\varphi: \bar{V}_W \rightarrow \mathbf{R}$

$$\pi \mapsto (x, 0, 0)$$

其中  $(x, 0, 0)$  是平面  $\pi$  与  $X$  轴的交点. 又  $\pi_1 \neq \pi_2$  时, 有  $\varphi(\pi_1) \neq \varphi(\pi_2)$ , 所以是单射, 且易知  $\varphi$  是满射, 是线性映射, 所以  $\varphi$  是同构映射. 于是知  $\bar{V}_W \cong \mathbf{R}^{(1)}$ .

26. (1) 设  $\varphi: \mathbf{R}^{(3)} \rightarrow \mathbf{R}^{(1)}$  是一满线性映射, 证明  $W = \ker \varphi$  是过原点的平面.

(2) 证明: 任一  $x \in \mathbf{R}^{(1)}$  的原象  $\varphi^{-1}(x)$  是平行于  $W$  的平面.

解 (1) 因为  $\dim(\ker \varphi) = \dim(\mathbf{R}^{(3)}) - \dim(\text{Im} \varphi) = 2$ ,

所以  $\ker \varphi$  是  $\mathbf{R}^3$  中 2 维子空间, 因此它是过原点的平面.

(2) 由于任  $x \in \mathbf{R}^{(1)}$ , 设  $\alpha_0$  为其一个原像 (即有  $\varphi(\alpha_0) = x$ ), 则  $x$  的原像的全体为

$$\varphi^{-1}(x) = \alpha_0 + \ker \varphi = \{\alpha_0 + \alpha \mid \alpha \in \ker \varphi\},$$

所以是平行  $W$  的平面.

27. 在  $\mathbf{R}^4$  中, 求由基  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$  到基  $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$  的过渡矩阵, 并求向量  $x$  在指定基下的坐标:

$$(1) \alpha_1 = (1, 1, 1, 1), \alpha_2 = (1, 1, -1, -1),$$

$$\alpha_3 = (1, -1, 1, -1), \alpha_4 = (1, -1, -1, 1);$$

$$\beta_1 = (1, 2, -1, -2), \beta_2 = (2, 3, 0, -1), \beta_3 = (1, 2, 1, 4), \beta_4 = (1, 3, -1, 0);$$

并求  $x = (7, 14, -1, 2)$  在基  $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$  下的坐标.

解 由过渡矩阵的定义, 有以下形式写法

$$(\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)A,$$

其中  $A$  的第  $j$  列是  $\beta_j$  在  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$  下的坐标. 把两组基用坐标列写出, 即得

$$(\beta_1^T, \beta_2^T, \beta_3^T, \beta_4^T) = (\alpha_1^T, \alpha_2^T, \alpha_3^T, \alpha_4^T)A,$$

于是

$$\begin{aligned} A &= (\alpha_1^T, \alpha_2^T, \alpha_3^T, \alpha_4^T)^{-1} (\beta_1^T, \beta_2^T, \beta_3^T, \beta_4^T) \\ &= \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 2 & 3 \\ -1 & 0 & 1 & -1 \\ -2 & -1 & 4 & 0 \end{bmatrix} = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 0 & 4 & 8 & 3 \\ 6 & 6 & -2 & 5 \\ 0 & 0 & -4 & -3 \\ -2 & -2 & 2 & -1 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

又从自然基  $\epsilon_1 = (1, 0, 0, 0), \dots, \epsilon_4 = (0, 0, 0, 1)$  到基  $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$  的过渡矩阵为

$$B = (\beta_1^T, \beta_2^T, \beta_3^T, \beta_4^T),$$

向量  $x$  在自然基下的坐标列为  $x^T$ , 于是  $x$  在基  $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$  下的坐标列为:

$$y = B^{-1}x^T = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 2 & 3 \\ -1 & 0 & 1 & -1 \\ -2 & -1 & 4 & 0 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 7 \\ 14 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

$$(2) \alpha_1 = (0, 0, 1, 0), \alpha_2 = (0, 0, 0, 1), \alpha_3 = (1, 0, 0, 0), \alpha_4 = (0, 1, 0, 0);$$

$$\beta_1 = (1, 0, -1, 0), \beta_2 = (-1, 0, -1, 0), \beta_3 = (0, 1, 0, -1), \beta_4 = (0, -1, 0, -1);$$

并求  $x=(1,4,-3,2)$  在  $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$  下的坐标.

解 设  $A$  是由基  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$  到基  $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$  的过渡矩阵, 则有

$$A = (\alpha_1^T, \alpha_2^T, \alpha_3^T, \alpha_4^T)^{-1} (\beta_1^T, \beta_2^T, \beta_3^T, \beta_4^T)$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

向量  $x$  在基  $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$  下的坐标为:

$$y = B^{-1}x^T = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \\ -3 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \\ -3 \end{bmatrix}.$$

其中矩阵  $B$  是由自然基到基  $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$  的过渡矩阵.

(3)  $\alpha_1=(1,1,1,1), \alpha_2=(1,2,1,1), \alpha_3=(1,1,2,1), \alpha_4=(1,3,2,3);$

$\beta_1=(1,0,3,3), \beta_2=(-2,-3,-5,-4),$

$\beta_3=(2,2,5,4), \beta_4=(-2,-3,-4,-4);$

并求  $x=(0,-3,0,-2)$  在  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$  下的坐标.

解 记由基  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$  到基  $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$  的过渡矩阵为  $A$ , 由自然基到基  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$  的过渡矩阵为  $B$ , 则有

$$A = (\alpha_1^T, \alpha_2^T, \alpha_3^T, \alpha_4^T)^{-1} (\beta_1^T, \beta_2^T, \beta_3^T, \beta_4^T).$$

$$= \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 4 & -2 & -2 & 2 \\ 0 & 2 & 0 & -2 \\ -1 & 0 & 2 & -1 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -2 & 2 & -2 \\ 0 & -3 & 2 & -3 \\ 3 & -5 & 5 & -4 \\ 3 & -4 & 4 & -4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 & -1 \\ -3 & 1 & -2 & 1 \\ 1 & -2 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \end{bmatrix}.$$

向量  $x$  在基  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$  下的坐标列为

$$y = B^{-1}x^T = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 4 & -2 & -2 & 2 \\ 0 & 2 & 0 & -2 \\ -1 & 0 & 2 & -1 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ -3 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

28. 设  $P_n$  是  $F$  上次数不超过  $n$  的多项式全体, 求由基  $\alpha_1=1, \alpha_2=x, \dots, \alpha_{n+1}=x^n$  到基  $\beta_1=1, \beta_2=(x-a), \dots, \beta_{n+1}=(x-a)^n$  的过渡矩阵, 并求多项式  $f(x)=a_0+a_1x+\dots+a_nx^n$  在这两组基下的坐标.

解 记所求过渡矩阵为  $A$ , 由定义  $A$  的第  $j$  列是  $\beta_j=(x-a)^{j-1}$  在基  $1, x, \dots, x^n$  下的坐标, 故知

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -a & a^2 & \cdots & (-1)^n a^n \\ 0 & 1 & -2a & & (-1)^{n-1} n a^{n-1} \\ \vdots & \ddots & 1 & & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

又  $f(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n$  在基  $1, x, \cdots, x^n$  下的坐标列为其系数排成的列向量  $(a_0, a_1, a_2, \cdots, a_n)^T$ ; 在基  $1, (x-a), (x-a)^2, \cdots, (x-a)^n$  下的坐标列为其 Taylor 展开系数排成的列向量, 即

$$\left(f(a), f'(a), \frac{f''(a)}{2!}, \cdots, \frac{1}{n!}f^{(n)}(a)\right)^T.$$

29. 求由向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  和  $\beta_1, \beta_2, \beta_3$  所张成的两个线性子空间的和与交的基.

(1)  $\alpha_1 = (1, 2, 1), \alpha_2 = (1, 1, -1), \alpha_3 = (1, 3, 3);$

$\beta_1 = (2, 3, -1), \beta_2 = (1, 2, 2), \beta_3 = (1, 1, -3);$

解 记  $W_1 = \langle \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \rangle, W_2 = \langle \beta_1, \beta_2, \beta_3 \rangle$ , 则

$$W_1 + W_2 = \langle \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1, \beta_2, \beta_3 \rangle,$$

因为  $W_1 + W_2$  的基就是向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1, \beta_2, \beta_3$  的极大线性无关组, 为求极大线性无关组, 只需把这 6 个向量的坐标列排成  $3 \times 6$  矩阵, 并对该矩阵进行初等行变换化为阶梯型:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 3 & 3 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 3 & -1 & 2 & -3 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & -2 \end{bmatrix}, \quad (*)$$

由于阶梯型矩阵的 1, 2, 4 列线性无关, 所以  $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1$  是  $W_1 + W_2$  的一组基;

又任  $\alpha \in W_1 \cap W_2$ , 有

$$\alpha = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3 = \mu_1\beta_1 + \mu_2\beta_2 + \mu_3\beta_3,$$

而由 (\*) 式知  $\alpha_3$  可由  $\alpha_1, \alpha_2$  线性表出,  $\beta_3$  可由  $\beta_1, \beta_2$  线性表出, 所以可取  $k_3 = \mu_3 = 0$ , 即只要解线性方程组

$$(\alpha_1^T, \alpha_2^T, \beta_1^T, \beta_2^T) \begin{bmatrix} k_1 \\ k_2 \\ -\mu_1 \\ -\mu_2 \end{bmatrix} = 0,$$

利用 (\*) 式(划去第 4, 6 列)易知解为

$$c(2, 1, -1, -1)^T, c \in \mathbf{R}$$

所以  $W_1 \cap W_2$  是 1 维的, 基为

$$2\alpha_1 + \alpha_2 = \beta_1 + \beta_2 = (3, 5, 1).$$

(2)  $\alpha_1 = (1, 2, 1, -2), \alpha_2 = (2, 3, 1, 0), \alpha_3 = (1, 2, 2, -3);$

$\beta_1 = (1, 1, 1, 1), \beta_2 = (1, 0, 1, -1), \beta_3 = (1, 3, 0, -4);$

解 同(1)有  $W_1 + W_2 = \langle \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1, \beta_2, \beta_3 \rangle$ , 由于

$$(\alpha_1^T, \alpha_2^T, \alpha_3^T, \beta_1^T, \beta_2^T, \beta_3^T) = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 2 & 1 & 0 & 3 \\ 1 & 1 & 2 & 1 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & -3 & 1 & -1 & -4 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & -1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -5 & 0 \end{bmatrix},$$

故知  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_2$  是  $W_1 + W_2$  的一组基;

为求  $W_1 \cap W_2$  的基, 需解线性方程组

$$(\alpha_1^T, \alpha_2^T, \alpha_3^T, \beta_1^T, \beta_2^T, \beta_3^T) \begin{bmatrix} k_1 \\ k_2 \\ k_3 \\ -\mu_1 \\ -\mu_2 \\ -\mu_3 \end{bmatrix} = 0,$$

其基础解系为

$$\eta_1 = (2, -1, -1, 1, 0, 0)^T, \quad \eta_2 = (-5, 1, 2, 0, 0, 1)^T,$$

于是得  $\dim W_1 \cap W_2 = 2$ , 其基为

$$e_1 = 2\alpha_1 - \alpha_2 - \alpha_3 = -\beta_1 = (-1, -1, -1, -1),$$

$$e_2 = -5\alpha_1 + \alpha_2 + 2\alpha_3 = -\beta_3 = (-1, -3, 0, 4).$$

也就是  $\beta_1, \beta_3$  为  $W_1 \cap W_2$  的基.

$$(3) \alpha_1 = (1, 1, 0, 0), \alpha_2 = (0, 1, 1, 0), \alpha_3 = (0, 0, 1, 1);$$

$$\beta_1 = (1, 0, 1, 0), \beta_2 = (0, 2, 1, 1), \beta_3 = (1, 2, 1, 2).$$

解 因为  $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow[\text{行变换}]{\text{经初等}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & 2 & 2 \end{bmatrix},$

所以  $W_1 + W_2 = \langle \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1, \beta_2, \beta_3 \rangle$  的基是  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1$ . (不唯一).

又线性方程组

$$(\alpha_1^T, \alpha_2^T, \alpha_3^T, \beta_1^T, \beta_2^T, \beta_3^T) \begin{bmatrix} k_1 \\ k_2 \\ k_3 \\ -\mu_1 \\ -\mu_2 \\ -\mu_3 \end{bmatrix} = 0$$

的基础解系为

$$\eta_1 = (1, 1, 1, -1, -1, 0)^T, \quad \eta_2 = (2, 0, 1, -1, 0, -1)^T$$

所以  $\dim W_1 \cap W_2 = 2$ ,  $e_1, e_2$  是  $W_1 \cap W_2$  的一组基, 其中

$$e_1 = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = \beta_1 + \beta_2 = (1, 2, 2, 1),$$

$$e_2 = 2\alpha_1 + 2\alpha_3 = \beta_1 + \beta_3 = (2, 2, 2, 2).$$

**30. 证明:** 线性子空间  $L_1$  和  $L_2$  的和  $S$  是直和当且仅当至少有一个向量  $x \in S$  唯一地表示为形式  $x = x_1 + x_2$ , 其中  $x_1 \in L_1, x_2 \in L_2$ .

**证**  $\Rightarrow$  (必要性) 由于  $S = L_1 \oplus L_2$  是直和, 所以  $\forall x \in S$  关于  $L_1, L_2$  的分解式是唯一的, 故至少有一个  $x$  表示式唯一.



⇐(充分性)若存在一个  $x$ , 表示式  $x = x_1 + x_2, x_1 \in L_1, x_2 \in L_2$  唯一, 要证  $S = L_1 + L_2$  是直和. 用反证法, 若不是直和, 由定理 5.4 知, 有非零向量  $\alpha \in L_1 \cap L_2$ , 又因为  $L_1 \cap L_2$  为子空间, 所以  $-\alpha \in L_1 \cap L_2$ , 于是有

$$x = x_1 + x_2 = (x_1 + \alpha) + (x_2 - \alpha), \quad x_1 + \alpha \in L_1, x_2 - \alpha \in L_2$$

与已知  $x$  的分解式唯一矛盾, 所以必  $L_1 \cap L_2 = 0$ , 故必为直和.

**31. 证明:** 所有  $n$  阶方阵空间是线性子空间  $L_1$  和  $L_2$  的直和, 其中  $L_1$  是对称方阵子空间,  $L_2$  是斜对称方阵子空间.

**证** 方法 1 记  $M_n(F)$  是  $n$  阶方阵空间, 任  $A \in M_n(F)$ , 有

$$A = \frac{1}{2}(A + A^T) + \frac{1}{2}(A - A^T) = B + C,$$

其中  $B \in L_1, C \in L_2$ , 又显然  $L_1 + L_2 \subseteq M_n(F)$

所以  $M_n(F) = L_1 + L_2$ , 且  $L_1 \cap L_2 = 0$

(若  $M \in L_1 \cap L_2$ , 有  $M^T = M, M^T = -M$ , 故  $M = -M$ , 所以  $M = 0$ )

故得  $M_n(F) = L_1 \oplus L_2$ .

方法 2 因为  $L_1 \subset M_n(F), L_2 \subset M_n(F)$ , 所以  $L_1 + L_2 \subseteq M_n(F)$ . 又因为  $L_1 \cap L_2 = 0$ , 所以  $L_1 + L_2$  是直和.

用  $E_{ij}$  记  $(i, j)$  位元素为 1, 其余元素为 0 的  $n$  阶方阵, 则由于

$\{(E_{ij} + E_{ji}), E_{ii}\}, 1 \leq i < j \leq n$  是  $L_1$  的基,

$\{(E_{ij} - E_{ji}), 1 \leq i < j \leq n$  是  $L_2$  的基.

知有  $\dim L_1 = \frac{1}{2}n(n+1), \dim L_2 = \frac{1}{2}n(n-1),$

所以  $\dim L_1 + \dim L_2 = n^2 = \dim M_n(F)$

故  $M_n(F) = L_1 \oplus L_2$ .

**32. 证明:** 每一个  $n$  维线性空间都可以表示成  $n$  个一维子空间的直和.

**证** 设  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$  是  $V_n(F)$  的一组基, 则

$$V_n(F) = \langle \alpha_1, \dots, \alpha_n \rangle = \langle \alpha_1 \rangle + \langle \alpha_2 \rangle + \dots + \langle \alpha_n \rangle,$$

其中  $\langle \alpha_i \rangle, i = 1, 2, \dots, n$ , 均是一维子空间, 又任  $\alpha \in V_n(F)$  有

$$\alpha = a_1 \alpha_1 + a_2 \alpha_2 + \dots + a_n \alpha_n, \quad \text{其中 } a_i \alpha_i \in \langle \alpha_i \rangle$$

由于坐标  $a_1, a_2, \dots, a_n$  唯一, 所以  $a_i \alpha_i$  唯一, 即  $\alpha$  关于子空间  $\langle \alpha_1 \rangle, \langle \alpha_2 \rangle, \dots, \langle \alpha_n \rangle$  的分解式唯一,

所以  $V_n(F) = \langle \alpha_1 \rangle \oplus \langle \alpha_2 \rangle \oplus \dots \oplus \langle \alpha_n \rangle$ .

**33. 证明:** 和  $\sum_{i=1}^s V_i$  是直和的充分必要条件是

$$V_i \cap \sum_{j=1}^{i-1} V_j = \{0\}, (i = 2, \dots, s).$$

**证** 方法 1 (归纳法)  $s=2$  时, 显然成立(定理 5.4), 假设  $s-1$  个子空间时命题成立, 则当  $s$  个子空间时, 由和  $\sum_{i=1}^s V_i$  为直和  $\Leftrightarrow V_s + \sum_{i=1}^{s-1} V_i$  为直和

$$\Leftrightarrow V_s \cap \sum_{i=1}^{s-1} V_i = \{0\}, \text{ 及 } V_i \cap \sum_{j=1}^{i-1} V_j = \{0\}, (i=2, \dots, s-1)$$

(由归纳假设,  $\sum_{i=1}^{s-1} V_i$  是直和  $\Leftrightarrow V_i \cap \sum_{j=1}^{i-1} V_j = \{0\}, i=2, \dots, s-1$ ), 得证.

方法 2  $\Rightarrow$  若有  $i$ , 使得  $(V_1 + \dots + V_{i-1}) \cap V_i \neq (0)$ , 则必  $\exists \alpha \neq 0$ , 使  $\alpha, -\alpha \in V_i$ , 且  $\alpha, -\alpha \in V_1 + \dots + V_{i-1}$ . 设  $\alpha$  有分解式:

$$\alpha = \alpha_1 + \dots + \alpha_{i-1}, \text{ 其中 } \alpha_k \in V_k, (k=1, \dots, i-1),$$

则  $\alpha_k$  不全为 0, 于是有

$$0 = \alpha_1 + \dots + \alpha_{i-1} + (-\alpha) = 0 + \dots + 0$$

即零向量的分解不唯一, 与已知  $\sum_{i=1}^s V_i$  为直和矛盾, 所以必有

$$V_i \cap \sum_{j=1}^{i-1} V_j = \{0\}.$$

$\Leftarrow$  如果  $\sum_{i=1}^s V_i$  不是直和, 则零向量表示不唯一,

$$0 = 0 + \dots + 0 = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_s,$$

其中  $\alpha_i$  不全为零. 设从后往前数第一个非零的为  $\alpha_t$ , 则有

$$\alpha_t = -(\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_{t-1}),$$

又  $\alpha_1, \dots, \alpha_{t-1}$  不能全为 0, (否则  $\alpha_t$  为零), 而  $\alpha_t \in V_t, -(\alpha_1 + \dots + \alpha_{t-1}) \in \sum_{j=1}^{t-1} V_j$ ,

于是得  $V_t \cap \sum_{j=1}^{t-1} V_j \neq \{0\}$

与已知矛盾, 所以必有  $\sum_{i=1}^s V_i$  是直和.

34. 令  $V$  是  $X$  的次数  $\leq n (n \geq 1)$  的实系数多项式全体所构成的线性空间.

(1) 证明:  $V$  中有给定实根  $c$  的全体多项式的集合  $L$  是  $V$  的一个子空间;

(2) 求  $L$  的维数;

(3) 对  $V$  中有  $k$  个不同实根  $c_1, \dots, c_k$  (不计重数) 的全体多项式的集合  $L_k (1 \leq k \leq n)$ , 证明同样的问题.

证 (1)  $L$  中加法封闭:  $\forall f, g \in L, f+g \in L$ .

事实上, 由

$$\left. \begin{array}{l} f(c) = 0 \\ g(c) = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow (f+g)(c) = 0;$$

数乘封闭:  $\forall \lambda \in \mathbf{R}, f \in L$ , 由  $f(c) = 0 \Rightarrow \lambda f(c) = 0$

所以  $L$  是子空间.

(2) 作映射

$$\begin{aligned} \varphi: V &\rightarrow \mathbf{R} \\ f &\mapsto f(c) \end{aligned}$$

则

$$\ker \varphi = L, \quad \text{Im} \varphi = \mathbf{R},$$

所以  $\dim L = \dim V - \dim \mathbf{R} = (n+1) - 1 = n$ .

(3)  $L_k$  对加法封闭:任  $f, g \in L_k$  有  $f+g \in L_k$ , 因为对  $i=1, \dots, k$  均有

$$\text{由 } \left. \begin{array}{l} f(c_i) = 0 \\ g(c_i) = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow (f+g)(c_i) = 0;$$

对数乘封闭:任  $\lambda \in \mathbf{R}, f \in L_k$  均有  $\lambda f \in L_k$  即  $\lambda f(c_i) = 0$ ,

所以  $L_k$  是子空间.

下面用归纳法证明

$$\dim(L_k) = n+1-k.$$

$k=1$  时, (2) 中已证. 设  $k$  时成立, 则当  $k+1$  时, 令

$$\begin{aligned} \varphi_{k+1}: L_k &\rightarrow \mathbf{R} \\ f &\mapsto f(c_{k+1}) \end{aligned}$$

则

$$\ker \varphi_{k+1} = L_{k+1}, \quad \text{Im} \varphi_{k+1} = \mathbf{R},$$

所以

$$\begin{aligned} \dim(L_{k+1}) &= \dim L_k - \dim \mathbf{R} = (n+1-k) - 1 \\ &= (n+1) - (k+1). \end{aligned}$$

35. 设  $X^2+1$  的倍式全体为  $\langle X^2+1 \rangle = \{(X^2+1)g(X) \mid g(X) \in \mathbf{R}[X]\}$ , 这是  $\mathbf{R}[X]$  的一个子空间.

(1) 描述商空间  $E = \mathbf{R}[X] / \langle X^2+1 \rangle$ , 证明  $E$  是  $\mathbf{R}$  上的二维线性空间,  $\{\bar{1}, \bar{X}\}$  为其一基, 其中  $\overline{h(X)}$  表示  $h(X)$  代表的同余类, 即  $\overline{h(X)} = h(X) + \langle X^2+1 \rangle$ .

证 对任一  $f(X) \in \mathbf{R}[X]$ , 设  $f(X) = (X^2+1)q(X) + r(X)$ , 其中  $r(X) = a_0 + a_1X$ , 则

$$\overline{f(X)} = \overline{(X^2+1)q(X)} + \overline{r(X)} = \overline{r(X)} = \bar{a}_0 + \bar{a}_1\bar{X}.$$

现在证明  $\varphi: \mathbf{R} \rightarrow \bar{\mathbf{R}}, a \mapsto \bar{a}$  是同构映射(符号如本题(3)): 若  $\bar{a} = \bar{b}$ , 则  $\overline{a-b} = \bar{a} - \bar{b} = \bar{0}$ ,  $a-b \in \langle X^2+1 \rangle$  (即是  $X^2+1$  的倍式), 故  $a-b=0, a=b$ , 这说明  $\varphi$  是单射, 又显然是满射, 从而是双射. 再由

$$\overline{a_1 + a_2} = \bar{a}_1 + \bar{a}_2, \quad \overline{a_1 a_2} = \bar{a}_1 \bar{a}_2,$$

即知  $\varphi$  是同构映射. 所以可将  $\bar{\mathbf{R}}$  和  $\mathbf{R}$  等同, 将  $\bar{a} \in \bar{\mathbf{R}}$  与  $a \in \mathbf{R}$  等同. 于是上述

$$\overline{f(X)} = a_0 + a_1\bar{X}.$$

故

$$E = \{a_0 + a_1\bar{X} \mid a_0, a_1 \in \mathbf{R}\},$$

而且  $a_0 + a_1\bar{X} = b_0 + b_1\bar{X}$  当且仅当  $a_0 = b_0, a_1 = b_1$ . (若  $a_0 \neq b_0$ , 或  $a_1 \neq b_1$ , 则  $(a_0 + a_1\bar{X}) - (b_0 + b_1\bar{X}) = (a_0 - b_0) + (a_1 - b_1)\bar{X} = \overline{(a_0 - b_0) + (a_1 - b_1)X} \neq \bar{0}$ , 因为  $(a_0 - b_0) + (a_1 - b_1)X$  不是  $X^2+1$  的倍式).

所以  $E$  是  $\mathbf{R}$  上二维线性空间,  $\{\bar{1}, \bar{X}\}$  是基.

(2) 在  $E$  中定义乘法  $\bar{a}_1 \bar{a}_2 = \overline{a_1 a_2}$ , 证明  $E$  是一个域, 求  $2 \cdot \bar{1} + 3\bar{X}$  的逆.

证 显然  $E$  是一个含么交换环, 对其中任一非 0 元  $\bar{r} = a_0 + a_1\bar{X}$ , 显然  $r = a_0 + a_1X$  与  $X^2+1$  互素, 故存在  $u, v \in \mathbf{R}[X]$  使  $ur + v(X^2+1) = 1, \overline{ur} + \overline{v(X^2+1)} = \bar{1}$ , 即  $\overline{ur} = 1$ , 即知

$\bar{r}$  可逆且  $\bar{r}^{-1} = \bar{u}$ . 对  $r = 2 + 3X$ , 由带余除法知

$$(X^2 + 1) - \left(\frac{1}{3}X - \frac{2}{9}\right)(3X + 2) = \frac{13}{9},$$

于是有 Bezout 等式

$$\frac{9}{13}(X^2 + 1) + \frac{1}{13}(2 - 3X)(3X + 2) = 1$$

故  $\bar{r} = 2 + 3\bar{X}$  的逆为  $\frac{2}{13} - \frac{3}{13}\bar{X}$ .

(3) 证明  $\varphi: \mathbf{R} \rightarrow \bar{\mathbf{R}}, a \mapsto \bar{a}$  是域的同构映射 (即  $\varphi$  为双射且  $\varphi(a_1 + a_2) = \varphi(a_1) + \varphi(a_2)$ ,  $\varphi(a_1 a_2) = \varphi(a_1)\varphi(a_2)$ , 其中  $\mathbf{R} = \{\bar{a} | a \in \mathbf{R}\}$ ). 于是  $\mathbf{R}$  与  $\bar{\mathbf{R}}$  可视为等同, 从而  $E \supset \mathbf{R}$  是  $\mathbf{R}$  的扩域.

证 见(1)中证明.

(4) 证明  $\bar{X} \in E$  是  $X^2 + 1$  在  $E$  中的根, 因此若记  $\bar{X} = i$ , 可知  $i^2 = -1$ .

证 因为  $\bar{X}^2 + 1 = \overline{X^2 + 1} = \bar{0} = 0$ , 故  $\bar{X} \in E$  是  $X^2 + 1$  的根.

\* 36. 设  $p(X)$  为域  $F$  上  $n$  次不可约多项式, 记  $\langle p(X) \rangle = \{p(X)g(X) | g(X) \in F[X]\}$ , 称为  $p(X)$  的倍式全体. 证明  $\langle p(X) \rangle$  是  $F[X]$  的子空间.

(1) 描述商空间  $E = F[X]/\langle p(X) \rangle$ , 求其维数、基.

(2) 适当定义乘法使  $E$  成为域, 如何求  $E$  中一个非 0 元的逆?

(3) 证明  $\varphi: F \rightarrow \bar{F}, a \mapsto \bar{a}$  是域的同构映射 (定义见上题(3)), 其中  $\bar{F} = \{\bar{a} | a \in F\}$ , 因此  $F$  与  $\bar{F}$  可视为等同,  $E \supset F$ .

(4) 证明  $E$  中有  $p(X)$  的至少一个根.

(5) 如果上述  $p(X)$  代之以可约多项式  $f(X)$ , 情况有何不同, 为什么?

证 因  $p(X) \in \langle p(X) \rangle$ ; 且对任  $p_1, p_2 \in \langle p(X) \rangle$ ,  $\exists g_1, g_2 \in F[X]$ , 使  $p_1 = p(X)g_1, p_2 = p(X)g_2$ , 于是有

$$p_1(X) + p_2(X) = p(X)(g_1 + g_2) \in \langle p(X) \rangle,$$

及任  $\lambda \in F, \lambda p_1(X) = p(X)(\lambda g_1) \in \langle p(X) \rangle$ . 所以  $\langle p(X) \rangle$  非空, 对加法和数乘运算封闭, 故是  $F[X]$  的子空间.

(1) 对任一  $f(X) \in F[X]$ , 设  $f(X) = p(X)q(X) + r(X)$ , 其中  $r(X) = a_0 + a_1X + \cdots + a_{n-1}X^{n-1}$ . 则

$$\overline{f(X)} = \overline{a_0 + \cdots + a_{n-1}X^{n-1}} = \bar{a}_0 + \bar{a}_1\bar{X} + \cdots + \bar{a}_{n-1}\bar{X}^{n-1}.$$

如同 35 题(1)中证明,  $\bar{F} = \{\bar{a} | a \in F\}$  与  $F$  同构, 故可将  $\bar{F}$  与  $F$  等同, 将  $\bar{a}$  与  $a$  等同. 故

$$\overline{f(X)} = a_0 + a_1\bar{X} + \cdots + a_{n-1}\bar{X}^{n-1}.$$

于是

$$E = \{a_0 + a_1\bar{X} + \cdots + a_{n-1}\bar{X}^{n-1} | a_i \in F, 0 \leq i \leq n-1\},$$

而且  $a_0 + \cdots + a_{n-1}\bar{X}^{n-1} = b_0 + \cdots + b_{n-1}\bar{X}^{n-1}$  当且仅当  $a_i = b_i (0 \leq i \leq n-1)$ . (若存在  $a_i \neq b_i$ , 则  $(a_0 + \cdots + a_{n-1}\bar{X}^{n-1}) - (b_0 + \cdots + b_{n-1}\bar{X}^{n-1}) = (a_0 - b_0) + \cdots + (a_{n-1} - b_{n-1})\bar{X}^{n-1} = \overline{(a_0 - b_0) + \cdots + (a_{n-1} - b_{n-1})X^{n-1}} \neq \bar{0}$ , 因为  $(a_0 - b_0) + \cdots + (a_{n-1} - b_{n-1})X^{n-1}$  不是

$p(X)$ 的倍式). 这说明  $E$  是  $\mathbf{R}$  上的  $n$  维线性空间,  $\{1, \bar{X}, \dots, \bar{X}^{n-1}\}$  是一个基.

(2) 在  $E$  中定义乘法:  $\bar{f}_1 \bar{f}_2 = \overline{f_1 f_2}$  ( $\bar{f}_i \in E$ ), 则显然  $E$  是一个交换环, 对其中任一非 0 元  $\bar{f} = \bar{r} = a_0 + a_1 \bar{X} + \dots + a_{n-1} \bar{X}^{n-1}$ , 记  $r = a_0 + a_1 X + \dots + a_{n-1} X^{n-1}$ , 则  $r$  与  $p(X)$  互素, 故存在  $u, v \in F[X]$ , 使

$$ur + vp = 1.$$

故  $\bar{u}\bar{r} + \bar{v}\bar{p} = \bar{1}$ , 即  $\bar{u}\bar{r} = \bar{1}$ . 故  $\bar{r}$  可逆且  $\bar{r}^{-1} = \bar{u}$ .

(3) 在(1)中已证.

(4) 记  $\alpha = \bar{X} \in E$ , 则  $p(\alpha) = p(\bar{X}) = \overline{p(X)} = \bar{0} = 0$ , 故  $\alpha$  是  $p(X)$  在  $E$  中的一个根.

(5) 当  $p(X) = g(X)$  为可约时, 则  $E$  不是一个域. 理由如下:

设  $g(X) = g_1(X)g_2(X)$ ,  $g_i(X)$  不是常数. 则  $\bar{0} = \overline{g(X)} = \overline{g_1(X)} \overline{g_2(X)}$ . 注意  $\overline{g_i(X)}$  是  $E$  中非 0 元(因为  $g_i(X)$  不可能是  $g(X)$  的倍). 所以非零元  $\overline{g_i(X)}$  是零因子(所以不可能有逆存在, 否则, 若  $\overline{g_1(X)}^{-1} = \bar{h(X)}$ . 则由  $\bar{0} = \overline{g_1(X)} \overline{g_2(X)}$ , 可知,  $\bar{0} = \bar{h(X)} \cdot \bar{0} = \bar{h(X)} \overline{g_1(X)} \cdot \overline{g_2(X)} = \overline{g_2(X)}$ , 不可能), 故  $E$  不是域.

## 5.4 补充题与解答

$$1. \text{ 已知 } W_1 = \left\{ \begin{bmatrix} a & 0 & b \\ c & 0 & b \\ 0 & c & d \end{bmatrix} \mid a, b, c, d \in \mathbf{R} \right\}, W_2 = \left\{ \begin{bmatrix} x & 0 & y \\ 0 & z & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \mid x, y, z \in \mathbf{R} \right\},$$

求  $W_1 + W_2$ ,  $W_1 \cap W_2$  的维数和基.

解 记  $E_{ij}$  为  $(i, j)$  位元素为 1, 而其余元素均为 0 的 3 阶方阵. 则

$$\begin{aligned} W_1 &= a \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} + b \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} + c \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} + d \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &= aE_{11} + b(E_{13} + E_{23}) + c(E_{21} + E_{32}) + dE_{33}. \end{aligned}$$

因  $E_{11}, E_{13} + E_{23}, E_{21} + E_{32}, E_{33}$  线性无关, 所以  $\dim W_1 = 4$ .

而

$$W_2 = xE_{11} + yE_{13} + zE_{22},$$

所以

$$\dim W_2 = 3.$$

又

$$\begin{aligned} W_1 + W_2 &= L(E_{11}, E_{13} + E_{23}, E_{21} + E_{32}, E_{33}, E_{11}, E_{13}, E_{22}) \\ &= L(E_{11}, E_{13}, E_{21} + E_{32}, E_{22}, E_{23}, E_{33}) \end{aligned}$$

所以  $\dim(W_1 + W_2) = 6$ , 上式中 6 个生成元就是它的一组基. 于是

$$\dim W_1 \cap W_2 = 4 + 3 - 6 = 1, \text{ 易知 } E_{11} \text{ 为 } W_1 \cap W_2 \text{ 的基.}$$

2. 设  $W_1$  是齐次线性方程组  $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_2 - x_3 = 0 \end{cases}$  的解空间, 求商空间  $\mathbf{R}^{(3)} / W_1$  的维数和基.

解 求解已知的齐次线性方程组,得

$$W_1 = \{k(-2, 1, 1)^T\}, \quad k \in \mathbf{R},$$

于是  $(-2, 1, 1)^T$  是  $W_1$  的基, 把它扩充为  $\mathbf{R}^{(3)}$  的基

$$(-2, 1, 1)^T, (0, 1, 0)^T, (0, 0, 1)^T,$$

由此知  $\mathbf{R}^3/W_1$  的基为

$$(0, 1, 0)^T + W_1, (0, 0, 1)^T + W_2.$$

所以

$$\dim \mathbf{R}^{(3)}/W_1 = 2.$$

3. 设

$$e_{11} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, e_{12} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, e_{13} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, e_{14} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix},$$

$$g_{21} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, g_{22} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, g_{23} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, g_{24} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

(1) 证明  $\{e_{1i}\}, \{g_{2j}\}$  都是  $M_2(\mathbf{R})$  的基; (2) 求由基  $\{e_{1i}\}$  到基  $\{g_{2j}\}$  的过渡矩阵; (3) 求方阵  $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}$  在两组基下的坐标.

解 (1) 记  $(e_{11}, e_{12}, e_{13}, e_{14}) = (E_{11}, E_{12}, E_{13}, E_{14})B,$

$$(g_{21}, g_{22}, g_{23}, g_{24}) = (E_{11}, E_{12}, E_{13}, E_{14})C,$$

则因为

$$\det B = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} \neq 0, \det C = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$$

知  $\{e_{1i}\}, \{g_{2j}\}$  是两组线性无关的向量, 所以均是  $M_2(\mathbf{R})$  的基.

(2) 设由基  $\{e_{1i}\}$  到基  $\{g_{2j}\}$  的过渡矩阵为  $D$ , 则有形式写法

$$(g_{21}, g_{22}, g_{23}, g_{24}) = (e_{11}, e_{12}, e_{13}, e_{14})D,$$

把两组基在自然基  $E_{11}, E_{12}, E_{13}, E_{14}$  下的坐标列代入上式有:

$$C = BD. \quad \text{所以 } D = B^{-1}C.$$

以下用初等变换法求  $B^{-1}C$ :

$$(B, C) = \left[ \begin{array}{cccc|cccc} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{\substack{-r_2+r_1 \\ -r_4+r_3}} \left[ \begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right]$$

所以

$$D = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

(3)  $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 0 \end{bmatrix} = E_{11} - 2E_{12} + 3E_{21} = e_{11} - 2(e_{12} - e_{11}) + 3e_{13} = 3e_{11} - 2e_{12} + 3e_{13},$

又

$$\begin{aligned} A &= \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 0 \end{bmatrix} = E_{11} - 2E_{12} + 3E_{21} \\ &= (g_{24} - g_{23}) - 2(g_{22} - g_{21}) + 3(g_{21} + g_{23} - g_{24}) \\ &= 5g_{21} - 2g_{22} + 2g_{23} - 2g_{24}, \end{aligned}$$

所以  $A$  在两组基下的坐标分别为:

$$\begin{aligned} X &= (3, -2, 3, 0)^T, \\ Y &= (5, -2, 2, -2)^T. \end{aligned}$$

4. 设  $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & 0 \\ 1 & \cdots & \cdots & 1 \end{bmatrix}$  是  $n$  阶方阵,

(1) 证明所有与  $A$  可交换的矩阵 (记为  $T(A)$ ) 的全体是  $M_2(R)$  的子空间; (2) 求  $T(A)$  的维数和一组基.

解 (1) 因为  $AI = IA$ , 所以  $I \in T(A)$ , 故  $T(A)$  非空.

$\forall B, C \in T(A)$ , 有  $AB = BA, AC = CA$ , 于是,  $A(B+C) = (B+C)A$ , 所以  $B+C \in T(A)$ , 又对任  $k \in F$ , 均有  $(kB)A = A(kB)$ , 即  $kB \in T(A)$ , 所以  $T(A)$  对加法和数乘封闭. 由引理 5.2,  $T(A)$  是  $M_2(R)$  的子空间.

(2) 因为  $A = I + J + J^2 + \cdots + J^{n-1}$ , 所以  $A^{-1} = I - J$ , 其中

$$J = \begin{bmatrix} 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ 1 & \ddots & & \vdots \\ & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

又因为  $AB = BA \Leftrightarrow BA^{-1} = A^{-1}B \Leftrightarrow B(I - J) = (I - J)B \Leftrightarrow BJ = JB$ . 于是知, 与  $A$  乘法可交换的全体  $B = (b_{ij})$  须满足

$$\begin{bmatrix} b_{12} & \cdots & \cdots & b_{1n} & 0 \\ b_{22} & b_{23} & \cdots & b_{2n} & 0 \\ b_{32} & b_{33} & \cdots & b_{3n} & \vdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \vdots \\ b_{n2} & \cdots & \cdots & b_{nn} & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \cdots & \cdots & \cdots & 0 \\ b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n-1} & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & \cdots & b_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ b_{n-11} & \cdots & \cdots & b_{n-1n-1} & b_{n-1n} \end{bmatrix}$$

比较两边元素知有  $b_{12} = \cdots = b_{1n} = 0 \rightarrow b_{23} = \cdots = b_{2n} = 0 \rightarrow b_{34} = \cdots = b_{3n} = 0 \rightarrow \cdots \rightarrow b_{n-1n} = 0$  (即  $b_{ij} = 0$  ( $j > i$  时)); 且  $b_{11} = b_{22} = \cdots = b_{nn}, b_{21} = b_{32} = \cdots = b_{n-1n-1}, b_{31} = b_{42} = \cdots = b_{n-2n-2}, \cdots, b_{n-11} = b_{n2}$ . (因为比较两边  $(i, j)$  位元素有  $b_{ij+1} = b_{i-1j}$ ).

即

$$B = \begin{bmatrix} b_1 & 0 & \cdots & 0 \\ b_2 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ b_n & \cdots & b_2 & b_1 \end{bmatrix} = b_1 I + b_2 J + \cdots + b_n J^{n-1}.$$

所以  $T(A)$  是  $n$  维的,  $I, J, J^2, \dots, J^{n-1}$  为其一组基.

5. 设  $W_1, W_2$  是线性空间  $V$  的两个非平凡子空间, 证明: 存在  $\alpha \in V$  使  $\alpha \in W_1$  且  $\alpha \in W_2$ .

证 因为  $W_1, W_2$  是  $V$  的非平凡子空间, 所以存在  $\alpha \in W_1, \beta \in W_2$ . 若  $\alpha \in W_2$ , 则  $\alpha$  为所求; 若  $\beta \in W_1$ , 则  $\beta$  为所求. 否则便有

$$\alpha \in W_1, \beta \in W_1; \beta \in W_2, \alpha \in W_2,$$

于是令  $\gamma = \alpha + \beta$ , 则  $\gamma \in W_1$ , 且  $\gamma \in W_2$ .



## 线性变换

## 6.1 定义与定理

**定义 6.1** 设  $V_1$  和  $V_2$  是域  $F$  上的线性空间, 若映射  $\varphi: V_1 \rightarrow V_2$ , 满足  $\varphi(\alpha + \beta) = \varphi(\alpha) + \varphi(\beta)$ ,  $\varphi(\lambda\alpha) = \lambda\varphi(\alpha)$ ,  $(\alpha, \beta \in V, \lambda \in F)$  则称  $\varphi$  为线性映射.

**定理 6.1** 设  $\varphi: V_1 \rightarrow V_2$  是  $F$  上两线性空间  $V_1$  到  $V_2$  的线性映射, 则

$$\dim V_1 = \dim(\ker \varphi) + \dim(\operatorname{Im} \varphi).$$

**定理 6.2** 设  $\mathcal{A}: V_1 \rightarrow V_2$  为域  $F$  上线性空间  $V_1$  到  $V_2$  的线性映射, 在  $V_1$  和  $V_2$  中分别取定基  $\alpha_1, \dots, \alpha_n$  和  $\beta_1, \dots, \beta_m$  之后, 以  $\mathcal{A}\alpha_1, \dots, \mathcal{A}\alpha_n$  的坐标列为列作矩阵  $A$ , 亦即

$$\mathcal{A}(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = (\beta_1, \dots, \beta_m)A.$$

则对任意  $\alpha \in V_1$ ,  $\beta = \mathcal{A}\alpha$  的充分必要条件是

$$y = Ax$$

其中  $x, y$  分别为  $\alpha, \beta$  的坐标列. ( $A$  称为  $\mathcal{A}$  的矩阵表示)

- 系 (1)  $\dim(\ker \mathcal{A}) = n - r(A)$  (称为  $\mathcal{A}$  或  $A$  的零度(nullity));  
 (2)  $\dim(\operatorname{Im} \mathcal{A}) = r(A)$  (称为  $\mathcal{A}$  或  $A$  的秩)  
 (3)  $\mathcal{A}$  为单射  $\Leftrightarrow \ker \mathcal{A} = 0 \Leftrightarrow A$  为列独立阵;  
 (4)  $\mathcal{A}$  为满射  $\Leftrightarrow \mathcal{A}V_1 = V_2 \Leftrightarrow A$  为行独立阵;  
 (5)  $\mathcal{A}$  为双射  $\Leftrightarrow A$  为可逆方阵.

**定理 6.3** 设  $\mathcal{A}: V_1 \rightarrow V_2$  为域  $F$  上线性空间  $V_1$  到  $V_2$  的线性映射, 且  $\mathcal{A}$  在  $V_1$  和  $V_2$  的基  $\{\alpha_i\}, \{\beta_i\}$  下的矩阵表示为  $A$ , 在基  $\{\tilde{\alpha}_i\}, \{\tilde{\beta}_i\}$  下的矩阵表示为  $B$ , 若  $(\tilde{\alpha}_1, \dots, \tilde{\alpha}_n) = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)P$ ,  $(\tilde{\beta}_1, \dots, \tilde{\beta}_m) = (\beta_1, \dots, \beta_m)Q$ , 则

$$B = Q^{-1}AP.$$

即  $\mathcal{A}$  在  $V_1$  和  $V_2$  不同基之下的矩阵表示  $A$  与  $B$  相抵.

系 对任一线性映射  $\mathcal{A}: V_1 \rightarrow V_2$ , 总存在  $V_1$  和  $V_2$  的基  $\epsilon_1, \dots, \epsilon_n$  和  $\eta_1, \dots, \eta_m$  使得  $\mathcal{A}$  的矩阵表示为  $A = \begin{bmatrix} I_r & O \\ O & O \end{bmatrix}$ .

设  $V_1, V_2$  分别是域  $F$  上  $n$  维,  $m$  维线性空间, 记  $V_1$  到  $V_2$  的线性映射全体为  $\operatorname{Hom}(V_1, V_2)$ , 则有

**定理 6.4**  $\operatorname{Hom}(V_1, V_2)$  在以下定义加法和数乘下是  $F$  上线性空间: 对  $\forall \mathcal{A}, \mathcal{B} \in \operatorname{Hom}(V_1, V_2)$ ,  $\lambda \in F$  和  $\forall \alpha \in V_1$

$$(\mathcal{A} + \mathcal{B})\alpha = \mathcal{A}\alpha + \mathcal{B}\alpha,$$

$$(\lambda\mathcal{A})\alpha = \lambda(\mathcal{A}\alpha).$$

**定理 6.5** 线性空间  $\text{Hom}(V_1, V_2)$  与  $M_{m \times n}(F)$  同构.

**系** (1) 设  $V$  是域  $F$  上  $n$  维线性空间, 则定义于  $V$  上的线性函数(映射)  $f: V \rightarrow F$  全体是  $F$  上  $n$  维线性空间(记为  $V^*$ , 称为  $V$  的对偶空间).

(2) 取定  $V$  的一个基  $\alpha_1, \dots, \alpha_n$  后, 若  $x \in V$  的坐标为  $x_1, \dots, x_n$ , 则对  $f \in V^*$  有

$$f(x) = (a_1, \dots, a_n) \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix},$$

其中  $A = (a_1, \dots, a_n)$  是  $f$  的矩阵表示,  $a_i = f(\alpha_i)$ .

**定义 6.2** 设  $V$  是域  $F$  上的线性空间.  $V$  到自身的线性映射称为  $V$  上的一个线性变换(即  $\mathcal{A}: V \rightarrow V$ , 对  $\forall \alpha, \beta \in V, \lambda \in F$  满足  $\mathcal{A}(\alpha + \beta) = \mathcal{A}\alpha + \mathcal{A}\beta, \mathcal{A}(\lambda\alpha) = \lambda(\mathcal{A}\alpha)$ ).

**定理 6.6** 设  $\mathcal{A}$  为  $F$  上线性空间  $V$  的线性变换, 在  $V$  中取定基  $\alpha_1, \dots, \alpha_n$  后, 以  $\mathcal{A}\alpha_1, \dots, \mathcal{A}\alpha_n$  的坐标列为列作矩阵  $A$ , 记为

$$\mathcal{A}(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)A,$$

则对任意  $\alpha \in V, \beta = \mathcal{A}\alpha$  的充分必要条件是

$$y = Ax,$$

其中  $x, y$  分别为  $\alpha, \beta$  的坐标列( $A$  称为  $\mathcal{A}$  的方阵表示).

**定理 6.7** 设  $\mathcal{A}$  是域  $F$  上线性空间  $V$  的线性变换,  $\mathcal{A}$  在  $V$  的基  $\alpha_1, \dots, \alpha_n$  和  $\eta_1, \dots, \eta_n$  下的方阵表示分别为  $A$  和  $B$ , 而  $(\eta_1, \dots, \eta_n) = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)P$ , 则

$$B = P^{-1}AP.$$

**定义 6.3** 对于域  $F$  上的两个  $n$  阶方阵  $A, B$ , 若存在  $F$  上的可逆阵  $P$  使得  $B = P^{-1}AP$ , 则称  $A$  与  $B$  在域  $F$  上相似.

**定义 6.4** (1) 设  $E$  是环, 又是域  $F$  上线性空间, 且  $\lambda(\alpha\beta) = (\lambda\alpha)\beta = \alpha(\lambda\beta), (\lambda \in F, \alpha, \beta \in E)$ , 则称  $E$  为  $F$  上的代数.

(2)  $F$  上两个代数  $E_1$  与  $E_2$  称为同构, 是指有双射  $\varphi: E_1 \rightarrow E_2$  使得  $\varphi(\alpha + \beta) = \varphi(\alpha) + \varphi(\beta), \varphi(\lambda\alpha) = \lambda\varphi(\alpha), \varphi(\alpha\beta) = \varphi(\alpha)\varphi(\beta)$  对任意  $\alpha, \beta \in E_1$  和  $\lambda \in F$  成立,  $\varphi$  称为同构映射.

**定理 6.8** 设  $V$  为域  $F$  上  $n$  维线性空间,  $V$  上的线性变换全体  $\text{End}(V)$  对如下定义的运算是  $F$  上的代数, 且它与  $n$  阶全方阵代数同构:

$$\text{End}(V) \cong M_n(F).$$

$\text{End}(V)$  上的加法, 乘法, 数乘定义如下:

$$\begin{aligned} (\mathcal{A}\mathcal{B})(\alpha) &= \mathcal{A}(\mathcal{B}(\alpha)), \\ (\mathcal{A} + \mathcal{B})(\alpha) &= \mathcal{A}(\alpha) + \mathcal{B}(\alpha), \\ (\lambda\mathcal{A})(\alpha) &= \lambda(\mathcal{A}(\alpha)). \end{aligned}$$

其中  $\mathcal{A}, \mathcal{B} \in \text{End}(V), \lambda \in F, \alpha \in V$ .

**定义 6.5** (1) **零变换** 把任一向量映为 0 的变换, 方阵表示为零方阵.

(2) **恒等变换** 记为  $\mathcal{I}$  或  $\mathcal{E}$ , 不改变  $V$  中任一元素的变换, 方阵表示为  $I$ .

(3) **数乘(纯量)变换** 记为  $k$  或  $k\mathcal{I}$ , 将  $V$  中任一向量  $\alpha$  映为  $k\alpha$  的变换, 方阵表示为  $kI$ .

(4) **仿射变换**  $\mathcal{A}$  在  $V$  的某基  $\alpha_1, \dots, \alpha_n$  下的矩阵表示为  $A = \text{diag}\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\}$ .

(5) 投影(射)变换  $\mathcal{A}$  在  $V$  的某基  $\alpha_1, \dots, \alpha_n$  下的方阵表示为

$$A = \begin{bmatrix} I_r & O \\ O & O \end{bmatrix}$$

(这相当于把  $V$  中向量  $\alpha = \lambda_1 \alpha_1 + \dots + \lambda_n \alpha_n$  投影到基向量  $\alpha_1, \dots, \alpha_r$  的生成空间上).

(6) 线性变换  $\mathcal{A}$  的多项式 设  $f(X) = a_0 X^n + a_1 X^{n-1} + \dots + a_{n-1} X + a_n \in F[X]$ , 则

$$f(\mathcal{A}) = a_0 \mathcal{A}^n + a_1 \mathcal{A}^{n-1} + \dots + a_{n-1} \mathcal{A} + a_n \mathcal{E}$$

称为  $\mathcal{A}$  的多项式, 若  $\mathcal{A}$  的方阵表示为  $A$ , 则线性变换  $f(\mathcal{A})$  的方阵表示为  $f(A) = a_0 A^n + \dots + a_{n-1} A + a_n I$ .

**定义 6.6** 设  $\mathcal{A}$  是域  $F$  上线性空间  $V$  的线性变换,  $W$  是  $V$  的子空间, 若对  $\forall \alpha \in W$ , 有  $\mathcal{A}\alpha \in W$ , 则称  $W$  为  $\mathcal{A}$  作用下的不变子空间.

**引理 6.1** 设  $W$  是  $V$  上的线性变换  $\mathcal{A}$  的不变子空间, 则映射

$$\begin{aligned} \mathcal{A}_1: W &\rightarrow W \\ \alpha &\mapsto \mathcal{A}\alpha \end{aligned}$$

是  $W$  上的线性变换(称为  $\mathcal{A}$  在  $W$  上的限制), 记为  $\mathcal{A}_1 = \mathcal{A}|_W$ .

**引理 6.2** 线性空间  $V$  上的线性变换  $\mathcal{A}$  的有限个不变子空间之和仍为  $\mathcal{A}$  的不变子空间;  $\mathcal{A}$  的任意多个不变子空间的交仍为  $\mathcal{A}$  的不变子空间.

**定理 6.9** 设  $\mathcal{A}$  为域  $F$  上的线性空间  $V$  上的线性变换,  $W$  是  $V$  的子空间. 取  $W$  的基  $\alpha_1, \dots, \alpha_r$  并扩充为  $V$  的基  $\alpha_1, \dots, \alpha_r, \alpha_{r+1}, \dots, \alpha_n$ , 那么  $W$  是  $\mathcal{A}$  的不变子空间的充要条件是  $\mathcal{A}$  在此基下的方阵表示形如

$$A = \begin{bmatrix} A_1 & A_3 \\ O & A_2 \end{bmatrix} \quad (\text{其中 } A_1 \text{ 为 } r \text{ 阶方阵})$$

且当上述成立时, 还有以下结论:

(1)  $A_1$  为  $\mathcal{A}_1 = \mathcal{A}|_W$  的方阵表示;

(2) 若  $A_3 = 0$ , 则  $W_2 = \langle \alpha_{r+1}, \dots, \alpha_n \rangle$  也是  $\mathcal{A}$  的不变子空间,  $A_2$  为  $\mathcal{A}|_{W_2}$  的方阵表示.

(3) 一般情形下,  $A_2$  为商空间  $V/W$  的线性变换  $\bar{\mathcal{A}}$  在基  $\bar{\alpha}_{r+1}, \dots, \bar{\alpha}_n$  下的方阵表示, 这里  $\bar{\alpha} = \alpha + W$ , 而  $\bar{\mathcal{A}}$  的定义为  $\bar{\mathcal{A}}(\bar{\alpha}) = \overline{\mathcal{A}\alpha}$ .

**系** 设  $W_1$  与  $W_2$  均为  $V$  上的线性变换  $\mathcal{A}$  的不变子空间, 且  $V = W_1 \oplus W_2$ , 在  $W_1$  中取基  $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ , 在  $W_2$  中取基  $\alpha_{r+1}, \dots, \alpha_n$ , 则  $\mathcal{A}$  在  $V$  中的基  $\alpha_1, \dots, \alpha_r, \alpha_{r+1}, \dots, \alpha_n$  下的方阵表示为

$$A = \begin{bmatrix} A_1 & O \\ O & A_2 \end{bmatrix} \quad (\text{其中 } A_1 \text{ 为 } r \text{ 阶方阵}).$$

设  $V$  是域  $F$  上的线性空间,  $\mathcal{A}$  是  $V$  上的线性变换,  $A$  是  $\mathcal{A}$  在基  $\{\alpha_i\}$  下的方阵表示.

**定义 6.7** 若有  $\lambda \in F$  及非零向量  $\alpha \in V$  使

$$\mathcal{A}\alpha = \lambda\alpha$$

或即

$$Ax = \lambda x$$

( $x$  是  $\alpha$  在基  $\{\alpha_i\}$  下的坐标列) 则称  $\lambda$  为  $\mathcal{A}$  (或  $A$ ) 的特征值 (或特征根),  $\alpha$  称为  $\mathcal{A}$  的属于特征值  $\lambda$  的特征向量,  $x$  称为  $A$  的属于特征值  $\lambda$  的特征向量.

**定义 6.8** 多项式  $f(\lambda) = \det(\lambda I - A) \in F[\lambda]$  称为  $\mathcal{A}$  或  $A$  的特征多项式.

**定理 6.10** (1)  $\mathcal{A}$  的特征多项式与  $V$  的基向量的选取无关(即相似方阵有相同的特征多项式);

(2)  $\mathcal{A}$  的特征多项式  $f(\lambda)$  的根就是它的特征值, 对  $\mathcal{A}$  的每个特征值  $\lambda \in F$ , 至少存在一个非零向量  $\alpha \in V$ , 使  $\mathcal{A}\alpha = \lambda\alpha$ ;

(3) 当  $F = \mathbb{C}$  时,  $V$  上的任一线性变换  $\mathcal{A}$  总有复的特征向量(因为特征多项式  $f(\lambda)$  在  $\mathbb{C}$  中有根), 所以  $\mathcal{A}$  总有一维不变子空间.

**定理 6.11** 设  $f(\lambda) = \det(\lambda I - A) = \lambda^n - a_1\lambda^{n-1} + a_2\lambda^{n-2} + \cdots + (-1)^na_n$  是  $n$  阶方阵  $A$  的特征多项式, 则

(1)  $a_i$  是  $A$  的  $i$  阶主子式之和 ( $i=1, 2, \dots, n$ ), 特别

$$a_1 = \operatorname{tr} A, \quad a_n = \det A$$

(2) 若  $f(\lambda)$  有  $n$  个根  $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ , 则  $a_i = \sigma_i$  是  $\lambda_1, \dots, \lambda_n$  的  $i$  次初等对称多项式, 特别

$$a_1 = \lambda_1 + \cdots + \lambda_n, \quad a_n = \lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n.$$

(3) 若  $A = \begin{bmatrix} A_1 & A_3 \\ O & A_2 \end{bmatrix}$ , 则  $f(\lambda) = f_1(\lambda)f_2(\lambda)$ , 其中  $f_i(\lambda)$  为  $A_i$  的特征多项式 ( $i=1, 2$ )

(4) 若  $A = \begin{bmatrix} \lambda_1 & * & \cdots & * \\ & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & * \\ & & & \lambda_n \end{bmatrix}$  为上三角阵, 则  $\lambda_1, \dots, \lambda_n$  为  $A$  的特征根.

(5) 若  $F$  为数域, 则  $\det A \neq 0$  当且仅当其特征根(复根)均非零.

**定理 6.12** 设  $A$  为域  $F$  上  $n$  阶方阵.

(1) 若  $A$  在  $F$  中有  $n$  个特征根  $\lambda_1, \dots, \lambda_n$  (重根计入), 则  $A$  在  $F$  上相似于上三角形方阵  $B$ ,  $B$  的对角线上元素为  $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ .

(2) 若  $\lambda_1, \dots, \lambda_r$  是  $A$  在  $F$  中的特征根(可能有重根), 则  $A$  在  $F$  上相似于

$$B = \begin{bmatrix} B_1 & B_2 \\ O & B_3 \end{bmatrix}, \quad \text{其中 } B_1 = \begin{bmatrix} \lambda_1 & \cdots & * \\ & \ddots & \vdots \\ & & \lambda_r \end{bmatrix} \text{ 为上三角形方阵.}$$

**定义 6.9** 设  $\lambda_1 \in F$  是  $\mathcal{A}$  的特征多项式  $f(\lambda)$  的  $n_1$  重根, 则  $n_1$  称为  $\lambda_1$  的代数重数. 属于  $\lambda_1$  的特征向量全体加上零向量构成一个子空间, 记为

$$V_{\lambda_1} = \{\alpha \in V \mid \mathcal{A}\alpha = \lambda_1\alpha\},$$

称为属于  $\lambda_1$  的特征子空间.  $\dim V_{\lambda_1}$  称为  $\lambda_1$  的几何重数.

系  $\dim V_{\lambda_1} \leq n_1$  (几何重数  $\leq$  代数重数).

**定义 6.10** 若在  $V$  中存在一组基, 使线性变换  $\mathcal{A}$  在此基下的方阵表示是对角阵, 则称  $\mathcal{A}$  是可对角化的.

**定理 6.13**  $\mathcal{A}$  可对角化的 5 个充分必要条件:

(1)  $\mathcal{A}$  有  $n$  个线性无关的特征向量;

(2) 空间  $V$  可分解成一维不变子空间的直和;

- (3)  $\dim V_{\lambda_i} = n_i$  (几何重数=代数重数);  
 (4)  $V$  可分解成  $\mathcal{A}$  的特征子空间的直和;  
 (5)  $\mathcal{A}$  的极小多项式无重根.

**定理 6.14** 设  $A$  为域  $F$  上  $n$  阶方阵, (1) 若  $x_1, \dots, x_k$  是  $A$  的线性无关的特征向量, 扩充为  $F^{(n)}$  的基  $x_1, \dots, x_k, \dots, x_n$ , 令  $P = (x_1, \dots, x_n)$ , 则

$$P^{-1}AP = \begin{bmatrix} \Lambda & A_2 \\ O & A_3 \end{bmatrix},$$

其中  $\Lambda$  是  $k$  阶对角形方阵.

(2) 设  $S_i$  是  $A$  的属于特征值  $\lambda_i$  的线性无关的特征向量集 ( $i=1, \dots, r$ ), 且  $\lambda_1, \dots, \lambda_r$  互异, 则向量集  $S_1 \cup S_2 \cup \dots \cup S_r$  线性无关.

## 6.2 解题方法介绍

**求线性变换  $\mathcal{A}$  在一组基下的矩阵的方法**

1. 用定义 由定理 6.6, 求线性变换  $\mathcal{A}$  在  $V$  中基  $\alpha_1, \dots, \alpha_n$  上的方阵表示  $A$ , 只要计算基向量的象  $\mathcal{A}\alpha_1, \dots, \mathcal{A}\alpha_n$  在基  $\alpha_1, \dots, \alpha_n$  上的坐标列, 作为  $A$  各列. 形式地记为

$$(\mathcal{A}\alpha_1, \dots, \mathcal{A}\alpha_n) = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)A.$$

2. 用公式  $(\mathcal{A}\alpha_1, \dots, \mathcal{A}\alpha_n) = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)A$

(1) 当  $V$  是  $n$  数组列向量空间  $F^{(n)}$  时,  $(\mathcal{A}\alpha_1, \dots, \mathcal{A}\alpha_n)$  与  $(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$  均可看成方阵, 于是以上式子可按通常矩阵乘法进行, 又  $\alpha_1, \dots, \alpha_n$  线性无关, 所以方阵  $(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$  可逆, 故

$$A = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)^{-1}(\mathcal{A}\alpha_1, \dots, \mathcal{A}\alpha_n).$$

(2) 当  $V$  是任意的  $n$  维线性空间  $V_n(F)$  时, 取定一组基后,  $\mathcal{A}\alpha_1, \dots, \mathcal{A}\alpha_n, \alpha_1, \dots, \alpha_n$  的坐标列仍满足上述公式, 所以仍可用(1)的方法计算  $A$ .

**注** (2)求得的  $A$  是线性变换  $\mathcal{A}$  在基  $\alpha_1, \dots, \alpha_n$  上的方阵表示.

3. 用公式  $y = Ax$  (见定理 6.6) 设线性变换  $\mathcal{A}$  在基  $\epsilon_1, \dots, \epsilon_n$  下的方阵为  $A$ , 若给出  $\beta_1 = \mathcal{A}\alpha_1, \dots, \beta_n = \mathcal{A}\alpha_n$ , 且给出  $\alpha_1, \dots, \alpha_n, \beta_1, \dots, \beta_n$  在此基上的坐标列为  $x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_n$ , 则应有  $\beta_i = \mathcal{A}\alpha_i$  ( $i=1, \dots, n$ ) 的坐标式为

$$y_1 = Ax_1, y_2 = Ax_2, \dots, y_n = Ax_n,$$

也即

$$(y_1, y_2, \dots, y_n) = (Ax_1, \dots, Ax_n) = A(x_1, \dots, x_n),$$

此时, 若  $\alpha_1, \dots, \alpha_n$  线性无关, 则得

$$A = (y_1, \dots, y_n)(x_1, \dots, x_n)^{-1}.$$

**注** 这里算出的  $A$  是线性变换  $\mathcal{A}$  在基  $\epsilon_1, \dots, \epsilon_n$  上的方阵. (也即,  $\alpha_i$  与  $\beta_i$  的坐标列在哪组基上, 求出的方阵就在哪组基上, 见 34 题)

## 6.3 习题与解答

1. 设线性映射  $\mathcal{A}: \mathbf{R}^{(3)} \rightarrow \mathbf{R}^{(2)}$  定义为

$$\mathcal{A}(x_1, x_2, x_3)^T = (x_1 + 2x_2, x_1 - x_2)^T,$$

求  $\mathcal{A}$  在  $\mathbf{R}^{(3)}$  的基  $\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3\}$  和  $\mathbf{R}^{(2)}$  的基  $\{\beta_1, \beta_2\}$  下的矩阵表示:

$$(1) \alpha_1 = (1, 0, 0)^T, \alpha_2 = (0, 1, 0)^T, \alpha_3 = (0, 0, 1)^T; \beta_1 = (1, 0)^T, \beta_2 = (0, 1)^T;$$

$$(2) \alpha_1 = (1, 1, 1)^T, \alpha_2 = (0, 1, 1)^T, \alpha_3 = (0, 0, 1)^T; \beta_1 = (1, 1)^T, \beta_2 = (1, 0)^T;$$

$$(3) \alpha_1 = (1, 2, 3)^T, \alpha_2 = (0, 1, -1)^T, \alpha_3 = (-1, -2, 3)^T; \beta_1 = (1, 2)^T, \beta_2 = (2, 1)^T.$$

解 由已知, 任  $x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \in \mathbf{R}^{(3)},$

$$y = \mathcal{A}x = \begin{bmatrix} x_1 + 2x_2 \\ x_1 - x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = Ax,$$

故  $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$  是  $\mathcal{A}$  在  $\mathbf{R}^{(3)}$  的自然基和  $\mathbf{R}^{(2)}$  的自然基下的矩阵表示.

(这里用到在自然基下, 向量  $x = (x_1, x_2, x_3)^T$  和  $y = (x_1 + 2x_2, x_1 - x_2)^T$  的坐标就是它们自身).

由此知

(1) 方法 1 因为  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  及  $\beta_1, \beta_2$  分别为  $\mathbf{R}^{(3)}$  和  $\mathbf{R}^{(2)}$  的自然基, 所以  $\mathcal{A}$  的矩阵表示就是

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}.$$

方法 2 用定义, 因为

$$\mathcal{A}\alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \beta_1 + \beta_2 = (\beta_1, \beta_2) \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix},$$

$$\mathcal{A}\alpha_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix} = (\beta_1, \beta_2) \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix},$$

$$\mathcal{A}\alpha_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} = (\beta_1, \beta_2) \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix},$$

所以

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}.$$

(2) 方法 1 设  $P, Q$  分别是 (1) 中基  $\{\alpha_i\}, \{\beta_j\}$  到 (2) 中基  $\{\alpha_i\}, \{\beta_j\}$  的过渡矩阵, 则

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad Q = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

于是

$$B = Q^{-1}AP = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 3 & 3 & 0 \end{bmatrix}.$$

方法 2 因为  $\mathcal{A}\alpha_1 = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \end{bmatrix} = (\beta_1, \beta_2) \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \end{bmatrix},$

$$\mathcal{A}\alpha_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix} = (\beta_1, \beta_2) \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$\mathcal{A}\alpha_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} = (\beta_1, \beta_2) \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

所以

$$B = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 3 & 3 & 0 \end{bmatrix}$$

(3) 方法 1 因为  $\mathcal{A}$  在  $\mathbf{R}^{(3)}$  和  $\mathbf{R}^{(2)}$  不同基之下的矩阵表示相抵. 这里  $\mathbf{R}^{(3)}$  与  $\mathbf{R}^{(2)}$  中过渡矩阵分别为:

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & -2 \\ 3 & -1 & 3 \end{bmatrix}, \quad Q = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix},$$

于是

$$\begin{aligned} C = Q^{-1}AP &= \frac{1}{3} \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & -2 \\ 3 & -1 & 3 \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{3} \begin{bmatrix} -7 & -4 & 7 \\ 11 & 5 & -11 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

方法 2 因为  $\mathcal{A}\alpha_1 = \begin{bmatrix} 5 \\ -1 \end{bmatrix} = (\beta_1, \beta_2) \begin{bmatrix} -\frac{7}{3} \\ \frac{11}{3} \end{bmatrix},$

$$\mathcal{A}\alpha_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix} = (\beta_1, \beta_2) \begin{bmatrix} -\frac{4}{3} \\ \frac{5}{3} \end{bmatrix},$$

$$\mathcal{A}\alpha_3 = \begin{bmatrix} -5 \\ 1 \end{bmatrix} = (\beta_1, \beta_2) \begin{bmatrix} \frac{7}{3} \\ -\frac{11}{3} \end{bmatrix},$$

所以

$$C = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} -7 & -4 & 7 \\ 11 & 5 & -11 \end{bmatrix}.$$

2. 设

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 3 \end{bmatrix},$$

$V_1$  是  $\alpha_1 = (1, 1, 1)^T$  和  $\alpha_2 = (0, 1, 2)^T$  张成的  $\mathbf{R}^{(3)}$  的子空间, 由  $x \mapsto Ax$  定义  $V_1$  到  $V_2 = \mathbf{R}^{(3)}$  的线性映射  $\varphi$ .

(1) 求  $\varphi$  在  $V_1$  的基  $\alpha_1, \alpha_2$  和  $V_2$  的基  $(1, 0, 0)^T, (0, 1, 0)^T, (0, 0, 1)^T$  下的矩阵表示  $B$ , 并求  $\varphi$  的核, 象, 及它们的维数.

解 因为

$$\varphi\alpha_1 = A\alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \\ 2 \end{bmatrix},$$

$$\varphi\alpha_2 = A\alpha_2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 5 \\ 6 \end{bmatrix},$$

所以

$$B = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 5 & 5 \\ 2 & 6 \end{bmatrix}.$$

$\ker\varphi$  就是  $Bx=0$  的解空间, 解之, 得  $\ker\varphi = \{0\}$ , 所以  $\dim(\ker\varphi) = 0$ ;

$$\operatorname{Im}\varphi = \langle \varphi\alpha_1, \varphi\alpha_2 \rangle = k_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \\ 2 \end{bmatrix} + k_2 \begin{bmatrix} -1 \\ 5 \\ 6 \end{bmatrix},$$

所以

$$\dim(\operatorname{Im}\varphi) = 2.$$

(2) 求  $\varphi$  在  $V_1$  的基  $\{\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_1 - \alpha_2\}$  和  $V_2$  的上述基下的矩阵表示  $C$ ;

解 因为  $(d_1, d_2) = (\alpha_1, \alpha_2) \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$ , 所以从基  $\alpha_1, \alpha_2$  到基  $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_1 - \alpha_2$  的过渡矩阵为  $P = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$ .

所以

$$C = BP = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 5 & 5 \\ 2 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 10 & 0 \\ 8 & -4 \end{bmatrix}.$$

(3) 求  $\alpha = (3, 2, 1)^T \in V_1$  在基  $\alpha_1, \alpha_2$  下的坐标表示, 并分别用(1)中矩阵表示及  $A\alpha$  求  $\varphi(\alpha)$ .

解  $\alpha = (3, 2, 1)^T = (\alpha_1, \alpha_2) \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix}$ ,  $\varphi\alpha$  在基  $(1, 0, 0)^T, (0, 1, 0)^T, (0, 0, 1)^T$  下的坐标为

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} = B \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 5 & 5 \\ 2 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 10 \\ 0 \end{bmatrix}$$

又

$$\varphi\alpha = A\alpha = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 10 \\ 0 \end{bmatrix}.$$



3. 设  $A = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}$ ,  $B = \begin{bmatrix} e^{i\theta} & O \\ O & e^{-i\theta} \end{bmatrix}$ ,  $\theta$  为实数, 按如下方法找出方阵  $P$  使  $P^{-1}AP = B$ .

(1) 定义线性映射  $\mathcal{A}: \mathbf{C}^{(2)} \rightarrow \mathbf{C}^{(2)}$ ,  $x \mapsto Ax$  ( $x$  用自然基  $e_1 = (1, 0)^T$ ,  $e_2 = (0, 1)^T$  表示);

(2) 求  $\mathbf{C}^{(2)}$  的新基  $\{\alpha_1, \alpha_2\}$ , 使  $\mathcal{A}$  在新基下的方阵表示为  $B$ ;

(3) 求出自然基到新基的过渡矩阵  $P$ , 验证  $P^{-1}AP = B$ .

解 (1) 由  $(\mathcal{A}e_1, \mathcal{A}e_2) = (e_1, e_2)A$ , 知在自然基  $e_1, e_2$  下, 任  $x \in \mathbf{C}^{(2)}$ , 有  $\mathcal{A}x = Ax$ . (即  $A$  为  $\mathcal{A}$  在  $e_1, e_2$  下的方阵表示).

(2) 由  $(\mathcal{A}\alpha_1, \mathcal{A}\alpha_2) = (\alpha_1, \alpha_2) \begin{bmatrix} e^{i\theta} & O \\ O & e^{-i\theta} \end{bmatrix} = (e^{i\theta}\alpha_1, e^{-i\theta}\alpha_2)$ , 知  $\alpha_1, \alpha_2$  须分别满足

$$A\alpha_1 = e^{i\theta}\alpha_1, \quad A\alpha_2 = e^{-i\theta}\alpha_2,$$

设  $\alpha_1 = (a_{11}, a_{21})^T$ ,  $\alpha_2 = (a_{12}, a_{22})^T$ , 代入上式得

$$\begin{cases} -i \sin\theta a_{11} - \sin\theta a_{21} = 0 \\ a_{11} \sin\theta - ia_{21} \sin\theta = 0 \end{cases}$$

及

$$\begin{cases} ia_{12} \sin\theta - a_{22} \sin\theta = 0 \\ a_{12} \sin\theta + ia_{22} \sin\theta = 0 \end{cases}$$

所以可取  $\alpha_1 = (1, -i)^T$ ,  $\alpha_2 = (1, i)^T$

(3) 由(2)知

$$(\alpha_1, \alpha_2) = (e_1, e_2) \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -i & i \end{bmatrix},$$

于是  $P = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -i & i \end{bmatrix}$  是从基  $e_1, e_2$  到基  $\alpha_1, \alpha_2$  的过渡矩阵, 易算出  $P^{-1} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & i \\ 1 & -i \end{bmatrix}$ , 则

$$P^{-1}AP = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & i \\ 1 & -i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e^{i\theta} & e^{-i\theta} \\ -ie^{i\theta} & ie^{-i\theta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e^{i\theta} & O \\ O & e^{-i\theta} \end{bmatrix}$$

4. 设  $\mathcal{A}$  是  $F$  上二维线性空间  $V$  到自身的线性映射, 在某基下的方阵表示为  $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ , 证明:  $\mathcal{A}^2 - (a+d)\mathcal{A} + (ad-bc)\mathcal{I} = 0$  为零变换 ( $\mathcal{I}$  是恒等映射).

证明 因为  $\mathcal{A}^2 - (a+d)\mathcal{A} + (ad-bc)\mathcal{I}$  在某基下的方阵表示为

$$\begin{aligned} A^2 - (a+d)A + (ad-bc)I &= \begin{bmatrix} a^2+bc & ab+bd \\ ac+cd & bc+d^2 \end{bmatrix} - (a+d) \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \\ &\quad + \begin{bmatrix} ad-bc & 0 \\ 0 & ad-bc \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = 0. \end{aligned}$$

所以  $\mathcal{A}^2 - (a+d)\mathcal{A} + (ad-bc)\mathcal{I} = 0$  是零变换

5. 证明:  $F[X]$  和  $F[[X]]$  均为  $F$  上的代数.

证 因为  $F[X]$  是环 (见定理 1.4), 是线性空间 (见《高等代数学》例 5.6), 又数乘和乘法可交换: 对任  $f, g \in F[X]$ ,  $\lambda \in F$  有

$$\lambda(fg) = (\lambda f)g = f(\lambda g).$$

所以  $F[X]$  是  $F$  上的代数.

同理  $F[[X]]$  是环(见 1.3 节 56 题), 是线性空间(见 5.3 节 6 题), 又数乘与乘法可交换:

对任  $\lambda \in F, f, g \in F[[X]]$ , 设  $f(X) = \sum_{i=1}^{\infty} a_i X^i, g(X) = \sum_{i=1}^{\infty} b_i X^i$ , 有

$$\begin{aligned}\lambda(fg) &= \lambda \sum_{k=0}^{\infty} \left( \sum_{i+j=k} a_i b_j \right) X^k = \sum_{k=0}^{\infty} \left( \sum_{i+j=k} (\lambda a_i) b_j \right) X^k = (\lambda f)g \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \left( \sum_{i+j=k} a_i (\lambda b_j) \right) X^k = f(\lambda g),\end{aligned}$$

所以  $F[[X]]$  是  $F$  上的代数.

6. 证明  $F[X, Y]$  是  $F$  上的代数.

证  $F[X, Y]$  中的多项式相加, 相乘按结合律、交换律、分配律进行, 然后合并同类项.

(1)  $F[X, Y]$  显然是环(对多项式加法和乘法), 因为它对加法是阿贝尔群(即对加法封闭, 满足交换律、结合律,  $0+f=f$  对任意  $f \in F[X, Y]$  成立, 且  $(-f)+(f)=0$ ); 对乘法满足封闭性和结合律, 而且乘法对加法满足分配律.

(2)  $F[X, Y]$  是  $F$  上的线性空间(因为  $F[X, Y]$  对加法是阿贝尔群, 而且  $\lambda(f+g) = \lambda f + \lambda g, (\lambda+\mu)f = \lambda f + \mu f, (\lambda\mu)f = \lambda(\mu f), 1 \cdot f = f$  对任意  $f, g \in F[X, Y], \lambda, \mu \in F$  均成立).

(3)  $\lambda(fg) = (\lambda f)g = f(\lambda g)$  对任  $\lambda \in F, f \in F[X, Y]$  成立.

综合以上三点, 由代数的定义知  $F[X, Y]$  是  $F$  上的代数.

7. 设  $V$  是  $F$  上线性空间,  $\alpha_1, \dots, \alpha_n$  是其一基, 于是由

$$\mathcal{A}\alpha_i = \alpha_{i+1} \quad (i = 1, \dots, n-1), \quad \mathcal{A}\alpha_n = 0$$

定义了  $V$  的一个线性变换  $\mathcal{A}$ ,

(1) 试求  $\mathcal{A}$  在基  $\alpha_1, \dots, \alpha_n$  下的方阵表示;

(2) 证明  $\mathcal{A}^n = 0, \mathcal{A}^{n-1} \neq 0$ ;

(3) 设  $\mathcal{B}$  是  $V$  的线性变换且满足  $\mathcal{B}^n = 0, \mathcal{B}^{n-1} \neq 0$ , 则存在  $V$  的基使  $\mathcal{B}$  的方阵表示与 (1) 中  $\mathcal{A}$  的方阵表示相同;

(4) 证明: 若  $F$  上  $n$  阶方阵  $M, N$  满足  $M^n = N^n = 0, M^{n-1} \neq 0, N^{n-1} \neq 0$ , 则  $M$  与  $N$  相似.

证 (1) 由已知

$$\mathcal{A}\alpha_i = \alpha_{i+1} = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \begin{bmatrix} \vdots \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \end{bmatrix} \text{第 } i+1 \text{ 行} \quad i = 1, \dots, n-1,$$

$\mathcal{A}\alpha_n = 0$ , 故有

$$(\mathcal{A}\alpha_1, \dots, \mathcal{A}\alpha_n) = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \begin{bmatrix} 0 & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & \ddots & & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)A,$$

于是知  $\mathcal{A}$  在基  $\alpha_1, \dots, \alpha_n$  下的方阵表示为

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ 1 & \ddots & \ddots & & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

(2) 方法 1 因为  $\forall \alpha \in V$ , 设  $\alpha = \sum_{i=1}^n x_i \alpha_i$ , 则  $\mathcal{A}\alpha = \sum_{i=1}^n x_i \mathcal{A}\alpha_i$ , 由此知, 判断一个线性变换是否为零变换, 只要看它是否把基向量变成 0 就可以了. 因为由已知条件知有

$$\mathcal{A}\alpha_1 = \alpha_2, \mathcal{A}\alpha_2 = \alpha_3, \dots, \mathcal{A}\alpha_{n-1} = \alpha_n, \mathcal{A}\alpha_n = 0,$$

易算得

$$\mathcal{A}^{n-1}\alpha_1 = \alpha_n \neq 0, \mathcal{A}^{n-1}\alpha_2 = \mathcal{A}\alpha_n = 0, \dots, \mathcal{A}^{n-1}\alpha_{n-1} = \mathcal{A}^{n-2}(\mathcal{A}\alpha_n) = 0, \mathcal{A}^{n-1}\alpha_n = 0,$$

也即是  $\mathcal{A}^{n-1}\alpha_1 \neq 0, \mathcal{A}^{n-1}\alpha_i = \mathcal{A}^{i-1}(\mathcal{A}^{n-i}\alpha_i) = \mathcal{A}^{i-1}\alpha_n = 0, (i=2, \dots, n),$

故知  $\mathcal{A}^{n-1} \neq 0$ ;

而  $\mathcal{A}^n \alpha_1 = \mathcal{A}\alpha_n = 0, \mathcal{A}^n \alpha_i = \mathcal{A}^i(\mathcal{A}^{n-i}\alpha_i) = \mathcal{A}^i \alpha_n = 0, i=2, \dots, n$

所以  $\mathcal{A}^n = 0$ .

方法 2 因为  $\mathcal{A}$  在基  $\alpha_1, \dots, \alpha_n$  下的方阵表示为  $A$ ,

所以  $\mathcal{A}^{n-1}$  在基  $\alpha_1, \dots, \alpha_n$  下的方阵表示为  $A^{n-1}$ ,

$\mathcal{A}^n$  在基  $\alpha_1, \dots, \alpha_n$  下的方阵表示为  $A^n$ ,

而

$$A^{n-1} = \begin{bmatrix} 0 & & & \\ \vdots & \ddots & & \\ \vdots & & \ddots & \\ 0 & & & \ddots \\ 1 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}, \quad A^n = \begin{bmatrix} 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 \end{bmatrix}$$

所以  $\mathcal{A}^{n-1} \neq 0, \mathcal{A}^n = 0$ .

(3) 因为  $\mathcal{B}^n = 0, \mathcal{B}^{n-1} \neq 0$ , 所以  $\exists \beta \neq 0$ , 使得  $\mathcal{B}^{n-1}\beta \neq 0$ , 而  $\mathcal{B}^n\beta = 0$ . 于是

$\beta, \mathcal{B}\beta, \dots, \mathcal{B}^{n-1}\beta$  线性无关

因为, 若有  $k_1, k_2, \dots, k_n$  使  $k_1\beta + k_2\mathcal{B}\beta + \dots + k_n\mathcal{B}^{n-1}\beta = 0$ , 两边经  $\mathcal{B}$  作用后得  $k_1\mathcal{B}\beta + k_2\mathcal{B}^2\beta + \dots + k_{n-1}\mathcal{B}^{n-1}\beta + 0 = 0$ , 继续用  $\mathcal{B}$  作用下去, 经  $n-2$  次后得

$$k_1\mathcal{B}^{n-1}\beta = 0 \rightarrow k_1 = 0,$$

代回中间各式, 可推知  $k_2 = k_3 = \dots = k_n = 0$ .

由  $\beta, \mathcal{B}\beta, \dots, \mathcal{B}^{n-1}\beta$  线性无关, 而  $V$  是  $n$  维的, 所以它是  $V$  的一个基, 记其为  $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ ,

则在此基上显然有

$$\mathcal{B}(\beta_j) = \beta_{j+1}, (j = 1, 2, \dots, n-1), \mathcal{B}(\beta_n) = 0$$

于是由(1)知:  $\mathcal{B}$  在此基上的方阵表示为

$$B = \begin{bmatrix} 0 & & & \\ 1 & \ddots & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

(4) 由(2)知方阵  $M$  所实现的变换  $\mathcal{M}$  满足  $\mathcal{M}^n = 0, \mathcal{M}^{n-1} \neq 0$ , 又由(3)知  $\mathcal{M}$  在某基下的方阵表示为  $B$ , 所以  $M$  相似于  $B$ .

同理  $N$  相似于  $B$ , 所以  $M$  相似于  $N$ . 由此知  $M, N$  可看成一个线性变换在不同基下的方阵表示.

8. 证明: 若  $\mathcal{A}$  是  $\mathbf{R}^{(2)}$  上线性变换且  $\mathcal{A}^2 = \mathcal{A}$ , 则存在基使  $\mathcal{A}$  的方阵表示为  $0, I, \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ .

证 (1) 当  $\dim(\ker \mathcal{A}) = 0$ , 设  $\alpha_1, \alpha_2$  为  $\mathbf{R}^{(2)}$  的基, 则  $\beta_1 = \mathcal{A}\alpha_1, \beta_2 = \mathcal{A}\alpha_2$  线性无关. 又因为  $\mathcal{A}^2 = \mathcal{A}$ , 所以有

$$\mathcal{A}\beta_1 = \mathcal{A}^2\alpha_1 = \mathcal{A}\alpha_1 = \beta_1,$$

$$\mathcal{A}\beta_2 = \mathcal{A}^2\alpha_2 = \mathcal{A}\alpha_2 = \beta_2,$$

故  $\mathcal{A}$  在基  $\beta_1, \beta_2$  下的方阵表示为  $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ .

(2) 当  $\dim(\ker \mathcal{A}) = 2$  时,  $\ker \mathcal{A} = \mathbf{R}^{(2)}$ , 所以任  $\alpha \in \mathbf{R}^{(2)}, \mathcal{A}\alpha = 0$ , 故  $\mathcal{A}$  的方阵表示为 0 方阵.

(3) 当  $\dim(\ker \mathcal{A}) = 1$ , 则  $\dim(\operatorname{Im} \mathcal{A}) = 1$ , 任取  $\alpha_1 \in \operatorname{Im} \mathcal{A}$ , 必存在  $\beta$ , 使  $\alpha_1 = \mathcal{A}\beta$ , 于是  $\mathcal{A}\alpha_1 = \mathcal{A}^2\beta = \mathcal{A}\beta = \alpha_1$ , 所以  $\alpha_1 \neq 0$  时  $\alpha_1 \notin \ker \mathcal{A}$ , 即  $\ker \mathcal{A} \cap \operatorname{Im} \mathcal{A} = \{0\}$ , 这说明  $\mathbf{R}^{(2)} = \operatorname{Im} \mathcal{A} \oplus \ker \mathcal{A}$ . 取  $\alpha_2 (\neq 0) \in \ker \mathcal{A}$ , 则  $\alpha_1, \alpha_2$  线性无关, 且

$$\begin{cases} \mathcal{A}\alpha_1 = \alpha_1 \\ \mathcal{A}\alpha_2 = 0 \end{cases}$$

所以  $\mathcal{A}$  在基  $(\alpha_1, \alpha_2)$  下的方阵表示为  $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ .

注 满足  $\mathcal{A}^2 = \mathcal{A}$  的变换, 称为幂等变换, 用(3)中证法可以证明: 对  $n$  维线性空间  $V$  上的幂等变换  $\mathcal{A}$ , 必存在  $V$  的一组基, 使  $\mathcal{A}$  的方阵表示为  $\begin{bmatrix} I_r & O \\ O & O \end{bmatrix}$ , 其中  $r = \mathcal{A}$  的秩.

9. 计算  $\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}^{100}, \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}^{100}$ .

$$\text{解} \quad \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}^{100} = \left[ \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}^2 \right]^{50} = \begin{bmatrix} 1 & \\ & -1 \end{bmatrix}^{50} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I_2;$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}^{100} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}^{2 \times 50} = \begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}^{50}$$

$$= 2^{50} \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}^{50} = 2^{50} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}^{25} = 2^{50} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}.$$

\* 10. 用方阵表示  $S_4$  中元素  $(2\ 3\ 1\ 4)$ ,  $(1\ 3)$ ,  $(2\ 4)$ .

解

$$\mu(2\ 3\ 1\ 4) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \mu(1\ 3) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\mu(2\ 4) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

\* 11. 设  $f(X) = X^3 + pX + q$  是  $\mathbb{Z}[X]$  中不可约多项式,  $\alpha$  是其一复根.

(1) 试证明:  $\mathbb{Q}[\alpha] = \{g(\alpha) \mid g(X) \in \mathbb{Q}[X]\}$  是  $\mathbb{Q}$  上线性空间, 求其维数与基;

(2) 试证明:  $\varphi_f: \beta \mapsto f'(\alpha)\beta$  定义了  $\mathbb{Q}[\alpha]$  的一个线性变换 (其中  $f'(X)$  是  $f(X)$  的导数,  $f'(\alpha) = 3\alpha^2 + p$ ), 求  $\varphi_f$  在基  $1, \alpha, \alpha^2$  下的方阵表示  $A_f$ ;

(3) 求  $\det A_f$  且与  $\text{disc}(f)$  比较.

证 方法 1 (1) 在  $\mathbb{Q}[\alpha]$  中定义加法和数乘如下: 对任  $f(\alpha), g(\alpha) \in \mathbb{Q}[\alpha], \lambda \in \mathbb{Q}$ ,

$$f(\alpha) + g(\alpha) = (f + g)(\alpha),$$

$$\lambda f(\alpha) = (\lambda f)(\alpha).$$

则显然加法, 数乘封闭. (因为  $f + g \in \mathbb{Q}[X], \lambda f \in \mathbb{Q}[X]$ , 所以  $(f + g)(\alpha) \in \mathbb{Q}[\alpha], (\lambda f)(\alpha) \in \mathbb{Q}[\alpha]$ ).

又加法满足:

- ① 交换律,  $f(\alpha) + g(\alpha) = (f + g)(\alpha) = (g + f)(\alpha) = g(\alpha) + f(\alpha)$ ,
- ② 结合律  $(f(\alpha) + g(\alpha)) + h(\alpha) = (f + g + h)(\alpha) = f(\alpha) + (g(\alpha) + h(\alpha))$ ,
- ③ 有零元, 即  $0 \in \mathbb{Q}[X], 0(\alpha) = \theta$ , 则  $0(\alpha) + f(\alpha) = (0 + f)(\alpha) = f(\alpha)$ ,
- ④ 有负元, 任  $f(\alpha) \in \mathbb{Q}[\alpha]$ , 有  $-f(\alpha) + f(\alpha) = (-f + f)(\alpha) = 0\alpha = \theta$ .

数乘满足:

$$\textcircled{1} \lambda(f(\alpha) + g(\alpha)) = \lambda f(\alpha) + \lambda g(\alpha)$$

(因为左边  $= (\lambda(f + g))(\alpha) = (\lambda f + \lambda g)(\alpha) = (\lambda f)(\alpha) + (\lambda g)(\alpha) =$  右)

$$\textcircled{2} (\lambda + \mu)f(\alpha) = ((\lambda + \mu)f)(\alpha) = (\lambda f + \mu f)(\alpha) = \lambda f(\alpha) + \mu f(\alpha),$$

$$\textcircled{3} (\lambda\mu)f(\alpha) = (\lambda\mu f)(\alpha) = \lambda(\mu f)(\alpha) = \lambda(\mu f(\alpha)),$$

$$\textcircled{4} 1 \cdot f(\alpha) = f(\alpha).$$

所以  $\mathbb{Q}[\alpha]$  是  $\mathbb{Q}$  上的线性空间.  $1, \alpha, \alpha^2$  是  $\mathbb{Q}[\alpha]$  的基. (事实上因  $f(X)$  在  $\mathbb{Z}$  上不可约, 所以不存在不全为 0 的数  $k_1, k_2, k_3$  使得  $k_1 \cdot 1 + k_2\alpha + k_3\alpha^2 = 0$ , 故  $1, \alpha, \alpha^2$  线性无关. 而由  $f(\alpha) = \alpha^3 + p\alpha + q = 0$ , 得  $\alpha^3 = -q - p\alpha$ , 即  $\alpha^3$  可由  $1, \alpha, \alpha^2$  线性表出, 由此也易知  $\alpha^k (k \geq 4)$  均可由  $1, \alpha, \alpha^2$  线性表出, 于是任  $g(\alpha)$  可由  $1, \alpha, \alpha^2$  线性表出), 故知

$$\dim \mathbb{Q}[\alpha] = 3.$$

方法 2 同 12 题(1)的证法.

(2) 任  $\beta_1, \beta_2 \in \mathbf{Q}[\alpha]$ , 设  $\beta_1 = g_1(\alpha), \beta_2 = g_2(\alpha)$ , 于是

$$\begin{aligned}\varphi_{f'}(\beta_1 + \beta_2) &= \varphi_{f'}(g_1(\alpha) + g_2(\alpha)) = \varphi_{f'}(g_1 + g_2)(\alpha) = (3\alpha^2 + p)(g_1 + g_2)(\alpha) \\ &= (3\alpha^2 + p)(g_1(\alpha) + g_2(\alpha)) = (3\alpha^2 + p)g_1(\alpha) + (3\alpha^2 + p)g_2(\alpha) \\ &= \varphi_{f'}\beta_1 + \varphi_{f'}\beta_2,\end{aligned}$$

$$\varphi_{f'}\lambda\beta_1 = \varphi_{f'}(\lambda g_1)(\alpha) = (3\alpha^2 + p)(\lambda g_1)(\alpha) = \lambda\varphi_{f'}\beta_1,$$

所以  $\varphi_{f'}$  是  $\mathbf{Q}[\alpha]$  上的线性变换.

又因为

$$\varphi_{f'}(1) = 3\alpha^2 + p$$

$$\varphi_{f'}(\alpha) = (3\alpha^2 + p)\alpha = 3\alpha^3 + p\alpha = -3q - 2p\alpha$$

$$\varphi_{f'}(\alpha^2) = (3\alpha^2 + p)\alpha^2 = 3\alpha^4 + p\alpha^2 = -2p\alpha^2 - 3q\alpha$$

所以

$$A_{f'} = \begin{bmatrix} p & -3q & 0 \\ 0 & -2p & -3q \\ 3 & 0 & -2p \end{bmatrix}.$$

$$(3) \det A_{f'} = 4p^3 + 9q^2,$$

$$\text{disc}(f) = R(f, f') / (-1)^{\frac{3 \times 2}{2}} = -R(f, f')$$

$$\begin{aligned}&= - \begin{vmatrix} 1 & 0 & p & q & 0 \\ 0 & 1 & 0 & p & q \\ 3 & 0 & p & & \\ & 3 & 0 & p & \\ & & 3 & 0 & p \end{vmatrix} = -(p^3 - 3p^3 - 3p^3 + 9p^3 + 9q^2) \\ &= -(4p^3 + 9q^2),\end{aligned}$$

所以

$$\det A_{f'} = -\text{disc}(f).$$

\* 12. 设  $f(X) = X^n + aX + b$  是  $\mathbf{Z}[X]$  中不可约多项式,  $\alpha$  是其一复根.

(1) 试证明  $\mathbf{Q}[\alpha]$  是  $\mathbf{Q}$  上  $n$  维线性空间, 求其一基;

(2) 试证明:  $\varphi_{f'}: \beta \mapsto f'(\alpha)\beta$  定义了  $\mathbf{Q}[\alpha]$  的一个线性变换. 求  $\varphi_{f'}$  在某基下的方阵表示  $A_{f'}$ ;

(3) 求  $\det A_{f'}$ , 并与 3.3 节中第 44(1)题  $f(X)$  的判别式  $\text{disc}(f)$  比较.

证 (1) 设  $g(\alpha) \in \mathbf{Q}[\alpha]$ , 其中  $g(X) \in \mathbf{Q}[X]$ , 由带余除法可得

$$g(X) = f(X)q(X) + r(X), \quad \deg r(X) < n.$$

设  $r(X) = b_0 + b_1X + \cdots + b_{n-1}X^{n-1}$ , 则

$$g(\alpha) = f(\alpha)q(\alpha) + r(\alpha) = r(\alpha) = b_0 + b_1\alpha + \cdots + b_{n-1}\alpha^{n-1}.$$

因此可知

$$\mathbf{Q}[\alpha] = \{b_0 + b_1\alpha + \cdots + b_{n-1}\alpha^{n-1} \mid b_0, \cdots, b_{n-1} \in \mathbf{Q}\}$$

又  $f(X)$  不可约, 所以  $1, \alpha, \alpha^2, \cdots, \alpha^{n-1}$  线性无关, 于是得  $\mathbf{Q}[\alpha]$  是  $\mathbf{Q}$  上的  $n$  维线性空间,  $\{1, \alpha, \cdots, \alpha^{n-1}\}$  是其一基.

(2) (i) 对任意的  $\beta_1, \beta_2 \in \mathbf{Q}[\alpha]$  和  $\lambda \in \mathbf{Q}$ , 有

$$\varphi_{f'}(\beta_1 + \beta_2) = f'(\alpha)(\beta_1 + \beta_2) = f'(\alpha)\beta_1 + f'(\alpha)\beta_2 = \varphi_{f'}(\beta_1) + \varphi_{f'}(\beta_2),$$

$$\varphi_{f'}(\lambda\beta_1) = f'(\alpha)(\lambda\beta_1) = \lambda f'(\alpha)\beta_1 = \lambda\varphi_{f'}(\beta_1),$$

故  $\varphi_{f'}$  是  $\mathbf{Q}[\alpha]$  上的线性变换.

(ii) 取  $\mathbf{Q}[\alpha]$  的基  $\{1, \alpha, \dots, \alpha^{n-1}\}$ , 由  $f(\alpha) = \alpha^n + a\alpha + b = 0$

知

$$\varphi_{f'}(1) = f'(\alpha) = n\alpha^{n-1} + a = a + n\alpha^{n-1},$$

$$\varphi_{f'}(\alpha) = f'(\alpha)\alpha = n\alpha^n + a\alpha = -nb + (1-n)a\alpha,$$

$$\varphi_{f'}(\alpha^2) = f'(\alpha)\alpha^2 = -nb\alpha + (1-n)a\alpha^2,$$

$$\dots \dots \dots$$

$$\varphi_{f'}(\alpha^{n-2}) = f'(\alpha)\alpha^{n-2} = -nb\alpha^{n-3} + (1-n)a\alpha^{n-2},$$

$$\varphi_{f'}(\alpha^{n-1}) = f'(\alpha)\alpha^{n-1} = -nb\alpha^{n-2} + (1-n)a\alpha^{n-1}.$$

设  $\varphi_{f'}$  在基  $1, \alpha, \dots, \alpha^{n-1}$  下的方阵表示为  $A_{f'}$ , 由定义  $A_{f'}$  的第  $j$  列应是  $\varphi_{f'}\alpha^{j-1}$  的坐标列, 故

$$A_{f'} = \begin{bmatrix} a, & -nb & & & \\ & (1-n)a, & -nb & & \\ & & (1-n)a & \ddots & \\ & & & \ddots & \ddots \\ & & & & \ddots & -nb \\ n & & & & & (1-n)a \end{bmatrix}$$

(3)

$$\begin{aligned} \det A_{f'} &= a \begin{vmatrix} (1-n)a & -nb & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & -nb \\ & & & (1-n)a \end{vmatrix} + (-1)^{n-1} n \begin{vmatrix} & -nb & & \\ (1-n)a & & \ddots & \\ & \ddots & & \ddots \\ & & & (1-n)a, & -nb \end{vmatrix} \\ &= a(1-n)^{n-1}a^{n-1} + (-1)^{n-1}n \cdot (-nb)^{n-1} \\ &= (1-n)^{n-1}a^n + n^n b^{n-1}. \end{aligned}$$

因为  $\text{disc}(f) = R(f, f') / (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} = [(1-n)^{n-1}a^n + n^n b^{n-1}] / (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}},$

所以  $\det A_{f'} = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} \text{disc}(f).$

\* 13. 设  $f(X) = X^n + a_{n-1}X^{n-1} + \dots + a_0$  是  $\mathbf{Q}[X]$  中不可约多项式,  $\alpha$  是其一复根.

(1) 试证明  $\mathbf{Q}[\alpha] = \{g(\alpha) \mid g(X) \in \mathbf{Q}[X]\}$  是  $\mathbf{Q}$  上  $n$  维线性空间,  $1, \alpha, \dots, \alpha^{n-1}$  是一基;

(2) 由  $\alpha$  定义了  $\mathbf{Q}[\alpha]$  上的线性变换  $\varphi_\alpha: \beta \mapsto \alpha\beta$ , 求  $\varphi_\alpha$  在上述基下的方阵表示  $A_\alpha$  并求  $\det A_\alpha$ ;

(3) 设  $\lambda$  是一个复变数(即在  $\mathbf{C}$  中取值的自变量), 由  $\varphi_{\lambda-\alpha}: \beta \mapsto (\lambda-\alpha)\beta$  定义了  $\mathbf{Q}[\alpha]$  中的线性变换  $\varphi_{\lambda-\alpha}$ , 求它在上述基下的方阵表示  $A_{\lambda-\alpha}$ , 并求  $\det A_{\lambda-\alpha}$ .

证 (1) 设  $g(\alpha) \in \mathbf{Q}[\alpha]$ , 其中  $g(X) \in \mathbf{Q}[X]$ , 由带余除法可知  $g(X) = f(X)q(X) + r(X)$ , 其中  $\deg r(X) < n$ . 设

$$r(X) = b_0 + b_1X + \dots + b_{n-1}X^{n-1}$$

则

$$g(\alpha) = f(\alpha)g(\alpha) + r(\alpha) = r(\alpha) = b_0 + b_1\alpha + \cdots + b_{n-1}\alpha^{n-1}$$

故

$$\mathbf{Q}[\alpha] = \{g(\alpha) \mid g(X) \in \mathbf{Q}[X]\} = \{b_0 + b_1\alpha + \cdots + b_{n-1}\alpha^{n-1} \mid b_0, \dots, b_{n-1} \in \mathbf{Q}\}$$

故  $\mathbf{Q}[\alpha]$  是  $\mathbf{Q}$  上的  $n$  维线性空间,  $1, \alpha, \dots, \alpha^{n-1}$  是其一基 (事实上, 因为  $f(X)$  在  $\mathbf{Q}$  中不可约, 所以  $1, \alpha, \dots, \alpha^{n-1}$  线性无关, 即不存在不全为 0 的数  $k_0, k_1, \dots, k_{n-1}$ , 使  $k_0 + k_1\alpha + \cdots + k_{n-1}\alpha^{n-1} = 0$ . 又由前式知任  $g(\alpha)$  均可由  $1, \alpha, \dots, \alpha^{n-1}$  线性表出).

(2) 显然  $\varphi_\alpha$  是  $\mathbf{Q}[\alpha]$  的线性变换. 注意  $f(\alpha) = \alpha^n + a_{n-1}\alpha^{n-1} + \cdots + a_0 = 0$

$$\varphi_\alpha(1) = \alpha$$

$$\varphi_\alpha(\alpha) = \alpha^2$$

$$\dots \dots$$

$$\varphi_\alpha(\alpha^{n-2}) = \alpha^{n-1}$$

$$\varphi_\alpha(\alpha^{n-1}) = \alpha^n = -a_0 - a_1\alpha - \cdots - a_{n-1}\alpha^{n-1},$$

由于  $A_\alpha$  的第  $j$  列应是  $\varphi_\alpha(\alpha^{j-1})$  的坐标列, 故

$$A_\alpha = \begin{bmatrix} 0 & & & & -a_0 \\ 1 & 0 & & & -a_1 \\ & 1 & \ddots & & \vdots \\ & & \ddots & 0 & \vdots \\ & & & 1 & -a_{n-1} \end{bmatrix}$$

按第一行展开:

$$\det A_\alpha = (-1)^{n+1}(-a_0) = (-1)^n a_0$$

(或由  $\det(\lambda I - A_\alpha) = f(\lambda)$ , 令  $\lambda = 0$  也可得  $\det A_\alpha = (-1)^n f(0) = (-1)^n a_0$ ).

(3) 易证  $\varphi_{\lambda-\alpha}$  是  $\mathbf{Q}[\alpha]$  的线性变换.

$$\varphi_{\lambda-\alpha}(1) = \lambda - \alpha,$$

$$\varphi_{\lambda-\alpha}(\alpha) = (\lambda - \alpha)\alpha = \lambda\alpha - \alpha^2,$$

$$\dots \dots \dots$$

$$\varphi_{\lambda-\alpha}(\alpha^{n-2}) = (\lambda - \alpha)\alpha^{n-2} = \lambda\alpha^{n-2} - \alpha^{n-1},$$

$$\varphi_{\lambda-\alpha}(\alpha^{n-1}) = (\lambda - \alpha)\alpha^{n-1} = \lambda\alpha^{n-1} - \alpha^n = -a_0 - a_1\alpha - \cdots - a_{n-2}\alpha^{n-2} + (\lambda - a_{n-1})\alpha^{n-1}.$$

由于  $A_{\lambda-\alpha}$  的第  $j$  列应是  $\varphi_{\lambda-\alpha}(\alpha^{j-1})$  的坐标列, 故

$$A_{\lambda-\alpha} = \begin{bmatrix} \lambda & & & & -a_0 \\ -1 & \lambda & & & -a_1 \\ & -1 & \ddots & & \vdots \\ & & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & & \ddots & \lambda & -a_{n-2} \\ & & & & -1 & \lambda - a_{n-1} \end{bmatrix}$$

故

$$\det A_\alpha = f(\lambda).$$

14. 设  $\mathcal{D}$  为多项式形式空间  $F[X]$  上的“求导”变换,  $W$  为次数不超过  $n$  的多项式全



体,证明  $W$  是  $\mathcal{D}$  的不变子空间.

证 任  $f(X) \in W$ , 设

$$f(X) = a_n X^n + a_{n-1} X^{n-1} + \cdots + a_1 X + a_0,$$

则

$$f'(X) = na_n X^{n-1} + (n-1)a_{n-1} X^{n-2} + \cdots + a_1 \in W,$$

所以  $W$  是  $\mathcal{D}$  的不变子空间.

15. 设  $A = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ , 由  $x \mapsto Ax$  定义了  $\mathbf{R}^{(2)}$  上的线性变换  $\mathcal{A}$ . 求  $\mathcal{A}$  的不变子空间.

解 事实上  $A$  是  $\mathcal{A}$  在  $\mathbf{R}^{(2)}$  的自然基下的方阵表示 (自然基  $e_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, e_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ ). 任  $x \in \mathbf{R}^2$ , 设  $x = (x_1, x_2)^T$ , 则

$$Ax = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -x_2 \\ x_1 \end{bmatrix},$$

所以当  $x=0$  时,  $Ax=0$ ; 当  $x \in \mathbf{R}^{(2)}$  时,  $Ax \in \mathbf{R}^{(2)}$ ,

故  $0, \mathbf{R}^{(2)}$  为  $\mathcal{A}$  的不变子空间.

因为一维不变子空间是由特征向量生成的, 即满足  $Ax = \lambda x$  的非零向量, 为此先求  $A$  的特征值

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda & 1 \\ -1 & \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 + 1 = 0 \rightarrow \lambda = \pm i,$$

因为无实特征值, 所以无实特征向量, 故在  $\mathbf{R}^{(2)}$  中无一维不变子空间.

16. 设  $\mathcal{A}$  为  $\mathbf{R}^{(2)}$  的线性变换, 在自然基下方阵表示为  $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$ .

(1) 证明  $\mathcal{A}$  的不变子空间只能为  $\mathbf{R}^{(2)}$  和  $0$ ;

(2) 设  $\mathcal{B}$  是  $\mathbf{C}^{(2)}$  的线性变换, 在自然基下的方阵表示为  $A$ , 证明  $\mathcal{B}$  有一维不变子空间.

证 (1) 因为  $A0=0$ , 任  $x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \in \mathbf{R}^{(2)}$ ,

$$Ax = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 - x_2 \\ 2x_1 + 2x_2 \end{bmatrix} \in \mathbf{R}^{(2)},$$

所以  $0, \mathbf{R}^{(2)}$  是  $\mathcal{A}$  的不变子空间.

又由  $Ax = \lambda x$ , 知有  $\det(\lambda I - A) = \lambda^2 - 3\lambda + 4 = 0 \rightarrow \lambda_{1,2} = \frac{3 \pm \sqrt{7}i}{2} \in \mathbf{R}$ ,

即特征值为复数, 所以在  $\mathbf{R}^{(2)}$  中,  $\mathcal{A}$  没有一维不变子空间.

(2) 在  $\mathbf{C}^{(2)}$  中,  $Ax = \lambda x \rightarrow (A - \lambda I)x = 0$ ,

$$\begin{bmatrix} \frac{1+\sqrt{7}i}{2} & 1 \\ -2 & \frac{-1+\sqrt{7}i}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = 0 \rightarrow \eta^{(1)} = \begin{bmatrix} 1 \\ -\frac{1+\sqrt{7}i}{2} \end{bmatrix},$$

$$\begin{bmatrix} \frac{1-\sqrt{7}i}{2} & 1 \\ -2 & \frac{-1-\sqrt{7}i}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = 0 \rightarrow \eta^{(2)} = \begin{bmatrix} 1 \\ \frac{-1+\sqrt{7}i}{2} \end{bmatrix},$$

所以  $\langle \eta^{(1)} \rangle, \langle \eta^{(2)} \rangle$  均是  $\mathscr{B}$  的一维不变子空间.

17. 设  $V$  是  $[0, 1]$  上连续实函数全体所成  $\mathbf{R}$  上线性空间,  $\mathcal{T}$  为  $V$  的“不定积分”变换:

$$(\mathcal{T}f)(x) = \int_0^x f(t) dt$$

多项式函数子空间是否是不变子空间? 可微函数呢? 以  $x = \frac{1}{2}$  为零点的函数呢?

解 (1) 设  $W_1 = \{f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0 \mid a_i \in \mathbf{R}, 0 \leq i \leq n, n \text{ 为正整数}\}$ .

任  $f(x) \in W_1$ , 有

$$\int_0^x f(t) dt = \frac{a_n}{n+1} x^{n+1} + \frac{a_{n-1}}{n} x^n + \cdots + \frac{a_1 x^2}{2} + a_0 x \in W_1$$

所以  $W_1$  是  $\mathcal{T}$  的不变子空间.

(这里  $W_1$  是全体多项式函数, 次数为任意, 若限制次数  $\leq n$ , 则对“积分”变换不是子空间).

(2) 设  $W_2 = \{f(x) \mid f(x) \text{ 可微}\}$ ,

任  $f(x) \in W_2$ ,

因为

$$\left(\int_0^x f(t) dt\right)'_x = f(x),$$

所以

$$\int_0^x f(t) dt \in W_2,$$

故  $W_2$  是  $\mathcal{T}$  的不变子空间.

(3) 设  $W_3 = \left\{f(x) \mid f(x) = \left(x - \frac{1}{2}\right)^m g(x), g\left(\frac{1}{2}\right) \neq 0, g(x) \text{ 在 } [0, 1] \text{ 上连续}\right\}$ .

任  $f(x) \in W_3$ ,

$$\begin{aligned} \int_0^x f(t) dt &= \int_0^x \left(t - \frac{1}{2}\right)^m g(t) dt \\ &= \left(x - \frac{1}{2}\right)^m \int_0^x g(t) dt - m \int_0^x \left(\int_0^t g(t) dt\right) \left(t - \frac{1}{2}\right)^{m-1} dt \end{aligned}$$

当  $m=1$  时, 有

$$\int_0^x f(t) dt = \left(x - \frac{1}{2}\right) \int_0^x g(t) dt - \int_0^x \left(\int_0^t g(t) dt\right) dt$$

如  $g(t) = 1$ , 即  $f(x) = x - \frac{1}{2}$ , 则  $\int_0^x f(t) dt = \frac{1}{2}x(x-1)$ , 不再以  $x = \frac{1}{2}$  为零点.

故

$$\int_0^x f(t) dt \notin W_3,$$

于是  $W_3$  不是  $\mathcal{T}$  的不变子空间.

18. 证明:  $n$  维线性空间  $V$  的任一子空间  $W$  是某一线性变换  $\mathcal{A}$  的象集.

证 在  $W$  中取基  $b_1, \dots, b_r$ , 扩充为  $V$  的基  $b_1, \dots, b_r, b_{r+1}, \dots, b_n$ . 令

$$\begin{aligned}\mathcal{A}b_i &= b_i & i &= 1, 2, \dots, r, \\ \mathcal{A}b_j &= 0, & j &= r+1, \dots, n.\end{aligned}$$

对任  $x \in V$ , 设  $x = \sum_{i=1}^n \lambda_i b_i$ , 则有

$$\mathcal{A}x = \sum_{i=1}^n \lambda_i \mathcal{A}b_i = \sum_{i=1}^r \lambda_i b_i \in W, \quad \text{故 } \text{Im} \mathcal{A} \subseteq W;$$

又任  $\beta \in W$ , 可设  $\beta = \sum_{i=1}^r \mu_i b_i$ , 则存在  $\alpha \in V$ , 使

$$\mathcal{A}\alpha = \beta, \quad (\text{只要取 } \alpha = \beta + \sum_{i=r+1}^n \mu_i b_i \text{ 即可})$$

于是得

$$W \subset \text{Im} \mathcal{A}, \quad \text{所以 } W = \text{Im} \mathcal{A}.$$

19. 证明:  $n$  维线性空间  $V$  的任一子空间  $W$  是某一线性变换  $\mathcal{A}$  的核.

证 在  $W$  中取基  $b_1, \dots, b_r$ , 扩充为整个空间  $V$  的基  $b_1, \dots, b_r, b_{r+1}, \dots, b_n$ . 令

$$\begin{aligned}\mathcal{A}b_i &= 0, & i &= 1, 2, \dots, r, \\ \mathcal{A}b_j &= b_j, & r+1 \leq j \leq n.\end{aligned}$$

任  $x \in V$ , 设  $x = \sum_{i=1}^n \lambda_i b_i$ , 则

$$\mathcal{A}x = \sum_{i=1}^n \lambda_i \mathcal{A}b_i = \sum_{i=r+1}^n \lambda_i b_i,$$

又因为  $b_{r+1}, \dots, b_n$  线性无关,

$$\text{所以 } \mathcal{A}x = 0 \Leftrightarrow \lambda_{r+1} = \dots = \lambda_n = 0 \Leftrightarrow x = \sum_{i=1}^r \lambda_i b_i \in W$$

即

$$\ker \mathcal{A} = W.$$

20. 对任意矩阵  $A_{m \times n}$  和  $B_{n \times m}$ , 证明  $AB$  与  $BA$  的非 0 特征根均相同. 当  $m=n$  时, 证明  $AB$  与  $BA$  的特征根相同.

证 因为对任  $A_{m \times n}, B_{n \times m}$  有

$$\lambda^n \det(\lambda I_m - AB) = \lambda^m \det(\lambda I_n - BA),$$

(证明见第 4 章补充题 10).

当  $\lambda \neq 0$  时,

$$\det(\lambda I_m - AB) = 0 \Leftrightarrow \det(\lambda I_n - BA) = 0$$

所以  $AB$  与  $BA$  的非 0 特征根均相同.

当  $m=n$  时, 有

$$\det(\lambda I_m - AB) = \det(\lambda I_n - BA),$$

即  $AB$  与  $BA$  的特征多项式完全相同, 所以特征根相同.

21. 设  $\mathcal{A}$  是  $\mathbf{R}^{(3)}$  上的线性变换, 在自然基下方阵表示为

$$A = \begin{bmatrix} -9 & 4 & 4 \\ -8 & 3 & 4 \\ -16 & 8 & 7 \end{bmatrix},$$

试求出  $\mathcal{A}$  的三个线性无关向量构成  $\mathbf{R}^{(3)}$  的基, 从而求出  $\mathcal{A}$  的对角阵表示.

解

$$\det(\lambda I - A) = \begin{vmatrix} \lambda + 9 & -4 & -4 \\ 8 & \lambda - 3 & -4 \\ 16 & -8 & \lambda - 7 \end{vmatrix} = (\lambda - 3)(\lambda^2 + 2\lambda + 1) = 0,$$

所以

$$\lambda_1 = 3, \lambda_2 = -1 \text{ 为二重根,}$$

对  $\lambda_1 = 3$ , 解齐次线性方程组  $(\lambda_1 I - A)X = 0$ , 得

$$x_1 = (1, 1, 2)^T, \text{ 全部解为 } kx_1, k \in \mathbf{R},$$

对  $\lambda_2 = -1$ , 解齐次线性方程组  $(\lambda_2 I - A)X = 0$ , 得

$$x = k_1 x_2 + k_2 x_3, \text{ 其中 } x_2 = (1, 2, 0)^T, x_3 = (1, 0, 2)^T,$$

则  $\mathcal{A}$  在基  $x_1, x_2, x_3$  下的方阵表示为

$$\begin{bmatrix} 3 & & \\ & -1 & \\ & & -1 \end{bmatrix}.$$

22. 设

$$A = \begin{bmatrix} 6 & -3 & -2 \\ 4 & -1 & -2 \\ 10 & -5 & -3 \end{bmatrix}$$

$A$  在  $\mathbf{R}$  上是否相似于对角形方阵? 在  $\mathbf{C}$  上呢?

解

$$\det(\lambda I - A) = \begin{vmatrix} \lambda - 6 & 3 & 2 \\ -4 & \lambda + 1 & 2 \\ -10 & 5 & \lambda + 3 \end{vmatrix} = (\lambda - 2)(\lambda^2 + 1) = 0,$$

所以

$$\lambda_1 = 2, \lambda_2 = i, \lambda_3 = -i.$$

因为有两个复特征根, 所以  $A$  没有三个线性无关的实特征向量, 所以在  $\mathbf{R}$  上  $A$  不相似于对角阵, 在  $\mathbf{C}$  上  $A$  相似于

$$\begin{bmatrix} 2 & & \\ & i & \\ & & -i \end{bmatrix}.$$

23. 设  $\mathcal{A}$  是  $\mathbf{R}^{(4)}$  的线性变换, 在自然基下方阵表示为

$$A = \begin{bmatrix} 0 & a & & \\ & 0 & b & \\ & & 0 & c \\ & & & 0 \end{bmatrix},$$

问当  $a, b, c$  取何值时  $\mathcal{A}$  可对角化(即有对角形方阵表示)?

解 方法 1 显然  $\mathcal{A}$  的特征值为 0(四重根), 为求其特征子空间  $V_{\lambda=0}$ , 需解方程组  $Ax=0$ , 知只有当  $a, b, c$  均为 0 时, 其解空间才是 4 维的, 即  $\mathcal{A}$  可对角化当且仅当  $a, b, c$  为 0.

方法 2 若  $\mathcal{A}$  可对角化, 说明存在可逆阵  $P$ , 使得

$$P^{-1}AP = D = 0 \rightarrow A = 0$$

所以  $a=b=c=0$ .

24. 证明: 线性变换的属于两个不同特征根的两个特征向量是线性无关的. 试讨论多个特征根或多个特征向量的情形.

证 (1) 设  $\mathcal{A}x_1 = \lambda_1 x_1$ ,  $\mathcal{A}x_2 = \lambda_2 x_2$ ,  $\lambda_1 \neq \lambda_2$ , (不妨设  $\lambda_1 \neq 0$ ), 则若有

$$k_1 x_1 + k_2 x_2 = 0 \quad (1)$$

两边作用  $\mathcal{A}$  得  $k_1 \lambda_1 x_1 + k_2 \lambda_2 x_2 = 0$ , 此式减去 (1)  $\times \lambda_1$  得  $k_2 (\lambda_2 - \lambda_1) x_2 = 0$ , 由  $\lambda_2 - \lambda_1 \neq 0$ ,  $x_2 \neq 0$ , 知  $k_2 = 0$  代回 (1) 式得  $k_1 = 0$ ,

所以  $x_1, x_2$  线性无关.

(2) 设  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_s$  为  $\mathcal{A}$  的互不相同的特征值, 且有  $\mathcal{A}x_i = \lambda_i x_i$ ,  $i = 1, 2, \dots, s$ .

对向量的个数  $s$  作归纳法: 当  $s=2$  时, 由 (1) 已证. 假设  $s-1$  时命题成立, 做线性组合

$$k_1 x_1 + k_2 x_2 + \dots + k_s x_s = 0 \quad (2)$$

用  $\mathcal{A}$  作用于上式两边得

$$k_1 \mathcal{A}x_1 + k_2 \mathcal{A}x_2 + \dots + k_s \mathcal{A}x_s = 0$$

即

$$k_1 \lambda_1 x_1 + k_2 \lambda_2 x_2 + \dots + k_s \lambda_s x_s = 0 \quad (3)$$

(3) - (2)  $\times \lambda_s$  (不妨设  $\lambda_s \neq 0$ ) 得

$$k_1 (\lambda_1 - \lambda_s) x_1 + k_2 (\lambda_2 - \lambda_s) x_2 + \dots + k_{s-1} (\lambda_{s-1} - \lambda_s) x_{s-1} = 0,$$

由归纳假设知  $x_1, x_2, \dots, x_{s-1}$  线性无关, 又  $\lambda_i \neq \lambda_s, i = 1, 2, \dots, s-1$ ,

所以必有  $k_1 = k_2 = \dots = k_{s-1} = 0$ , 代回 (2) 式  $\rightarrow k_s = 0$ ,

所以  $x_1, x_2, \dots, x_s$  线性无关.

(3) 设  $\lambda_1, \dots, \lambda_s$  是  $\mathcal{A}$  的互不相同的特征值, 而  $x_1^{(1)}, \dots, x_{n_1}^{(1)}$  是  $\mathcal{A}$  的属于特征值  $\lambda_1$  的线性无关的特征向量,  $i = 1, 2, \dots, s$ . 我们将证明向量组

$$x_1^{(1)}, \dots, x_{n_1}^{(1)}, x_1^{(2)}, \dots, x_{n_2}^{(2)}, \dots, x_1^{(s)}, \dots, x_{n_s}^{(s)}$$

线性无关. 为此对特征值的个数  $s$  作归纳法:

当  $s=1$  时,  $x_1^{(1)}, \dots, x_{n_1}^{(1)}$  线性无关.

假设  $(s-1)$  时成立, 考虑  $s$  时的情况.

设存在

$$\mu_{ij} \quad \begin{matrix} i = 1, 2, \dots, s, \\ j = 1, 2, \dots, n_i \end{matrix}$$

使得

$$\sum_{i=1}^s \sum_{j=1}^{n_i} \mu_{ij} x_j^{(i)} = 0 \quad (4)$$

把  $\mathcal{A}$  作用在 (4) 式两边, 有

$$\sum_{i=1}^s \sum_{j=1}^{n_i} \mu_{ij} \mathcal{A}x_j^{(i)} = 0$$

即

$$\sum_{i=1}^s \sum_{j=1}^{n_i} \mu_{ij} \lambda_i x_j^{(i)} = 0 \quad (5)$$

(5) - (4)  $\times \lambda_s$  有

$$\sum_{i=1}^{s-1} \sum_{j=1}^{n_i} \mu_{ij} (\lambda_i - \lambda_s) x_j^{(i)} = 0$$

由归纳假设知

$$\{x_j^{(i)}\} \quad \begin{array}{l} i = 1, 2, \dots, s-1, \\ j = 1, 2, \dots, n_i, \end{array} \quad \text{线性无关.}$$

$$\text{所以 } \mu_{ij} = 0, \quad \begin{array}{l} i = 1, 2, \dots, s-1, \\ j = 1, 2, \dots, n_i \end{array}$$

代回(4)式中知  $\mu_{sj} = 0, j = 1, 2, \dots, n_s$ . 于是得所有的  $\mu_{ij} = 0$ , 故

$$\{x_j^{(i)} \mid i = 1, 2, \dots, s; j = 1, 2, \dots, n_i\} \text{ 线性无关.}$$

25. 证明: 2 阶对称实方阵一定在  $\mathbf{R}$  上相似于对角形方阵.

$$\text{证 设 } A = \begin{bmatrix} a & b \\ b & d \end{bmatrix}, \text{ 则 } \det(\lambda I - A) = \lambda^2 - (a+d)\lambda + ad - b^2$$

$$\text{所以 } \lambda_{1,2} = \frac{(a+d) \pm \sqrt{(a-d)^2 + 4b^2}}{2}$$

$$\text{① 当 } (a-d)^2 + 4b^2 = 0, \text{ 即 } a=d, b=0, \lambda_{1,2}=a, A = \begin{bmatrix} a & \\ & a \end{bmatrix};$$

② 否则  $\lambda_1, \lambda_2$  为不等实数, 故存在  $x_1, x_2$ , 使  $Ax_1 = \lambda_1 x_1, Ax_2 = \lambda_2 x_2$ , 取  $P = (x_1, x_2)$ , 则有

$$AP = (Ax_1, Ax_2) = (\lambda_1 x_1, \lambda_2 x_2) = P \begin{bmatrix} \lambda_1 & \\ & \lambda_2 \end{bmatrix},$$

即

$$P^{-1}AP = \begin{bmatrix} \lambda_1 & \\ & \lambda_2 \end{bmatrix}.$$

$$26. \text{ 证明: 2 阶复方阵 } A \text{ 必复相似于 } \begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{bmatrix} \text{ 或 } \begin{bmatrix} a & 1 \\ 0 & a \end{bmatrix}.$$

$$\text{证 若 } A \text{ 有两个不等特征值 } a, b, \text{ 则 } A \text{ 相似于 } \begin{bmatrix} a & \\ & b \end{bmatrix};$$

若  $A$  有两个相等的特征值 ( $\lambda_1 = \lambda_2 = a$ ), 且有两线性无关的特征向量  $x_1, x_2$ , 取  $P = (x_1, x_2)$ , 则仍有  $P^{-1}AP = \begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{bmatrix};$

当  $\lambda_1 = \lambda_2 = a$ , 且  $A$  只有一个线性无关的特征向量  $x_1$  时, 再找  $x_2$ , 使  $P_1 = (x_1, x_2)$  为可逆阵, 于是有  $AP_1 = (Ax_1, Ax_2) = (ax_1, Ax_2) = (x_1, x_2) \begin{bmatrix} a & b \\ 0 & a \end{bmatrix}$ , 即

$$P_1^{-1} A P_1 = \begin{bmatrix} a & b \\ 0 & a \end{bmatrix},$$

再找  $P_2 = \begin{bmatrix} b & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ , 则  $P_2^{-1} = \begin{bmatrix} b^{-1} & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$  且令  $P = P_1 P_2$ , 故有

$$P^{-1} A P = P_2^{-1} P_1^{-1} A P_1 P_2 = \begin{bmatrix} a & 1 \\ 0 & a \end{bmatrix}.$$

27. 设 2 阶复方阵  $N$  满足  $N^2=0$ , 证明  $N=0$  或  $N$  相似于  $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ .

证 方法 1 设  $\lambda$  为  $N$  的特征值, 由  $N^2=0$  知  $\lambda^2=0$ , 故  $\lambda=0$  为二重根 (事实上, 由  $Nx=\lambda x, \rightarrow N^2x=\lambda^2x=0, x \neq 0$ , 所以  $\lambda^2=0$ ). 再利用 26 题知  $N$  相似于对角阵 (即相似于 0 矩阵), 所以  $N=0$  或  $N$  相似于上三角阵, 对角线元素为其特征值 0, 所以  $N$  相似于  $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ .

方法 2 因为  $N^2=0$ , 所以  $\det N=0$ , 故  $\text{rank}(N)=0$ , 或 1,

当  $r(N)=0$  时,  $N=0$ ;

当  $r(N)=1$  时, 设  $N = \begin{bmatrix} a & b \\ ka & kb \end{bmatrix}$ , 其中  $a, b$  不全为 0,

$$\det(\lambda I - N) = \lambda^2 - (a + kb)\lambda = 0, \rightarrow \lambda_1 = 0, \lambda_2 = a + kb = 0$$

所以  $a = -kb$ , 故

$$N = \begin{bmatrix} -kb & b \\ -k^2b & kb \end{bmatrix} = b \begin{bmatrix} -k & 1 \\ -k^2 & k \end{bmatrix}.$$

解  $(\lambda I - N)x = 0$ , 得特征向量, 取  $x_1 = (b, kb)^T$  令  $P = \begin{bmatrix} b & 0 \\ kb & 1 \end{bmatrix} \rightarrow P^{-1} = \begin{bmatrix} b^{-1} & 0 \\ -k & 1 \end{bmatrix}$ , 则

$$P^{-1} N P = \begin{bmatrix} b^{-1} & 0 \\ -k & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -kb & b \\ -k^2b & kb \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b & 0 \\ kb & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -k & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b & 0 \\ kb & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

28. 设  $V$  是  $F$  上  $n$  阶方阵全体所成  $F$  上线性空间,  $A$  为一固定的  $F$  上  $n$  阶方阵, 设  $V$  的线性变换  $\varphi$  由“左乘以  $A$ ”定义, 即  $\varphi: X \mapsto AX$ , 那么  $\varphi$  与  $A$  是否有相同的特征值?

解 由已知

$$\begin{aligned} \varphi: M_n &\rightarrow M_n \\ X &\mapsto AX \end{aligned}$$

于是, 我们易得

$$\begin{aligned} \lambda \text{ 是 } \varphi \text{ 的特征值} &\Leftrightarrow (\varphi - \lambda \epsilon) X = 0 \text{ 有非零解 } X (\text{方阵}) \\ &\Leftrightarrow (A - \lambda I) X = 0 \text{ 有非零解 } X (\text{方阵}), \\ &\Leftrightarrow (A - \lambda I) y = 0 \text{ 有非零解 } y (\text{向量}, y \in F^{(n)}), \\ &\Leftrightarrow \lambda \text{ 是 } A \text{ 的特征值}, \end{aligned}$$

所以  $\varphi$  与  $A$  特征值同.

下面我们来看一下线性变换  $\varphi$  的矩阵表示:

先以  $n=2$  为例, 设  $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$ , 则

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda - a_{11} & -a_{12} \\ -a_{21} & \lambda - a_{22} \end{vmatrix}.$$

易算得  $\varphi$  在基  $E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}$  上方阵表示为

$$B = \begin{bmatrix} a_{11} & 0 & a_{12} & 0 \\ 0 & a_{11} & 0 & a_{12} \\ a_{21} & 0 & a_{22} & 0 \\ 0 & a_{21} & 0 & a_{22} \end{bmatrix} = (a_{ij} I_2),$$

于是有

$$\det(\lambda I - B) = \begin{vmatrix} \lambda - a_{11} & -a_{12} \\ -a_{21} & \lambda - a_{22} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} \lambda - a_{11} & -a_{12} \\ -a_{21} & \lambda - a_{22} \end{vmatrix} = |\lambda I - A|^2.$$

当  $A$  是  $n$  阶方阵时, 我们有  $B = (a_{ij} I_n)$ , 其求法如下:

记  $A = (a_{ij})_{n \times n}$ ,  $X = \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{bmatrix}$ , 其中  $\alpha_i$  是方阵  $X$  的第  $i$  行元素构成的行向量. 取  $M_n(F)$

的基

$$\{E_{ij}\} = \{E_{11}, E_{12}, \dots, E_{1n}, E_{21}, \dots, E_{2n}, \dots, E_{n1}, \dots, E_{nn}\}$$

则方阵  $X$  在此基上的坐标为

$$\tilde{X} = \begin{bmatrix} \alpha_1^T \\ \vdots \\ \alpha_n^T \end{bmatrix}_{n^2 \times 1},$$

设  $B$  为  $\varphi$  在基  $\{E_{ij}\}$  上的方阵表示, 则  $\varphi X = AX$  的坐标形式为

$$\widehat{\varphi X} = B\tilde{X}$$

而

$$\varphi X = AX = (a_{ij})_{n \times n} \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11}\alpha_1 + \dots + a_{1n}\alpha_n \\ \vdots \\ a_{n1}\alpha_1 + \dots + a_{nn}\alpha_n \end{bmatrix}_{n \times n}$$

$$\text{所以 } \widehat{\varphi X} = \begin{bmatrix} a_{11}\alpha_1^T + \dots + a_{1n}\alpha_n^T \\ \vdots \\ a_{n1}\alpha_1^T + \dots + a_{nn}\alpha_n^T \end{bmatrix}_{n^2 \times 1} = \begin{bmatrix} a_{11}I & \dots & a_{1n}I \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{n1}I & \dots & a_{nn}I \end{bmatrix}_{n^2 \times n^2} \begin{bmatrix} \alpha_1^T \\ \vdots \\ \alpha_n^T \end{bmatrix} = (a_{ij} I_n) \tilde{X}.$$

所以

$$B = (a_{ij} I_n)_{n^2 \times n^2}$$

且有

$$\det(\lambda I - B) = (\det(\lambda I - A))^n$$

故  $B$  与  $A$  的特征值相同, (区别是重数不同).

注 因为  $\det(\lambda I - B)$  中取  $1, n+1, 2n+1, \dots, (n-1)n+1$  行、列交叉处的元素得的



子式恰为  $\det(\lambda I - A)$ ; 同样取  $2, n+2, \dots, (n-1)n+2$  行、列交叉处的元素得的子式也为  $\det(\lambda I - A), \dots$ , 即  $\lambda I - B$  经行(列)初等变换可化为准对角阵, 用矩阵乘法写出就是

$$P^{-1}(\lambda I - B)P = \begin{bmatrix} (\lambda I - A) & & \\ & \ddots & \\ & & (\lambda I - A) \end{bmatrix}_{n^2 \times n^2}$$

其中  $P$  为对换方阵之积. 于是得  $|\lambda I - B| = |\lambda I - A|^n$ .

(对换方阵就是单位方阵经互换两行得到的方阵).

29. 设  $A$  为 3 阶实方阵, 证明: 若  $A$  不实相似于上三角形阵, 则  $A$  复相似于对角阵.

证 因为  $A$  为实方阵, 所以  $\det(\lambda I - A)$  为三次实系数多项式, 于是知其必有实根, 且复根共轭出现. 又由已知,  $A$  不实相似于上三角形阵, 知  $A$  的特征值不全为实数(否则与定理 6.12 矛盾)故  $A$  必有三个不等特征值  $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ , 由定理 6.13 知

$$A \sim \begin{bmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \lambda_3 \end{bmatrix}.$$

30. 设  $V$  是  $F$  上  $n$  阶方阵全体所成  $F$  上线性空间,  $A, B$  为其中两固定方阵.  $\varphi_i$  是  $V$  上线性变换, 定义为:  $\varphi_1(X) = AX, \varphi_2(X) = AX - XA, \varphi_3(X) = XB, \varphi_4(X) = AXB$ . 试求  $\varphi_i$  的方阵表示 ( $1 \leq i \leq 4$ ) ( $V$  的基取为  $E_{11}, \dots, E_{1n}, E_{21}, \dots, E_{2n}, \dots, E_{n1}, \dots, E_{nn}$ ).

解 设  $\varphi_i$  的方阵表示为  $M_i (i=1, 2, 3, 4)$ , 并记  $A = (a_{ij}), B = (b_{ij}), X = \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{bmatrix}$ , 其中

$\alpha_i$  是方阵  $X$  的行向量.

① 由 28 题知  $\varphi_1$  的方阵表示为

$$M_1 = (a_{ij} I_n)_{n^2 \times n^2}.$$

② 设

$$\varphi_2: M_n(F) \rightarrow M_n(F)$$

$$X \mapsto XA$$

则

$$\varphi_2 X = XA = \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{bmatrix} A = \begin{bmatrix} \alpha_1 A \\ \vdots \\ \alpha_n A \end{bmatrix}$$

所以 
$$\widetilde{\varphi_2 X} = \begin{bmatrix} A^T \alpha_1^T \\ \vdots \\ A^T \alpha_n^T \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A^T & & \\ & \ddots & \\ & & A^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha_1^T \\ \vdots \\ \alpha_n^T \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A^T & & \\ & \ddots & \\ & & A^T \end{bmatrix} \widetilde{X}$$

因为

$$\varphi_2 X = \varphi_1 X - \varphi_3 X$$

所以 
$$M_2 = M_1 - \begin{bmatrix} A^T & & \\ & \ddots & \\ & & A^T \end{bmatrix} = (a_{ij} I_n)_{n^2} - \begin{bmatrix} A^T & & \\ & \ddots & \\ & & A^T \end{bmatrix}_{n^2}.$$

③ 由上知

$$M_3 = \begin{bmatrix} B^T & & \\ & \ddots & \\ & & B^T \end{bmatrix}.$$

④ 因为

$$\varphi_4 X = AXB = A \begin{bmatrix} \alpha_1 B \\ \vdots \\ \alpha_n B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (a_{11}\alpha_1 + \cdots + a_{1n}\alpha_n)B \\ \vdots \\ (a_{n1}\alpha_1 + \cdots + a_{nn}\alpha_n)B \end{bmatrix}$$

故

$$\begin{aligned} \widetilde{\varphi_4 X} &= \begin{bmatrix} B^T(a_{11}\alpha_1^T + \cdots + a_{1n}\alpha_n^T) \\ \vdots \\ B^T(a_{n1}\alpha_1^T + \cdots + a_{nn}\alpha_n^T) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} B^T & & \\ & \ddots & \\ & & B^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_{11}\alpha_1^T + \cdots + a_{1n}\alpha_n^T \\ \vdots \\ a_{n1}\alpha_1^T + \cdots + a_{nn}\alpha_n^T \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} B^T & & \\ & \ddots & \\ & & B^T \end{bmatrix} (a_{ij}I_n) \begin{bmatrix} \alpha_1^T \\ \vdots \\ \alpha_n^T \end{bmatrix} = M_3 \cdot M_1 \widetilde{X} \end{aligned}$$

所以

$$M_4 = M_3 M_1.$$

31. 设线性空间  $V$  的线性变换  $\mathcal{E}$  满足  $\mathcal{E}^2 = \mathcal{E}$ , 则称  $\mathcal{E}$  为投影或投射. 试证明

- (1)  $V$  中向量  $\beta$  属于  $\mathcal{E}$  的象集  $\mathcal{E}V$  当且仅当  $\mathcal{E}\beta = \beta$ ;
- (2)  $V = \mathcal{E}V \oplus \ker \mathcal{E}$ , 且  $V$  的任一向量直和分解为  $\alpha = \mathcal{E}\alpha + (\alpha - \mathcal{E}\alpha)$ ;
- (3) 对任一直和分解  $V = V_1 \oplus V_0$ , 存在唯一的射影  $\mathcal{E}$ , 使  $V_1 = \mathcal{E}V, V_0 = \ker \mathcal{E}$ ;
- (4) 每个射影  $\mathcal{E}$  均有方阵表示  $\begin{bmatrix} I_r & O \\ O & O \end{bmatrix}$ .

解 (1)  $\Rightarrow$  设  $\beta \in \text{Im } \mathcal{E}$ , 所以  $\exists \alpha$ , 使  $\beta = \mathcal{E}\alpha$ , 于是有  $\mathcal{E}\beta = \mathcal{E}(\mathcal{E}\alpha) = \mathcal{E}\alpha = \beta$ .

$\Leftarrow$  设  $\beta \in V$ , 若  $\mathcal{E}\beta = \beta$ , 则  $\beta \in \text{Im } \mathcal{E}$ .

(2) 任  $\alpha \in V$ , 有  $\alpha = \mathcal{E}\alpha + (\alpha - \mathcal{E}\alpha)$ , 其中  $\mathcal{E}\alpha \in \text{Im } \mathcal{E}, \alpha - \mathcal{E}\alpha \in \ker \mathcal{E}$ , (因为  $\mathcal{E}(\alpha - \mathcal{E}\alpha) = \mathcal{E}\alpha - \mathcal{E}^2\alpha = 0$ )

所以

$$V = \mathcal{E}V + \ker \mathcal{E},$$

又任  $\beta \in \text{Im } \mathcal{E}$ , 有  $\mathcal{E}\beta = \beta$ , 故当  $\beta \neq 0$  时,  $\mathcal{E}\beta \neq 0$ ,

所以

$$\text{Im } \mathcal{E} \cap \ker \mathcal{E} = \{0\}$$

故知

$$V = \mathcal{E}V \oplus \ker \mathcal{E}.$$

注 证直和这一步也可用  $\dim V = \dim \mathcal{E}V + \dim \ker \mathcal{E} = n$  代替  $\mathcal{E}V \cap \ker \mathcal{E} = \{0\}$ .

(3) 在  $V_1$  中取基  $\alpha_1, \cdots, \alpha_r$ , 在  $V_0$  中取基  $\alpha_{r+1}, \cdots, \alpha_n$ , 则  $\alpha_1, \cdots, \alpha_r, \alpha_{r+1}, \cdots, \alpha_n$  为  $V$  的基. 于是设

$$\mathcal{E}\alpha_i = \alpha_i \quad 1 \leq i \leq r, \quad \mathcal{E}\alpha_i = 0, \quad r+1 \leq i \leq n$$

则有

$$V_1 = \mathcal{E}V, \quad V_0 = \ker \mathcal{E}, \quad (\mathcal{E} \text{ 存在且唯一}).$$

事实上, 对任  $\alpha \in V$ , 记  $\alpha = \sum_{i=1}^n x_i \alpha_i$ , 则有

$$\alpha = \sum_{i=1}^r x_i \alpha_i + \sum_{i=r+1}^n x_i \alpha_i = \beta + \gamma, \quad \beta \in V_1, \gamma \in V_0$$

$$\mathcal{E}\alpha = \mathcal{E}\beta + \mathcal{E}\gamma = \beta + 0 = \beta.$$

(4) 在  $\text{Im}\mathcal{E}$  中选取基  $\mathcal{E}_1, \dots, \mathcal{E}_r$ ,  $\ker\mathcal{E}$  中取基  $\mathcal{E}_{r+1}, \dots, \mathcal{E}_n$ , 由(2)知  $\epsilon_1, \dots, \epsilon_r, \epsilon_{r+1}, \dots, \epsilon_n$  为  $V$  的基, 且有

$$\mathcal{E}\epsilon_i = \epsilon_i \quad 1 \leq i \leq r, \quad \mathcal{E}\epsilon_i = 0, \quad r+1 \leq i \leq n$$

于是知  $\mathcal{E}$  在此基下的方阵表示为

$$A = \begin{bmatrix} I_r & O \\ O & O \end{bmatrix}.$$

32. (1) 设线性空间  $V = W_1 \oplus \dots \oplus W_s$ , 试证明存在  $V$  的线性变换  $\mathcal{E}_1, \dots, \mathcal{E}_s$  (称为典型投影或正则投影) 使

$$\textcircled{1} \mathcal{E}_i^2 = \mathcal{E}_i \quad (\text{即 } \mathcal{E}_i \text{ 为投影}, 1 \leq i \leq s);$$

$$\textcircled{2} \mathcal{E}_i \mathcal{E}_j = 0 \quad (\text{当 } j \neq i);$$

$$\textcircled{3} \mathcal{E}_1 + \dots + \mathcal{E}_s = I \text{ 为恒等变换};$$

$$\textcircled{4} \mathcal{E}_i V = W_i.$$

(2) 反之试证明: 若有  $V$  上线性变换  $\mathcal{E}_1, \dots, \mathcal{E}_s$  满足上述条件  $\textcircled{1} \textcircled{2} \textcircled{3}$ , 记  $W_i = \mathcal{E}_i V$ , 则

$$V = W_1 \oplus \dots \oplus W_s.$$

证 (1) 设  $V = W_1 \oplus \dots \oplus W_s$ , 则任  $\alpha \in V$ , 有

$$\alpha = \alpha_1 + \dots + \alpha_s, \quad \alpha_i \in W_i, \quad i = 1, \dots, s.$$

此分解式唯一. 于是有

$$\textcircled{1} \quad \begin{aligned} \text{令 } \mathcal{E}_i: V &\rightarrow V & i=1, \dots, s, \\ \alpha &\mapsto \alpha_i \end{aligned}$$

则  $\mathcal{E}_i^2(\alpha) = \mathcal{E}_i(\mathcal{E}_i\alpha) = \mathcal{E}_i\alpha_i = \alpha_i = \mathcal{E}_i(\alpha)$ , 所以  $\mathcal{E}_i^2 = \mathcal{E}_i$ .

$\textcircled{2}$  在  $\textcircled{1}$  的选取下, 有  $\mathcal{E}_i \mathcal{E}_j(\alpha) = \mathcal{E}_i(\alpha_j) = 0$  (当  $i \neq j$  时).

$\textcircled{3}$  对任  $\alpha$  有

$$(\mathcal{E}_1 + \dots + \mathcal{E}_s)(\alpha) = \mathcal{E}_1\alpha + \dots + \mathcal{E}_s\alpha = \alpha_1 + \dots + \alpha_s = I\alpha,$$

所以

$$\mathcal{E}_1 + \dots + \mathcal{E}_s = I \text{ 是恒等变换}$$

$\textcircled{4}$  任  $\alpha \in V$ , 有  $\mathcal{E}_i\alpha = \alpha_i \in W_i$ , 所以  $\mathcal{E}_i V \subseteq W_i$ ; 又任  $\beta \in W_i \subset V$ , 有  $\mathcal{E}_i\beta = \mathcal{E}_i(0 + \dots + 0 + \beta + 0 + \dots + 0) = \beta$ , 所以  $\beta \in \mathcal{E}_i V$ ,  $W_i \subseteq \mathcal{E}_i V$ , 于是得  $\mathcal{E}_i V = W_i$ .

(2)  $\textcircled{1}$  设  $\mathcal{E}_1 + \dots + \mathcal{E}_s = I$  为恒等变换, 则任  $x \in V$ , 有

$$\mathcal{E}_1 x + \dots + \mathcal{E}_s x = x,$$

其中

$$\mathcal{E}_i x = x_i \in W_i$$

所以

$$V = W_1 + \dots + W_s \quad (\text{是和}),$$

$\textcircled{2}$  下面证 0 向量分解唯一. 设有  $x_1 + \dots + x_s = 0$ , 其中  $x_i \in W_i$ , 则应有  $x_i = \mathcal{E}_i y_i$ ,  $y_i \in V$ , 故有

$$\mathcal{E}_1 y_1 + \dots + \mathcal{E}_s y_s = 0,$$

上式左作用  $\mathcal{E}_1$ , 有

$$\mathcal{E}_1^2 y_1 + \mathcal{E}_1 \mathcal{E}_2 y_2 + \dots + \mathcal{E}_1 \mathcal{E}_s y_s = 0,$$

因为  $\mathcal{E}_1^2 = \mathcal{E}_1, \mathcal{E}_1 \mathcal{E}_j = 0, j=2, \dots, s$ , 故上式为

$$\mathcal{E}_1 y_1 + 0 + \dots + 0 = 0, \rightarrow x_1 = \mathcal{E}_1 y_1 = 0,$$

同理可证  $x_i = 0, (i=2, \dots, s)$ . 所以  $V = W_1 \oplus \dots \oplus W_s$  (是直和).

33. 设  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  是  $\mathbf{R}^{(3)}$  的基,  $W$  是  $\alpha_1$  和  $\alpha_2$  所决定的平面,  $\mathcal{E}$  是平行于平面  $W$  而向  $\alpha_3$  所在直线的投影(或投射), 求证  $\mathcal{E}$  是线性变换并求其在基  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  下的方阵表示.

证 因为  $\mathbf{R}^{(3)}$  的基是  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ , 所以任  $\alpha \in \mathbf{R}^3$  有  $\alpha = a_1 \alpha_1 + a_2 \alpha_2 + a_3 \alpha_3$ , 平行于  $W$  作投影就是减去  $\alpha$  在  $W$  上的分量, 所以  $\mathcal{E}\alpha = a_3 \alpha_3$ . 又  $\forall \beta \in \mathbf{R}^{(3)}$  记  $\beta = b_1 \alpha_1 + b_2 \alpha_2 + b_3 \alpha_3$ . 则有  $\mathcal{E}(\alpha + \beta) = \mathcal{E}((a_1 + b_1)\alpha_1 + (a_2 + b_2)\alpha_2 + (a_3 + b_3)\alpha_3) = (a_3 + b_3)\alpha_3 = \mathcal{E}\alpha + \mathcal{E}\beta$ ,

$\mathcal{E}(\lambda\alpha) = \mathcal{E}(\lambda a_1 \alpha_1 + \lambda a_2 \alpha_2 + \lambda a_3 \alpha_3) = \lambda a_3 \alpha_3 = \lambda \mathcal{E}\alpha$ . 故  $\mathcal{E}$  是线性变换.

因为  $\mathcal{E}\alpha_1 = 0 = \mathcal{E}\alpha_2, \mathcal{E}\alpha_3 = \alpha_3$ , 所以  $\mathcal{E}$  在基  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  下的方阵表示为

$$E = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

34. 设  $\mathbf{R}^{(3)}$  的线性变换  $\mathcal{A}$  把  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  分别变换为  $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ , 求  $\mathcal{A}$  在  $\mathbf{R}^{(3)}$  的自然基下的方阵表示  $A$ :

$$(1) \alpha_1 = (2, 3, 5)^T, \alpha_2 = (0, 1, 2)^T, \alpha_3 = (1, 0, 0)^T;$$

$$\beta_1 = (1, 1, 1)^T, \beta_2 = (1, 1, -1)^T, \beta_3 = (2, 1, 2)^T;$$

$$(2) \alpha_1 = (2, 0, 3)^T, \alpha_2 = (4, 1, 5)^T, \alpha_3 = (3, 1, 2)^T;$$

$$\beta_1 = (1, 2, -1)^T, \beta_2 = (4, 5, -2)^T, \beta_3 = (1, 1, 0)^T.$$

解 方法 1 因为  $\mathcal{A}$  在自然基下的方阵表示为  $A$ , 而  $\alpha_i, \beta_i (i=1, 2, 3)$  在自然基下的坐标就是它们自身. 所以  $\beta_i = \mathcal{A}\alpha_i$  在自然基下的坐标式为  $\beta_i = A\alpha_i (i=1, 2, 3)$  故有  $(\beta_1, \beta_2, \beta_3) = A(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ , 而  $\det(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \neq 0$ , 所以得  $A = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)^{-1}$ .

$$(1) A = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)^{-1}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 0 & -5 & 3 \\ 1 & -4 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -11 & 6 \\ 1 & -7 & 4 \\ 2 & -1 & 0 \end{bmatrix}.$$

$$(2) A = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)^{-1}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 4 & 1 \\ 2 & 5 & -1 \\ -1 & -2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -\frac{7}{3} & -\frac{1}{3} \\ -1 & \frac{5}{3} & \frac{2}{3} \\ 1 & -\frac{2}{3} & -\frac{2}{3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & \frac{11}{3} & \frac{5}{3} \\ -4 & \frac{13}{3} & \frac{10}{3} \\ 2 & -\frac{5}{3} & -\frac{5}{3} \end{bmatrix}.$$

方法 2 此题也可这样考虑: 因  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性无关, 所以是  $\mathbf{R}^{(3)}$  的基, 设  $\mathcal{A}$  在此基上的方阵表示为  $B$ , 有  $(\beta_1, \beta_2, \beta_3) = \mathcal{A}(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)B$ , 因  $\alpha_i, \beta_i$  均为数组列向量, 故  $B = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)^{-1}(\beta_1, \beta_2, \beta_3)$ . 又设从自然基到  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  的过渡矩阵为  $T$ , 有  $T = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$  且  $B = T^{-1}AT$ , 所以  $A = TBT^{-1} = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)^{-1}$ .

35. 证明:  $\mathbf{R}^{(3)}$  中变换  $\mathcal{A}(x) = \alpha x^T \alpha$  是线性变换, 其中  $\alpha = (1, 2, 3)^T$ , 求  $\mathcal{A}$  在  $\mathbf{R}^{(3)}$  的

自然基  $e_1, e_2, e_3$  和以下基上的方阵表示:  $\beta_1 = (1, 0, 1)^T, \beta_2 = (2, 0, -1)^T, \beta_3 = (1, 1, 0)^T$ .

解 任  $x, y \in \mathbf{R}^{(3)}$  设  $x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}, y = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix}$ , 则由已知有

$$\mathcal{A}x = \alpha x^T \alpha = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} (x_1, x_2, x_3) \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}, \mathcal{A}y = \alpha y^T \alpha = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} (y_1, y_2, y_3) \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix},$$

故由矩阵乘法的结合律, 乘法对加法的分配律, 及数乘可交换知

$$\mathcal{A}(x+y) = \alpha(x+y)^T \alpha = \alpha x^T \alpha + \alpha y^T \alpha = \mathcal{A}x + \mathcal{A}y$$

$$\mathcal{A}(\lambda x) = \alpha(\lambda x)^T \alpha = \lambda \alpha x^T \alpha = \lambda \mathcal{A}x,$$

所以  $\mathcal{A}$  是线性变换.

因为  $\mathcal{A}e_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} (1, 0, 0) \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}; \mathcal{A}e_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} (0, 1, 0) \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{bmatrix};$

$$\mathcal{A}e_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} (0, 0, 1) \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \\ 9 \end{bmatrix}.$$

所以  $\mathcal{A}$  在自然基上的方阵表示为  $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & 9 \end{bmatrix}$ .

又因为

$$\mathcal{A}\beta_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} (1, 0, 1) \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 8 \\ 12 \end{bmatrix}; \mathcal{A}\beta_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} (2, 0, -1) \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ -2 \\ -3 \end{bmatrix}; \mathcal{A}\beta_3 = \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \\ 9 \end{bmatrix},$$

设  $\mathcal{A}$  在  $\beta_1, \beta_2, \beta_3$  上的方阵表示为  $B$ , 故有  $\mathcal{A}(\beta_1, \beta_2, \beta_3) = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)B$ , 于是得

$$\begin{aligned} B &= (\beta_1, \beta_2, \beta_3)^{-1} (\mathcal{A}\beta_1, \mathcal{A}\beta_2, \mathcal{A}\beta_3) \\ &= \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & -1 & 3 \\ 8 & -2 & 6 \\ 12 & -3 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{20}{3} & -\frac{5}{3} & \frac{15}{3} \\ -\frac{16}{3} & \frac{4}{3} & -4 \\ 8 & -2 & 6 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

注 求方阵  $B$  的过程也可如下进行: 因为从自然基  $e_1, e_2, e_3$  到基  $\beta_1, \beta_2, \beta_3$  的过渡矩阵  $T = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)$ , 而  $B = T^{-1}AT = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)^{-1}A(\beta_1, \beta_2, \beta_3) = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)^{-1}(A\beta_1, A\beta_2, A\beta_3)$ . 其中  $A$  是  $\mathcal{A}$  在自然基上的方阵表示.

36. 证明: 用给定矩阵  $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$  左乘和右乘, 定义了二阶方阵空间  $V$  的两个线性变换  $\mathcal{A}_L$  和  $\mathcal{A}_R$ . 并求此二变换在以下基上的方阵表示:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

解 由已知,任  $M \in V$ ,  $\mathcal{A}_L M = AM$ ,  $\mathcal{A}_R M = MA$ ,又对任  $N \in V$ ,  $k_1, k_2 \in F$  有

$$\mathcal{A}_L(k_1 M + k_2 N) = A(k_1 M + k_2 N) = k_1 AM + k_2 AN = k_1 \mathcal{A}_L M + k_2 \mathcal{A}_L N,$$

同理  $\mathcal{A}_R(k_1 M + k_2 N) = k_1 \mathcal{A}_R M + k_2 \mathcal{A}_R N$ ,所以  $\mathcal{A}_L, \mathcal{A}_R$  是线性变换.

$$\text{因为 } \mathcal{A}_L E_{11} = \begin{bmatrix} a & 0 \\ c & 0 \end{bmatrix}, \mathcal{A}_L E_{21} = \begin{bmatrix} b & 0 \\ d & 0 \end{bmatrix}, \mathcal{A}_L E_{12} = \begin{bmatrix} 0 & a \\ 0 & c \end{bmatrix}, \mathcal{A}_L E_{22} = \begin{bmatrix} 0 & b \\ 0 & d \end{bmatrix},$$

$$\text{所以 } \mathcal{A}_L \text{ 在基 } E_{11}, E_{21}, E_{12}, E_{22} \text{ 上的方阵为 } \begin{bmatrix} a & b & 0 & 0 \\ c & d & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a & b \\ 0 & 0 & c & d \end{bmatrix}.$$

同理,由

$$\mathcal{A}_R E_{11} = \begin{bmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \mathcal{A}_R E_{21} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ a & b \end{bmatrix}, \mathcal{A}_R E_{12} = \begin{bmatrix} c & d \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \mathcal{A}_R E_{22} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ c & d \end{bmatrix},$$

$$\text{知 } \mathcal{A}_R \text{ 在基 } E_{11}, E_{21}, E_{12}, E_{22} \text{ 下的方阵表示为 } \begin{bmatrix} a & 0 & c & 0 \\ 0 & a & 0 & c \\ b & 0 & d & 0 \\ 0 & b & 0 & d \end{bmatrix}.$$

37. 设线性变换  $\mathcal{A}$  在基  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$  下的方阵表示为

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & -1 & 2 \\ 2 & 5 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 3 \end{bmatrix},$$

求  $\mathcal{A}$  在以下基上的方阵表示:

(1)  $\alpha_1, \alpha_3, \alpha_2, \alpha_4$ ;

(2)  $\alpha_1, \alpha_1 + \alpha_2, \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4$ .

解 (1) 设  $(\mathcal{A}\alpha_1, \mathcal{A}\alpha_3, \mathcal{A}\alpha_2, \mathcal{A}\alpha_4) = (\alpha_1, \alpha_3, \alpha_2, \alpha_4)B$ , ( $B$  的列是基向量的象在基上的坐标),而

$$\mathcal{A}\alpha_1 = \alpha_1 + 3\alpha_2 + 2\alpha_3 + \alpha_4 = (\alpha_1, \alpha_3, \alpha_2, \alpha_4)(1, 2, 3, 1)^T,$$

$$\mathcal{A}\alpha_3 = -\alpha_2 + 3\alpha_3 + \alpha_4 = (\alpha_1, \alpha_3, \alpha_2, \alpha_4)(0, 3, -1, 1)^T,$$

$$\mathcal{A}\alpha_2 = 2\alpha_1 + 5\alpha_3 + 2\alpha_4 = (\alpha_1, \alpha_3, \alpha_2, \alpha_4)(2, 5, 0, 2)^T,$$

$$\mathcal{A}\alpha_4 = \alpha_1 + 2\alpha_2 + \alpha_3 + 3\alpha_4 = (\alpha_1, \alpha_3, \alpha_2, \alpha_4)(1, 1, 2, 3)^T,$$

故知

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 5 & 1 \\ 3 & -1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}.$$

(2) 设  $(\alpha_1, \alpha_1 + \alpha_2, \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)T$ , 易知过渡矩阵

$$T = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \rightarrow T^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & & \\ & 1 & -1 & \\ & & 1 & -1 \\ & & & 1 \end{bmatrix},$$

设  $\mathcal{A}$  在基  $\alpha_1, \alpha_1 + \alpha_2, \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4$  下的方阵表示为  $C$ , 则有

$$C = T^{-1}AT = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & -4 & -8 & -7 \\ 1 & 4 & 6 & 4 \\ 1 & 3 & 4 & 7 \end{bmatrix}.$$

(以上在(1),(2)中我们用的是两个不同的解决问题思路:(1)用的是求基向量的象在基上的坐标,可以说是用的方阵表示的定义.用在这里,几乎不用经什么计算即得;(2)用的是线性变换在不同基下的方阵是相似的,利用已知的  $A$  和两组基的过渡矩阵  $T$  及公式  $C = T^{-1}AT$ .)

38. 设线性变换  $\mathcal{A}$  在基  $\alpha_1 = (1, 2)^T, \alpha_2 = (2, 3)^T$  下方阵为  $\begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}$ . 而线性变换  $\mathcal{B}$  在

基  $\beta_1 = (3, 1)^T, \beta_2 = (4, 2)^T$  下方阵为  $\begin{bmatrix} 4 & 6 \\ 6 & 9 \end{bmatrix}$ , 求变换  $\mathcal{A} + \mathcal{B}$  在基  $\beta_1, \beta_2$  下的方阵表示.

解 设从基  $\alpha_1, \alpha_2$  到基  $\beta_1, \beta_2$  的过渡矩阵为  $T$ , 即有  $(\beta_1, \beta_2) = (\alpha_1, \alpha_2)T$ , 所以  $T = (\alpha_1, \alpha_2)^{-1}(\beta_1, \beta_2)$ , 于是  $\mathcal{A}$  在基  $\beta_1, \beta_2$  下的方阵为

$$\begin{aligned} A_1 &= T^{-1}AT = (\beta_1, \beta_2)^{-1}(\alpha_1, \alpha_2)A(\alpha_1, \alpha_2)^{-1}(\beta_1, \beta_2) \\ &= \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -3 & 2 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 40 & 38 \\ -\frac{71}{2} & -34 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

$\mathcal{A} + \mathcal{B}$  在基  $\beta_1, \beta_2$  下的方阵为

$$\begin{bmatrix} 40 & 38 \\ -\frac{71}{2} & -34 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 4 & 6 \\ 6 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 44 & 44 \\ -\frac{59}{2} & -25 \end{bmatrix}.$$

39. 设线性变换  $\mathcal{A}$  在基  $\alpha_1 = (-3, 7)^T, \alpha_2 = (1, -2)^T$  下方阵为  $\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 5 & -3 \end{bmatrix}$ , 线性变换

$\mathcal{B}$  在基  $\beta_1 = (6, -7)^T, \beta_2 = (-5, 6)^T$  下方阵表示为  $\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 7 \end{bmatrix}$ , 求变换  $\mathcal{A}\mathcal{B}$  在基  $(1, 0)^T, (0, 1)^T$  下的方阵表示.

解 因为  $(\alpha_1, \alpha_2) = (e_1, e_2)T_1$ , 所以  $T_1 = (\alpha_1, \alpha_2)$ , 又因  $(\beta_1, \beta_2) = (e_1, e_2)T_2$ , 故  $T_2 = (\beta_1, \beta_2)$ .

于是知  $\mathcal{A}$  在  $e_1, e_2$  下方阵为

$$A_1 = T_1 \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 5 & -3 \end{bmatrix} T_1^{-1} = \begin{bmatrix} -3 & 1 \\ 7 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 5 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 7 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

$\mathcal{B}$  在  $e_1, e_2$  下方阵表示为

$$B_1 = T_2 \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 7 \end{bmatrix} T_2^{-1} = \begin{bmatrix} 6 & -5 \\ -7 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 6 & 5 \\ 7 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -143 & -122 \\ 177 & 151 \end{bmatrix}.$$

故  $\mathcal{AB}$  在基  $e_1, e_2$  下的方阵为  $A_1 B_1 = \begin{bmatrix} 109 & 93 \\ 34 & 29 \end{bmatrix}$ .

40.  $n$  维线性空间  $V$  上线性变换  $\mathcal{A}$  称为非奇异的, 是指  $\mathcal{A}$  在某基下的方阵表示  $A$  非奇异 (即  $\det A \neq 0$ ). 试证明  $\mathcal{A}$  非奇异与以下每个命题等价:

- (1) 若  $\mathcal{A}x=0$ , 总有  $x=0$ ;
- (2)  $\mathcal{A}$  把  $V$  的基变为基;
- (3) 若  $x_1 \neq x_2$ , 总有  $\mathcal{A}x_1 \neq \mathcal{A}x_2$ ;
- (4)  $\mathcal{A}$  为满射;
- (5)  $\mathcal{A}$  有逆.

证 任  $x \in V$ , 其坐标记为  $\mathcal{I}x$ . 则  $\mathcal{A}x=0 \Leftrightarrow A\mathcal{I}x=0$

- (1)  $\mathcal{A}$  非奇异  $\stackrel{D}{=} \det A \neq 0 \Leftrightarrow A\mathcal{I}x=0$ , 只有零解 ( $\mathcal{I}x=0$ )  
 $\Leftrightarrow \mathcal{A}x=0$  只有零解 ( $x=0$ ).

- (2)  $\mathcal{A}$  在基  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$  下方阵表示为  $A$ , 即有

$$(\mathcal{A}\alpha_1, \dots, \mathcal{A}\alpha_n) = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)A$$

于是有  $\mathcal{A}$  非奇异  $\Leftrightarrow \det A \neq 0 \Leftrightarrow A$  可逆 (其列线性无关)  $\Leftrightarrow \mathcal{A}\alpha_1, \dots, \mathcal{A}\alpha_n$  线性无关 ( $A$  的  $i$  列为  $\mathcal{A}\alpha_i$  的坐标)  $\Leftrightarrow \mathcal{A}\alpha_1, \dots, \mathcal{A}\alpha_n$  为基.

- (3) 原命题等价于: 若  $(x_1 - x_2) \neq 0$ , 总有  $\mathcal{A}(x_1 - x_2) \neq 0$ , 也即是  $\mathcal{A}(x_1 - x_2) = 0$ , 仅当  $(x_1 - x_2) = 0$  成立. 于是由 (1) 立得. 也可由以下得出:

$$\begin{aligned} \det A \neq 0 &\Leftrightarrow A\mathcal{I}(x_1 - x_2) \neq 0 \quad (\text{当 } \mathcal{I}x_1 \neq \mathcal{I}x_2) \\ &\Leftrightarrow \mathcal{A}(x_1 - x_2) \neq 0 \quad (\text{当 } x_1 \neq x_2). \end{aligned}$$

- (4)  $\Rightarrow$  任  $x \in V$ , 由  $A$  可逆, 故可令  $A^{-1}\mathcal{I}x = \mathcal{I}y$ , 即  $\mathcal{I}x = A\mathcal{I}y$ , 所以找到  $y$  使  $x = \mathcal{A}y$ , 故  $\mathcal{A}$  为满射.

$\Leftarrow$  若  $\mathcal{A}$  为满射, 则  $\mathcal{A}V = V$ , 所以  $\mathcal{A}\alpha_1, \dots, \mathcal{A}\alpha_n$  是  $V$  的基 (因  $\mathcal{A}V = L(\mathcal{A}\alpha_1, \dots, \mathcal{A}\alpha_n)$ ), 故其坐标列线性无关, 即  $A$  的列线性无关, 故  $\det A \neq 0$ , 所以  $\mathcal{A}$  非奇异.

- (5) 定义

$$\mathcal{B}: V \rightarrow V$$

$$x \mapsto \mathcal{B}x$$

其中  $\mathcal{B}$  在基  $\alpha_1, \dots, \alpha_n$  下的方阵为  $A^{-1}$ . 于是

$\mathcal{A}$  为非奇异的  $\Leftrightarrow \det A \neq 0 \Leftrightarrow AA^{-1} = I \Leftrightarrow \mathcal{AB} = \mathcal{E}$  为恒等变换  $\Leftrightarrow \mathcal{A}$  有逆.

41. 求在某基  $\alpha_1, \dots, \alpha_n$  下有下列方阵表示  $A$  的  $\mathbf{R}^{(n)}$  的线性变换  $\mathcal{A}$  的特征根与特征向量:

$$(1) \begin{bmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 5 & -3 & 3 \\ -1 & 0 & -2 \end{bmatrix}; (2) \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -4 & 4 & 0 \\ -2 & 1 & 2 \end{bmatrix}; (3) \begin{bmatrix} 7 & -12 & 6 \\ 10 & -19 & 10 \\ 12 & -24 & 13 \end{bmatrix};$$



$$(4) \begin{bmatrix} 4 & -5 & 7 \\ 1 & -4 & 9 \\ -4 & 0 & 5 \end{bmatrix}; (5) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}; (6) \begin{bmatrix} 3 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 5 & -3 \\ 4 & -1 & 3 & -1 \end{bmatrix}.$$

解 (1)  $P_A(\lambda) = \det(\lambda I - A) = \lambda^3 + 3\lambda^2 + 3\lambda + 1 = (\lambda + 1)^3 = 0$ , 所以  $\lambda = -1$  为  $\mathcal{A}$  的特征根(三重根).  $\mathcal{A}$  的特征向量  $x$  是满足  $\mathcal{A}x = \lambda x$  的非零向量, 其坐标是齐次线性方程组  $(\lambda I - A)X = 0$  的非零解.

对  $\lambda = -1$  解  $(\lambda I - A)X = 0$ .

$$\begin{bmatrix} -3 & 1 & -2 \\ -5 & 2 & -3 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \text{ 所以 } X = c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}, c_1 \neq 0$$

故  $L(\alpha) = L(\alpha_1 + \alpha_2 - \alpha_3)$  中全部非零向量均是  $\mathcal{A}$  的属于特征值  $-1$  的特征向量.

(2)  $P_A(\lambda) = \det(\lambda I - A) = \lambda(\lambda - 2)(\lambda - 4) + 4(\lambda - 2) = (\lambda - 2)^3 = 0$ , 故  $\lambda = -2$  为  $\mathcal{A}$  的特征值.

解  $(-2I - A)X = 0$ , 得  $X = c_1(1, 2, 0)^T + c_2(0, 0, 1)^T$ ,  $c_1, c_2$  不同时为 0. 故  $\alpha = \alpha_1 + 2\alpha_2, \beta = \alpha_3$  为特征向量,  $\mathcal{A}$  的属于特征根  $-2$  的全部特征向量为  $L(\alpha, \beta)$  中非零者.

(3)  $P_A(\lambda) = \lambda^3 - \lambda^2 - \lambda + 1 = (\lambda - 1)^2(\lambda + 1) = 0$ ,  $\lambda = 1$  (为二重根),  $\lambda = -1$  为  $\mathcal{A}$  的特征根.

对  $\lambda = 1$ , 解  $(I - A)X = 0$ , 得  $X = c_1 \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$ , 故  $\mathcal{A}$  的属于特征值 1 的特征向量为

为  $L(\beta_1, \beta_2)$  中非零向量, 其中  $\beta_1 = 2\alpha_1 + \alpha_2, \beta_2 = \alpha_1 - \alpha_3$ .

对  $\lambda = -1$ , 解  $(-I - A)X = 0$ , 得  $X = c_1(3, 5, 6)^T$ , 故  $\mathcal{A}$  属于特征值  $-1$  的特征向量为  $c_1(3\alpha_1 + 5\alpha_2 + 6\alpha_3), c_1 \neq 0$ .

(4)  $P_A(\lambda) = \lambda^3 - 5\lambda^2 + 17\lambda - 13 = (\lambda - 1)(\lambda^2 - 4\lambda + 13) = 0$ ,

对  $\lambda_1 = 1$ , 解  $(\lambda_1 I - A)X = 0$ , 得  $X_1 = c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$ , 故  $\mathcal{A}$  的属于特征根 1 的特征向量为  $c_1(\alpha_1 + 2\alpha_2 + \alpha_3), c_1 \neq 0$ .

对  $\lambda_2 = 2 + 3i$ , 解  $(\lambda_2 I - A)X = 0$ , 得  $X_2 = c_2(3 - 3i, 5 - 3i, 4)^T$ , 故  $\mathcal{A}$  的属于特征值  $2 + 3i$  的特征向量为  $c_2((3 - 3i)\alpha_1 + (5 - 3i)\alpha_2 + 4\alpha_3)$ , 其中  $c_2 \neq 0$ .

对  $\lambda_3 = 2 - 3i$ , 解  $(\lambda_3 I - A)X = 0$ , 得  $X_3 = c_3(3 + 3i, 5 + 3i, 4)^T$ , 故  $\mathcal{A}$  的属于特征值  $2 - 3i$  的特征向量为

$c_3((3 + 3i)\alpha_1 + (5 + 3i)\alpha_2 + 4\alpha_3)$ , 其中  $c_3 \neq 0$ .

(5)  $P_A(\lambda) = \det(\lambda I - A) = \lambda^2(\lambda - 1)^2 = 0$ ,

对  $\lambda = 1$ , 解得  $X = c_1(1, 0, 1, 0)^T + c_2(0, 0, 0, 1)^T$ , 记  $\gamma_1 = \alpha_1 + \alpha_3, \gamma_2 = \alpha_4$ , 则  $\mathcal{A}$  的属于

特征值 1 的特征向量为  $c_1\gamma_1 + c_2\gamma_2$ , ( $c_1, c_2$  不同时为 0).

对  $\lambda=0$ , 解得  $X=c_3(0,1,0,0)^T + c_4(0,0,1,0)^T$ , 记  $\gamma_3=\alpha_2$ ,  $\gamma_4=\alpha_3$ , 则  $\mathcal{A}$  的属于特征根 0 的特征向量为  $c_3\alpha_2 + c_4\alpha_3$ , ( $c_3, c_4$  不同时为 0).

$$\begin{aligned} (6) P_A(\lambda) &= \begin{vmatrix} \lambda-3 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & \lambda-1 & 0 & 0 \\ -3 & 0 & \lambda-5 & 3 \\ -4 & 1 & -3 & \lambda+1 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} \lambda-3 & 1 \\ -1 & \lambda-1 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} \lambda-5 & 3 \\ -3 & \lambda+1 \end{vmatrix} \\ &= (\lambda-2)^4 = 0, \end{aligned}$$

对  $\lambda=2$  解  $(\lambda I - A)X=0$ , 得  $X=c_1(1,1,-1,0)^T + c_2(1,1,0,1)^T$ , 故  $\mathcal{A}$  的属于特征值 2 的特征向量为

$$c_1(\alpha_1 + \alpha_2 - \alpha_3) + c_2(\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_4),$$

其中  $c_1, c_2$  不同时为 0.

42. 设  $\mathcal{A}$  是  $n$  维线性空间  $V$  的线性变换, 若  $\mathcal{A}$  有  $n$  个互异的特征值, 试证明  $\mathcal{A}$  可对角化(即有对角形方阵表示). 反过来对不对?

解 因为  $\mathcal{A}$  的属于不同特征根的特征向量是线性无关的, 于是由  $\mathcal{A}$  有  $n$  个不同特征值知  $\mathcal{A}$  有  $n$  个线性无关的特征向量, 取之为基, 则  $\mathcal{A}$  在此基上的方阵表示为对角阵  $\text{diag}\{\lambda_1, \dots, \lambda_n\}$ .

反之, 若  $\mathcal{A}$  可对角化, 并不能得出  $\mathcal{A}$  有  $n$  个互异的特征值, 如纯量变换  $\mathcal{K}$ , 它的方阵表示为  $kI$ , 是对角阵, 但只有一个  $n$  重特征值  $\lambda=k$ .

43. 设  $\mathcal{A}$  为线性空间  $V$  的线性变换, 在基  $\alpha_1, \dots, \alpha_n$  下方阵表示如下. 试问  $\mathcal{A}$  是否可对角化(即在某基下有对角方阵表示)? 若可以, 则求出使其对角化的基及对角形方阵表示:

$$\begin{aligned} (1) & \begin{bmatrix} -1 & 3 & -1 \\ -3 & 5 & -1 \\ -3 & 3 & 1 \end{bmatrix}; (2) \begin{bmatrix} 6 & -5 & -3 \\ 3 & -2 & -2 \\ 2 & -2 & 0 \end{bmatrix}; (3) \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{bmatrix}; \\ (4) & \begin{bmatrix} 4 & -3 & 1 & 2 \\ 5 & -8 & 5 & 4 \\ 6 & -12 & 8 & 5 \\ 1 & -3 & 2 & 2 \end{bmatrix}; (5) \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

解 (1)  $P_A(\lambda) = \det(\lambda I - A) = (\lambda-1)(\lambda-2)^2 = 0$ , 对特征值  $\lambda=1$ , 解得特征向量  $\eta_1 = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$ ; 对特征值  $\lambda=2$ , 解得两线性无关特征向量  $\eta_2 = \alpha_1 + \alpha_2$ ,  $\eta_3 = \alpha_1 - 3\alpha_3$ , 则在基  $\eta_1, \eta_2, \eta_3$  上  $\mathcal{A}$  的方阵表示为

$$\text{diag}\{1, 2, 2\}.$$

(2)  $P_A(\lambda) = (\lambda-1)(\lambda^2-3\lambda+2) = (\lambda-1)^2(\lambda-2) = 0$ , 对特征值  $\lambda=1$  (二重根), 只有一个线性无关的特征向量  $\eta = \alpha_1 + \alpha_2$ , 所以  $\mathcal{A}$  不可对角化.

(3)  $P_A(\lambda) = (\lambda-2)^3(\lambda+2) = 0$ , 对特征值  $\lambda=2$ , 解得三个线性无关的特征向量

$$\eta_1 = \alpha_1 + \alpha_2, \eta_2 = \alpha_1 + \alpha_3, \eta_3 = \alpha_1 + \alpha_4;$$

对特征值  $\lambda=-2$ , 解得特征向量  $\eta_4 = \alpha_1 - \alpha_2 - \alpha_3 - \alpha_4$ , 则在基  $\eta_1, \eta_2, \eta_3, \eta_4$  下  $\mathcal{A}$  的方阵表示为

$$\text{diag}\{2, 2, 2, -2\}.$$

(4)  $P_A(\lambda) = \det(\lambda I - A) = \lambda^4 - 6\lambda^3 + 13\lambda^2 - 12\lambda + 4 = (\lambda-1)^2(\lambda-2)^2 = 0$ .

对  $\lambda=1$  解得两线性无关特征向量  $\eta_1 = \frac{1}{2}\alpha_1 + \frac{5}{6}\alpha_2 + \alpha_3, \eta_2 = \frac{1}{2}\alpha_1 + \frac{1}{6}\alpha_2 + \alpha_4$ ; 但对  $\lambda=2$  (二重根) 只解得一个线性无关的特征向量  $\eta_3 = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$ , 所以  $\mathcal{A}$  不可对角化.

$$(5) P_A(\lambda) = \det(\lambda I - A) = \begin{vmatrix} \lambda & -1 \\ -1 & \lambda \end{vmatrix}^2 = (\lambda^2 - 1)^2 = (\lambda+1)^2(\lambda-1)^2 = 0,$$

对  $\lambda=1$ , 得两线性无关特征向量  $\eta_1 = \alpha_2 + \alpha_3, \eta_2 = \alpha_1 + \alpha_4$ ; 对  $\lambda=-1$ , 得两线性无关特征向量  $\eta_3 = -\alpha_1 + \alpha_4, \eta_4 = -\alpha_2 + \alpha_3$ , 所以  $\mathcal{A}$  在基  $\eta_1, \eta_2, \eta_3, \eta_4$  上的方阵表示为

$$\text{diag}\{1, 1, -1, -1\}.$$

44. 设

$$A = \begin{bmatrix} & & & 1 \\ & & \ddots & \\ & \ddots & & \\ 1 & & & \end{bmatrix},$$

试求可逆阵  $P$  使得  $P^{-1}AP = B$  为对角阵.

解

$$P_A(\lambda) = \begin{cases} \begin{vmatrix} \lambda & & & -1 \\ & \ddots & & \\ & & \lambda & -1 \\ & -1 & \lambda & \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda & -1 \\ -1 & \lambda \end{vmatrix}^k = (\lambda-1)^k(\lambda+1)^k; \quad n=2k, \\ \begin{vmatrix} \lambda & & & -1 \\ & \ddots & & \\ & & \lambda & -1 \\ & & \lambda-1 & \\ & & \lambda-1 & \\ & -1 & \lambda & \\ & & \ddots & \\ -1 & & & \lambda \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda-1 & \\ -1 & \lambda \end{vmatrix}^k (\lambda-1) = (\lambda-1)^{k+1}(\lambda+1)^k; \quad n=2k+1 \end{cases}$$

$\lambda=1$ , 解  $(\lambda I - A)X = 0$ , 得

$$X_{11} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, X_{12} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \dots, X_{1k} = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \end{bmatrix}, X_{1k+1} = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$$

当  $n=2k$  时, 没有  $X_{1k+1}$  这个特征向量. 而当  $n=2k+1$  时,  $X_{1k} = (0, \dots, 0, 1, 0, 1, 0, \dots, 0)^T$ .

对  $\lambda = -1$ , 解  $(-I - A)X = 0$ , 得

$$X_{21} = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ \vdots \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, X_{22} = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \dots, X_{2k} = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \end{bmatrix},$$

当  $n=2k+1$  时,  $X_{2k} = (0, \dots, 0, -1, 0, 1, 0, \dots, 0)^T$

于是取

$$P = \begin{bmatrix} 1 & & & & & & -1 \\ & \ddots & & & & & \\ & & 1 & -1 & & & \\ & & 1 & 1 & & & \\ & \ddots & & & \ddots & & \\ 1 & & & & & & 1 \end{bmatrix}_{2k}, \text{ 或 } P = \begin{bmatrix} 1 & & & & & & -1 \\ & \ddots & & & & & \\ & & 1 & -1 & & & \\ & & & 1 & & & \\ & & 1 & 1 & & & \\ & \ddots & & & \ddots & & \\ 1 & & & & & & 1 \end{bmatrix}_{2k+1}$$

则

$$P^{-1}AP = \begin{bmatrix} I_k & \\ & -I_k \end{bmatrix}_{2k}, \text{ 或 } P^{-1}AP = \begin{bmatrix} I_{k+1} & \\ & -I_k \end{bmatrix}_{2k+1}.$$

45. 用  $r(\mathcal{A})$  表示  $n$  维线性空间  $V$  的线性变换  $\mathcal{A}$  的秩 (即其象的维数), 用  $\text{null}(\mathcal{A})$  表示  $\mathcal{A}$  的零度 (即其核的秩). 对  $\mathbf{R}^{(n)}$  的线性变换  $\mathcal{A}$  与  $\mathcal{B}$  及  $\mathbf{R}^{(n)}$  的任一子空间  $W$ , 以及  $W$  在  $\mathcal{A}$  下的 (全) 原象  $\mathcal{A}^{-1}W$ , 证明:

- (1)  $\dim W - \text{null}(\mathcal{A}) \leq \dim \mathcal{A}W \leq \dim W$ ;
- (2)  $\dim W \leq \dim \mathcal{A}^{-1}W \leq \dim W + \text{null}(\mathcal{A})$ ;
- (3)  $r(\mathcal{A} + \mathcal{B}) \leq r(\mathcal{A}) + r(\mathcal{B})$ ;
- (4)  $\text{null}(\mathcal{A}\mathcal{B}) \leq \text{null}(\mathcal{A}) + \text{null}(\mathcal{B})$ .

证 (1) 设  $\mathcal{A}$  在  $W$  上的导出变换为  $\mathcal{A}_1$ , 则有

$$\dim W = \dim \ker \mathcal{A}_1 + \dim \mathcal{A}_1 W$$

而  $\ker \mathcal{A}_1 \subseteq \ker(\mathcal{A})$ ,  $\mathcal{A}_1 W = \mathcal{A}W$ , 故得

$$\dim W \leq \text{null}(\mathcal{A}) + \dim \mathcal{A}W.$$

(2) 设  $\mathcal{A}$  在  $\mathcal{A}^{-1}W$  上的限制为  $\mathcal{A}_2$  (记为  $\mathcal{A}_2 = \mathcal{A}|_{\mathcal{A}^{-1}W}$ ), 则有

$$\dim \mathcal{A}^{-1}W = \dim \ker \mathcal{A}_2 + \dim \mathcal{A}_2(\mathcal{A}^{-1}W),$$

而  $\ker \mathcal{A}_2 \subseteq \ker(\mathcal{A})$ ,  $\mathcal{A}_2(\mathcal{A}^{-1}W) = W$ , 故

$$\dim \mathcal{A}^{-1}W \leq \text{null}(\mathcal{A}) + \dim W, \text{ 所以得证.}$$

(3) 设  $\mathcal{A}, \mathcal{B}$  在某基下方阵表示分别为  $A, B$ , 则由 4.3 节 34 题(3)知有  $r(A+B) \leq r(A) + r(B)$ , 即得

$$r(\mathcal{A} + \mathcal{B}) \leq r(\mathcal{A}) + r(\mathcal{B})$$

(4) 由  $n = \text{null } \mathcal{AB} + r(\mathcal{AB}) = \text{null } \mathcal{B} + r(\mathcal{B})$ , 得

$$\text{null } \mathcal{AB} = n - r(\mathcal{AB}) = \text{null } \mathcal{B} + r(\mathcal{B}) - r(\mathcal{AB})$$

记  $\mathcal{B}V = W_1$ , 则  $r(\mathcal{B}) = \dim W_1$ ,  $r(\mathcal{AB}) = \dim(\mathcal{A}W_1)$ , 由(1)有

$$r(\mathcal{B}) - r(\mathcal{AB}) = \dim W_1 - \dim(\mathcal{A}W_1) \leq \text{null } \mathcal{A},$$

故

$$\text{null } \mathcal{AB} \leq \text{null } \mathcal{A} + \text{null } \mathcal{B}.$$

注 (4) 也可以利用  $n$  阶方阵关于秩的公式:  $r(AB) \geq r(A) + r(B) - n$  来证, 把  $r(AB) = n - \text{null}(\mathcal{AB})$ ,  $r(A) = n - \text{null}(\mathcal{A})$ ,  $r(B) = n - \text{null}(\mathcal{B})$  代入上式, 即得证.

46. 证明: 线性变换  $\mathcal{A}$  的任意一组特征向量张成的向量空间必是  $\mathcal{A}$  的不变子空间.

证 设  $W = \langle x_1, \dots, x_s \rangle$ , 其中  $x_i$  满足  $\mathcal{A}x_i = \lambda_i x_i$ ,  $i = 1, \dots, s$ . 任  $\alpha \in W$ , 记  $\alpha =$

$$\sum_{k=1}^s c_k x_k, \text{ 则有}$$

$$\mathcal{A}\alpha = \sum_{k=1}^s c_k \mathcal{A}x_k = \sum_{k=1}^s c_k \lambda_k x_k \in W,$$

所以  $W$  是  $\mathcal{A}$  的不变子空间.

47. 设  $A$  是  $n$  阶方阵且满足  $r(A+I) + r(A-I) = n$ , 则  $A^2 = I$ .

证 设  $r(A+I) = r$ , 则  $(A+I)X=0$  的解空间是  $n-r$  维的, 它是  $A$  的属于特征值  $\lambda = -1$  的特征子空间, 取  $X_{r+1}, \dots, X_n$  为其基.

又由已知得  $r(A-I) = n-r$ , 所以  $(A-I)X=0$  的解空间是  $r$  维的, 它是  $A$  的属于特征值 1 的特征子空间, 取其基为  $X_1, \dots, X_r$ .

令  $P = (X_1, \dots, X_r, X_{r+1}, \dots, X_n)$ , 显然  $P$  可逆, (属于不同特征值的特征向量线性无关), 且有

$$P^{-1}AP = \begin{bmatrix} I_r & \\ & -I_{n-r} \end{bmatrix} \rightarrow A = P \begin{bmatrix} I_r & \\ & -I_{n-r} \end{bmatrix} P^{-1} \rightarrow A^2 = I.$$

48. 证明: 若空间所有非零向量均为线性变换  $\mathcal{A}$  的特征向量, 则  $\mathcal{A}$  为纯量变换, 即有常数  $c$  使  $\mathcal{A}x = cx$  对所有向量  $x$  成立.

证 取  $x_1, x_2$  线性无关, 且设  $\mathcal{A}x_1 = \lambda_1 x_1$ ,  $\mathcal{A}x_2 = \lambda_2 x_2$ , 则  $\mathcal{A}(x_1 + x_2) = \mathcal{A}x_1 + \mathcal{A}x_2 = \lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2$ , 要  $(x_1 + x_2)$  也是特征向量则须  $\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 = \lambda(x_1 + x_2)$

即

$$(\lambda_1 - \lambda)x_1 + (\lambda_2 - \lambda)x_2 = 0,$$

但  $x_1, x_2$  线性无关, 所以必  $\lambda = \lambda_1 = \lambda_2$ , 即  $\mathcal{A}$  的所有特征值相同, 即对任  $x$ , 有  $\mathcal{A}x = cx$ .

49. 设  $\mathcal{A}$  为非奇异线性变换, 证明  $\mathcal{A}$  的不变子空间均为  $\mathcal{A}^{-1}$  的不变子空间.

证 方法 1 设  $W$  是  $\mathcal{A}$  的不变子空间, 在  $W$  中取基  $\alpha_1, \dots, \alpha_r$  并扩充为  $V$  的基  $\alpha_1, \dots, \alpha_r, \alpha_{r+1}, \dots, \alpha_n$ , 则  $\mathcal{A}$  在此基上的方阵表示为  $A = \begin{bmatrix} A_1 & A_3 \\ O & A_2 \end{bmatrix}$ , 其中  $A_1, A_2$  均可逆 (因  $A$  可逆).

又  $\mathcal{A}^{-1}$  在上述基上的方阵表示为  $A^{-1} = \begin{bmatrix} A_1^{-1} & * \\ O & A_2^{-1} \end{bmatrix}$ , 即仍为准上三角阵, 所以  $W$  是  $\mathcal{A}^{-1}$  的不变子空间.

方法 2 设  $W$  是  $\mathcal{A}$  的不变子空间, 在  $W$  中取基  $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ , 则因  $\mathcal{A}$  可逆, 所以  $\mathcal{A}\alpha_1, \dots, \mathcal{A}\alpha_r$  亦线性无关且是  $W$  的基. 于是任  $\beta \in W$ , 有

$$\beta = k_1 \mathcal{A}\alpha_1 + \dots + k_r \mathcal{A}\alpha_r = \mathcal{A}(k_1 \alpha_1 + \dots + k_r \alpha_r)$$

所以  $\mathcal{A}^{-1}\beta = k_1 \alpha_1 + \dots + k_r \alpha_r \in W$ .

方法 3 因为  $\mathcal{A}$  可逆,  $W$  为  $\mathcal{A}$  的不变子空间, 所以  $\mathcal{A}|_W = \mathcal{A}_1$  仍为可逆, 所以  $W = \mathcal{A}_1 W$ , 两边用  $\mathcal{A}^{-1}$  作用得:  $\mathcal{A}^{-1}W = \mathcal{A}^{-1}\mathcal{A}_1 W = \mathcal{A}^{-1}\mathcal{A}W = W$ , 故  $W$  是  $\mathcal{A}^{-1}$  的不变子空间.

50. 若  $W$  是线性变换  $\mathcal{A}$  的不变子空间, 则其象  $\mathcal{A}W$ , 及原象  $\mathcal{A}^{-1}W$  均为  $\mathcal{A}$  的不变子空间.

证 ① 任  $\alpha \in \mathcal{A}W$ ,  $\mathcal{A}\alpha \in \mathcal{A}W$ , 故  $\mathcal{A}W$  是  $\mathcal{A}$  的不变子空间.

② 任  $\alpha \in \mathcal{A}^{-1}W$ , 则  $\beta = \mathcal{A}\alpha \in W$ , 故知  $\gamma = \mathcal{A}\beta \in W$  (因  $W$  是  $\mathcal{A}$  的不变子空间), 所以

$$\mathcal{A}\alpha = \beta = \mathcal{A}^{-1}\gamma, (\gamma \in W),$$

于是  $\mathcal{A}\alpha \in \mathcal{A}^{-1}W$ , 故  $\mathcal{A}^{-1}W$  是  $\mathcal{A}$  的不变子空间.

51. 设  $\mathbf{R}^{(n)}$  的线性变换  $\mathcal{A}$  在基  $\alpha_1, \dots, \alpha_n$  下的方阵表示为对角形, 且对角线上元素互异, 求  $\mathcal{A}$  的所有不变子空间, 共多少个?

证 由已知  $\alpha_1, \dots, \alpha_n$  均为  $\mathcal{A}$  的分别属于特征值  $\lambda_1, \dots, \lambda_n$  的特征向量. 对任  $k$ ,  $W = \langle \alpha_{i_1}, \dots, \alpha_{i_k} \rangle$  均是  $\mathcal{A}$  的不变子空间 (由 46 题), 其中  $1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n$ .

又若  $W_1 \subset \mathbf{R}^{(n)}$  是  $\mathcal{A}$  的不变子空间, 则  $\mathcal{A}_1 = \mathcal{A}|_{W_1}$  是  $W_1$  上的线性变换, 其特征值是  $\mathcal{A}$  的特征值的一部分, 不妨设为  $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ , 且  $r = \dim W_1$ , 故存在  $\beta_1, \dots, \beta_r \in W_1$ , 使  $\mathcal{A}_1 \beta_1 = \lambda_1 \beta_1, \dots, \mathcal{A}_1 \beta_r = \lambda_r \beta_r$ , 由于  $\mathcal{A}_1 \beta_i = \mathcal{A}\beta_i$ , 所以  $\beta_i$  是  $\mathcal{A}$  的特征向量, 故  $\beta_i = k_i \alpha_{i_i}, k_i \neq 0$ , 所以  $W_1 = \langle \beta_1, \dots, \beta_r \rangle = \langle \alpha_{i_1}, \dots, \alpha_{i_r} \rangle$ . 即所有不变子空间均可由特征向量张成. 共有

$$1 + C_n^1 + C_n^2 + \dots + C_n^{n-1} + 1 = (1+1)^n = 2^n \text{ 个}.$$

52. 证明: 复线性空间的任何两个可交换的线性变换必有公共的特征向量.

证 记这样的两个线性变换分别为  $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ , 由已知有  $\mathcal{A}\mathcal{B} = \mathcal{B}\mathcal{A}$ . 又设  $\lambda_0$  是  $\mathcal{A}$  的一个特征值 (特征多项式在复数域上总有根), 相应的特征子空间记为  $V_{\lambda_0}$ , 即  $V_{\lambda_0} = \ker(\mathcal{A} - \lambda_0 \mathcal{E})$ . 下证  $V_{\lambda_0}$  是  $\mathcal{B}$  的不变子空间: 任  $\alpha \in V_{\lambda_0}$ , 有

$$(\mathcal{A} - \lambda_0 \mathcal{E})\mathcal{B}\alpha = \mathcal{B}(\mathcal{A} - \lambda_0 \mathcal{E})\alpha = \mathcal{B}0 = 0,$$

所以  $\mathcal{B}\alpha \in \ker(\mathcal{A} - \lambda_0 \mathcal{E}) = V_{\lambda_0}$ . 故得证.

又记  $\mathcal{B}_1 = \mathcal{B}|_{V_{\lambda_0}}$ , 则  $\mathcal{B}_1$  是  $V_{\lambda_0}$  上的线性变换, 在  $\mathbf{C}$  上有特征值  $\mu$ , 于是有特征向量  $\beta$ , 使  $\mathcal{B}_1 \beta = \mu \beta, (\beta \neq 0, \beta \in V_{\lambda_0})$ , 此即  $\mathcal{B}\beta = \mu \beta$  而  $\mathcal{A}\beta = \lambda_0 \beta$ , 所以  $\beta$  是  $\mathcal{A}, \mathcal{B}$  的公共特征向量.

(此证明中  $\mathcal{E}$  表恒等变换).

53. 证明: 若  $B=P^{-1}AP$ ,  $f(X)$  为多项式, 则  $f(B)=P^{-1}f(A)P$ .

证 设  $f(X)=a_nX^n+a_{n-1}X^{n-1}+\cdots+a_1X+a_0$ , 则

$$\begin{aligned}f(B) &= a_nB^n + a_{n-1}B^{n-1} + \cdots + a_1B + a_0I \\&= a_n(P^{-1}AP)^n + a_{n-1}(P^{-1}AP)^{n-1} + \cdots + a_1(P^{-1}AP) + a_0I \\&= P^{-1}(a_nA^n + a_{n-1}A^{n-1} + \cdots + a_1A + a_0I)P \\&= P^{-1}f(A)P.\end{aligned}$$

(这里用到  $(P^{-1}AP)^k = (P^{-1}AP)\cdots(P^{-1}AP) = P^{-1}A^kP$ ).

54. 证明: 两个对角方阵相似的充分必要条件为对角线元素相同, 只是排列次序不同.

证 记  $A=\text{diag}\{\lambda_1, \cdots, \lambda_n\}$ ,  $B=\text{diag}\{\mu_1, \cdots, \mu_n\}$ , 对角线上分别为它们的特征值.

$\Rightarrow$  若有  $B=P^{-1}AP$ , 则  $\det(\lambda I - A) = \det(\lambda I - B)$ , 所以其特征值对应相等.

$\Leftarrow$  若  $\lambda_{i_k} = \mu_k$ ,  $k=1, \cdots, n$ , 则取  $P$  为第一种初等方阵 (即由对换单位方阵的两行得到) 之积, (这样的  $P$  也称为置换方阵) 即有  $P^{-1}AP=B$ . 即  $A$  相似于  $B$ .

55. 设  $A, B$  为实方阵, 若  $A, B$  在  $\mathbb{C}$  上相似 (即有复方阵  $P$ , 使  $P^{-1}AP=B$ ), 则  $A, B$  在  $\mathbb{R}$  上相似 (即有实方阵  $T$  使  $T^{-1}AT=B$ ).

证 设  $P=P_1+iP_2$ , 由  $P^{-1}AP=B$  知  $A(P_1+iP_2)=(P_1+iP_2)B$ , 故得

$$AP_1=P_1B, AP_2=P_2B \rightarrow A(P_1+\mu P_2)=(P_1+\mu P_2)B,$$

因  $\det(P_1+\mu P_2)$  为  $\mu$  的  $n$  次多项式, 在实数域中最多有  $n$  个根, 避开它们即可使  $P_1+\mu P_2$  为可逆的. 令其为  $T$ , 则  $T$  为实方阵, 且有  $T^{-1}AT=B$ .

\* 56. 设数域  $K$  包含域  $F$ , 方阵  $A, B$  的元素属于  $F$ . 证明: 若  $A, B$  在  $K$  上相似 (即有元素属于  $K$  的方阵  $P$  使  $P^{-1}AP=B$ ), 则  $A, B$  在  $F$  上相似 (即有元素属于  $F$  的方阵  $T$  使  $T^{-1}AT=B$ ).

证 因为  $P^{-1}AP=B$  相当于  $AP=PB$ , 即  $AP-PB=0$ , 把  $P=(p_{ij})$  的元素看成变元, 则  $AP-PB=0$  是  $n^2$  个方程,  $n^2$  个未知数的齐次线性方程组, 它的系数 (由  $a_{ij}, b_{ij}$  构成) 属于  $F$ . 由题设知此线性方程组有非零解  $p_{ij} \in K$ , 所以系数行列式为 0, 故在  $F$  上也有非零解  $P=(p_{ij})$  ( $p_{ij} \in F, 1 \leq i, j \leq n$ ). 以下只要证明有  $F$  上解  $P$  且  $P$  可逆即可.

$AP-PB=0$  的基础解系 (即解空间的基) 可取为  $F$  上的方阵  $P_1, \cdots, P_s$  (基础解系由令自由未知元为  $(0, \cdots, 0, 1)^T, \cdots, (1, 0, \cdots, 0)^T$  得到) 由题设可知, 存在  $K$  上一解  $P$  是可逆的, 令  $P=x_1P_1+x_2P_2+\cdots+x_sP_s$ , 这相当于说存在  $x_i \in K$ , 使  $\det P = \det(x_1P_1+\cdots+x_sP_s) \neq 0$ . 注意  $\det(x_1P_1+\cdots+x_sP_s) = f(x_1, \cdots, x_s)$  是  $x_1, \cdots, x_s$  的多项式.

以下证明: 对系数属于  $F$  的非零多项式  $f(x_1, \cdots, x_s)$  必存在  $(c_1, \cdots, c_s) \in F^s$ , 使  $f(c_1, \cdots, c_s) \neq 0$ .  $s=1$  时显然, 设对  $s-1$  情形成立, 看  $s$  情形: 因  $f$  不是 0 多项式, 所以  $f(x_1, \cdots, x_s) = a_0x_s^m + \cdots + a_m$ , 其中  $a_i = a_i(x_1, \cdots, x_{s-1}) \in F[x_1, \cdots, x_{s-1}]$ , 且  $a_0 \neq 0$ . 故由归纳假设知存在  $c_1, \cdots, c_{s-1}$  使  $a_0(c_1, \cdots, c_{s-1}) \neq 0$ , 即

$$f(c_1, \cdots, c_{s-1}, x_s) = a_0(c_1, \cdots, c_{s-1})x_s^m + \cdots + a_m(c_1, \cdots, c_{s-1}) \neq 0,$$

所以  $\exists c_s = x_s$  代入得  $f(c_1, \cdots, c_s) \neq 0$ .

57. 设方阵  $A$  与  $B$  可交换且均相似于对角形, 则它们可同时对角化 (即存在方阵  $P$

使  $P^{-1}AP, P^{-1}BP$  同时为对角形).

解 因为  $A$  相似于对角阵, 所以必存在  $P_1$  使

$$P_1^{-1}AP_1 = \begin{bmatrix} \lambda_1 I_{n_1} & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_s I_{n_s} \end{bmatrix} \quad \text{其中 } \lambda_1, \dots, \lambda_s \text{ 互异,}$$

由  $AB=BA$  知有  $P_1^{-1}AP_1 P_1^{-1}BP_1 = P_1^{-1}BP_1 P_1^{-1}AP_1$ , 利用 4.3 节 13 题知  $P_1^{-1}BP_1 = \text{diag}\{B_{11}, \dots, B_s\}$  为准对角阵, 且由  $B$  可对角化知,  $\exists Q_i$  使  $Q_i^{-1}B_{ii}Q_i$  为对角阵, ( $i=1, \dots, s$ ), 记

$$P_2 = \begin{bmatrix} Q_1 & & \\ & \ddots & \\ & & Q_s \end{bmatrix},$$

取  $P=P_1P_2$ , 则  $P^{-1}AP, P^{-1}BP$  同时为对角形.

58. 设  $\Phi$  是一族  $n$  阶方阵, 其中方阵两两可交换且均相似于对角形, 则  $\Phi$  中方阵可同时对角化(即存在可逆方阵  $P$  使对任意  $A \in \Phi$  均有  $P^{-1}AP$  为对角形).

证 若方阵  $A$  只有一个不同的特征值, 则  $A=P^{-1}\lambda I P=\lambda I$  为纯量方阵, 故若所有  $\Phi$  中方阵均只有一个不同的特征值, 则定理显然. 现设  $\Phi$  中有一个方阵  $A_1$  至少有两个互异的特征值, 于是存在  $P_1$  使

$$P_1^{-1}A_1P_1 = \begin{bmatrix} \lambda_1 I & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_s I \end{bmatrix}, \quad (\lambda_1, \dots, \lambda_s \text{ 互异}, s \geq 2)$$

由 57 题知: 对所有与  $A_1$  可交换的方阵  $A_i$  均有

$$P_1^{-1}A_iP_1 = \begin{bmatrix} A_{i1} & & \\ & \ddots & \\ & & A_{is} \end{bmatrix}$$

因每个方阵  $A_{ij}$   $i=2, 3, \dots, j=1, 2, \dots, s$  的阶均小于  $n$ , 故对每个固定的  $j$ , 由归纳假设知存在可逆阵  $Q_j$  使

$$Q_j^{-1}A_{ij}Q_j = B_{ij} \quad \text{为对角形, } (1 \leq j \leq s, i=2, 3, \dots),$$

令  $P_2 = \text{diag}\{Q_1, \dots, Q_s\}$ , 取  $P=P_1P_2$ , 则对任  $A_i \in \Phi$ ,

$$P^{-1}A_iP \text{ 为对角阵.}$$

## 6.4 补充题与解答

1. 设  $V$  是复数域  $\mathbb{C}$  上的  $n$  维线性空间,  $\mathcal{A}$  是  $V$  的线性变换, 则  $\mathcal{A}$  有任意  $r$  维的不变子空间 ( $1 \leq r \leq n$ ).

证 因为  $\mathcal{A}$  在  $\mathbb{C}$  上有  $n$  个特征根  $\lambda_1, \dots, \lambda_n$  (重根计入), 于是由定理 12, 在  $V$  中存在一组基  $\epsilon_1, \dots, \epsilon_n$ , 使  $\mathcal{A}$  在此基上的方阵表示为上三角阵:



$$\begin{bmatrix} \lambda_1 & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ & \lambda_2 & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & b_{n-1,n} \\ & & & \lambda_n \end{bmatrix}$$

则  $W_r = \langle \varepsilon_1, \dots, \varepsilon_r \rangle (1 \leq r \leq n)$  是  $\mathcal{A}$  的  $r$  维不变子空间. 事实上, 任  $\alpha \in W_r$ , 有  $\alpha = \sum_{i=1}^r x_i \varepsilon_i$ ,

则  $\mathcal{A}\alpha = \sum_{i=1}^r x_i \mathcal{A}\varepsilon_i$ , 其中  $\mathcal{A}\varepsilon_i = b_{1i}\varepsilon_1 + \cdots + b_{i-1,i}\varepsilon_{i-1} + \lambda_i\varepsilon_i \in W_r (1 \leq i \leq r)$ .

所以  $\mathcal{A}\alpha \in W_r$ , 故得证.

2. 设  $V$  是实数域  $R$  上二阶方阵所成的线性空间, 其中一组基为

$$\varepsilon_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \varepsilon_2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \varepsilon_3 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \varepsilon_4 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix},$$

它们在线性变换  $\sigma$  下的象分别为

$$\alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}, \alpha_2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 3 \end{bmatrix}, \alpha_3 = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 7 & 3 \end{bmatrix}, \alpha_4 = \begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 7 & 7 \end{bmatrix}.$$

求  $\sigma(\alpha_1), \sigma(\alpha_2), \sigma(\alpha_3), \sigma(\alpha_4)$ .

解 取  $V$  的自然基

$$E_{11} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, E_{12} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, E_{13} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, E_{14} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

且设  $\sigma$  在此基下的方阵表示为  $A$ . 又用  $\tilde{\varepsilon}_i, \tilde{\alpha}_i$  分别记  $\varepsilon_i, \alpha_i$  在此自然基下的坐标列 ( $\in \mathbb{R}^{(4)}$ ), 于是有

$$\tilde{\alpha}_i = A\tilde{\varepsilon}_i, \quad i = 1, 2, 3, 4.$$

也即有

$$(\tilde{\alpha}_1, \tilde{\alpha}_2, \tilde{\alpha}_3, \tilde{\alpha}_4) = A(\tilde{\varepsilon}_1, \tilde{\varepsilon}_2, \tilde{\varepsilon}_3, \tilde{\varepsilon}_4).$$

故知

$$\begin{aligned} A &= (\tilde{\alpha}_1, \tilde{\alpha}_2, \tilde{\alpha}_3, \tilde{\alpha}_4)(\tilde{\varepsilon}_1, \tilde{\varepsilon}_2, \tilde{\varepsilon}_3, \tilde{\varepsilon}_4)^{-1} \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \\ 3 & 3 & 7 & 7 \\ 0 & 3 & 3 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 3 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 4 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

则

$$\widetilde{\sigma\alpha_1} = A\tilde{\alpha}_1 = \begin{bmatrix} 7 \\ 0 \\ 15 \\ 0 \end{bmatrix}, \widetilde{\sigma\alpha_2} = A\tilde{\alpha}_2 = \begin{bmatrix} 7 \\ 7 \\ 15 \\ 15 \end{bmatrix}, \widetilde{\sigma\alpha_3} = A\tilde{\alpha}_3 = \begin{bmatrix} 17 \\ 7 \\ 37 \\ 15 \end{bmatrix}, \widetilde{\sigma\alpha_4} = A\tilde{\alpha}_4 = \begin{bmatrix} 17 \\ 17 \\ 37 \\ 37 \end{bmatrix}.$$

这是  $\sigma\alpha_1, \sigma\alpha_2, \sigma\alpha_3, \sigma\alpha_4$  在自然基下的坐标, 故知

$$\sigma\alpha_1 = \begin{bmatrix} 7 & 0 \\ 15 & 0 \end{bmatrix}, \sigma\alpha_2 = \begin{bmatrix} 7 & 7 \\ 15 & 15 \end{bmatrix}, \sigma\alpha_3 = \begin{bmatrix} 17 & 7 \\ 37 & 15 \end{bmatrix}, \sigma\alpha_4 = \begin{bmatrix} 17 & 17 \\ 37 & 37 \end{bmatrix}.$$

3. 设  $\mathbf{R}^3$  中的线性变换  $\mathcal{A}$  把基  $\alpha=(1,0,1)$ ,  $\beta=(0,1,0)$ ,  $\gamma=(0,0,1)$  变为基  $(1,0,2)$ ,  $(-1,2,-1)$ ,  $(1,0,0)$ , 试求  $\mathcal{A}$  在基  $\alpha, \beta, \gamma$  及基  $\epsilon_1=(1,0,0)$ ,  $\epsilon_2=(0,1,0)$ ,  $\epsilon_3=(0,0,1)$  下的方阵表示.

解 设  $\mathcal{A}$  在基  $\alpha, \beta, \gamma$  下的矩阵为  $A$ , 在基  $\epsilon_1, \epsilon_2, \epsilon_3$  下的矩阵为  $B$ . 则有

$$(\alpha, \beta, \gamma) = (\alpha, \beta, \gamma)A \rightarrow (\tilde{\alpha}, \tilde{\beta}, \tilde{\gamma}) = (\tilde{\alpha}, \tilde{\beta}, \tilde{\gamma})A; \quad (1)$$

$$(\tilde{\alpha}, \tilde{\beta}, \tilde{\gamma}) = B(\tilde{\alpha}, \tilde{\beta}, \tilde{\gamma}). \quad (2)$$

其中  $\tilde{\alpha}$  是  $\sigma\alpha$  在自然基  $\epsilon_1, \epsilon_2, \epsilon_3$  下的坐标.

又因为在  $\mathbf{R}^3$  中, 每个向量的坐标就是其转置. 故得

$$\begin{aligned} A &= (\tilde{\alpha} \tilde{\beta} \tilde{\gamma})^{-1} (\tilde{\alpha} \tilde{\beta} \tilde{\gamma}) \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}. \\ B &= (\tilde{\alpha} \tilde{\beta} \tilde{\gamma}) (\tilde{\alpha} \tilde{\beta} \tilde{\gamma})^{-1} \\ &= \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

这里  $A=C^{-1}D$  和  $B=DC^{-1}$  均不必求逆后再做方阵乘法. 可直接由对  $(C, D)$  做初等行变换化为  $(I, C^{-1}D)$  和对  $\begin{bmatrix} C \\ D \end{bmatrix}$  做初等列变换化为  $\begin{bmatrix} I \\ DC^{-1} \end{bmatrix}$  得到. 详见 5.2 节解题方法介绍.

注 公式(1), (2)的来源见 6.2 节求线性变换在某基下的矩阵的方法中 2 与 3.

4. 设  $\mathcal{A}$  是数域  $F$  上  $n$  维线性空间  $V$  的线性变换, 证明:

(1) 在  $F[X]$  中至少有一个次数  $\leq n^2$  的多项式  $f(X)$ , 使得  $f(\mathcal{A})=0$ ;

(2)  $\mathcal{A}$  可逆的充分必要条件是有一常数项不为零的多项式  $f(X)$ , 使得  $f(\mathcal{A})=0$ .

证 (1) 方法 1 因为  $\dim L(V)=n^2$ , 所以  $L(V)$  中  $n^2+1$  个向量  $\mathcal{E}, \mathcal{A}, \mathcal{A}^2, \dots, \mathcal{A}^{n^2}$  必线性相关. 即存在不全为 0 的数  $a_0, a_1, \dots, a_{n^2}$  使

$$a_{n^2} \mathcal{A}^{n^2} + a_{n^2-1} \mathcal{A}^{n^2-1} + \dots + a_1 \mathcal{A} + a_0 \mathcal{E} = 0.$$

方法 2: 由于  $\mathcal{A}$  的特征多项式是  $\mathcal{A}$  的化零多项式, 而  $\deg f_{\mathcal{A}}(\lambda) = n \leq n^2$ , 所以得证.

(2)  $\Leftarrow$  (充分性) 若存在  $f(X) = X^m + a_{m-1}X^{m-1} + \dots + a_1X + a_0$ , 其中  $a_0 \neq 0$ , 使  $f(\mathcal{A})=0$ , 即有

$$\mathcal{A}^m + a_{m-1}\mathcal{A}^{m-1} + \dots + a_1\mathcal{A} + a_0\mathcal{E} = 0$$

于是得  $\mathcal{A}(\mathcal{A}^{m-1} + a_{m-1}\mathcal{A}^{m-2} + \dots + a_1) = -a_0\mathcal{E}$ , 所以  $\mathcal{A}$  可逆.

$\Rightarrow$  (必要性) 方法 1 由(1)知存在  $f(X)$  使  $f(\mathcal{A})=0$ , ( $\deg f \leq n^2$ ). 当  $\mathcal{A}$  可逆时, 设此多项式从低次往高次数, 第一个不为零的项为  $a_k\mathcal{A}^k$ , 则由

$$\mathcal{A}^m + a_{m-1}\mathcal{A}^{m-1} + \dots + a_k\mathcal{A}^k = 0$$

左乘  $(\mathcal{A}^{-1})^k$ , 得

$$\mathcal{A}^{m-k} + a_{m-1}\mathcal{A}^{m-1-k} + \cdots + a_k\mathcal{E} = 0$$

因为  $a_k \neq 0$ , 所以  $g(X) = X^{m-k} + a_{m-1}X^{m-1-k} + \cdots + a_k$  为所求.

此题中  $\mathcal{E}$  表恒等变换.

方法 2 设  $\mathcal{A}$  的特征多项式为

$$f_{\mathcal{A}}(\lambda) = \lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \cdots + a_1\lambda + a_0\epsilon, \quad \text{其中 } a_0 = \det A.$$

则  $f_{\mathcal{A}}(\mathcal{A}) = 0$ , 且当  $\mathcal{A}$  可逆时,  $A$  可逆, 故  $a_0 = \det A \neq 0$ . 即  $f_{\mathcal{A}}(\lambda)$  满足题设条件. (这里  $A$  是  $\mathcal{A}$  在某基上的方阵表示).

## 第7章

# 方阵相似标准形与空间分解

### 7.1 定义与定理

定理 7.1(孙子定理) 整数的一次同余式组

$$\begin{cases} x = b_1 \pmod{m_1}, \\ \dots \dots \dots \\ x = b_s \pmod{m_s}, \end{cases}$$

当  $m_1, \dots, m_s$  为两两互素的整数时, 对任意的整数  $b_1, \dots, b_s$  总有整数解  $x$ , 且此解在模  $m = m_1 \cdots m_s$  意义下唯一. 事实上, 记  $M_i = m/m_i$ , 由辗转相除法求得整数  $u_1, \dots, u_s$ , 使得

$$u_1 M_1 + \cdots + u_s M_s = 1,$$

记  $e_i = u_i M_i (1 \leq i \leq s)$ , 则

$$x \equiv b_1 e_1 + \cdots + b_s e_s \pmod{m}.$$

定理 7.1'(孙子分解) 设  $m = m_1 \cdots m_s$ , 其中  $m_i$  为两两互素整数 ( $1 \leq i \leq s$ ). 则有直和分解

$$\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} = \mathbb{Z}\bar{e}_1 \oplus \mathbb{Z}\bar{e}_2 \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}\bar{e}_s \cong \mathbb{Z}/m_1\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/m_2\mathbb{Z} \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}/m_s\mathbb{Z},$$

$$\bar{x} = b_1 \bar{e}_1 + \cdots + b_s \bar{e}_s \mapsto (b_1, b_2, \dots, b_s),$$

其中  $x \equiv b_i \pmod{m_i}$ ,  $\mathbb{Z}\bar{e}_i \cong \mathbb{Z}/m_i\mathbb{Z} (1 \leq i \leq s)$ . 而且

$$\bar{e}_1 + \bar{e}_2 + \cdots + \bar{e}_s = \bar{1},$$

$$\bar{e}_i \bar{e}_j = \bar{0} \text{ (当 } i \neq j), \bar{e}_i^2 = \bar{e}_i.$$

定义 7.1 设  $\mathcal{A}$  为  $V$  上的线性变换,  $A$  为  $n$  阶方阵. 若多项式形式  $g(\lambda) \in F[\lambda]$  使得  $g(\mathcal{A}) = 0$  为零变换 (或  $g(A) = 0$  为零矩阵), 则  $g(\lambda)$  称为  $\mathcal{A}$  的 (或  $A$  的) 零化多项式或化零多项式.

定义 7.2 线性变换  $\mathcal{A}$  (方阵  $A$ ) 的最低次首一零化多项式称为  $\mathcal{A}$  的 ( $A$  的) 最小多项式, 或极小多项式, 记为  $m_{\mathcal{A}}(\lambda)$  ( $m_A(\lambda)$ ) 或  $m(\lambda)$ .

定理 7.2 对任一线性变换  $\mathcal{A}$ , 其极小多项式存在且唯一; 其倍式全体  $\{m_{\mathcal{A}}(\lambda)h(\lambda) | h(\lambda) \in F[\lambda]\}$  即为  $\mathcal{A}$  的零化多项式全体.

定理 7.3 (Cayley-Hamilton) 线性变换  $\mathcal{A}$  (或方阵  $A$ ) 的特征多项式  $f(\lambda)$  是  $\mathcal{A}$  (或  $A$ ) 的零化多项式.

定理 7.4 设  $F \subset C$  为数域, 线性变换  $\mathcal{A}$  的特征多项式  $f(\lambda)$  在  $F[\lambda]$  中分解为

$$f(\lambda) = p_1(\lambda)^{d_1} p_2(\lambda)^{d_2} \cdots p_s(\lambda)^{d_s}.$$

其中  $p_i(\lambda)$  为  $F$  上不可约多项式,  $d_i > 0 (i = 1, \dots, s)$ , 则  $\mathcal{A}$  的最小多项式  $m_{\mathcal{A}}(\lambda)$  为

$$m(\lambda) = p_1(\lambda)^{r_1} p_2(\lambda)^{r_2} \cdots p_s(\lambda)^{r_s}.$$

其中  $d_i \geq r_i > 0 (i=1, \dots, s)$ . 特别,  $f(\lambda)$  与  $m(\lambda)$  的根集相同(重数可不同)不可约因子集也相同.

**定理 7.5** 设

$$A = \begin{bmatrix} 0 & & & & -c_0 \\ 1 & \ddots & & & -c_1 \\ & \ddots & \ddots & & \vdots \\ & & \ddots & 0 & -c_{n-2} \\ & & & 1 & -c_{n-1} \end{bmatrix},$$

$A$  称为多项式  $f(\lambda) = c_0 + c_1\lambda + \cdots + c_{n-1}\lambda^{n-1} + \lambda^n \in F[\lambda]$  的友阵, 则  $A$  的最小多项式和特征多项式均为  $f(\lambda)$ .

**定义 7.3** 设多项式形式  $f(\lambda) \in F[\lambda]$ , 则记

$$\ker f = \ker f(\lambda) = \{\alpha \in V \mid f(\mathcal{A})\alpha = 0\},$$

称  $\ker f(\mathcal{A})$  为属于  $f$  的广义特征子空间, 其向量称为广义特征向量.

**引理 7.1** 设  $f, g \in F[\lambda]$ ,  $m = m(\lambda)$  是  $\mathcal{A}$  的最小多项式,  $\mathcal{A}$  是  $V$  上的线性变换, 则

- (1)  $\ker f$  是  $\mathcal{A}$  的不变子空间.
- (2)  $\ker(1) = 0$ ,  $\ker(m) = V$ .
- (3) 若  $g \mid f$ , 则  $\ker g \subset \ker f$ .
- (4)  $\ker(f) \cap \ker(g) = \ker(d)$ , 其中  $d = (f, g)$  为最大公因子.
- (5)  $\ker(f) + \ker(g) = \ker(M)$ , 其中  $M = [f, g]$  为最小公倍.
- (6) 若  $f$  与  $g$  互素, 则  $\ker(fg) = \ker(f) \oplus \ker(g)$ .

**定义 7.4** 设  $W_1, \dots, W_s$  均为线性空间  $V$  的子空间, 若有  $V = W_1 \oplus \cdots \oplus W_s$ , 则对任意  $x \in V$ , 有唯一分解式  $x = x_1 + \cdots + x_s$ , 其  $x_i \in W_i, i=1, 2, \dots, s$ . 这时对每个  $i (1 \leq i \leq s)$  定义映射

$$\begin{aligned} \eta_i: W_i &\rightarrow V, x_i \mapsto x; \\ \pi_i: V &\rightarrow W_i, x \mapsto x_i. \end{aligned}$$

则  $\eta$  为单射, 称为正则嵌入;  $\pi_i$  为满射, 称为正则投影.

**定理 7.6(空间准素分解)** 设域  $F$  上线性空间  $V$  的线性变换  $\mathcal{A}$  的最小多项式为

$$m(\lambda) = p_1(\lambda)^{r_1} p_2(\lambda)^{r_2} \cdots p_s(\lambda)^{r_s}, (s \geq 2).$$

其中  $p_i(\lambda)$  为  $F$  上首一不可约多项式, 互异,  $r_i$  为正整数  $(i=1, \dots, s)$ . 则

$$W_i = \ker p_i(\lambda)^{r_i} = \{\alpha \in V \mid p_i(\mathcal{A})^{r_i} \alpha = 0\}$$

是  $\mathcal{A}$  的不变子空间, 且

- (1)  $V = W_1 \oplus W_2 \oplus \cdots \oplus W_s$ .
- (2)  $\mathcal{A}_i = \mathcal{A}|_{W_i}$  的最小多项式为  $p_i(\lambda)^{r_i}$ .
- (3) 正则射影  $\mathcal{E}_i: V \rightarrow W_i$  是  $\mathcal{A}$  的多项式.
- (4) 若线性变换  $\mathcal{B}$  与  $\mathcal{A}$  可交换, 则  $W_i$  也是  $\mathcal{B}$  的不变子空间  $(1 \leq i \leq s)$ .

**系 1** 在定理 7.6 的条件下设  $\mathcal{A}$  的特征多项式为

$$f(\lambda) = p_1(\lambda)^{d_1} p_2(\lambda)^{d_2} \cdots p_s(\lambda)^{d_s},$$

则  $p_i(\lambda)^{d_i}$  是  $\mathcal{A}$  的特征多项式 ( $i=1, \dots, s$ ), 且

$$W_i = \ker p_i(\lambda)^{r_i} = \ker p_i(\lambda)^{d_i} = \{\alpha \in V \mid p_i(\mathcal{A})^k \alpha = 0, \text{ 对某正整数 } k \text{ 成立}\}.$$

**系 2** 设域  $F$  上  $n$  阶方阵  $A$  的最小多项式为  $m(\lambda) = p_1(\lambda)^{r_1} \cdots p_s(\lambda)^{r_s}$ , 特征多项式为  $f(\lambda) = p_1(\lambda)^{d_1} \cdots p_s(\lambda)^{d_s}$  ( $p_i(\lambda) \in F[\lambda]$  为首一不可约, 互异,  $d_i \geq r_i$  为正整数). 则

(1) 存在  $F$  上可逆方阵  $P$  使

$$A = P \begin{bmatrix} A_1 & & \\ & \ddots & \\ & & A_s \end{bmatrix} P^{-1}.$$

其中  $A_i$  的最小多项式和特征多项式分别为  $p_i(\lambda)^{r_i}$  和  $p_i(\lambda)^{d_i}$  ( $i=1, \dots, s$ ).

(2) 方阵

$$E_i = P \begin{bmatrix} 0 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 0 & & \\ & & & I_{n_i} & \\ & & & & 0 \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & 0 \end{bmatrix} P^{-1}$$

为  $A$  的多项式(这里的分块与(1)中分块一致,  $n_i = \deg p_i(\lambda)^{d_i}$ ).

(3) 若方阵  $B$  与  $A$  可交换, 则

$$B = P \begin{bmatrix} B_1 & & \\ & \ddots & \\ & & B_s \end{bmatrix} P^{-1}.$$

其中分块与(1)中一致,  $B_i$  的阶为  $n_i = \deg p_i(\lambda)^{d_i}$ .

**系 3** 域  $F$  上方阵  $A$  在  $F$  上相似于对角形方阵(即存在  $F$  上方阵  $P$  使  $P^{-1}AP$  为对角阵)的充分必要条件为  $A$  的最小多项式  $m(\lambda)$  在  $F$  上分解为互素的一次因子之积:

$$m(\lambda) = (\lambda - \lambda_1) \cdots (\lambda - \lambda_s), \text{ 其中 } \lambda_1, \dots, \lambda_s \in F \text{ 互异.}$$

**系 4** 设  $V$  是  $F$  上  $n$  维线性空间, 若其线性变换  $\mathcal{A}$  的特征多项式和最小多项式分别为:

$$f(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{d_1} \cdots (\lambda - \lambda_s)^{d_s},$$

$$m(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{r_1} \cdots (\lambda - \lambda_s)^{r_s},$$

其中  $\lambda_1, \dots, \lambda_s \in F$  互异,  $d_i \geq r_i > 0$  ( $1 \leq i \leq s$ ), 则

(1)  $V = W_1 \oplus \cdots \oplus W_s$ .

其中

$$W_i = \ker(\lambda - \lambda_i)^{r_i} = \{\alpha \in V \mid (\lambda_i I - \mathcal{A})^k \alpha = 0 \text{ 对某正整数 } k \text{ 成立}\}$$

称为“属于  $\lambda_i$  的根子空间”, 是  $\mathcal{A}$  的不变子空间, 其中向量称为属于  $\lambda_i$  的根向量.

(2)  $\mathcal{A}|_{W_i}$  的特征多项式为  $(\lambda - \lambda_i)^{d_i}$ , 最小多项式为  $(\lambda - \lambda_i)^{r_i}$ .

(3) 正则射影  $\mathcal{E}_i: V \rightarrow W_i$  是  $\mathcal{A}$  的多项式. 特别若  $\mathcal{B}$  是与  $\mathcal{A}$  可交换的线性变换, 则

$W_i$  是  $\mathscr{B}$  的不变子空间 ( $1 \leq i \leq s$ ).

**系 5** 若域  $F$  上的  $n$  阶方阵  $A$  在  $F$  中有几个特征根 (重根计  $\lambda$ ), 则有方阵  $D$  和  $N$  使

$$A = D + N, \quad DN = ND,$$

其中  $D$  在  $F$  上相似于对角形方阵,  $N$  为幂零方阵. 并且  $D$  与  $N$  由  $A$  唯一决定且均为  $A$  的多项式.

**定义 7.5** (1) 设  $\alpha \in V$ , 则  $F[\lambda]\alpha = F[\mathscr{A}]\alpha$  称为  $\alpha$  生成的  $\mathscr{A}$  的循环子空间 (这是含  $\alpha$  的最小不变子空间). (2) 若  $V$  中有向量  $\alpha$  使  $F[\lambda]\alpha = V$ , 则称  $V$  是循环空间, 称  $\alpha$  是  $V$  的循环向量. (3) 若

$$g(\lambda)\alpha = g(\mathscr{A})\alpha = 0,$$

则称  $g(\lambda)$  为  $\alpha$  的零化或化零多项式,  $\alpha$  的化零多项式中次数最低的首一多项式称为  $\alpha$  的最小零化子.

**定理 7.7** 设  $V$  是域  $F$  上  $n$  维线性空间,  $\mathscr{A}$  是  $V$  的线性变换. 固定  $\alpha \in V$ , 记  $\alpha$  生成的循环子空间为

$$W = F[\mathscr{A}]\alpha = F[\lambda]\alpha.$$

(1) 若  $\alpha, \mathscr{A}\alpha, \dots, \mathscr{A}^{k-1}\alpha$  线性无关, 而  $\alpha, \mathscr{A}\alpha, \dots, \mathscr{A}^k\alpha$  线性相关, 即存在不全为 0 的  $c_0, \dots, c_{k-1}, 1$  使

$$\mathscr{A}^k\alpha + c_{k-1}\mathscr{A}^{k-1}\alpha + \dots + c_0\alpha = 0,$$

则  $m_\alpha(\lambda) = \lambda^k + c_{k-1}\lambda^{k-1} + \dots + c_1\lambda + c_0 \in F[\lambda]$  是  $\alpha$  的最小零化子.

(2)  $W = F[\mathscr{A}]\alpha$  的维数为  $k = \deg m_\alpha(\lambda)$ , 且  $\alpha, \mathscr{A}\alpha, \dots, \mathscr{A}^{k-1}\alpha$  是  $W$  的基.

(3)  $\mathscr{A}_W = \mathscr{A}|_W$  在上述基下的方阵表示为  $m_\alpha(\lambda)$  的友阵

$$A_W = \begin{bmatrix} 0 & & & -c_0 \\ 1 & \ddots & & \vdots \\ & \ddots & 0 & -c_{k-2} \\ & & 1 & -c_{k-1} \end{bmatrix},$$

特别知道  $\mathscr{A}_W$  的最小多项式  $m_W$ , 特征多项式  $f_W$ , 及  $\alpha$  的最小零化子  $m_\alpha$  三者相等:

$$m_W = f_W = m_\alpha.$$

**定义 7.6** 设  $W$  是  $\mathscr{A}$  的不变子空间, 向量  $\alpha$  到  $W$  的导子  $C_{\alpha/W}$  是指使  $g(\mathscr{A})\alpha \in W$  的最低次首一多项式  $g(\lambda)$ .

**定理 7.8 (循环分解定理)** 设  $V$  是域  $F$  上  $n$  维线性空间,  $\mathscr{A}$  是  $V$  的线性变换, 则

(1)  $V = F[\mathscr{A}]\alpha_1 \oplus \dots \oplus F[\mathscr{A}]\alpha_r$ ,

其中  $V_i = F[\mathscr{A}]\alpha_i$  是  $\alpha_i \in V$  生成的非 0 循环子空间, 特别  $\mathscr{A}_i = \mathscr{A}|_{V_i}$  的最小多项式  $m_i = m_i(\lambda)$ , 特征多项式  $f_i = f_i(\lambda)$ , 及  $\alpha_i$  的最小零化子  $m_{\alpha_i} = m_{\alpha_i}(\lambda)$  三者相等:

$$m_i = f_i = m_{\alpha_i} \quad (1 \leq i \leq r).$$

(2)  $m_i | m_{i-1}$  ( $i = 2, 3, \dots, r$ ), 且  $m_1, \dots, m_r$  由  $\mathscr{A}$  唯一决定 (称为  $\mathscr{A}$  的不变因子).  $\mathscr{A}$  的最小多项式为  $m$ , 特征多项式为  $f(\lambda) = m_1 \cdots m_r$ .

**系 1** 设  $\mathscr{A}$  是域  $F$  上  $n$  维线性空间  $V$  的线性变换, 则

(1) 存在向量  $\alpha \in V$  使得  $m_\alpha = m$ , 即  $\alpha$  的最小零化子  $m_\alpha(\lambda)$  等于  $\mathscr{A}$  的最小多项式  $m_\mathscr{A}(\lambda)$ .

(2)  $V$  是循环空间 ( $V = F[\mathcal{A}]a$ ) 当且仅当  $\mathcal{A}$  的最小多项式  $m$  等于其特征多项式  $f$ .

(3)  $m \mid f$  且  $m$  与  $f$  有相同的不可约因子, 即若  $\mathcal{A}$  的特征多项式分解为

$$f = p_1^{d_1} \cdots p_s^{d_s}.$$

其中  $p_1, \dots, p_s$  是  $F$  上不可约多项式, 互异, 则  $\mathcal{A}$  的最小多项式为

$$m = p_1^{r_1} \cdots p_s^{r_s},$$

$d_i \geq r_i$  为正整数, 且  $\deg p_i^{d_i} = \dim \ker p_i^{d_i} (1 \leq i \leq s)$ .

**定理 7.9** (方阵的有理标准形) 对域  $F$  上任一方阵  $A$ , 存在着  $F$  上可逆方阵  $P$  使得

$$B = P^{-1}AP = \text{diag}(C(m_1), \dots, C(m_r)).$$

其中  $C(m_i)$  是  $m_i \in F[\lambda]$  的友阵, 且  $m_i \mid m_{i-1} (i=2, \dots, r)$ .  $m_1, \dots, m_r$  由  $A$  唯一决定 (称为  $A$  的不变因子). 特别知  $A$  的最小多项式为  $m_1$ , 特征多项式为  $f(\lambda) = m_1 \cdots m_r$  (方阵  $B$  称为  $A$  的有理标准形).

**系 1** 设  $A$  是域  $F$  上的  $n$  阶幂零方阵 (即对某正整数  $k$  有  $A^k = 0$ ), 则存在  $F$  上可逆方阵  $P$  使得

$$P^{-1}AP = \begin{bmatrix} A_1 & & \\ & \ddots & \\ & & A_r \end{bmatrix}, \text{ 其中 } A_i = \begin{bmatrix} 0 & & & \\ 1 & \ddots & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & 1 & 0 \end{bmatrix}_{k_i \times k_i},$$

且  $k_1 \geq k_2 \geq \dots \geq k_r$ .

**定理 7.10** (复数域  $\mathbb{C}$  上的若当标准分解) 设  $V$  是域  $F$  上  $n$  维线性空间,  $\mathcal{A}$  是  $V$  的线性变换. 若  $\mathcal{A}$  在  $F$  中有几个特征根 (重根计  $\lambda$ ) (例如  $F = \mathbb{C}$  时总如此), 则  $V$  分解为循环子空间的直和

$$V = W_1 \oplus W_2 \oplus \dots \oplus W_t.$$

其中任一  $W_i$  (记为  $W$ ) 有如下性质:  $\mathcal{A}_W = \mathcal{A}|_W$  的最小多项式与特征多项式相等, 为  $(\lambda - c)^k$ , 且存在  $\alpha$  满足  $\alpha = \alpha_1, (\lambda - c)\alpha_1 = \alpha_2, \dots, (\lambda - c)^{k-1}\alpha_1 = \alpha_k, (\lambda - c)^k\alpha_1 = 0$ , 亦即

$$\mathcal{A}\alpha_1 = c\alpha_1 + \alpha_2, \mathcal{A}\alpha_2 = c\alpha_2 + \alpha_3, \dots, \mathcal{A}\alpha_{k-1} = c\alpha_{k-1} + \alpha_k, \mathcal{A}\alpha_k = c\alpha_k.$$

在基  $\alpha_1, \dots, \alpha_k$  下  $\mathcal{A}_W$  的方阵表示为  $J_k(c)$  (自然  $c, k, \alpha$  均随  $i$  不同而可能不同). 其中

$$J_k(c) = \begin{bmatrix} c & & & \\ 1 & \ddots & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & 1 & c \end{bmatrix}.$$

这种方阵称为若当块. 如上的序列  $\alpha_1, \dots, \alpha_k$  称为一个“若当链”.

**系 1** (复方阵若当标准形) 设域  $F$  上  $n$  阶方阵  $A$  在  $F$  上有  $n$  个特征根 (重根计  $\lambda$ ) (例如  $F = \mathbb{C}$  时), 则存在  $F$  上可逆方阵  $P$  使

$$P^{-1}AP = \begin{bmatrix} J_1 & & \\ & \ddots & \\ & & J_t \end{bmatrix},$$

其中  $J_i$  为若当块, 且  $J_i$  由  $A$  唯一决定 (不计次序) ( $i=1, \dots, t$ ).

**定理 7.11** (一般域上 (广义) 若当标准形定理) 设  $V$  是域  $F$  上  $n$  维线性空间,  $\mathcal{A}$  是  $V$



的线性变换,则  $V$  分解为循环子空间的直和:

$$V = W_1 \oplus \cdots \oplus W_t,$$

记  $W$  为任一  $W_i (i=1, \dots, t)$ , 则  $\mathcal{A}_W = \mathcal{A}|_W$  的极小多项式和特征多项式均形如  $p(\lambda)^k$ ,  $p(\lambda)$  为  $F$  上  $e$  次不可约多项式. 且存在  $\alpha \in W$  满足

$$\begin{aligned} \alpha &= \alpha_1, \mathcal{A}\alpha = \alpha_2, \mathcal{A}^2\alpha = \alpha_3, \dots, \mathcal{A}^{e-1}\alpha = \alpha_e; \\ p(\mathcal{A})\alpha &= \alpha_{e+1}, \mathcal{A}p(\mathcal{A})\alpha = \alpha_{e+2}, \mathcal{A}^2p(\mathcal{A})\alpha = \alpha_{e+3}, \dots, \mathcal{A}^{e-1}p(\mathcal{A})\alpha = \alpha_{2e}; \\ &\dots\dots \\ p(\mathcal{A})^{k-1}\alpha &= \alpha_{(k-1)e+1}, \mathcal{A}p(\mathcal{A})^{k-1}\alpha = \alpha_{(k-1)e+2}, \dots, \mathcal{A}^{e-1}p(\mathcal{A})^{k-1}\alpha = \alpha_{ke}. \\ \mathcal{A}\alpha_e &= \mathcal{A}^e\alpha = c_0\alpha_1 + c_1\alpha_2 + \cdots + c_{e-1}\alpha_e + \alpha_{e+1}; \\ \mathcal{A}\alpha_{2e} &= \mathcal{A}^e p(\mathcal{A})\alpha = c_0\alpha_{e+1} + c_1\alpha_{e+2} + \cdots + c_{e-1}\alpha_{2e} + \alpha_{2e+1}; \\ &\dots\dots \\ \mathcal{A}\alpha_{ke} &= \mathcal{A}^e p(\mathcal{A})^{k-1}\alpha = c_0\alpha_{(k-1)e+1} + \cdots + c_{e-1}\alpha_{ke}. \end{aligned}$$

使在基  $\alpha_1, \dots, \alpha_{ke}$  下,  $\mathcal{A}|_W$  的方阵表示形如

$$J(p(\lambda)^k) = \begin{bmatrix} C(p) & & \\ E & \ddots & \\ & \ddots & \ddots \\ & & E & C(p) \end{bmatrix}, \text{ 其中 } E = \begin{bmatrix} & & & 1 \\ & & 0 & \\ & \ddots & & \\ 0 & & & \end{bmatrix},$$

$C(p)$  是  $p(\lambda)$  的友阵.

系 1(方阵广义若当标准形定理) 对域  $F$  上任一方阵  $A$ , 存在  $F$  上方阵  $P$ , 使

$$P^{-1}AP = \begin{bmatrix} J_1 & & \\ & \ddots & \\ & & J_t \end{bmatrix},$$

其中  $J_i$  为形如定理中的广义若当块. 且  $J_i$  由  $A$  唯一决定(不计次序) ( $1 \leq i \leq t$ ).

系 2(实数域  $\mathbf{R}$  上若当标准形定理) 对实数域  $\mathbf{R}$  上任意方阵  $A$ , 存在着实可逆方阵  $P$  使

$$P^{-1}AP = \begin{bmatrix} J_1 & & \\ & \ddots & \\ & & J_t \end{bmatrix},$$

其中  $J_i$  为形如定理 7.10 中的若当块, 或为如下形式:

$$\begin{bmatrix} 0 & c_0 & & & \\ 1 & c_1 & & & \\ & 1 & 0 & c_0 & \\ & & 1 & c_1 & \\ & & & 1 & \ddots \\ & & & & 0 & c_0 \\ & & & & & 1 & c_1 \end{bmatrix}.$$

这里  $c_1^2 + 4c_0 < 0, c_1, c_0 \in \mathbf{R}$ .

**定义 7.7** 元素属于多项式形式环  $F[\lambda]$  的矩阵称为  $\lambda$ -矩阵.

**引理 7.2** 方阵  $A(\lambda)$  可逆(即存在  $\lambda$ -矩阵  $B(\lambda)$  使  $A(\lambda)B(\lambda) = B(\lambda)A(\lambda) = I$ , 此时  $B(\lambda)$  称为  $A(\lambda)$  的逆, 记为  $B(\lambda) = A(\lambda)^{-1}$ ) 的充分必要条件为  $\det A(\lambda) \in F^*$  为非 0 常数.

**定义 7.8**  $\lambda$ -矩阵  $A(\lambda)$  与  $B(\lambda)$  相抵(或等价)是指存在可逆  $\lambda$ -方阵  $P(\lambda)$  和  $Q(\lambda)$  使得

$$B(\lambda) = P(\lambda)A(\lambda)Q(\lambda).$$

**定理 7.12**  $F$  上方阵  $A$  与  $B$  在  $F$  上相似当且仅当  $\lambda I - A$  与  $\lambda I - B$  在  $F[\lambda]$  上相抵.

**定义 7.9** 初等  $\lambda$ -方阵是由单位方阵经以下行变换得到的方阵:

- (1) 交换单位方阵  $I$  的两行;
- (2) 把单位方阵  $I$  的某行乘以一非 0 常数  $c \in F^*$ ;
- (3) 把  $I$  的一行乘以多项式  $g(\lambda)$  加到另一行上去.

易知初等  $\lambda$ -方阵左乘于  $A(\lambda)$  相当对  $A(\lambda)$  做初等行变换.

**定理 7.13** ( $\lambda$ -矩阵相抵标准形) 设  $A(\lambda)$  为  $\lambda$ -矩阵, 则存在可逆  $\lambda$ -方阵  $P(\lambda)$  和  $Q(\lambda)$  使得

$$B(\lambda) = P(\lambda)A(\lambda)Q(\lambda) = \begin{bmatrix} d_1(\lambda) & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & d_r(\lambda) & & \\ & & & 0 & \\ & & & & \ddots \\ & & & & & 0 \end{bmatrix},$$

其中  $d_i(\lambda) | d_{i+1}(\lambda)$ ,  $d_i(\lambda)$  为首一多项式 ( $i=1, \dots, r$ ). ( $d_1(\lambda), \dots, d_r(\lambda)$  称为  $A(\lambda)$  的不变因子组.  $B(\lambda)$  也称为  $A(\lambda)$  的 **Smith 标准形**.)

**系 1** 设  $A(\lambda)$  为  $\lambda$ -矩阵, 则存在初等  $\lambda$ -方阵  $P_1(\lambda), \dots, P_s(\lambda), Q_1(\lambda), \dots, Q_t(\lambda)$  使

$$P_s(\lambda) \cdots P_1(\lambda)A(\lambda)Q_1(\lambda) \cdots Q_t(\lambda) = \begin{bmatrix} d_1(\lambda) & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & d_r(\lambda) & & \\ & & & 0 & \\ & & & & \ddots \\ & & & & & 0 \end{bmatrix},$$

其中  $d_i(\lambda) | d_{i+1}(\lambda)$  ( $i=1, \dots, r-1$ ),  $d_1(\lambda), \dots, d_r(\lambda)$  为首一多项式.

**系 2**  $\lambda$ -方阵  $A(\lambda)$  可逆当且仅当  $A(\lambda)$  为初等  $\lambda$ -方阵之积.

**定义 7.10**  $\lambda$ -矩阵  $A(\lambda)$  的所有  $k$  阶非 0 子行列式的首一最大公因子  $D_k$  称为  $A(\lambda)$  的  $k$  阶行列式因子.  $D_1, \dots, D_r$  称为其行列式因子组.

**引理 7.3** 初等变换不改变  $\lambda$ -矩阵的各阶行列式因子.

**定理 7.14**  $\lambda$ -矩阵  $A(\lambda)$  与  $B(\lambda)$  相抵当且仅当二者的行列式因子组相同, 或者不变因子组相同.

**定义 7.11** 设域  $F$  上  $\lambda$ -矩阵  $A(\lambda)$  的不等于 1 的不变因子为  $d_1(\lambda), \dots, d_r(\lambda)$ , ( $d_i(\lambda) | d_{i+1}(\lambda)$ ,  $i=1, \dots, r-1$ ). 并设在  $F$  上因子分解为

$$d_1(\lambda) = p_1(\lambda)^{k_{11}} p_2(\lambda)^{k_{12}} \cdots p_{s_1}(\lambda)^{k_{1s_1}},$$

.....

$$d_r(\lambda) = p_1(\lambda)^{k_{r1}} p_2(\lambda)^{k_{r2}} \cdots p_{s_r}(\lambda)^{k_{rs_r}}$$

其中  $p_j(\lambda)$  为  $F$  上互异首一不可约多项式,  $k_{ij}$  为正整数且  $k_{ij} \leq k_{(i+1)j}$  ( $i=1, \dots, r$ ;  $j=1, \dots, s_i$ ). 则全体不可约因子幂

$$p_j(\lambda)^{k_{ij}} (i=1, \dots, r; j=1, \dots, s_i),$$

称为  $A(\lambda)$  的在  $F$  上的初等因子组(注意相同者均重复计入; 1 不计入).

**引理 7.4** 若已知  $A(\lambda)$  的秩  $r$ , 则  $A(\lambda)$  的不变因子组与其初等因子组互相决定.

**引理 7.5** 设  $A(\lambda) = \begin{bmatrix} A_1(\lambda) & \\ & A_2(\lambda) \end{bmatrix}$ , 其中  $A_1(\lambda)$  和  $A_2(\lambda)$  为任意  $\lambda$ -矩阵, 则  $A(\lambda)$

的初等因子组为  $A_1(\lambda)$  和  $A_2(\lambda)$  的初等因子组的合并(重因子计入).

**系 1**  $F$  上  $n$  阶方阵  $A$  与  $B$  相似

$\Leftrightarrow \lambda I - A$  与  $\lambda I - B$  相抵;

$\Leftrightarrow \lambda I - A$  与  $\lambda I - B$  的不变因子组相同;

$\Leftrightarrow \lambda I - A$  与  $\lambda I - B$  的行列式因子组相同;

$\Leftrightarrow \lambda I - A$  与  $\lambda I - B$  的初等因子组相同.

**定义 7.12**  $\lambda I - A$  的不变因子、行列式因子、初等因子分别称为  $A$  的不变因子、行列式因子、初等因子(因子 1 常不计入).

**定理 7.15** 设域  $F$  上方阵  $A$  的不变因子为  $d_1(\lambda), \dots, d_r(\lambda)$ , 在  $F$  上的初等因子为  $p_1(\lambda)^{k_1}, \dots, p_s(\lambda)^{k_s}$  (重者也计入), 则  $A$  在  $F$  上相似于以下三种方阵  $C, G, J$  (分别称为第一, 二, 三种相似标准形):

$$C = \begin{bmatrix} C(d_1) & & \\ & \ddots & \\ & & C(d_r) \end{bmatrix} \quad (\text{有理标准形});$$

$$G = \begin{bmatrix} C(p_1^{k_1}) & & \\ & \ddots & \\ & & C(p_s^{k_s}) \end{bmatrix} \quad (\text{初等因子友阵形});$$

$$J = \begin{bmatrix} J(p_1^{k_1}) & & \\ & \ddots & \\ & & J(p_s^{k_s}) \end{bmatrix} \quad (F \text{ 上若当标准形});$$

其中  $C(g)$  表示  $g(\lambda)$  的友阵, 而  $J(p^k)$  形如定理 7.11 中为  $k \deg p$  阶方阵(称为广义若当块), 特别, 当  $F = \mathbb{C}$  为复数域时,  $p_i(\lambda) = \lambda - c_i$  为一次,  $J(p^k)$  为若当块,  $J$  为若当标准形.

**系 1** 若域  $F$  上  $n$  阶方阵在  $F$  中有  $n$  个特征根(重根计  $\lambda$ ) (特别  $F = \mathbb{C}$  时总有这种情形), 则  $A$  在  $F$  上相似于若当标准形

$$J = \begin{bmatrix} J_{k_1}(\lambda_1) & & \\ & \ddots & \\ & & J_{k_s}(\lambda_s) \end{bmatrix}, \quad J_{k_i}(\lambda_i) = \begin{bmatrix} \lambda_i & & \\ 1 & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & 1 & \lambda_i \end{bmatrix}_{k_i \times k_i}.$$

系 2 方阵  $A$  与其转置  $A^T$  相似.

系 3 若域  $F$  上方阵  $A$  和  $B$  在扩域  $E(\supset F)$  上相似, 则必在  $F$  上相似. 特别两实方阵  $A$  和  $B$  若在复数域  $C$  上相似, 则必在实数域  $R$  上相似.

系 4 设  $V$  是域  $F$  上  $n$  维线性空间,  $\mathcal{A}$  是其线性变换, 则存在  $V$  的基  $\alpha_1, \dots, \alpha_n$  使  $\mathcal{A}$  的方阵表示为  $C$ ; 存在  $V$  的基  $\beta_1, \dots, \beta_n$  使  $\mathcal{A}$  的方阵表示为  $G$ ; 存在  $V$  的基  $\gamma_1, \dots, \gamma_n$  使  $\mathcal{A}$  的方阵表示为  $J(C, G, J)$  (如定理 15).

系 5 设  $A$  为方阵,  $\lambda I - A$  的不变因子组为  $1, \dots, 1, d_1(\lambda), \dots, d_r(\lambda) (d_i(\lambda) | d_{i+1}(\lambda), i=1, \dots, r-1)$ . 若  $m_1(\lambda), \dots, m_r(\lambda)$  为  $A$  的(循环分解)有理标准形决定的“不变因子”, 则  $d_r(\lambda) = m_1(\lambda), d_{r-1}(\lambda) = m_2(\lambda), \dots, d_1(\lambda) = m_r(\lambda)$ . 特别  $d_r(\lambda)$  为  $A$  的极小多项式.

系 6 设  $A$  为  $n$  阶复方阵, 则  $A$  在复数域上相似于对角阵(或称可对角化)

$\Leftrightarrow A$  有  $n$  个线性无关的(复)特征向量;

$\Leftrightarrow A$  在复数域上初等因子均为一次;

$\Leftrightarrow A$  的不变因子均无重根;

$\Leftrightarrow A$  的极小多项式无重根;

$\Leftrightarrow cI - A$  与  $(cI - A)^2$  的秩相同(对任意  $c \in C$ );

$\Leftrightarrow A$  的特征多项式无重根(即  $A$  有  $n$  个不同的特征值).

定义 7.13  $F$  上方阵  $A$  称为半单的, 如果其极小多项式为  $F$  上互异不可约多项式的积. 方阵表示能为半单方阵的线性变换称为半单变换.

引理 7.6 设方阵  $A$  的最小多项式为  $m(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{k_1} \cdots (\lambda - \lambda_r)^{k_r}$ , 任给一组复数  $\{b_{ij} | 1 \leq i \leq r, 0 \leq j \leq k_i - 1\}$ , 必存在多项式  $f(\lambda)$  使得

$$b_{ij} = \frac{1}{j!} f^{(j)}(\lambda_i) \quad (1 \leq i \leq r, 0 \leq j \leq k_i - 1),$$

且若作限制  $\deg f(\lambda) < \deg m(\lambda)$ , 则此多项式  $f(\lambda)$  是唯一的(称为 **Lagrange-Sylvester** 插值多项式).

定理 7.16 设复方阵  $A = PJP^{-1} = P \operatorname{diag}(J_1, \dots, J_s) P^{-1}$ , 其中  $J_i = \lambda I + N_i$  为  $k_i$  阶若当块. 则  $A$  的多项式全体恰为所有方阵  $B = P \operatorname{diag}(B_1, \dots, B_s) P^{-1}$ , 其中

$$B_i = \sum_{j=0}^{k_i} b_{ij} N_i^j = \begin{bmatrix} b_{i0} & & & & \\ b_{i1} & \ddots & & & \\ b_{i2} & \ddots & \ddots & & \\ \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \\ \ddots & \ddots & b_{i2} & b_{i1} & b_{i0} \end{bmatrix} \quad (b_{ij} \in C),$$

且当  $\lambda_i = \lambda_k$  时有  $b_{ij} = b_{kj}$  (对所有可能  $i, k, j$ ). 事实上, 若  $B = f(A)$ , 则  $b_{ij} = \frac{1}{j!} f^{(j)}(\lambda_i)$ .

定义 7.14 设复方阵  $A$  的最小多项式为  $m(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{k_1} \cdots (\lambda - \lambda_r)^{k_r}$ . 若复变量的数值函数  $f(\lambda)$  使得数组(称为  $f(\lambda)$  在  $A$  的谱值组)

$$\{f^{(j)}(\lambda_i) | 1 \leq i \leq r, 0 \leq j \leq k_i - 1\}$$

存在, 则称  $f(A)$  有意义(或  $f(\lambda)$  在  $A$  有定义). 此时有唯一的次数小于  $\deg m(\lambda)$  的多项式  $g(\lambda)$  使得

$$f^{(j)}(\lambda_i) = g^{(j)}(\lambda_i) \quad (1 \leq i \leq r, 0 \leq j \leq k_i - 1),$$

于是定义  $f(\lambda)$  在  $A$  的取值为  $f(A) = g(A)$ .  $g(\lambda)$  称为  $f(\lambda)$  对  $A$  的代表多项式.

**定理 7.17** 设复方阵  $A$  的若当标准形为  $J$ , 即  $A = PJP^{-1} = P \operatorname{diag}(J_1, \dots, J_s)P^{-1}$ , 其中

$$J_i = \lambda_i I + N_i = \begin{bmatrix} \lambda_i & & & \\ & \ddots & & \\ & & \ddots & \\ & & & \ddots & \\ & & & & \lambda_i \end{bmatrix},$$

那么与  $A$  可交换的方阵恰为所有可能方阵  $B = PB_1P^{-1} = P(B_{ij})P^{-1}$ . 其中  $B_i = (B_{ij})$  是与  $J$  相应分块的方阵且

$$B_{ij} = \begin{cases} 0, & \text{当 } \lambda_i \neq \lambda_j \\ \text{下三角分层矩阵,} & \text{当 } \lambda_i = \lambda_j. \end{cases}$$

下三角分层矩阵是指形如下的矩阵

$$\begin{bmatrix} b_1 & 0 & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & 0 \\ b_2 & \ddots & \ddots & & & & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & & & \vdots \\ b_p & \cdots & b_2 & b_1 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix} \quad \text{或} \quad \begin{bmatrix} 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ \vdots & & & \vdots \\ 0 & & & \vdots \\ b_1 & & & \vdots \\ b_2 & \ddots & & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ b_p & \cdots & b_2 & b_1 \end{bmatrix}.$$

**系 1** 方阵  $A$  相似于某多项式的友阵的充分必要条件是: 与  $A$  可交换的方阵都是  $A$  的多项式. 又设  $\mathcal{A}$  为线性空间  $V$  的线性变换, 则  $V$  是  $\mathcal{A}$  的循环空间的充要条件是: 与  $\mathcal{A}$  乘法可交换的  $V$  的线性变换都是  $\mathcal{A}$  的多项式.

**定理 7.18** 以  $\mathcal{C}(A)$  记与方阵  $A$  可交换的方阵全体. 则  $\mathcal{C}(\mathcal{C}(A))$  为  $A$  的多项式集. 也就是说, 若  $M$  与所有和  $A$  可交换的方阵  $B$  均(乘法)可交换, 则  $M$  只能是  $A$  的多项式.

**系 1** 若方阵  $A$  可逆, 则  $A^{-1}$  是  $A$  的多项式.

**引理 7.7** 设  $V$  是域  $F$  上  $n$  维线性空间,  $\mathcal{A}$  是其线性变换, 在基  $\epsilon_1, \dots, \epsilon_n$  下的方阵表示为  $A = (a_{ij})$  记  $v_j = \lambda t_j - \sum_{i=1}^n a_{ij} t_i, (1 \leq j \leq n)$ , 即

$$(v_1, \dots, v_n) = (t_1, \dots, t_n)(\lambda I - A),$$

则  $v_1, \dots, v_n$  是  $K = \ker \varphi$  在  $F[\lambda]$  上生成元.

(这里  $t_1, \dots, t_n$  是不定元,  $V_t = F[\lambda]t_1 \oplus F[\lambda]t_2 \oplus \cdots \oplus F[\lambda]t_n = \{a_1(\lambda)t_1 + \cdots + a_n(\lambda)t_n \mid a_1(\lambda), \dots, a_n(\lambda) \in F[\lambda]\}$ , 多项式  $g(\lambda) \in F[\lambda]$  对  $v = a_1(\lambda)t_1 + \cdots + a_n(\lambda)t_n \in V_t$  的作用为:  $g(\lambda)v = g(\lambda) \sum_i a_i(\lambda)t_i = \sum_i (g(\lambda)a_i(\lambda))t_i$ . 映射

$$\varphi: V_t \longrightarrow V,$$

$$\sum_i a_i(\lambda)t_i \longmapsto \sum_i a_i(\lambda)\epsilon_i.)$$

**定理 7.19** 设  $V$  为域  $F$  上  $n$  维线性空间,  $\mathcal{A}$  是其线性变换, 则

$$V = F[\mathcal{A}]_{\alpha_1} \oplus \cdots \oplus F[\mathcal{A}]_{\alpha_r} \cong F[\mathcal{A}]/(m_1) \oplus \cdots \oplus F[\mathcal{A}]/(m_r),$$

其中  $\alpha_i \in V$  的最小化零多项式为  $m_i$  (即化零理想为  $(m_i)$ ),  $m_i | m_{i+1}, i=1, \dots, r-1$ .

**定义 7.15** 设  $R$  为含 1 交换环,  $V$  是 Abel 群, 且  $R$  的元素与  $V$  的元素有数乘定义 (即有映射  $R \times V \longrightarrow V, (r, v) \longmapsto rv$ ) 满足:  $r(v_1 + v_2) = r(v_1) + r(v_2), (r_1 + r_2)v = r_1v + r_2v, (r_1r_2)v = r_1(r_2v), 1v = v$ . 则称  $V$  为  $R$ -模.

## 7.2 解题方法介绍

### 7.2.1 求特定余式的多项式的方法

由孙子定理得到: 已知  $m_1(\lambda), m_2(\lambda)$ , 求最低次数的多项式  $h(\lambda)$ , 使  $h(\lambda)$  除以  $m_1(\lambda)$  余  $r_1(\lambda)$ , 除以  $m_2(\lambda)$  余  $r_2(\lambda)$  的方法. 其步骤为: (1) 用辗转相除法求  $u(\lambda), v(\lambda)$  使  $u(\lambda)m_2(\lambda) + v(\lambda)m_1(\lambda) = 1$ ; (2)  $r_1u(\lambda)m_2(\lambda) + r_2v(\lambda)m_1(\lambda)$  除以  $m(\lambda) = m_1(\lambda)m_2(\lambda)$  得到的余式即为  $h(\lambda)$ .

例如, 1.4 节中 1. 题,  $m_1 = (X-1)^2, m_2 = (X-2)^3, r_1 = 2X, r_2 = 3X$ ;

$$um_2 + vm_1 = -(3X-2)(X-2)^3 + (3X^2-14X+17)(X-1)^2 = 1,$$

$$\begin{aligned} f(X) &\equiv -2Xu m_2 + 3Xvm_1 \pmod{m_1m_2} \\ &= -2(X-2)^3(4X-3) + (12X^2-91X+72)(X-1)^2 \\ &= 4X^4 - 27X^3 + 66X^2 - 65X + 24. \end{aligned}$$

### 7.2.2 求方阵 $A$ 的最小多项式的方法

1. 用特征多项式是零化多项式, 重因子部分降幂看是否为化零多项式, 找幂次最低者. 即若特征多项式  $P_A(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{n_1} (\lambda - \lambda_2)^{n_2} \cdots (\lambda - \lambda_s)^{n_s}$ ,  $\lambda_1, \dots, \lambda_s$  互异, 则  $m_A(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{d_1} \cdots (\lambda - \lambda_s)^{d_s}$ , 其中  $1 \leq d_i \leq n_i, (i=1, \dots, s)$ ,  $d_i$  是 Jordan 标准形中相对特征值  $\lambda_i$  的最大 Jordan 块的阶数. 所以, (1) 当方阵阶数较低, 或  $n_i$  较小时直接验算即可得次数最低的零化多项式; (2) 可通过计算相对于各特征值的最大 Jordan 块的阶数来定出  $d_i$ . 这只需要求  $P_A(\lambda)$ , 及计算  $(\lambda_i I - A)^k$  的秩.

2. 用“若  $I, A, A^2, \dots, A^{m-1}$  线性无关, 而  $A^m = \sum_{k=0}^{m-1} c_k A^k$ , 则  $m(\lambda) = \lambda^m - \sum_{k=0}^{m-1} c_k \lambda^k$  为  $A$  的最小多项式”.

3. 用对  $(\lambda I - A)$  做初等变换化为

$$\begin{bmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 1 & & \\ & & & d_1(\lambda) & \\ & & & & \ddots \\ & & & & & d_r(\lambda) \end{bmatrix},$$

且  $d_i(\lambda) | d_{i+1}(\lambda), i=1, \dots, r-1$ , 则  $m(\lambda) = d_r(\lambda)$  是最小多项式.

4. 若方阵为友阵型, 则  $P_A(\lambda) = m(\lambda)$  (即特征多项式就是极小多项式). 设

$$A = \begin{bmatrix} 0 & & & -c_1 \\ 1 & \ddots & & \vdots \\ & \ddots & 0 & -c_{k-2} \\ & & 1 & -c_{k-1} \end{bmatrix},$$

则  $m(\lambda) = P_A(\lambda) = \lambda^k + c_{k-1}\lambda^{k-1} + \cdots + c_1\lambda + c_0$ .

### 7.2.3 求含向量 $\alpha$ 的( $\mathcal{A}$ 的)最小不变子空间 $W$ 的方法

若  $\alpha, \mathcal{A}\alpha, \cdots, \mathcal{A}^{k-1}\alpha$  线性无关, 而  $\mathcal{A}^k\alpha$  可由  $\alpha, \mathcal{A}\alpha, \cdots, \mathcal{A}^{k-1}\alpha$  线性表出, 则

$$W = L(\alpha, \mathcal{A}\alpha, \cdots, \mathcal{A}^{k-1}\alpha).$$

又若  $\mathcal{A}$  在  $V$  中某基  $\epsilon_1, \cdots, \epsilon_n$  下的方阵表示为  $A$ ,  $\alpha$  在此基下的坐标记为  $x$ , 则

$$(\alpha, \mathcal{A}\alpha, \cdots, \mathcal{A}^{k-1}\alpha) = (\epsilon_1, \cdots, \epsilon_n)(x, Ax, \cdots, A^{k-1}x).$$

故知  $W = L((\epsilon_1, \cdots, \epsilon_n)(x, Ax, \cdots, A^{k-1}x)).$

例子见补充题 1.

### 7.2.4 求 Jordan 标准形和可逆阵 $P$ 的方法(一)

1. 求  $A$  的特征多项式

$$f(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{n_1} \cdots (\lambda - \lambda_s)^{n_s}, \quad \sum n_i = n, \lambda_i \neq \lambda_j,$$

故

$$A \sim \text{diag}\{J_{n_1}(\lambda_1), \cdots, J_{n_s}(\lambda_s)\} = J.$$

$A$  有  $s$  个不同的特征值, 所以  $J$  的准对角线上是  $s$  块, 而每块的阶数 = 特征值的代数重数.

2. (1) 求  $J_{n_i}(\lambda_i)$  中 Jordan 块的个数  $t_i$

$$\begin{aligned} t_i &= \text{属于特征值 } \lambda_i \text{ 的线性无关的特征向量的个数} \\ &= \dim V_{\lambda_i} = n - r(A - \lambda_i I). \end{aligned}$$

(2) 计算每个 Jordan 块的阶数, 记  $d_k$  为  $k$  阶 Jordan 块的个数, 则

$$d_k = \left[ r(A - \lambda_i I)^{k-1} - r(A - \lambda_i I)^k \right] - \left[ r(A - \lambda_i I)^k - r(A - \lambda_i I)^{k+1} \right].$$

$\geq k$  阶块的个数  $> k$  阶块的个数

这个公式不要死记硬背, 要理解它: 对于  $k$  阶 Jordan 块

$$N_k = \begin{bmatrix} \lambda_i & & & \\ 1 & \ddots & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & 1 & \lambda_i \end{bmatrix},$$

$(N_k - \lambda_i I)^l$  的秩随  $l$  每增加 1 而减少 1,  $(N_k - \lambda_i I)^k = 0$ , 且当  $l > k$  时其秩不变. 即每个  $k$  阶块对

$$r(J - \lambda_i I)^{k-1} - r(J - \lambda_i I)^k$$

的贡献是 1, 而对  $r(J - \lambda_i I)^k - r(J - \lambda_i I)^{k+1}$  没贡献. 另外, 对于阶数比较低的方阵, 它的 Jordan 标准形只有仅由  $r(J - \lambda_i I)$  ( $= r(A - \lambda_i I)$ ) 就可确定的几种形式 (再由  $r(J - \lambda_i I)^2$  就可排除其他而得一种), 那么也不必非用此公式去算. 总之要多动脑筋才能巧.

3. 写出  $A$  的 Jordan 标准形.

4. 求可逆阵  $P$ . 设  $P=(x_1, x_2, \dots, x_n)$ , 及  $J$  的第一个 Jordan 块是  $k$  阶的, 则  $x_1, \dots, x_k$  满足

$$(A - \lambda_1 I)x_k = 0, (A - \lambda_1 I)x_{k-1} = x_k, \dots, (A - \lambda_1 I)x_1 = x_2,$$

故先求特征向量  $x_k$ , 再逐个求广义特征向量. 这里要注意: 当  $\dim V_{\lambda_1} \geq 2$  时要适当选取特征子空间的基向量以使接下来的非齐次线性方程组有解.

$x_1, x_2, \dots, x_k$  也可以这样选取: 因为它们均  $\in \ker(A - \lambda_1 I)^k$ , 所以可以先在根子空间中选取一个向量  $x_1$ , 由它循环生成此循环子空间:

$$x_1, (A - \lambda_1 I)x_1, \dots, (A - \lambda_1 I)^{k-1}x_1,$$

这里要注意, 不是每个  $\alpha \in \ker(A - \lambda_1 I)^k$  都有资格做  $x_1$  的, 也要选得巧才好 (实际上是  $\alpha \in \ker(A - \lambda_1 I)^k$ , 而  $\alpha \notin \ker(A - \lambda_1 I)^{k-1}$  才行). 例子见 63 题.

### 7.2.5 求 Jordan 标准形方法(二)用 $\lambda$ -矩阵方法

1. 先求初等因子组, 有以下三个路径:

(1) 求不变因子, 找可逆  $\lambda$ -矩阵  $P(\lambda), Q(\lambda)$ , 使

$$P(\lambda)(\lambda I - A)Q(\lambda) = \begin{bmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 1 & & \\ & & & d_1(\lambda) & \\ & & & & \ddots \\ & & & & & d_r(\lambda) \end{bmatrix},$$

其中  $d_i | d_{i+1}, i=1, \dots, r-1$ . 因式分解  $d_i(\lambda)$  得初等因子组.

(2) 找  $P(\lambda), Q(\lambda)$  使

$$P(\lambda)(\lambda I - A)Q(\lambda) = \begin{bmatrix} g_1(\lambda) & & & \\ & \ddots & & \\ & & \ddots & \\ & & & g_n(\lambda) \end{bmatrix},$$

分解  $g_i(\lambda)$  得初等因子组.

(3) 计算  $(\lambda I - A)$  的行列式因子  $D_1, \dots, D_n \rightarrow$  求出  $A$  的不等于 1 的不变因子  $d_1, \dots, d_r \rightarrow$  分解  $d_i$  得初等因子组.

2. 由初等因子组写出  $A$  的 Jordan 标准形. (若要求有理标准形, 初等因子友阵形也一样.)

3. 求  $P$  的方法有两种:

(1) 由  $(\beta_1, \dots, \beta_n) = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)P^{-1}(\lambda)$ , 找  $P$  使  $(\beta_1, \dots, \beta_n) = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)P$ , 这里  $A, J$  分别看成线性变换  $\mathcal{A}$  在  $V$  的基  $\alpha_1, \dots, \alpha_n$  和  $\beta_1, \dots, \beta_n$  下的方阵表示. 记  $P^{-1}(\lambda) = (g_{ij}(\lambda))$  则

$$\beta_j = g_{1j}(\mathcal{A})\alpha_1 + g_{2j}(\mathcal{A})\alpha_2 + \dots + g_{nj}(\mathcal{A})\alpha_n, j = 1, 2, \dots, n.$$

(2) 同(一)解根子空间找 Jordan 链.



### 7.3 习题与解答

\* 1. 求整数  $x$  使

$$(1) \begin{cases} x \equiv 3 \pmod{8} \\ x \equiv 7 \pmod{81} \end{cases}; \quad (2) \begin{cases} x \equiv 1 \pmod{4} \\ x \equiv 2 \pmod{5} \\ x \equiv 3 \pmod{9} \end{cases}$$

解 (1) 首先求  $u_1, u_2$  使  $u_1 \cdot 81 + u_2 \cdot 8 = 1$ , 因为  $81 - 80 = 1$ , 所以  $u_1 = 1, u_2 = -10$ . 于是得

$$x \equiv 3 \times u_1 \times 81 + 7 \times u_2 \times 80 = 243 - 560 = -317 \equiv 331 \pmod{81 \times 8}.$$

(2) 求  $u_1, u_2, u_3$  使得  $u_1 \times 45 + u_2 \times 36 + u_3 \times 20 = 1$ , 为此先求  $t_1, t_2$  使  $t_1 \times 45 + t_2 \times 36 = 9$ , 这只要取  $t_1 = 1, t_2 = -1$  即可. 再由  $S_1(45 - 36) + S_2 \times 20 = 1$  知  $S_1 = 9, S_2 = -4$ . 于是有

$$9 \times 45 - 9 \times 36 - 4 \times 20 = 1, (u_1 = 9, u_2 = -9, u_3 = -4)$$

$$\begin{aligned} \text{所以 } x &\equiv 1 \times 9 \times 45 + 2 \times (-9) \times 36 + 3 \times (-4) \times 20 \pmod{180} \\ &= -243 - 240 = -483 \equiv 57 \pmod{180}. \end{aligned}$$

\* 2. 分解  $\mathbf{Z}/180\mathbf{Z} = \mathbf{Z}\bar{e}_1 \oplus \mathbf{Z}\bar{e}_2 \oplus \mathbf{Z}\bar{e}_3$ , 其中  $\mathbf{Z}\bar{e}_1 \cong \mathbf{Z}/4\mathbf{Z}, \mathbf{Z}\bar{e}_2 \cong \mathbf{Z}/5\mathbf{Z}, \mathbf{Z}\bar{e}_3 \cong \mathbf{Z}/9\mathbf{Z}$ , 并把任一  $x \in \mathbf{Z}/180\mathbf{Z}$  表为  $x = x_1 + x_2 + x_3, x_i \in \mathbf{Z}\bar{e}_i$ , 具体求出  $e_i$  和  $x_i$ .

解 由 1 题(2)知  $e_1 = 9 \times 45, e_2 = -9 \times 36, e_3 = -4 \times 20$ , 故  $\bar{e}_1 = 45, \bar{e}_2 = 36, \bar{e}_3 = 100$ .

所以有  $\mathbf{Z}/180\mathbf{Z} = \mathbf{Z}\bar{45} \oplus \mathbf{Z}\bar{36} \oplus \mathbf{Z}\bar{100} \cong \mathbf{Z}/4\mathbf{Z} \oplus \mathbf{Z}/5\mathbf{Z} \oplus \mathbf{Z}/9\mathbf{Z}$  又  $\bar{e}_1 + \bar{e}_2 + \bar{e}_3 = \bar{45} + \bar{36} + \bar{100} = \bar{1}$ , 且  $\bar{e}_i^2 = \bar{e}_i, \bar{e}_i \cdot \bar{e}_j = 0, (i \neq j)$ . 任  $x \in \mathbf{Z}/180\mathbf{Z}$ , 有

$$x = b_1 \bar{45} + b_2 \bar{36} + b_3 \bar{100} = x_1 + x_2 + x_3$$

而  $b_i = \bar{x} \bar{e}_i$ , 所以  $x_i = b_i \bar{e}_i = \bar{x} \bar{e}_i^2 = \bar{x} \bar{e}_i = \overline{x e_i}$ ,

故  $x_1 = \overline{x 45}, x_2 = \overline{x 36}, x_3 = \overline{x 100}$ .

3. 求下列方阵的最小多项式:

$$\begin{bmatrix} 5 & -6 & -6 \\ -1 & 4 & 2 \\ 3 & -6 & -4 \end{bmatrix}; \begin{bmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 2 & 2 & -1 \\ 2 & 2 & 0 \end{bmatrix}; \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}; \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & 0 & 0 \\ -2 & -2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}.$$

解 (1) 用不变因子组来求. (记已知方阵为  $A$ )

$$\begin{aligned} (\lambda I - A) &= \begin{bmatrix} \lambda - 5 & 6 & 6 \\ 1 & \lambda - 4 & -2 \\ -3 & 6 & \lambda + 4 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\lambda^2 + 9\lambda - 14 & 2(\lambda - 2) \\ 0 & 3(\lambda - 2) & \lambda - 2 \end{bmatrix} \rightarrow \\ &\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & (\lambda - 1)(\lambda - 2) & 0 \\ 0 & 0 & \lambda - 2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda - 2 & 0 \\ 0 & 0 & (\lambda - 1)(\lambda - 2) \end{bmatrix}, \end{aligned}$$

因此得最小多项式为  $m(\lambda) = (\lambda - 1)(\lambda - 2)$ .

(2)  $P_A(\lambda) = \det(\lambda I - A) = (\lambda - 1)(\lambda - 2)^2$ . 而  $(\lambda - 1)(\lambda - 2)$  不是化零多项式, 所以  $m(\lambda) = (\lambda - 1)(\lambda - 2)^2$ .

(3) 因为  $I, A$  线性无关, 而  $A^2 = -I$ , 即  $A^2 + I = 0$ , 所以  $m(\lambda) = \lambda^2 + 1$ .

(4)  $P_A(\lambda) = \det(\lambda I - A) = \lambda^2(\lambda - 1)^2$ , 易得

$$A^2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -3 & -3 & 3 & 2 \\ 2 & 2 & -2 & -1 \end{bmatrix},$$

$$(A - I)^2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & -2 & 0 & 0 \\ -2 & -2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \end{bmatrix}^2 = \begin{bmatrix} -1 & -2 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

显见  $A^2(A - I) \neq 0, A(A - I)^2 \neq 0$  (即  $\lambda^2(\lambda - 1)$  与  $\lambda(\lambda - 1)^2$  均不是化零多项式, 此时当然  $A(A - I) \neq 0$ ) 所以最小多项式  $m(\lambda) = P_A(\lambda) = \lambda^2(\lambda - 1)^2$ .

4. 求方阵  $A$  的最小多项式和相似标准形.

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

解 由

$$A^2 = 2 \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}, A^3 = 2 \begin{bmatrix} 0 & 2 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 2 & 0 \end{bmatrix} = 4A,$$

所以  $m(\lambda) = \lambda^3 - 4\lambda = \lambda(\lambda + 2)(\lambda - 2)$ .

又因为  $r(A) = 2$ , 所以  $A$  相似于  $\text{diag}\{0, 0, 2, -2\}$ , 此为 Jordan 标准形.

也可以写为有理标准形 (不变因子友阵形), 因为这里  $d_3(\lambda) = m(\lambda) = \lambda(\lambda + 2)(\lambda - 2)$ ,  $d_2(\lambda) = \lambda$ ,  $d_1(\lambda) = 1$ , 所以  $A$  相似于

$$\begin{bmatrix} 0 & & & \\ \hline & 0 & 0 & 0 \\ & 1 & 0 & 4 \\ & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

5. 设  $\mathcal{A}$  为  $n$  维线性空间  $V$  的线性变换, 若有正整数  $k$  使  $\mathcal{A}^k = 0$  则  $\mathcal{A}^n = 0$ .

证 由  $\mathcal{A}x = \lambda x$  得  $\mathcal{A}^k x = \lambda^k x$ , 又因为  $\mathcal{A}^k = 0$ , 而  $x \neq 0$ , 所以  $\lambda^k = 0 \rightarrow \lambda = 0$ , 即  $\mathcal{A}$  的特征值均为 0, 于是知  $\mathcal{A}$  的特征多项式为  $P_{\mathcal{A}}(\lambda) = \lambda^n$ , 其是  $\mathcal{A}$  的化零多项式, 所以  $\mathcal{A}^n = 0$ . (或由  $\lambda = 0$ , 知存在  $V$  的基, 使  $\mathcal{A}$  的方阵表示为上三角阵且对角线上元素均为 0, 记为  $A$ , 则  $A^n = 0$ , 所以  $\mathcal{A}^n = 0$ .)

6. 找一个 3 阶方阵  $A$ , 其最小多项式为  $x^2$ .

解 找一个  $x^2$  的二阶友阵再加一块 0, 即

$$\begin{bmatrix} 0 & & \\ & 0 & 0 \\ & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

(或由  $m(x)=x^2$ , 知  $A^2=0$ , 所以特征值为 0 且最大若当块为二阶的, 立得. 由此易知形如

$$P \begin{bmatrix} 0 & & \\ & 0 & 0 \\ & 1 & 0 \end{bmatrix} P^{-1} \quad \text{或} \quad P \begin{bmatrix} 0 & & \\ & 0 & 1 \\ & 0 & 0 \end{bmatrix} P^{-1}$$

(其中  $P$  为任一可逆阵) 的方阵均满足要求.

7. 设  $V$  是次数不超过  $n$  的  $\mathbf{R}$  上多项式全体,  $\mathcal{D}$  是  $V$  上“求导”变换, 求  $\mathcal{D}$  的最小多项式.

解 取  $V$  的基  $1, x, \dots, x^n$ , 则  $\mathcal{D}$  在此基上的方阵表示为

$$D = \begin{bmatrix} 0 & 1 & & & \\ & \ddots & \ddots & & \\ & & \ddots & n & \\ & & & 0 & \end{bmatrix}_{n+1},$$

所以特征多项式为  $\lambda^{n+1}$ , 而任  $k \leq n, D^k \neq 0$ , 故最小多项式  $m(\lambda) = \lambda^{n+1}$ .

8. 设  $\mathcal{A}$  为  $\mathbf{R}^{(2)}$  上的投影:  $(x, y)^T \mapsto (x, 0)^T$ . 求  $\mathcal{A}$  的最小多项式.

解 因为  $\mathcal{A}$  在基  $(1, 0)^T, (0, 1)^T$  上的方阵表示为  $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ , 满足  $A^2 = A$ , 所以最小多项式为  $m(\lambda) = \lambda^2 - \lambda$ .

9. 设  $V$  是域  $F$  上  $n$  阶方阵全体所成空间,  $A$  为其中一固定方阵.  $V$  的线性变换  $\mathcal{T}$  由下式定义:  $\mathcal{T}(B) = AB$ , 证明  $\mathcal{T}$  与  $A$  的极小多项式相同.

证 设  $A = (a_{ij}), m(\lambda)$  为  $A$  的极小多项式. 由 6.3 节 28 题知线性变换  $\mathcal{T}$  在基  $E_{ij}$  (只  $(i, j)$  位元素为 1, 其他元素为 0 的方阵,  $i, j = 1, \dots, n$ ) 上的方阵表示为  $T = (a_{ij}I)_{n^2 \times n^2}$ , 记  $m(\lambda) = \sum_{l=0}^k c_l \lambda^l$  则  $m(A) = \sum_{l=0}^k c_l A^l = 0$ , 因为  $A^l = (d_{ij})$  时,  $T^l = (d_{ij}I)$ , 所以  $m(T) = \sum_{l=0}^k c_l T^l = 0$ .

10. 设  $A, B$  为域  $F$  上  $n$  阶方阵, 我们已经知道  $AB$  和  $BA$  的特征多项式相同. 它们的最小多项式是否相同?

解  $P_{AB}(\lambda) = \det(\lambda I - AB) = \det(\lambda I - BA) = P_{BA}(\lambda)$ , 但  $AB$  和  $BA$  的极小多项式不一定相同. 如  $A = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}; AB = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \neq \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = BA, P_{AB}(\lambda) = P_{BA}(\lambda) = \lambda^2$ , 而  $m_{AB}(\lambda) = \lambda^2, m_{BA}(\lambda) = \lambda$ .

11. 设  $\mathcal{A}$  是  $\mathbf{R}^{(3)}$  的线性变换, 在自然基下的方阵表示为

$$A = \begin{bmatrix} 6 & -3 & -2 \\ 4 & -1 & -2 \\ 10 & -5 & -3 \end{bmatrix},$$

把  $\mathcal{A}$  的最小多项式表示为  $m(x) = p_1(x)p_2(x)$ ,  $p_i$  是  $\mathbf{R}$  上首一不可约多项式, 记  $W_i = \ker p_i$ , 求  $W_1$  和  $W_2$  的基, 求  $\mathcal{A}_i = \mathcal{A}|_{W_i}$  的方阵表示.

**解** 因为特征多项式  $P_A(\lambda) = (\lambda-2)(\lambda^2+1)$  无重根, 所以  $m(\lambda) = (\lambda-2)(\lambda^2+1)$ .

$$W_1 = \ker(A-2I) = \{x \in \mathbf{R}^{(3)} \mid (A-2I)x = 0\}.$$

解  $(A-2I)x=0$ , 得  $x_1 = (1, 0, 2)^T$ , 所以  $W_1 = \langle x_1 \rangle$ ,  $\mathcal{A}_1$  的方阵表示为  $2$  (一阶方阵).

$$W_2 = \ker(\mathcal{A}^2+1) = \{x \in \mathbf{R}^3 \mid (A^2+I)x = 0\},$$

解  $(A^2+I)x=0$ , 得  $\eta_1 = (0, 0, 1)^T$ ,  $\eta_2 = (1, 1, 0)^T$ , 则  $W_2 = \langle \eta_1, \eta_2 \rangle$ . (若取  $\eta_1, \eta_2$  为  $W_2$  的

基, 则  $\mathcal{A}_2$  的方阵表示为  $\begin{bmatrix} -3 & 5 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}$ , 此时  $\mathbf{R}^{(3)} = W_1 \oplus W_2$ ) 我们要使  $\mathcal{A}_2$  的方阵表示为友阵

型  $\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ , 即为  $\lambda^2+1$  的友阵, 则  $x_2, x_3$  不能为  $W_2$  中任两线性无关的向量, 还需满足

$$Ax_2 = x_3, Ax_3 = -x_2,$$

取  $x_2 = (0, 0, -1)^T$ , 得  $x_3 = (2, 2, 3)^T$ . 则  $\mathcal{A}_2$  在  $x_2, x_3$  上的方阵表示为  $\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ . 令  $P =$

$(x_1, x_2, x_3)$ , 则

$$P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 2 & & \\ & 0 & -1 \\ & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

12. 设  $\mathcal{A}$  为  $\mathbf{R}^{(3)}$  的线性变换, 在自然基下方阵表示为

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 2 & 2 & -1 \\ 2 & 2 & 0 \end{bmatrix},$$

证明  $\mathcal{A} = \mathcal{D} + \mathcal{N}$ , 其中  $\mathcal{D}$  是  $\mathbf{R}^{(3)}$  上可对角化线性变换,  $\mathcal{N}$  为幂零线性变换, 且  $\mathcal{D}\mathcal{N} = \mathcal{N}\mathcal{D}$ , 求  $\mathcal{D}$  和  $\mathcal{N}$  在自然基下的方阵表示.

**解 方法 1**  $P_A(\lambda) = \det(\lambda I - A) = (\lambda-1)(\lambda-2)^2$ , 所以  $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = \lambda_3 = 2$ , 解  $(A-I)x=0$ , 得  $x_1 = (1, 0, 2)^T$ ; 对  $\lambda = 2$ , 解  $(A-2I)x=0$ , 得  $x_3 = (1, 1, 2)^T$ , 再由  $(A-2I)x_2 = x_3$ , 得  $x_2 = (0, 0, -1)^T$ . 故取  $P = (x_1, x_2, x_3)$ , 即

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & 2 \end{bmatrix}, \quad P^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix},$$

则

$$P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 2 & \\ & 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 2 & \\ & & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & & \\ & 0 & \\ & 1 & 0 \end{bmatrix},$$

于是得

$$A = P \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 2 & \\ & & 2 \end{bmatrix} P^{-1} + P \begin{bmatrix} 0 & & \\ & 0 & \\ & 1 & 0 \end{bmatrix} P^{-1}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ -2 & 2 & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 2 & 0 & -1 \\ 4 & 0 & -2 \end{bmatrix} = D + N.$$

故  $\mathcal{A} = \mathcal{D} + \mathcal{N}$ , 其中  $\mathcal{D}$  在自然基下的方阵表示为  $D$ , 即把  $\epsilon_1, \epsilon_2, \epsilon_3$  分别映为  $\epsilon_1 - 2\epsilon_3, \epsilon_1 + 2\epsilon_2 + 2\epsilon_3, 2\epsilon_3$ ;  $\mathcal{N}$  在自然基  $\epsilon_1, \epsilon_2, \epsilon_3$  下的方阵表示为  $N$ , 即有  $\mathcal{N}\epsilon_1 = 2\epsilon_1 + 2\epsilon_2 + 4\epsilon_3, \mathcal{N}\epsilon_2 = 0, \mathcal{N}\epsilon_3 = -\epsilon_1 - \epsilon_2 - 2\epsilon_3$ . 又

$$DN = P \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 2 & \\ & & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & & \\ & 0 & \\ & 1 & 0 \end{bmatrix} P^{-1} = P \begin{bmatrix} 0 & & \\ & 0 & \\ & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 2 & \\ & & 2 \end{bmatrix} P^{-1} = ND,$$

所以  $\mathcal{D}\mathcal{N} = \mathcal{N}\mathcal{D}$ .

(显然有  $P^{-1}DP = \text{diag}\{1, 2, 2\}$ , 所以  $\mathcal{D}$  可对角化; 而  $N^2 = 0$ , 故  $\mathcal{N}$  为幂零变换.)

方法 2  $P_A(\lambda) = (\lambda - 1)(\lambda - 2)^2$ , 故  $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = \lambda_3 = 2$ .

$$W_1 = \ker(\mathcal{A} - 1) = \mathbf{R}(1, 0, 2)^T,$$

$$W_2 = \ker(\mathcal{A} - 2)^2 = \{x \in \mathbf{R}^{(3)} \mid (A - 2I)^2 x = 0\} = \mathbf{R}(1, 1, 0)^T + \mathbf{R}(0, 0, 1)^T,$$

取

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad P^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -2 & 2 & 1 \end{bmatrix},$$

则

$$P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 4 & -1 \\ & 4 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 2 & \\ & & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & & \\ & 2 & -1 \\ & 4 & -2 \end{bmatrix},$$

所以

$$A = P \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 2 & \\ & & 2 \end{bmatrix} P^{-1} + P \begin{bmatrix} 0 & & \\ & 2 & -1 \\ & 4 & -2 \end{bmatrix} P^{-1} = D + N.$$

13. 设  $V$  是  $n$  维复线性空间, 设  $\mathcal{A}$  是  $V$  的线性变换,  $\mathcal{D}$  是  $\mathcal{A}$  的可对角化部分 (见定理 7.6 系 5). 证明: 对任意多项式  $g(X) \in \mathbf{C}[X]$ ,  $g(\mathcal{A})$  的可对角化部分为  $g(\mathcal{D})$ .

解 方法 1 设  $\mathcal{A}$  在  $V$  的某组基下的方阵表示为  $A$ , 因为在复线性空间中总存在  $V$  的基使  $\mathcal{A}$  的方阵表示为 Jordan 标准形, 类似 12 题得  $\mathcal{A} = \mathcal{D} + \mathcal{N}$ , 即  $A = D + N$ , 其中  $D$  相似于对角阵, 而  $N$  为幂零方阵.

$$\text{任 } g(X) \in \mathbf{C}[X], \text{ 设 } g(X) = \sum_{l=1}^k a_l X^l, g(A) = g(D + N) = \sum_{l=1}^k a_l (D + N)^l =$$

$$\sum_{l=1}^k a_l (D^l + C_l^1 D^{l-1} N + C_l^2 D^{l-2} N^2 + \cdots + C_l^{l-1} D N^{l-1} + N^l).$$

所以

$$g(A) = \sum_{l=1}^k a_l D^l + \sum_{l=1}^k a_l \sum_{i=1}^l C_l^i D^{l-i} N^i = g(D) + M.$$

而  $M$  是幂零的(不能对角化). 故  $g(\mathcal{A})$  的可对角部分为  $g(\mathcal{D})$ . (事实上,  $M$  中的每一项  $D^{l-i}N^i$  均是幂零的, 因为  $DN=ND$ , 所以  $(DN)^n=D^nN^n=0$ .)

方法 2 上述结论可由 Jordan 标准形直观得出: 设有可逆阵  $P$  使

$$\begin{aligned} A &= PJP^{-1} = P \begin{bmatrix} J_{n_1}(\lambda_1) & & \\ & \ddots & \\ & & J_{n_s}(\lambda_s) \end{bmatrix} P^{-1} \\ &= P \begin{bmatrix} \lambda_1 I_{n_1} & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_s I_{n_s} \end{bmatrix} P^{-1} + P \begin{bmatrix} J_1 & & \\ & \ddots & \\ & & J_s \end{bmatrix} P^{-1} = D + N. \end{aligned}$$

其中

$$J_{n_i}(\lambda_i) = \begin{bmatrix} \lambda_i & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & \lambda_i \end{bmatrix}, \quad J_i = \begin{bmatrix} 0 & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & 0 \end{bmatrix},$$

又任  $g(X) \in \mathbb{C}[X]$ , 有

$$g(A) = Pg(J)P^{-1} = P \begin{bmatrix} g(J_{n_1}(\lambda_1)) & & \\ & \ddots & \\ & & g(J_{n_s}(\lambda_s)) \end{bmatrix} P^{-1}.$$

其中

$$g(J_{n_i}(\lambda_i)) = \begin{bmatrix} g(\lambda_i) & g'(\lambda_i) & \cdots & \frac{g^{(n_i-1)}(\lambda_i)}{n_i!} \\ & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & g'(\lambda_i) \\ & & & g(\lambda_i) \end{bmatrix},$$

所以

$$\begin{aligned} g(A) &= P \begin{bmatrix} g(\lambda_1) I_{n_1} & & \\ & \ddots & \\ & & g(\lambda_s) I_{n_s} \end{bmatrix} P^{-1} + P \begin{bmatrix} 0 & * & \cdots & * \\ & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & * \\ & & & 0 \end{bmatrix} P^{-1} \\ &= g(D) + f(N). \end{aligned}$$

显见  $f(N)$  是幂零的.

14. 设  $V$  是域  $F$  上线性空间,  $\mathcal{A}$  是  $V$  上线性变换, 且  $\text{rank}(\mathcal{A})=1$ . 证明:  $\mathcal{A}$  或为可对角化的, 或为幂 0 的, 二者不兼有.

证 设  $\mathcal{A}$  在  $V$  的某基下的方阵表示为  $A$ . 因为  $\text{rank}(\mathcal{A})=1$ , 所以  $\mathcal{A}$  有 0 特征值. 而由  $Ax=0$  的解空间是  $n-r(A)=(n-1)$  维的, 知道属于  $\lambda=0$  的特征子空间  $V_0$  是  $n-1$  维的, 即  $\mathcal{A}$  有  $n-1$  个属于特征值 0 的线性无关的特征向量. 由此知  $\mathcal{A}$  的特征多项式为

$$\det(\lambda I - A) = \lambda^k(\lambda - \lambda_1)^{n-k}, \quad k \geq n-1.$$

若  $k=n-1$ , 则  $A$  相似于对角阵  $\text{diag}\{\lambda_1, 0, \dots, 0\}$ ,  $\rightarrow \mathcal{A}$  可对角化,

若  $k=n$ ,  $A$  相似于含有一个二阶若当块  $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ , 和  $n-2$  个一阶块的 Jordan 标准形,

即

$$A \sim \begin{bmatrix} 0 & 1 & & & \\ & 0 & & & \\ & & 0 & & \\ & & & \ddots & \\ & & & & 0 \end{bmatrix},$$

所以  $\mathcal{A}$  是幂零的.

15. 设  $V$  是域  $F$  上  $n$  阶方阵所成线性空间,  $A$  是其中一固定方阵. 定义  $V$  上线性变换  $T: T(B)=AB-BA$ . 证明: 若  $A$  为幂零方阵, 则  $T$  为幂零变换.

解 由 6.3 节第 30 题知  $T$  的方阵表示(在基  $E_{ij}$  下)为

$$M = A_1 - A_2 = (a_{ij}I_n) - \begin{bmatrix} A^T & & \\ & \ddots & \\ & & A^T \end{bmatrix},$$

易知当  $A$  是幂零方阵时,  $A_1, A_2$  均是幂零方阵, 且  $A_1A_2=A_2A_1$ , 则若  $A^k=0$  (即  $A$  是  $k$  次幂零的,  $A^{k-1} \neq 0$ ) 可得  $M^{2k}=(A_1-A_2)^{2k}=0$ . (因为按二项式展开, 各项中  $A_1$  或  $A_2$  的幂中总有一个  $\geq k$ , 故得知各项均为 0. 注意  $A_1, A_2$  与  $A$  的幂零次数相同.)

16. 举出两个 4 阶幂零方阵的例子, 它们有相同的极小多项式而不相似.

解 令

$$A_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & & \\ & 0 & & \\ & & 0 & \\ & & & 0 \end{bmatrix}, A_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & & \\ & 0 & & \\ & & 0 & 1 \\ & & & 0 \end{bmatrix},$$

则易算得  $A_1$  与  $A_2$  的极小多项式均为  $\lambda^2$ , 但  $\text{rank}(A_1) \neq \text{rank}(A_2)$ , 所以  $A_1$  与  $A_2$  不相似.

注 这种举例题的思路是: (1) 只要能说明问题, 要尽量简单, 让人一眼就看出结论; (2) 极小多项式相同, 所以两个方阵的特征值相同, 且相对每一特征值的最大 Jordan 块的阶数相同. 为简单醒目, 我们取  $A_1$  为 Jordan 形方阵, 取定  $A_1$  后让  $A_2$  最大 Jordan 块的个数与  $A_1$  不同或  $A_2$  的低阶 Jordan 块不同于  $A_1$  的即可.

17. 设  $V=W_1 \oplus \dots \oplus W_s$  是空间  $V$  对于线性变换  $\mathcal{A}$  的准素分解(如定理 7.6), 而  $W$  是  $\mathcal{A}$  的任一个不变子空间, 证明

$$W = (W_1 \cap W) \oplus \dots \oplus (W_s \cap W).$$

证 设  $V=W_1 \oplus \dots \oplus W_s$ , 则任  $\alpha \in V$  有  $\alpha = \alpha_1 + \dots + \alpha_s$ , 其中  $\alpha_i \in W_i$ .

任  $\beta \in (W_1 \cap W) \oplus \dots \oplus (W_s \cap W)$ , 有  $\beta = \beta_1 + \dots + \beta_s$ ,  $\beta_i \in W_i \cap W$ , 所以  $\beta_i \in W$ , 由  $W$  是  $V$  的子空间, 所以  $\sum \beta_i \in W$ , 即  $\beta \in W$ .

故

$$W \supseteq (W_1 \cap W) \oplus \cdots \oplus (W_s \cap W).$$

另一方面, 由  $V = \mathcal{E}_1 V \oplus \cdots \oplus \mathcal{E}_s V$ , 其中  $\mathcal{E}_i V = \ker p_i(\lambda)^{r_i} = W_i, i=1, \cdots, s$ . 任  $\alpha \in W$ , 有  $\alpha = \mathcal{E}_1 \alpha + \cdots + \mathcal{E}_s \alpha, \mathcal{E}_i \alpha \in W_i$ , 又因为  $\mathcal{E}_i$  是  $\mathcal{A}$  的多项式, 而  $W$  是  $\mathcal{A}$  的不变子空间, 从而也是  $\mathcal{E}_i$  的不变子空间, 所以  $\mathcal{E}_i \alpha \in W$ . 故  $\mathcal{E}_i \alpha \in W_i \cap W$ , 又因为  $(W_i \cap W) \cap (W_j \cap W) = 0$ , 所以

$$W \subseteq (W_1 \cap W) \oplus \cdots \oplus (W_s \cap W),$$

于是

$$W = (W_1 \cap W) \oplus \cdots \oplus (W_s \cap W).$$

18. 设  $V$  是  $F$  上  $n$  维线性空间,  $\mathcal{A}$  是其线性变换. 证明: 若  $\mathcal{A}$  与  $V$  上可对角化的每个线性变换均可交换, 则  $\mathcal{A}$  是纯量变换 (即恒等变换的固定常数倍).

证 设  $\mathcal{D}$  为  $V$  上可对角化的线性变换, 它在  $V$  的基  $\epsilon_1, \cdots, \epsilon_n$  下的方阵表示为

$$D = \text{diag}\{d_1, \cdots, d_n\}, \text{ 且 } d_i \neq d_j.$$

设  $\mathcal{A}$  在此基下的方阵表示为  $A = (a_{ij})$ , 由  $\mathcal{A}\mathcal{D} = \mathcal{D}\mathcal{A}$ , 知有  $AD = DA \rightarrow a_{ij}d_j = d_i a_{ij}, \rightarrow i \neq j$  时  $a_{ij} = 0$ . 于是知  $A$  必为对角阵. 设  $A = \text{diag}\{\mu_1, \cdots, \mu_n\}$ . 令

$$P = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & \ddots & \\ & & & & 1 \end{bmatrix} = I + E_{ij} (i \neq j),$$

则  $P^{-1} = I - E_{ij}$ , 取基  $\eta_1, \cdots, \eta_n$  使  $P^{-1}$  为从基  $\epsilon_1, \cdots, \epsilon_n$  到基  $\eta_1, \cdots, \eta_n$  的过渡矩阵, 即有

$$(\epsilon_1, \cdots, \epsilon_n) = (\eta_1, \cdots, \eta_n)P.$$

又设线性变换  $\mathcal{B}$  在基  $\eta_1, \cdots, \eta_n$  下的方阵为  $B = \text{diag}\{\lambda_1, \cdots, \lambda_n\}$ , 且  $\lambda_i \neq \lambda_j$ . 则它在基  $\epsilon_1, \cdots, \epsilon_n$  下的方阵表示为

$$P^{-1}BP = P^{-1} \begin{bmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & \lambda_i & \\ & & & \ddots & \\ & & & & \lambda_j & \\ & & & & & \ddots & \\ & & & & & & \lambda_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & \lambda_i & & \lambda_i - \lambda_j & \\ & & & \ddots & & \\ & & & & \lambda_j & \\ & & & & & \ddots & \\ & & & & & & \lambda_n \end{bmatrix},$$

则由  $\mathcal{A}\mathcal{B} = \mathcal{B}\mathcal{A}$ , 有  $AP^{-1}BP = P^{-1}BPA$ , 即

$$\begin{bmatrix} \mu_1 \lambda_1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & \mu_i \lambda_i & & \mu_j (\lambda_i - \lambda_j) \\ & & & \ddots & \\ & & & & \mu_j \lambda_j & \\ & & & & & \ddots & \\ & & & & & & \mu_n \lambda_n \end{bmatrix} =$$



$$\begin{bmatrix} \lambda_1 \mu_1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & \lambda_i \mu_i & & \mu_j (\lambda_i - \lambda_j) \\ & & & \ddots & \\ & & & & \lambda_j \mu_j \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & \lambda_n \mu_n \end{bmatrix},$$

因为  $\lambda_i - \lambda_j \neq 0$ , 所以必  $\mu_i = \mu_j$ , 取不同的  $\mathcal{B}$ , 可知必有  $\mu_1 = \mu_2 = \cdots = \mu_n$ . 所以  $A$  为纯量方阵, 由此知  $\mathcal{A}$  为纯量变换.

19.  $n$  维复线性空间  $V$  上任意多两两可交换的线性变换必有公共特征向量.

证 (1) 首先证  $V$  上两个可交换的线性变换  $\mathcal{A}, \mathcal{B}$  (满足  $\mathcal{AB} = \mathcal{BA}$ ) 必有公共特征向量.

在复数域中  $\mathcal{A}$  一定有一个特征值, 记为  $\lambda_0$ , 且记  $V_{\lambda_0}$  是  $\mathcal{A}$  的属于特征值  $\lambda_0$  的特征子空间. 任  $\xi \in V_{\lambda_0}$ , 有  $\mathcal{A}\xi = \lambda_0 \xi$ , 又由已知  $\mathcal{AB} = \mathcal{BA}$ , 从而得

$$\mathcal{A}(\mathcal{B}\xi) = \mathcal{B}(\mathcal{A}\xi) = \mathcal{B}\lambda_0 \xi = \lambda_0 \mathcal{B}\xi,$$

所以  $\mathcal{B}\xi \in V_{\lambda_0}$ , 于是  $V_{\lambda_0}$  是  $\mathcal{B}$  的不变子空间.

又设  $\mathcal{B}_0$  为  $\mathcal{B}$  在子空间  $V_{\lambda_0}$  上的限制,  $\mathcal{B}_0$  为线性变换且在复数域上必有特征值, 即存在  $\mu \in \mathbb{C}$  及  $\alpha \in V_{\lambda_0}$  使  $\mathcal{B}_0 \alpha = \mu \alpha$ , ( $\alpha \neq 0$ ), 故  $\mathcal{B}\alpha = \mathcal{B}_0 \alpha = \mu \alpha$ , 又由  $\alpha \in V_{\lambda_0}$ , 故有  $\mathcal{A}\alpha = \lambda_0 \alpha$ ,

所以  $\alpha$  是  $\mathcal{A}, \mathcal{B}$  的公共特征向量.

(2) 当任意多个时, 对空间的维数进行归纳法:

$V$  是 1 维的, 显然. (因为对任  $\mathcal{A}, \mathcal{A}\alpha = \lambda\alpha$ )

假设对  $\dim V = n-1$  时结论成立. 今证  $\dim V = n$  时, 结论也对. 若对任变换  $\mathcal{A}$ , 设  $\lambda$  为其特征值, 有特征子空间  $V_\lambda = V$ , 则  $\mathcal{A} = \lambda I$  ( $\mathcal{A}$  为纯量变换) 即  $V$  中每个向量都是各变换的特征向量 ( $\lambda$  随变换不同而变). 否则

若对某个变换  $\mathcal{A}_0$  ( $\lambda_0$  为其特征值), 有  $V_{\lambda_0} \neq V$ , 则  $V_{\lambda_0}$  是任变换 (与  $\mathcal{A}_0$  可交换) 的不变子空间. 而任变换在  $V_{\lambda_0}$  上的限制 (或称诱导出的变换) 也可交换. 此时  $\dim V_{\lambda_0} = n-1$ , 由归纳假设, 这些两两可交换的线性变换在  $V_{\lambda_0}$  上有公共的特征向量  $\alpha$ , 而  $\alpha$  也是  $\mathcal{A}$  的特征向量. 所以  $\alpha$  是所有这些两两可交换的线性变换的公共特征向量.

20. 属于不同特征值的所有根向量是线性无关的.

解 方法 1 由定理 7.6 知  $V = W_1 \oplus \cdots \oplus W_s$ , 其中  $W_i = \ker(\mathcal{A} - \lambda_i I)^{r_i} = \{\alpha \in V \mid (\mathcal{A} - \lambda_i I)^{r_i} \alpha = 0\}$ . 其中  $\lambda_1, \cdots, \lambda_s$  为  $V$  上的线性变换  $\mathcal{A}$  的不同的特征值,  $W_i$  中的向量称为属于  $\lambda_i$  的根向量.

设  $\alpha_{i1}, \cdots, \alpha_{ik_i}$  是  $W_i$  的基 ( $i=1, \cdots, s$ ), 则

$$\alpha_{11}, \cdots, \alpha_{1k_1}, \cdots, \alpha_{i1}, \cdots, \alpha_{ik_i}, \cdots, \alpha_{s1}, \cdots, \alpha_{sk_s},$$

线性无关. 事实上, 若有

$$\sum_{i=1}^s \sum_{j=1}^{k_i} \lambda_{ij} \alpha_{ij} = 0,$$

则由  $W_1 \oplus \cdots \oplus W_s = V$  是直和, 所以 0 向量的分解是唯一的, 知

$$\sum_{j=1}^{k_i} \lambda_{ij} \alpha_{ij} = 0, \quad i = 1, \dots, s.$$

而  $\alpha_{i1}, \dots, \alpha_{ik_i}$  是  $W_i$  的基, 线性无关, 所以必有  $\lambda_{ij} = 0, j = 1, \dots, k_i$ , 对  $i = 1, \dots, s$  均成立, 故得证.

方法 2 设  $\alpha_1 \in W_1, \dots, \alpha_s \in W_s, W_i = \ker(\lambda - \lambda_i)^{r_i}$ . 我们要证  $\alpha_1, \dots, \alpha_s$  线性无关. 设有

$$\mu_1 \alpha_1 + \dots + \mu_s \alpha_s = 0,$$

左边用  $(\mathcal{A} - \lambda_1 I)^{r_1}$  作用, 因为  $(\mathcal{A} - \lambda_1 I)^{r_1} \alpha_1 = 0$ , 所以得

$$(\mathcal{A} - \lambda_1 I)^{r_1} (\mu_2 \alpha_2 + \dots + \mu_s \alpha_s) = 0.$$

因为  $W_1 \cap W_j = 0, j = 2, \dots, s$ , 所以  $\mu_2 \alpha_2 + \dots + \mu_s \alpha_s = 0$ , 再用  $(\mathcal{A} - \lambda_2 I)^{r_2}$  作用于左边,  $\dots$  继续做下去, 得  $\mu_{s-1} \alpha_{s-1} + \mu_s \alpha_s = 0, \mu_s \alpha_s = 0$ , 于是由  $\alpha_s \neq 0$  知  $\mu_s = 0$ , 再由  $\alpha_{s-1} \neq 0$ , 知  $\mu_{s-1} = 0, \dots$ , 最后得  $\mu_1 = 0$ , 于是  $\alpha_1, \dots, \alpha_s$  线性无关.

21. 复线性空间  $V$  上线性变换  $\mathcal{A}$  在基  $\alpha_1, \dots, \alpha_n$  下的方阵表示如下, 求  $\mathcal{A}$  的特征值及根子空间.

$$(1) \begin{bmatrix} 4 & -5 & 2 \\ 5 & -7 & 3 \\ 6 & -9 & 4 \end{bmatrix}; (2) \begin{bmatrix} 1 & -3 & 4 \\ 4 & -7 & 8 \\ 6 & -7 & 7 \end{bmatrix}; (3) \begin{bmatrix} 2 & 6 & -15 \\ 1 & 1 & -5 \\ 1 & 2 & -6 \end{bmatrix}; (4) \begin{bmatrix} 0 & -2 & 3 & 2 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

解 (1)  $P_A(\lambda) = \lambda^2(\lambda - 1)$ , 因为  $A^2(A - I) = 0$  而  $A(A - I) \neq 0$ , 所以  $m(\lambda) = \lambda^2(\lambda - 1)$ . (特征值为 0(二重)和 1)

$$W_1 = \ker \lambda^2 = \{\alpha \in V \mid \mathcal{A}^2 \alpha = 0\} = \langle \alpha_1 - \alpha_3, \alpha_1 + \alpha_2 \rangle;$$

$$W_2 = \ker(\lambda - 1) = \{\alpha \in V \mid (\mathcal{A} - I)\alpha = 0\} = \langle \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 \rangle.$$

(2)  $P_A(\lambda) = (\lambda + 1)^2(\lambda - 3)$ , 因为  $(A + I)(A - 3I) \neq 0$ , 所以  $m(\lambda) = (\lambda + 1)^2(\lambda - 3)$ . 则属于特征值 -1 的根子空间

$$W_1 = \ker(\lambda + 1)^2 = \{\alpha \in V \mid (\mathcal{A} + I)^2 \alpha = 0\} = \langle \alpha_1 - \alpha_3, \alpha_1 + \alpha_2 \rangle;$$

属于特征值 3 的根子空间为

$$W_2 = \ker(\lambda - 3) = \{\alpha \in V \mid (\mathcal{A} - 3I)\alpha = 0\} = \langle \alpha_1 + 2\alpha_2 + 2\alpha_3 \rangle.$$

(3)  $P_A(\lambda) = (\lambda + 1)^3, \lambda = -1$  为三重根, 因为  $(A + I)^2 = 0$ , 所以  $m(\lambda) = (\lambda + 1)^2$ . 又因为  $(\mathcal{A} + I)^2 = 0$  是零变换, 所以  $\ker(\mathcal{A} + I)^2 = V$ , 即  $V$  中任向量均为属于特征根 -1 的根向量.

(4) 特征多项式  $P_A(\lambda) = |\lambda I - A| = \lambda^2(\lambda - 2)^2$ , 所以  $\lambda_{1,2} = 0, \lambda_{3,4} = 2$ . 又因为  $A^2(A - 2I) \neq 0, A(A - 2I)^2 \neq 0$ , 所以最小多项式为

$$m(\lambda) = \lambda^2(\lambda - 2)^2.$$

属于特征值  $\lambda = 0$  的根子空间为

$$W_1 = \ker \lambda^2 = \ker \mathcal{A}^2 = \langle \alpha_1, \alpha_2 + \alpha_4 \rangle.$$

其中  $\alpha_2 + \alpha_4$  是特征向量, 满足  $\mathcal{A}x = 0$ ; 记为  $x_2$ , 则  $\alpha_1$  满足  $\mathcal{A}x = x_2 = \alpha_2 + \alpha_4$ . 所以  $\alpha_1, \alpha_2 + \alpha_4$  是一个若当链.

属于特征值  $\lambda = 2$  的根子空间为

$$W_2 = \ker(\lambda - 2)^2 = \ker(\mathcal{A} - 2I)^2 = \langle \alpha_1 + \alpha_3, \alpha_1 + \alpha_4 \rangle.$$

其中  $\alpha_1 + \alpha_4$  是特征向量, 满足  $\mathcal{A}x = 2x$ ;  $\alpha_1 + \alpha_3$  满足  $(\mathcal{A} - 2I)x = \alpha_1 + \alpha_4$ , 它与  $\alpha_1 + \alpha_4$  构成一个 Jordan 链.

**注** 本题中根子空间是用其基的生成空间形式给出的. 因为这里只要求各根子空间, 没要求  $\mathcal{A}$  的方阵表示, 所以基的选取是不唯一的. 若要求为 Jordan 形, 则基的选取必须如 (4) 题.

**22. 证明:** 复线性空间完全由线性变换  $\mathcal{A}$  的根向量组成当且仅当  $\mathcal{A}$  的所有特征值均相等.

**证**  $\Leftarrow$  (充分性) 当所有特征值均相等时,  $\mathcal{A}$  的极小多项式为  $m(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{r_1}$ . (即  $(\mathcal{A} - \lambda_1 I)^{r_1} = 0$ ), 所以  $\ker(\mathcal{A} - \lambda_1 I)^{r_1} = V$ , 于是  $V$  中每个向量均为根向量.

$\Rightarrow$  (必要性) 用反证法: 设  $\mathcal{A}$  有两个不同的特征值, 即特征多项式为  $P_A(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{n_1}(\lambda - \lambda_2)^{n_2}$ , 极小多项式为  $m(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{r_1}(\lambda - \lambda_2)^{r_2}$ . 则由定理 7.6 有直和分解  $V = W_1 \oplus W_2$ , 其中

$$W_i = \ker(\lambda - \lambda_i)^{r_i} = \ker(\mathcal{A} - \lambda_i I)^{r_i}, \quad i = 1, 2,$$

$W_1, W_2$  分别为属于特征值  $\lambda_1$  和  $\lambda_2$  的根子空间. 又因为  $W_1, W_2$  均为  $V$  的真子空间, 所以必存在  $\alpha \in V$ , 使  $\alpha \in W_1$  且  $\alpha \in W_2$  (证明见 5.4 节题 5), 于是  $\alpha$  不是根向量, 与已知矛盾, 故必有  $\lambda_1 = \lambda_2$ .

**23. 设**  $V$  是无限可微的实函数  $f(x)$  全体, 按通常加法和数乘而为  $\mathbf{R}$  上无限维线性空间.  $\mathcal{D}$  是求导函数变换.

(1) 求  $\mathcal{D}$  的所有特征值和特征向量;

(2) 求  $\mathcal{D}$  的所有根子空间.

**解** (1) 由  $\mathcal{D}f = \lambda f$  知  $f'(x) = \lambda f(x) \rightarrow f(x) = ae^{\lambda x}$ ,  $\lambda, a \in \mathbf{R}$ , 所以任  $\lambda \in \mathbf{R}$  均为特征值, 而对每个特征值  $\lambda$ , 其特征子空间为  $V_\lambda = \mathbf{R}e^{\lambda x}$  (即  $\forall a \in \mathbf{R}, ae^{\lambda x}$  均是  $\mathcal{D}$  的属于特征值  $\lambda$  的特征向量).

(2) 对任  $\lambda \in \mathbf{R}$  ( $\mathcal{D}$  的特征值), 它的根子空间

$$W_\lambda = \ker(\mathcal{D} - \lambda I)^r = \{f(x) \mid (\mathcal{D} - \lambda I)^r f(x) = 0\}. \quad (r \text{ 为正整数})$$

即  $f(x)$  满足

$$f^{(r)} - \lambda r f^{(r-1)} + \cdots + (-1)^r \lambda^r f = 0$$

所以  $f(x) = e^{\lambda x} Q(x)$ , 其中  $Q(x)$  为多项式. 于是知:  $\mathcal{D}$  的属于每个特征值  $\lambda$  的根子空间为  $e^{\lambda x} \mathbf{R}[X]$ .

**24. 分别在  $\mathbf{R}$  和  $\mathbf{Q}$  上准素分解第 21 题中的矩阵.**

**解** (1) 因为  $m(\lambda) = \lambda^2(\lambda - 1)$ ,  $V = W_1 \oplus W_2$ , 其中

$$W_1 = \ker \mathcal{A}^2 = \ker \lambda^2 = L((\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)((-1, -1, 0)^T, (1, 2, 3)^T)),$$

$$W_2 = \ker(\mathcal{A} - I) = L((\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)(1, 1, 1)^T).$$

取

$$P = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & 1 \end{bmatrix}, \text{ 则 } P^{-1}AP = \left[ \begin{array}{cc|c} 0 & & \\ 1 & 0 & \\ \hline & & 1 \end{array} \right].$$

(2) 因为  $m(\lambda) = (\lambda+1)^2(\lambda-3)$ ,  $V = W_1 \oplus W_2$ , 其中

$$W_1 = \ker(\lambda+1)^2 = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)L((-1, -1, 0)^T, (1, 2, 1)^T),$$

$$W_2 = \ker(\lambda-3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)L((1, 2, 2)^T).$$

取

$$P = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}, \text{ 则 } P^{-1}AP = \begin{bmatrix} -1 & & \\ 1 & -1 & \\ & & 3 \end{bmatrix}.$$

(3) 因为  $m(\lambda) = (\lambda+1)^2$ , 此时  $V$  不能分解,  $A$  的准素分解即其自身. 此时若取

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \text{ 有 } P^{-1}AP = \begin{bmatrix} -1 & & \\ 1 & -1 & \\ & & -1 \end{bmatrix}.$$

这是  $V$  上的循环分解.

(4) 因为  $m(\lambda) = \lambda^2(\lambda-2)^2$ ,  $V = W_1 \oplus W_2$ , 其中

$$W_1 = \ker \lambda^2 = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)L((1, 0, 0, 0)^T, (0, 1, 0, 1)^T),$$

$$W_2 = \ker(\lambda-2)^2 = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)L((1, 0, 1, 0)^T, (1, 0, 0, 1)^T).$$

取

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \text{ 有 } P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 0 & & & \\ 1 & 0 & & \\ & & 2 & \\ & & 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

25. 设  $\mathcal{A}$  是  $F$  上  $n$  维线性空间  $V$  上的线性变换, 在某基下的方阵表示是  $F$  上某首一多项式  $f(x)$  的友阵. 证明:  $V$  是循环空间, 即存在  $\alpha \in V$  使  $V = F[\mathcal{A}]\alpha$ , 且  $f(x)$  是  $\mathcal{A}$  的最小多项式.

证 设  $\mathcal{A}$  在基  $\epsilon_1, \dots, \epsilon_n$  下的方阵表示为

$$A = \begin{bmatrix} 0 & & & -c_0 \\ 1 & \ddots & & \vdots \\ & \ddots & 0 & -c_{n-2} \\ & & 1 & -c_{n-1} \end{bmatrix},$$

即  $A$  为首一多项式  $f(x) = c_0 + c_1x + \dots + c_{n-1}x^{n-1} + x^n$  的友阵. 显然有

$$\mathcal{A}\epsilon_1 = \epsilon_2, \mathcal{A}\epsilon_2 = \epsilon_3, \dots, \mathcal{A}\epsilon_{n-1} = \epsilon_n, \mathcal{A}\epsilon_n = -c_0\epsilon_1 - \dots - c_{n-1}\epsilon_n.$$

即

$$\epsilon_1 = \epsilon_1, \epsilon_2 = \mathcal{A}\epsilon_1, \epsilon_3 = \mathcal{A}^2\epsilon_1, \dots, \epsilon_n = \mathcal{A}^{n-1}\epsilon_1,$$

故知  $\epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_n$  是循环基,  $\alpha = \epsilon_1$  是循环向量,  $F[\mathcal{A}]\alpha = F[\mathcal{A}]\epsilon_1 = V$ , 也即  $V$  是循环空间.

由定理 7.5 知  $A$  的最小多项式和特征多项式均为  $f(x)$ . 事实上, 我们很容易算出  $A$  的特征多项式  $|\lambda I - A| = f(\lambda)$ , 所以  $f(\mathcal{A}) = 0$ . 而我们只要证明  $A$  的最小多项式  $m(\lambda)$  的次数为  $n$  即可. 若  $\deg m(\lambda) = k < n$ , 设  $m(\lambda) = \lambda^k + a_{k-1}\lambda^{k-1} + \dots + a_1\lambda + a_0$ , 则

$$0 = m(\mathcal{A})\epsilon_1 = \mathcal{A}^k\epsilon_1 + a_{k-1}\mathcal{A}^{k-1}\epsilon_1 + \dots + a_1\mathcal{A}\epsilon_1 + a_0\epsilon_1,$$

与  $\mathcal{A}^k\epsilon_1, \mathcal{A}^{k-1}\epsilon_1, \dots, \mathcal{A}\epsilon_1, \epsilon_1$  线性无关矛盾. 证毕.

26. 设  $\mathcal{A}$  是  $n$  维线性空间  $V$  上线性变换,  $\alpha \in V$ .  $\alpha$  的次数最低的首一零化多项式

$m_a(\lambda)$ 称为 $\alpha$ (关于 $\mathcal{A}$ )的最小零化子. 证明 $g(\lambda)$ 为 $\alpha$ 的零化多项式(即 $g(\mathcal{A})\alpha=0$ )当且仅当 $m_a(\lambda)|g(\lambda)$ .

证 充分性显然, 即当 $g(\lambda)=m_a(\lambda)q(\lambda)$ 时, 有 $g(\mathcal{A})\alpha=m_a(\mathcal{A})q(\mathcal{A})\alpha=q(\mathcal{A})0=0$ .

必要性: 若 $g(\lambda)$ 为 $\alpha$ 的零化多项式, 由带余除法可设

$$g(\lambda) = m_a(\lambda)q(\lambda) + r(\lambda), \quad r=0 \text{ 或 } \deg r < \deg m_a,$$

则有

$$0 = g(\mathcal{A})\alpha = m_a(\mathcal{A})q(\mathcal{A})\alpha + r(\mathcal{A})\alpha = r(\mathcal{A})\alpha,$$

若 $r \neq 0$ , 则 $r(\lambda)$ 是比 $m_a(\lambda)$ 次数低的零化多项式, 与 $m_a(\lambda)$ 的定义矛盾, 故 $r=0$ , 即 $m_a(\lambda)|g(\lambda)$ .

27. 设 $\mathcal{A}$ 是 $n$ 维线性空间 $V$ 上线性变换,  $\alpha \in V$ 的最小零化子次数为 $k$ . 把 $\alpha, \mathcal{A}\alpha, \dots, \mathcal{A}^{k-1}\alpha$ 扩展为 $V$ 的基. 求 $\mathcal{A}$ 在此基下的方阵表示(分 $k=1, k=2$ 和 $k>2$ 三种情形). 若把基中向量次序换为 $\alpha, \mathcal{A}^2\alpha, \dots, \mathcal{A}\alpha$ 呢? (只须写出方阵的已知部分).

解 设 $\alpha$ 的最小零化子为 $m_a(\lambda)=\lambda^k+c_{k-1}\lambda^{k-1}+\dots+c_1\lambda+c_0$ , 因为 $\alpha, \mathcal{A}\alpha, \dots, \mathcal{A}^{k-1}\alpha$ 线性无关, 所以扩充 $\alpha_{k+1}, \dots, \alpha_n$ 使

$$\alpha, \mathcal{A}\alpha, \dots, \mathcal{A}^{k-1}\alpha, \alpha_{k+1}, \dots, \alpha_n$$

为 $V$ 的基, 于是 $\mathcal{A}$ 在此基下的方阵表示为

$$A = \begin{bmatrix} 0 & & -c_0 & & * & \cdots & * \\ 1 & \ddots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ & \ddots & 0 & -c_{k-2} & \vdots & & \vdots \\ & & 1 & -c_{k-1} & \vdots & & \vdots \\ \hline & & & & \vdots & & \vdots \\ & & & & \vdots & & \vdots \\ & & & & \vdots & & \vdots \\ & & & & * & \cdots & * \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_1 & A_3 \\ 0 & A_2 \end{bmatrix},$$

当 $k=1$ 时,  $m_a(\lambda)=\lambda+c_0$ , 即 $\mathcal{A}\alpha+c_0\alpha=0 \rightarrow \mathcal{A}\alpha=-c_0\alpha$ , 所以 $\alpha$ 是特征向量, 故 $A_1=-c_0$ ;

当 $k=2$ 时,  $m_a(\lambda)=\lambda^2+c_1\lambda+c_0$ ,  $\alpha, \mathcal{A}\alpha$ 线性无关, 所以 $A_1 = \begin{bmatrix} 0 & c_0 \\ 1 & -c_1 \end{bmatrix}$ .

当 $k \geq 3$ 时,  $A_1$ 为 $m_a(\lambda)$ 的友阵, 如上.

若改变基向量的排序为

$$\alpha, \mathcal{A}^2\alpha, \dots, \mathcal{A}^{k-1}\alpha, \alpha_{k+1}, \dots, \alpha_n, \mathcal{A}\alpha,$$

则 $\mathcal{A}$ 在此基上的方阵表示为:

$k=1$ 时, 不变(仍同上);  $k=2$ 时

$$B = \begin{bmatrix} 0 & * & \cdots & * & -c_0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & \vdots & & \vdots & 0 \\ 1 & * & \cdots & * & -c_1 \end{bmatrix};$$

$k \geq 3$ 时

$$B = \begin{bmatrix} 0 & & & -c_0 & * & \cdots & * & 0 \\ 0 & 0 & & -c_2 & \vdots & & \vdots & 1 \\ \vdots & 1 & \ddots & \vdots & \vdots & & \vdots & 0 \\ \vdots & & \ddots & 0 & \vdots & & \vdots & \vdots \\ \vdots & & & 1 & -c_{k-1} & \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & & & & & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & & & & & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & -c_1 & * & \cdots & * & 0 \end{bmatrix}.$$

28. 设  $\mathcal{A}$  是  $F^{(2)}$  上线性变换. 证明: 若非 0 向量  $\alpha$  不是  $\mathcal{A}$  的特征向量, 则  $\alpha$  生成  $F^{(2)}$  (即  $F[\mathcal{A}]\alpha = F^{(2)}$ ). 由此证明, 对于非纯量变换  $\mathcal{A}$ ,  $F^{(2)}$  总是循环空间.

证 任  $\alpha \in F^{(2)}$ , 若  $\alpha \neq 0$ , 且  $\alpha$  不是  $\mathcal{A}$  的特征向量, 即不存  $\lambda \in F$ , 使  $\mathcal{A}\alpha = \lambda\alpha$ , 于是知  $\alpha, \mathcal{A}\alpha$  线性无关, 故为  $F^{(2)}$  的基, 所以  $F[\mathcal{A}]\alpha = F^{(2)} = \langle \alpha, \mathcal{A}\alpha \rangle$ . (即  $\alpha$  为循环向量,  $F^{(2)}$  为循环空间).

对于非纯量变换  $\mathcal{A}$ , 设  $\lambda$  为其一个特征值, ( $\beta$  为其一个特征向量, 有  $\mathcal{A}\beta = \lambda\beta$ ). 则必有  $\alpha \in F^{(2)}$ , 使  $\mathcal{A}\alpha \neq \lambda\alpha$  (否则, 若对一切  $\alpha \in F^{(2)}$  有  $\mathcal{A}\alpha = \lambda\alpha$ , 则  $\mathcal{A}$  为纯量变换), 此时若有  $\mathcal{A}\alpha = \lambda_1\alpha$  ( $\lambda_1 \neq \lambda$ ), 则  $\alpha + \beta$  不是  $\mathcal{A}$  的特征向量, 由前述讨论知:

$F^{(2)} = \langle \alpha + \beta, \mathcal{A}(\alpha + \beta) \rangle$ , 所以  $F^{(2)}$  是循环空间.

29. 设  $\mathcal{A}$  是  $\mathbf{R}^{(3)}$  的线性变换, 在自然基下方阵表示为:

$$A = \begin{bmatrix} 3 & & \\ & 3 & \\ & & -2 \end{bmatrix},$$

证明:  $\mathcal{A}$  没有循环向量, 并求  $(1, -1, 3)^T$  生成的循环子空间.

证 由已知  $\mathcal{A}$  的极小多项式为  $m(\lambda) = (\lambda - 3)(\lambda + 2)$ , 即  $(\mathcal{A} - 3I)(\mathcal{A} + 2I) = \mathcal{A}^2 - \mathcal{A} + 6I = 0$ .

所以对任  $\alpha \in \mathbf{R}^{(3)}$ , 有  $m(\mathcal{A})\alpha = \mathcal{A}^2\alpha - \mathcal{A}\alpha + 6\alpha = 0$ , 即  $\alpha, \mathcal{A}\alpha, \mathcal{A}^2\alpha$  线性相关, 故  $\alpha$  不是循环向量 (因为  $\alpha$  是循环向量的必要条件是  $\alpha, \mathcal{A}\alpha, \mathcal{A}^2\alpha$  线性无关) 故  $\mathcal{A}$  没有循环向量.

当  $\alpha_0 = (1, -1, 3)^T$ ,  $\mathcal{A}\alpha_0 = A\alpha_0 = (3, -3, -6)^T$ , 显然  $\alpha_0, \mathcal{A}\alpha_0$  线性无关, 所以  $\alpha_0$  生成的循环子空间为

$$W = \langle \alpha_0, \mathcal{A}\alpha_0 \rangle = \mathbf{R}(1, -1, 3)^T + \mathbf{R}(3, -3, -6)^T.$$

30. 设  $\mathcal{A}$  是  $\mathbf{C}^{(3)}$  的线性变换, 在自然基下方阵表示为

$$A = \begin{bmatrix} 1 & i & 0 \\ -1 & 2 & -i \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix},$$

求  $\alpha = (1, 0, 0)^T, \beta = (1, 0, i)^T$  的最小零化子.

解 因为

$$\alpha = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \mathcal{A}\alpha = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}, \mathcal{A}^2\alpha = \begin{bmatrix} 1-i \\ -3 \\ -1 \end{bmatrix}, \mathcal{A}^3\alpha = \begin{bmatrix} 1-4i \\ -7+2i \\ -4 \end{bmatrix} = 4\mathcal{A}^2\alpha - (5+2i)\mathcal{A}\alpha + (2+2i)\alpha$$

$\alpha$ ,

所以

$$m_{\alpha}(\lambda) = \lambda^3 - 4\lambda^2 + (5 + 2i)\lambda - (2 + 2i);$$

又因为

$$\beta = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ i \end{bmatrix}, \mathcal{A}\beta = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ i \end{bmatrix}, \text{ 所以 } m_{\beta}(\lambda) = \lambda - 1.$$

注 当  $A$  是三阶方阵时, 若  $\alpha, \mathcal{A}\alpha, \mathcal{A}^2\alpha$  线性无关, 则  $A$  的特征多项式必为  $\alpha$  的最小零化子, 故

$$m_{\alpha}(\lambda) = |\lambda I - A|$$

31. 证明: 若  $\mathcal{A}^2$  有循环向量, 则  $\mathcal{A}$  也有循环向量; 反过来对吗?

证 设  $\alpha$  是  $\mathcal{A}^2$  的循环向量, 则

$$\begin{aligned} V \supset F[\mathcal{A}]\alpha &\supset \langle \alpha, \mathcal{A}\alpha, \mathcal{A}^2\alpha, \dots, \mathcal{A}^{2k-2}\alpha, \mathcal{A}^{2k-1}\alpha, \dots \rangle \\ &\supset \langle \alpha, \mathcal{A}^2\alpha, \dots, (\mathcal{A}^2)^{k-1}\alpha, \dots \rangle = V. \end{aligned}$$

(最后一个等号是因为已知  $\mathcal{A}^2$  有循环向量  $\alpha$ .)

所以  $F[\mathcal{A}]\alpha = V$ , 故  $\alpha$  也是  $\mathcal{A}$  的循环向量.

反过来不对. 如  $\mathcal{A}$  在自然基下方阵表示为  $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ , 则对任  $\alpha = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$ ,  $x_2 \neq 0$ , 有

$$\mathcal{A}\alpha = A\alpha = \begin{bmatrix} x_2 \\ 0 \end{bmatrix}, \text{ 故 } \alpha, \mathcal{A}\alpha \text{ 线性无关, 即}$$

$$F^{(2)} = \langle \alpha, A\alpha \rangle \quad (x_2 \neq 0 \text{ 的任 } \alpha \text{ 均为循环向量});$$

而因为  $A^2 = 0$ , 所以对任  $\alpha \in F^{(2)}$ , 都有  $\alpha, \mathcal{A}^2\alpha$  线性相关, 故  $\mathcal{A}^2$  无循环向量.

32. 设  $V$  是  $n$  维线性空间,  $\mathcal{A}$  为其线性变换, 且设  $\mathcal{A}$  可对角化 (即有对角形方阵表示). 证明: (1) 若  $\mathcal{A}$  有循环向量, 则  $\mathcal{A}$  有  $n$  个互异特征值. (2) 若  $\mathcal{A}$  有  $n$  个互异的特征值, 设  $\alpha_1, \dots, \alpha_n$  是它们相应的特征向量, 则  $\alpha_1 + \dots + \alpha_n$  是  $\mathcal{A}$  的循环向量.

证 由已知,  $\mathcal{A}$  可对角化则存在  $V$  的基, 使  $\mathcal{A}$  的方阵表示为

$$\begin{bmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{bmatrix}.$$

(1) 用反证法. 若  $\mathcal{A}$  有两个特征值相同, 不妨设  $\lambda_1 = \lambda_2$ , 则  $\mathcal{A}$  的极小多项式为

$$m(\lambda) = (\lambda - \lambda_2)(\lambda - \lambda_3) \cdots (\lambda - \lambda_n) = \lambda^{n-1} + c_{n-2}\lambda^{n-2} + \cdots + c_1\lambda + c_0,$$

即有

$$\mathcal{A}^{n-1} + c_{n-2}\mathcal{A}^{n-2} + \cdots + c_1\mathcal{A} + c_0I = 0,$$

所以对任  $\alpha \in V$ ,

$$m(\mathcal{A})\alpha = \mathcal{A}^{n-1}\alpha + c_{n-2}\mathcal{A}^{n-2}\alpha + \cdots + c_1\mathcal{A}\alpha + c_0\alpha = 0,$$

故  $\alpha, \mathcal{A}\alpha, \dots, \mathcal{A}^{n-1}\alpha$  线性相关.

于是知  $\mathcal{A}$  无循环向量, 与已知矛盾. 所以  $\mathcal{A}$  必有  $n$  个互异的特征值.

(2) 当  $\mathcal{A}$  有  $n$  个互异的特征值时, 设  $\mathcal{A}\alpha_i = \lambda_i\alpha_i, i = 1, 2, \dots, n$ , 则  $\alpha_1, \dots, \alpha_n$  是  $V$  的基. 令

$$\begin{aligned}
\alpha &= \alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_n, \\
\mathcal{A}\alpha &= \mathcal{A}(\alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_n) = \lambda_1\alpha_1 + \cdots + \lambda_n\alpha_n, \\
\mathcal{A}^2\alpha &= \lambda_1^2\alpha_1 + \cdots + \lambda_n^2\alpha_n \\
&\vdots \\
\mathcal{A}^{n-1}\alpha &= \lambda_1^{n-1}\alpha_1 + \cdots + \lambda_n^{n-1}\alpha_n.
\end{aligned}$$

显然,  $\alpha, \mathcal{A}\alpha, \dots, \mathcal{A}^{n-1}\alpha$  线性无关.

事实上,  $\alpha, \mathcal{A}\alpha, \dots, \mathcal{A}^{n-1}\alpha$  在基  $\alpha_1, \dots, \alpha_n$  上的坐标列排成的矩阵的行列式为  $n$  阶 Vandermonde 行列式. 即有

$$(\alpha, \mathcal{A}\alpha, \dots, \mathcal{A}^{n-1}\alpha) = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \begin{bmatrix} 1 & \lambda_1 & \cdots & \lambda_1^{n-1} \\ 1 & \lambda_2 & \cdots & \lambda_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & \lambda_n & \cdots & \lambda_n^{n-1} \end{bmatrix},$$

当  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$  互异时, 此行列式值非零. 于是知  $\alpha, \mathcal{A}\alpha, \dots, \mathcal{A}^{n-1}\alpha$  是  $V$  的基, 故  $\alpha = \alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_n$  是循环向量,  $V = F[\mathcal{A}]\alpha$ .

\*33. 设  $\mathcal{A}$  是  $n$  维线性空间  $V$  的线性变换, 有循环向量. 证明: 与  $\mathcal{A}$  可交换的  $V$  的任一线性变换  $\mathcal{B}$  必为  $\mathcal{A}$  的多项式.

证 方法 1 由已知  $\mathcal{A}$  有循环向量, 所以存在向量  $\alpha$ , 使

$$V = F[\mathcal{A}]\alpha = \langle \alpha, \mathcal{A}\alpha, \dots, \mathcal{A}^{n-1}\alpha \rangle.$$

对于与  $\mathcal{A}$  可交换的  $V$  的任一线性变换  $\mathcal{B}$ , 有  $\mathcal{B}\alpha$  可由循环基线性表出, 设为

$$\mathcal{B}\alpha = b_0\alpha + b_1\mathcal{A}\alpha + \cdots + b_{n-1}\mathcal{A}^{n-1}\alpha = f(\mathcal{A})\alpha,$$

其中  $f(\lambda) = b_0 + b_1\lambda + \cdots + b_{n-1}\lambda^{n-1}$ .

对任  $\beta \in V$ , 设  $\beta = x_1\alpha + x_2\mathcal{A}\alpha + \cdots + x_n\mathcal{A}^{n-1}\alpha = \sum_{k=1}^n x_k\mathcal{A}^{k-1}\alpha$ , 则有

$$\begin{aligned}
\mathcal{B}\beta &= \mathcal{B} \sum_{k=1}^n x_k\mathcal{A}^{k-1}\alpha = \sum_{k=1}^n x_k\mathcal{B}\mathcal{A}^{k-1}\alpha = \sum_{k=1}^n x_k\mathcal{A}^{k-1}\mathcal{B}\alpha \\
&= \sum_{k=1}^n x_k\mathcal{A}^{k-1}f(\mathcal{A})\alpha = f(\mathcal{A}) \sum_{k=1}^n x_k\mathcal{A}^{k-1}\alpha = f(\mathcal{A})\beta,
\end{aligned}$$

第 3 个等号是因为  $\mathcal{A}\mathcal{B} = \mathcal{B}\mathcal{A}$ , 从而  $\mathcal{A}^{k-1}\mathcal{B} = \mathcal{B}\mathcal{A}^{k-1}$ , 由于对一切  $\beta \in V$ , 有  $\mathcal{B}\beta = f(\mathcal{A})\beta$ ,

所以

$$\mathcal{B} = f(\mathcal{A}).$$

证毕.

方法 2 此题也可用矩阵的语言证明, 叙述如下:

由已知,  $\mathcal{A}$  有循环向量  $\alpha$  使  $\alpha, \mathcal{A}\alpha, \dots, \mathcal{A}^{n-1}\alpha$  为  $V$  的基,  $\mathcal{A}$  在此基下的方阵表示为

$$A = \begin{bmatrix} 0 & & & -c_0 \\ 1 & \ddots & & \vdots \\ & \ddots & 0 & -c_{n-2} \\ & & 1 & -c_{n-1} \end{bmatrix}.$$

$\alpha$  在此基下的坐标列为  $(1, 0, \dots, 0)^T$ , 记为  $\epsilon$ , 则

$$(\alpha, \mathcal{A}\alpha, \dots, \mathcal{A}^{n-1}\alpha) = (\alpha, \mathcal{A}\alpha, \dots, \mathcal{A}^{n-1}\alpha)(\epsilon, A\epsilon, \dots, A^{n-1}\epsilon),$$

而  $(\epsilon, A\epsilon, \dots, A^{n-1}\epsilon) = I$  (单位方阵), 于是对任一与  $\mathcal{A}$  可交换的线性变换  $\mathcal{B}$ , 设其在此循



环基下的方阵表示为  $B$ , 有  $AB=BA$ , 故

$$B = BI = B(\epsilon, A\epsilon, \dots, A^{n-1}\epsilon) = (B\epsilon, AB\epsilon, \dots, A^{n-1}B\epsilon),$$

设  $B=(b_{ij})$ , 则

$$B\epsilon = \begin{bmatrix} b_{11} \\ \vdots \\ b_{n1} \end{bmatrix} = b_{11}\epsilon + b_{21}A\epsilon + \dots + b_{n1}A^{n-1}\epsilon = \sum_{k=1}^n b_{k1}A^{k-1}\epsilon,$$

代入前式有

$$\begin{aligned} B &= \left( \sum_{k=1}^n b_{k1}A^{k-1}\epsilon, A \sum_{k=1}^n b_{k1}A^{k-1}\epsilon, \dots, A^{n-1} \sum_{k=1}^n b_{k1}A^{k-1}\epsilon \right) \\ &= \sum_{k=1}^n b_{k1}A^{k-1}(\epsilon, A\epsilon, \dots, A^{n-1}\epsilon) \\ &= \sum_{k=1}^n b_k A^{k-1}. \end{aligned}$$

所以  $B$  是  $A$  的多项式, 从而  $\mathcal{B}$  是  $\mathcal{A}$  的多项式.

34. 设  $\mathcal{A}$  是  $F$  上  $n$  维线性空间  $V$  的线性变换, 且设  $\mathcal{A}$  可对角化 (即在某基下方阵表示为对角形). 设  $\lambda_1, \dots, \lambda_s$  为其互异特征根,  $\lambda_i$  的特征子空间记为  $V_i$ ,  $d_i = \dim V_i$ .

(1) 证明每个向量  $\alpha$  可唯一表为  $\alpha = \beta_1 + \dots + \beta_s, \beta_i \in V_i$ ;

(2) 证明  $\alpha$  生成的循环子空间恰为  $\beta_1, \dots, \beta_s$  在  $F$  上张成的子空间;

(3) 证明  $\alpha$  的最小零化子为  $m_\alpha(\lambda) = \prod_{\beta_i \neq 0} (\lambda - \lambda_i)$ ;

(4) 取  $V_i$  的基  $\beta_{i1}, \dots, \beta_{id_i}$ , 记  $r = \max_i d_i$ , 取  $\alpha_1, \dots, \alpha_r$  如下:

$$\alpha_j = \sum_{d_i \geq j} \beta_{ij} \quad (1 \leq j \leq r),$$

证明  $\alpha_j$  生成的循环子空间  $F[\mathcal{A}]\alpha_j$  由  $\{\beta_{ij} \mid d_i \geq j\}$  张成, 且  $\alpha_j$  的最小零化子为

$$m_j(\lambda) = \prod_{d_i \geq j} (\lambda - \lambda_i);$$

(5) 证明  $V = F[\mathcal{A}]\alpha_1 \oplus \dots \oplus F[\mathcal{A}]\alpha_r$  是  $V$  的循环分解.

证 (1) 设在基  $\epsilon_1, \dots, \epsilon_n$  下  $\mathcal{A}$  的方阵表示为

$$A = \begin{bmatrix} \lambda_1 I & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_s I \end{bmatrix},$$

则  $V = V_1 \oplus \dots \oplus V_s$ , 其中  $V_i$  是  $\lambda_i$  的特征子空间. 故任  $\alpha \in V$ , 有唯一分解式

$$\alpha = \beta_1 + \dots + \beta_s, \text{ 其中 } \beta_i \in V_i.$$

(2) 方法 1 若对某  $\alpha$  其分解式中所有  $\beta_i$  均不为 0, 因为  $\beta_i$  分别属于不同的特征值, 所以  $\beta_1, \dots, \beta_s$  线性无关. 且由

$$\begin{aligned} \alpha &= \beta_1 + \dots + \beta_s, \\ \mathcal{A}\alpha &= \lambda_1\beta_1 + \dots + \lambda_s\beta_s, \\ &\vdots \\ \mathcal{A}^{s-1}\alpha &= \lambda_1^{s-1}\beta_1 + \dots + \lambda_s^{s-1}\beta_s. \end{aligned}$$

有

所以 
$$(\alpha, \mathcal{A}\alpha, \dots, \mathcal{A}^{s-1}\alpha) = (\beta_1, \dots, \beta_s) \begin{bmatrix} 1 & \lambda_1 & \cdots & \lambda_1^{s-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & \lambda_s & \cdots & \lambda_s^{s-1} \end{bmatrix},$$

因为右边方阵的行列式不为 0 (因  $\lambda_1, \dots, \lambda_s$  互异), 所以  $\alpha, \mathcal{A}\alpha, \dots, \mathcal{A}^{s-1}\alpha$  线性无关, 是  $\langle \beta_1, \dots, \beta_s \rangle$  中一组基.

所以 
$$\langle \alpha, \mathcal{A}\alpha, \dots, \mathcal{A}^{s-1}\alpha \rangle = \langle \beta_1, \dots, \beta_s \rangle.$$

若分解式中有某些  $\beta_i = 0$  时, 重新写为

$$\alpha = \beta_{i_1} + \cdots + \beta_{i_k}, \quad 1 \leq i_1 < \cdots < i_k \leq s, \quad \beta_{i_j} (\neq 0) \in V_{i_j}, \quad 1 < j < k,$$

则类似上述讨论, 仍得

$$\langle \alpha, \mathcal{A}\alpha, \dots, \mathcal{A}^{i_k-1}\alpha \rangle = \langle \beta_{i_1}, \dots, \beta_{i_k} \rangle = \langle \beta_1, \dots, \beta_s \rangle,$$

最后一个等号成立是因为仅仅加入 0 向量. (即把为 0 的  $\beta_i$  补入.)

方法 2 由任  $\alpha \in V$ , 可唯一表为  $\alpha = \beta_1 + \cdots + \beta_s$ , 其中  $\beta_i \in V_i$ , 知

$$\mathcal{A}\alpha = \mathcal{A}\beta_1 + \cdots + \mathcal{A}\beta_s = \lambda_1\beta_1 + \cdots + \lambda_s\beta_s,$$

故对任  $f(X) \in F[X]$ , 有

$$f(\mathcal{A})\alpha = f(\lambda_1)\beta_1 + \cdots + f(\lambda_s)\beta_s \in F\beta_1 + \cdots + F\beta_s,$$

故

$$F[\mathcal{A}]\alpha \subseteq F\beta_1 + \cdots + F\beta_s,$$

另一方面, 显然存在多项式  $f_i(\lambda) (1 \leq i \leq s)$ , 使  $f_i(\lambda_i) = 1, f_i(\lambda_j) = 0 (\forall j \neq i)$ , 故

$$\beta_i = f_i(\lambda_1)\beta_1 + \cdots + f_i(\lambda_i)\beta_i + \cdots + f_i(\lambda_s)\beta_s = f_i(\mathcal{A})\alpha \in F[\mathcal{A}]\alpha,$$

于是知

$$F\beta_1 + \cdots + F\beta_s \subseteq F[\mathcal{A}]\alpha, \text{ 所以 } F[\mathcal{A}]\alpha = \langle \beta_1, \dots, \beta_s \rangle.$$

(3) 记  $\alpha$  生成的循环子空间为  $W_\alpha$ , 则  $\mathcal{A}|_{W_\alpha}$  ( $\mathcal{A}$  在  $W_\alpha$  上的限制) 在基  $\alpha, \mathcal{A}\alpha, \dots, \mathcal{A}^{i_k-1}\alpha$  下的方阵为友阵形

$$\begin{bmatrix} 0 & & -c_0 \\ 1 & \ddots & \vdots \\ & 0 & -c_{n-2} \\ & 1 & -c_{n-1} \end{bmatrix},$$

故特征多项式  $f(\lambda) = m(\lambda) = m_\alpha(\lambda)$ , 而  $\mathcal{A}|_{W_\alpha}$  在基  $\beta_1, \dots, \beta_{i_k}$  下的方阵为对角阵

$$\begin{bmatrix} \lambda_{i_1} & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_{i_k} \end{bmatrix}, \quad 1 \leq i_1 < \cdots < i_k \leq s,$$

特征多项式为  $f(\lambda) = (\lambda - \lambda_1) \cdots (\lambda - \lambda_{i_k})$ ,

所以

$$m_\alpha(\lambda) = (\lambda - \lambda_1) \cdots (\lambda - \lambda_{i_k}) = \prod_{\beta_i \neq 0} (\lambda - \lambda_i).$$

(4) 取  $V_i$  的基  $\beta_{i1}, \dots, \beta_{id_i}, i = 1, 2, \dots, s$ , 则

$$\begin{array}{ccccccc} \beta_{11}, & \beta_{12}, & \cdots, & \beta_{1d_1} & (\in V_1) \\ \beta_{21}, & \beta_{22}, & \cdots, & \beta_{2d_2} & (\in V_2) \\ & & \vdots & & \\ \beta_{s1}, & \beta_{s2}, & \cdots, & \beta_{sd_s} & (\in V_s) \end{array}$$

是  $\mathcal{A}$  的  $n$  个线性无关的特征向量, 是  $V$  的基. 上表中各行的向量个数可能不同, 第一列向量相加记为  $\alpha_1$ , 第二列向量相加记为  $\alpha_2, \dots$ , 第  $r$  列相加记为  $\alpha_r$  ( $r = \max_i d_i$ ). 则由 (2) 的讨论知:  $\alpha_j$  生成的循环子空间  $F[\mathcal{A}]\alpha_j = \langle \beta_{1j}, \dots, \beta_{sj} \rangle = L\{\beta_{ij} \mid d_i \geq j\}$ .

如

$$\alpha_1 = \beta_{11} + \beta_{21} + \cdots + \beta_{s1},$$

$$F[\mathcal{A}]\alpha_1 = \langle \alpha_1, \mathcal{A}\alpha_1, \dots, \mathcal{A}^{s-1}\alpha_1 \rangle = \langle \beta_{11}, \beta_{21}, \dots, \beta_{s1} \rangle$$

$\alpha_1$  的最小零化子为

$$m_1(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2) \cdots (\lambda - \lambda_s).$$

对于其他的  $\alpha_j$  ( $j \geq 2$ ) 如 (2) 中第二种情况 (可能不是  $s$  个向量之和, 适当补入 0 向量之后, 即为 (2) 中所设), 所以仍有如  $\alpha_1$  类似的结论. 补入 0 后, 可写为  $\alpha_j = \beta_{1j} + \beta_{2j} + \cdots + \beta_{sj}$  (其中只有  $V_i$  的基的个数  $d_i \geq j$  时,  $\beta_{ij} \neq 0$ ), 所以有  $\alpha_j = \sum_{d_i \geq j} \beta_{ij}$  ( $1 \leq j \leq r$ ). 而  $\alpha_j$  的最小零化子

$$m_{\alpha_j}(\lambda) = \prod_{\beta_{ij} \neq 0} (\lambda - \lambda_i) = \prod_{d_i \geq j} (\lambda - \lambda_i). \quad \text{证毕.}$$

(5) 由 (4) 我们已知  $\{\beta_{ij} \mid i=1, \dots, s, 1 \leq j \leq d_i\}$  是  $V$  的基. 所以对任  $\alpha \in V$ , 有

$$\alpha = \sum_{i=1}^s \sum_{j=1}^{d_i} k_{ij} \beta_{ij} = \sum_{j=1}^r \sum_{d_i \geq j} k_{ij} \beta_{ij} = \sum_{j=1}^r \gamma_j,$$

其中

$$\gamma_j = \sum_{d_i \geq j} k_{ij} \beta_{ij} \in F[\mathcal{A}]\alpha_j.$$

又

$$F[\mathcal{A}]\alpha_j \cap F[\mathcal{A}]\alpha_l = 0 \quad (j \neq l),$$

所以

$$V = F[\mathcal{A}]\alpha_1 \oplus F[\mathcal{A}]\alpha_2 \oplus \cdots \oplus F[\mathcal{A}]\alpha_r.$$

**35.** 设  $\mathcal{A}$  为  $F^{(2)}$  上线性变换, 在自然基下方阵为  $\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ . 设  $\alpha_1 = (0, 1)^T$ , 证明  $F^{(2)} \neq F[\mathcal{A}]\alpha_1$ , 且对每个非 0 向量  $\alpha_2$ ,  $F[\mathcal{A}]\alpha_2$  与  $F[\mathcal{A}]\alpha_1$  总有非 0 交.

**证** 因为  $\alpha_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ ,  $\mathcal{A}\alpha_1 = A\alpha_1 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ , 所以  $\alpha_1, \mathcal{A}\alpha_1$  线性相关, 不能构成  $F^{(2)}$  的基, 于是  $\alpha_1$  不是  $F^{(2)}$  的循环向量, 即  $F^{(2)} \neq F[\mathcal{A}]\alpha_1$ , 显然有  $F[\mathcal{A}]\alpha_1 = F\alpha_1 = \langle \alpha_1 \rangle$ .

对任  $\alpha_2 \neq 0$ , 设  $\alpha_2 = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$ , 则  $\mathcal{A}\alpha_2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ x_1 \end{bmatrix}$ . 故当  $x_1 \neq 0$  时,  $F[\mathcal{A}]\alpha_2 = \langle \alpha_2, \mathcal{A}\alpha_2 \rangle = F^{(2)}$ ,

所以

$$F[\mathcal{A}]\alpha_2 \cap F[\mathcal{A}]\alpha_1 = F[\mathcal{A}]\alpha_1 = F\alpha_1.$$

而当  $x_1 = 0$ , 则  $x_2 \neq 0$  (因为  $\alpha_2 \neq 0$ ), 且  $\mathcal{A}\alpha_2 = 0$ , 所以  $F[\mathcal{A}]\alpha_2 = F\alpha_2 = F\alpha_1 = F[\mathcal{A}]\alpha_1$ , 仍有

$F[\mathcal{A}]_{\alpha_2} \cap F[\mathcal{A}]_{\alpha_1} = F\alpha_1$ . 故对任  $\alpha_2 \neq 0$ , 总有

$$F[\mathcal{A}]_{\alpha_2} \cap F[\mathcal{A}]_{\alpha_1} \neq \{0\}.$$

36. 设  $\mathcal{A}$  是  $F^{(4)}$  上线性变换, 在自然基  $\epsilon_1, \epsilon_2, \epsilon_3, \epsilon_4$  下方阵表示为

$$A = \begin{bmatrix} c & & & \\ 1 & c & & \\ & 1 & c & \\ & & 1 & c \end{bmatrix},$$

设  $W = \ker(\mathcal{A} - cI)$ .

(1) 证明  $W$  是由  $\epsilon_4$  张成的子空间  $F\epsilon_4$ ;

(2) 求  $\epsilon_i$  到  $W$  的导子  $C_{\epsilon_i/W} (i=4, 3, 2, 1)$ .

证 (1) 因为  $W = \ker(\mathcal{A} - cI) = \{\alpha \in F^{(4)} \mid (\mathcal{A} - cI)\alpha = 0\}$ , 即  $W$  是由  $\mathcal{A}$  的 (属于特征值  $c$  的) 特征向量构成, 解  $(A - cI)\alpha = 0$ , 得  $\alpha = \mu\epsilon_4, \mu \in F$ . 故

$$W = \langle \epsilon_4 \rangle = F\epsilon_4.$$

(2)  $W$  是  $\mathcal{A}$  的不变子空间 (因为任  $\alpha \in W, \mathcal{A}\alpha \in W$ ), 而  $\epsilon_4 \in W$ , 所以  $C_{\epsilon_4/W} = 1$ ;

又由  $\mathcal{A}$  在基  $\epsilon_1, \epsilon_2, \epsilon_3, \epsilon_4$  下的方阵表示为  $A$ , 知

$$A\epsilon_3 = \epsilon_3 + \epsilon_4 \rightarrow (A - cI)\epsilon_3 = \epsilon_4 \in W, \rightarrow C_{\epsilon_3/W} = \lambda - c;$$

$$A\epsilon_2 = \epsilon_2 + \epsilon_3 \rightarrow (A - cI)^2\epsilon_2 = \epsilon_4 \in W, \text{故 } C_{\epsilon_2/W} = (\lambda - c)^2;$$

$$A\epsilon_1 = \epsilon_1 + \epsilon_2 \rightarrow (A - cI)^3\epsilon_1 = \epsilon_4 \in W, \text{故 } C_{\epsilon_1/W} = (\lambda - c)^3.$$

37. 设  $\mathcal{A}$  是  $F$  上线性空间  $V$  的线性变换,  $V_1, \dots, V_r$  是  $\mathcal{A}$  的不变子空间且  $V = V_1 \oplus \dots \oplus V_r$ ,  $f(\lambda) \in F[\lambda]$  是  $F$  上多项式. 证明:  $fV = fV_1 \oplus \dots \oplus fV_r$  (注意对  $\alpha \in V, f\alpha = f(\mathcal{A}\alpha)$ ).

证 (1) 证  $fV_i \cap fV_j = \{0\}, (i \neq j)$ .

因  $V_i$  是  $\mathcal{A}$  的不变子空间, 从而  $V_i$  也是  $f(\mathcal{A})$  的不变子空间.

所以  $fV_i \subseteq V_i, fV_j \subseteq V_j$ ,

而  $V_i \cap V_j = \{0\}$ , 所以  $fV_i \cap fV_j = 0$ , 于是知

$fV_1 + \dots + fV_r$  是直和.

(2) 证  $fV = fV_1 \oplus \dots \oplus fV_r$ ,

任  $\alpha \in fV$ , 存在  $\beta \in V$ , 使  $\alpha = f(\mathcal{A})\beta$ . 又由  $V = V_1 \oplus \dots \oplus V_r$ , 知有唯一分解式

$$\beta = \beta_1 + \dots + \beta_r, \text{ 其中 } \beta_i \in V_i,$$

所以  $\alpha = f(\mathcal{A})\beta = f(\mathcal{A})(\beta_1 + \dots + \beta_r) = f(\mathcal{A})\beta_1 + \dots + f(\mathcal{A})\beta_r \in fV_1 \oplus \dots \oplus fV_r$ ,

(因为其中  $f(\mathcal{A})\beta_i \in fV_i$ ),

所以  $fV \subseteq fV_1 \oplus \dots \oplus fV_r$ .

又  $\forall \gamma \in fV_1 \oplus \dots \oplus fV_r$ , 有唯一分解式  $\gamma = \gamma_1 + \dots + \gamma_r$ , 其中  $\gamma_i \in fV_i$ , 故  $\exists \eta_i$ , 使  $f\eta_i = \gamma_i$ , 即有

$$\begin{aligned} \gamma &= \gamma_1 + \dots + \gamma_r = f\eta_1 + \dots + f\eta_r = f(\eta_1 + \dots + \eta_r) \\ &= f\eta \in fV. \quad (\eta = \eta_1 + \dots + \eta_r) \end{aligned}$$

故

$$fV_1 \oplus \dots \oplus fV_r \subseteq fV$$

所以得证.

38. 设  $\mathcal{A}$  是  $F$  上线性空间  $V$  的线性变换, 设  $\alpha, \beta \in V$  的最小零化子相同. 证明对于任意多项式  $f \in F[\lambda]$ ,  $f\alpha$  和  $f\beta$  的最小零化子相同.

证 设  $\alpha, \beta$  的最小零化子为  $m(\lambda)$ , 记  $\alpha_1 = f(\lambda)\alpha, \beta_1 = f(\lambda)\beta$ . 又设

$$(f, m) = d \quad \left( \text{由此得} \left( \frac{f}{d}, \frac{m}{d} \right) = 1 \right),$$

则

$$\alpha_1 = f(\lambda)\alpha = \frac{f}{d} d\alpha$$

的最小零化子必为  $\frac{m}{d}$

(1) 证  $\frac{m}{d}$  是  $\alpha_1$  的化零多项式.

因为 
$$\frac{m}{d}\alpha_1 = \frac{m}{d} \cdot \frac{f}{d} \cdot d\alpha = \frac{f}{d} \cdot m\alpha = 0.$$

(2) 证  $\frac{m}{d}$  是任  $(\alpha_1 \text{ 的})$  化零多项式的因式,

若  $0 = g\alpha_1 = gf\alpha$ , 则  $m \mid gf = g \cdot \frac{f}{d} \cdot d$ , 故  $\frac{m}{d} \mid g \cdot \frac{f}{d}$ , 又因  $\left( \frac{m}{d}, \frac{f}{g} \right) = 1$ , 所以  $\frac{m}{d} \mid g$ .

同理,  $\beta_1 = f\beta$  的最小零化子也为  $\frac{m}{d}$ , 得证.

39. 设  $\mathcal{A}$  为  $\mathbf{R}^{(3)}$  的线性变换, 在自然基下的方阵表示为:

$$\begin{bmatrix} 3 & -4 & -4 \\ -1 & 3 & 2 \\ 2 & -4 & -3 \end{bmatrix},$$

求出满足循环分解定理中的  $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ .

解 特征多项式为  $P_A(\lambda) = \det(\lambda I - A) = (\lambda - 1)^3$ , 极小多项式为  $m(\lambda) = (\lambda - 1)^2$ . 故  $\alpha_1$  的最小零化子应为  $m(\lambda)$ ,  $F[\mathcal{A}]\alpha_1$  是二维的, 于是  $F[\mathcal{A}]\alpha_2$  是一维的 (因为  $m_2 \mid m_1 = m$ , 所以  $m_2 = (\lambda - 1)$ , 而  $P_A(\lambda) = m_1 \cdot m_2$ ) 所以  $\alpha_2$  应为  $\mathcal{A}$  的属于特征值 1 的特征向量. 而  $\alpha_1$  不是特征向量即可. 取  $\alpha_1 = \epsilon_1 = (1, 0, 0)^T$  试之, 得  $\mathcal{A}\alpha_1 = (3, -1, 2)^T$  与  $\alpha_1$  线性无关, 故可取  $\alpha_1 = \epsilon_1$ , 因为  $F[\mathcal{A}]\alpha_1 \cap F[\mathcal{A}]\alpha_2 = 0$ , 所以  $\alpha_2 \notin F[\mathcal{A}]\alpha_1$ , 解  $(\lambda I - A)x = 0$ , 得  $x^{(1)} = (2, 1, 0)^T, x^{(2)} = (2, 0, 1)^T$  为基础解系, 特征子空间  $V_1 = \mathbf{R}x^{(1)} + \mathbf{R}x^{(2)}$ . 取  $\alpha_2 = (2, 1, 0)^T$  即可.  $\mathcal{A}$  在  $\alpha_1, \mathcal{A}\alpha_1, \alpha_2$  下的方阵表示为

$$B = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

40. 证明: 域  $F$  上 3 阶方阵  $A$  与  $B$  相似的充分必要条件为  $A$  与  $B$  有相同的特征多项式和最小多项式. 举例说明这对 4 阶方阵是不对的.

证 必要性显然. 即当  $A$  与  $B$  相似时, 它们的特征多项式和最小多项式相同.

充分性: 因为  $A$  与  $B$  特征多项式相同, 所以特征值同. 设为  $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ . 又最小多项式相同, 当  $m(\lambda)$  为单因子之积 (即极小多项式无重根) 时, 则

$$A \sim \begin{bmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \lambda_3 \end{bmatrix} \sim B;$$

当  $m(\lambda)$  有二重根, 不妨设为  $m(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2)^2$ , 则

$$A \sim \begin{bmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & 1 \\ & & \lambda_2 \end{bmatrix} \sim B;$$

当  $m(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^3$ , 即有三重根, 则

$$A \sim \begin{bmatrix} \lambda_1 & 1 & \\ & \lambda_1 & 1 \\ & & \lambda_1 \end{bmatrix} \sim B.$$

对于 3 阶方阵, 当特征值确定后, 它的极小多项式只有上述三种情况, 而对每种情况, 只对应一种相似标准形 (Jordan 形), 所以我们可以得出  $A$  相似于  $B$ .

但对于 4 阶方阵, 当  $A$  与  $B$  的特征值相同, 且极小多项式相同时, 可能有不同的相似标准形, 因此不能保证  $A$  与  $B$  相似. 如当  $m(\lambda)$  有二重根, 设  $m(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^2$ , 可有

$$A \sim \begin{bmatrix} \lambda_1 & 1 & & \\ & \lambda_1 & & \\ & & \lambda_1 & 1 \\ & & & \lambda_1 \end{bmatrix}, B \sim \begin{bmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_1 & & \\ & & \lambda_1 & 1 \\ & & & \lambda_1 \end{bmatrix}.$$

显然有  $A$  不相似于  $B$ .

**41.** 设数域  $K$  包含域  $F$ ,  $A$  与  $B$  为  $F$  上  $n$  阶方阵. 证明: 若  $A, B$  在  $K$  上相似, 则  $A, B$  在  $F$  上相似. (提示: 证明方阵的有理标准形不依赖于  $K$  或  $F$ ).

**证** 方法 1 此题用定理 7.14 系 1: 方阵  $A$  与方阵  $B$  相似  $\Leftrightarrow A$  与  $B$  的不变因子组相同. 而不变因子不因考虑域的不同而变化, 只由  $\lambda I - A$  的元素做加、减、乘得到. 或者叙述为: 若  $A$  与  $B$  在  $K$  上相似, 则它们的不变因子组相同, 而不变因子是  $F$  上多项式, 所以  $A$  与  $B$  在  $F$  上不变因子组同, (再用充分性) 故  $A$  与  $B$  在  $F$  上相似.

方法 2 若  $A$  与  $B$  在  $K$  上相似, 则它们的有理标准形相同, 即

$$A \sim \begin{bmatrix} c(d_1) & & \\ & \ddots & \\ & & c(d_r) \end{bmatrix} \sim B,$$

其中  $d_1, \dots, d_r$  为  $A$  (或  $B$ ) 的不变因子组,  $c(d_i)$  为  $d_i$  的友阵.  $d_i$  是  $F$  上多项式 (因  $d_i$  是  $\lambda I - A$  的元素作加、减、乘、带余除法而得) 所以  $A$  与  $B$  在  $F$  上也有如上的有理标准形, 故  $A$  与  $B$  在  $F$  上也相似.

**42.** 设  $A$  为复方阵, 若  $A$  的每个特征值均为实数, 则  $A$  相似于实方阵.

**证** 若  $A$  的特征值均为实数, 设其互异的特征值为  $\lambda_1, \dots, \lambda_s$ , 则  $A$  的特征多项式和极小多项式分别为

$$f(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{n_1} \cdots (\lambda - \lambda_s)^{n_s}, \quad \left( \sum_{i=1}^s n_i = n \right),$$

$$m(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{r_1} \cdots (\lambda - \lambda_s)^{r_s}, (r_i \leq n_i, i = 1, \cdots, s).$$

故  $f(\lambda), m(\lambda)$  均为实系数多项式. 记  $A$  的不变因子为  $d_1, \cdots, d_r$ , 则  $d_r = m(\lambda)$ ,  $d_{r-1} | d_r, \cdots, d_1 | d_2$ , 所以  $d_1, \cdots, d_r$  均是  $\mathbf{R}$  上的多项式. 而  $A$  的有理标准形为

$$\begin{bmatrix} c(d_1) & & \\ & \ddots & \\ & & c(d_r) \end{bmatrix},$$

其中  $c(d_i)$  是  $d_i$  的友阵, 其元素均为实数. 所以  $A$  相似于实方阵.

**43.** 设  $\mathcal{A}$  是有限维线性空间  $V$  的线性变换. 证明:  $V$  中有向量  $\alpha$  具有如下性质: 对任一多项式  $f$ , 若  $f(\mathcal{A})\alpha = 0$  则  $f(\mathcal{A}) = 0$  (此种向量  $\alpha$  称为分离向量). 再证明: 若  $\mathcal{A}$  有循环向量, 则循环向量是分离向量.

**证** 由定理 7.8, 取  $\alpha_1$  使  $c_1 = C_{\alpha_1/0}$  的次数取得最大值. 则  $\alpha_1$  的最小零化子  $m_1 = \mathcal{A}$  的极小多项式  $m(\lambda)$ , 故任  $f(\lambda) \in F[\lambda]$ , 若  $f(\mathcal{A})\alpha = 0$ , 则有  $m_1(\lambda) | f(\lambda)$ , 也即  $m(\lambda) | f(\lambda)$ , 所以  $f(\mathcal{A}) = 0$ .

若  $\alpha$  是循环向量, 则  $F[\mathcal{A}]\alpha = V$ , 所以  $\alpha$  的最小零化子  $m_\alpha(\lambda) = \mathcal{A}$  的极小多项式  $m(\lambda)$ .

若  $f(\mathcal{A})\alpha = 0 \Rightarrow m_\alpha(\lambda) | f(\lambda) \Leftrightarrow m(\lambda) | f(\lambda) \Rightarrow f(\mathcal{A}) = 0$ . 即当  $\alpha$  是循环向量时, 它的任一化零多项式都是线性变换  $\mathcal{A}$  的化零多项式.

**44.** 设  $A$  为数域  $F$  上  $n$  阶方阵,  $m(\lambda)$  为  $A$  的最小多项式. 若视  $A$  为  $\mathbf{C}$  上方阵, 则  $A$  有复数域上最小多项式  $m^*(\lambda)$ . 用线性方程组理论证明  $m = m^*$ . 这是否也可由循环分解得到?

**证** 设  $m^*(\lambda) = \lambda^k + b_{k-1}\lambda^{k-1} + \cdots + b_1\lambda + b_0, b_i \in \mathbf{C}$ , 则

$$A^k + b_{k-1}A^{k-1} + \cdots + b_1A + b_0I = 0. \quad (*)$$

用  $a_{ij}^l$  表  $A^l$  的  $(i, j)$  位元素, 则上式左边方阵第  $(i, j)$  位元素为

$$a_{ij}^k + b_{k-1}a_{ij}^{k-1} + \cdots + b_0a_{ij}^0, \quad \left( a_{ij}^0 = \delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases} \right),$$

于是,  $(*)$  式说明  $n^2$  个方程,  $k$  个未知量的齐次线性方程组

$$\begin{cases} x_k a_{ij}^k + x_{k-1} a_{ij}^{k-1} + \cdots + x_1 a_{ij}^1 + x_0 a_{ij}^0 = 0 \\ i, j = 1, \cdots, n \end{cases},$$

有非零解  $(1, b_{k-1}, \cdots, b_1, b_0)^T$ . 但由于此线性方程组系数属于  $F$ , 所以应有  $F$  上解  $(1, a_{k-1}, \cdots, a_0)^T$ ,

即

$$A^k + a_{k-1}A^{k-1} + \cdots + a_0I = 0$$

也就是说, 多项式  $f(\lambda) = \lambda^k + a_{k-1}\lambda^{k-1} + \cdots + a_1\lambda + a_0$  是  $A$  的 (在  $F$  上的) 化零多项式, 故  $m(\lambda) | f(\lambda)$ , 所以  $\deg m(\lambda) \leq k = \deg m^*(\lambda)$ . 又在复数域  $\mathbf{C}$  上,  $m(\lambda)$  也是  $A$  的化零多项式, 所以又有  $m^*(\lambda) | m(\lambda)$ , 且它们均首一, 故  $m(\lambda) = m^*(\lambda)$ .

这也可以由循环分解得到. 把  $A$  看成是  $F^{(n)}$  上的线性变换  $\mathcal{A}$  在自然基下的矩阵, 则

$$F^{(n)} = F[\mathcal{A}]\alpha_1 \oplus \cdots \oplus F[\mathcal{A}]\alpha_r = V_1 \oplus \cdots \oplus V_r,$$

其中  $V_1 = F[\mathcal{A}]\alpha_1$  是由  $\alpha_1 \in F^{(n)}$  生成的非 0 循环子空间.  $\mathcal{A}_1 = \mathcal{A}|_{V_1}$  的最小多项式  $m_1 = m(\lambda)$  (即  $\mathcal{A}$  的最小多项式), 它是由  $\mathcal{A}$  唯一决定的 (是  $\mathcal{A}$  的不变因子中次数最高的一个), 不随域的扩大而改变, 所以  $m^* = m$ .

45. 设  $A$  为  $n$  阶实方阵且  $A^2 + I = 0$ . 证明:  $n$  为偶数且在  $\mathbf{R}$  上相似于  $\begin{bmatrix} O & -I_k \\ I_k & O \end{bmatrix}$ , 其中  $k = n/2$ .

证 由已知  $A^2 + I = 0$ , 知  $A$  的极小多项式  $m(\lambda) = \lambda^2 + 1$ , 于是由定理 7.8 知 ( $A$  的有理标准形为)

$$A \sim \begin{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} & & \\ & \ddots & \\ & & \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \end{bmatrix}_n \sim \begin{bmatrix} & & \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \\ & \ddots & \\ \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} & & \end{bmatrix}_n \sim \begin{bmatrix} O & -I_k \\ I_k & O \end{bmatrix}_n.$$

其中第一个“ $\sim$ ”是用循环分解定理; 第二个“ $\sim$ ”是前后乘初等方阵  $P_{1,n-1}, P_{3,n-3}, P_{5,n-5}, \dots$ , (这里用到  $P_{ij}^{-1} = P_{ij}$ ); 第三个“ $\sim$ ”是继续在前面的方阵前后乘初等方阵  $P_{2,n-2}, P_{4,n-4}, \dots$ , 最后得到可逆阵  $P$ , 使

$$P^{-1}AP = \begin{bmatrix} O & -I_k \\ I_k & O \end{bmatrix}_n.$$

46. 设  $F$  为数域,  $\mathcal{A}$  为  $F^{(4)}$  的线性变换, 在自然基下方阵表示为:

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & a & 2 & 0 \\ 0 & 0 & b & 2 \end{bmatrix},$$

求  $\mathcal{A}$  的特征多项式. 分别对情形  $a=b=1; a=b=0; a=0, b=1$  求  $\mathcal{A}$  的最小多项式及满足循环分解定理的  $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ .

解  $\mathcal{A}$  的特征多项式  $f(\lambda) = |\lambda I - A| = (\lambda - 2)^4$ .

(1) 当  $a=b=1$  时,  $\mathcal{A}$  在自然基下的方阵表示

$$A = \begin{bmatrix} 2 & & & \\ 1 & 2 & & \\ & 1 & 2 & \\ & & 1 & 2 \end{bmatrix},$$

$\mathcal{A}$  的极小多项式  $m(\lambda) = (\lambda - 2)^4$ . 这时  $\alpha_1 = (1, 0, 0, 0)^T$  是循环向量.  $F[\mathcal{A}]\alpha_1 = F^{(4)}$ , 即  $F^{(4)}$  为循环空间.

$$\alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \mathcal{A}\alpha_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \mathcal{A}^2\alpha_1 = \begin{bmatrix} 4 \\ 4 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \mathcal{A}^3\alpha_1 = \begin{bmatrix} 8 \\ 12 \\ 6 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

显然  $\alpha_1, \mathcal{A}\alpha_1, \mathcal{A}^2\alpha_1, \mathcal{A}^3\alpha_1$  线性无关, 而  $\mathcal{A}^4\alpha_1 = (16, 32, 24, 8)^T = 8\mathcal{A}^3\alpha_1 - 24\mathcal{A}^2\alpha_1 + 32\mathcal{A}\alpha_1 - 6\alpha_1$ , 所以  $\mathcal{A}$  在基  $\alpha_1, \mathcal{A}\alpha_1, \mathcal{A}^2\alpha_1, \mathcal{A}^3\alpha_1$  下的方阵表示为



$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -6 \\ 1 & 0 & 0 & 32 \\ 0 & 1 & 0 & -24 \\ 0 & 0 & 1 & 8 \end{bmatrix}.$$

(2)  $a=b=0$  时,  $\mathcal{A}$  在自然基  $\epsilon_1, \epsilon_2, \epsilon_3, \epsilon_4$  下的方阵表示为

$$\begin{bmatrix} 2 & & & \\ 1 & 2 & & \\ & & 2 & \\ & & & 2 \end{bmatrix},$$

$\mathcal{A}$  的极小多项式  $m(\lambda) = (\lambda-2)^2$ . 取  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  如下,

$$\alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \mathcal{A}\alpha_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \alpha_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \alpha_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix},$$

显然  $\alpha_1, \mathcal{A}\alpha_1$  生成二维循环子空间,  $\alpha_2, \alpha_3$  各生成一维子空间,  $\alpha_1, \mathcal{A}\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性无关.

$\mathcal{A}^2\alpha_1 = -4\alpha_1 + 4\mathcal{A}\alpha_1 = (4, 4, 0, 0)^T$ . 所以  $\mathcal{A}$  在基  $\alpha_1, \mathcal{A}\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  下的方阵为

$$\begin{bmatrix} 0 & -4 & & \\ 1 & 4 & & \\ & & 2 & \\ & & & 2 \end{bmatrix}.$$

(3) 当  $a=0, b=1$  时,  $\mathcal{A}$  在自然基  $\epsilon_1, \epsilon_2, \epsilon_3, \epsilon_4$  下的方阵表示为

$$\begin{bmatrix} 2 & & & \\ 1 & 2 & & \\ & & 2 & \\ & & 1 & 2 \end{bmatrix},$$

$\mathcal{A}$  的极小多项式为  $m(\lambda) = (\lambda-2)^2$ . 取  $\alpha_1 = \epsilon_1, \alpha_2 = \epsilon_3$ , 则

$$\alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \mathcal{A}\alpha_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \alpha_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \mathcal{A}\alpha_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix},$$

$F[\mathcal{A}]\alpha_1$  与  $F[\mathcal{A}]\alpha_2$  都是二维循环子空间.  $\mathcal{A}$  在基  $\alpha_1, \mathcal{A}\alpha_1, \alpha_2, \mathcal{A}\alpha_2$  下的方阵表示为

$$\begin{bmatrix} 0 & -4 & & \\ 1 & 4 & & \\ & & 0 & -4 \\ & & 1 & 4 \end{bmatrix}.$$

47. 设  $\mathcal{A}$  是域  $F$  上  $n$  维线性空间  $V$  的线性变换. 证明:  $V$  中每个非 0 向量均为循环向量的充分必要条件为  $\mathcal{A}$  的特征多项式在  $F$  上不可约.

证  $\Leftarrow$  (充分性) 若  $\mathcal{A}$  的特征多项式  $f(\lambda)$  不可约, 则由定理 7.8 知, 其中只能  $r=1$ , 即

对任  $\alpha \in V$  ( $\alpha \neq 0$ ), 其最小零化子  $m_\alpha(\lambda) = f(\lambda)$ ,  $F[\mathcal{A}]\alpha = V$ . (因为  $\deg m_\alpha(\lambda) = \deg f(\lambda) = n$ , 所以  $\alpha, \mathcal{A}\alpha, \dots, \mathcal{A}^{n-1}\alpha$  线性无关是  $V$  的基.)

$\Rightarrow$  (必要性) 用反证法. 若  $\mathcal{A}$  的特征多项式  $f(\lambda)$  可约. 设  $f = f_1 f_2$ , 于是对任  $\alpha \in V$ , 有

$$0 = f(\mathcal{A})\alpha = f_1(\mathcal{A})(f_2(\mathcal{A})\alpha) = f_1(\mathcal{A})\beta,$$

则  $\beta = f_2(\mathcal{A})\alpha$  以  $f_1(\lambda)$  为化零多项式, 于是  $\beta$  不是循环向量, 与已知矛盾. (若  $\beta = 0$ , 由  $f_2(\mathcal{A})\alpha = 0$ , 说明  $\alpha$  不是循环向量), 所以  $f$  必不可约.

**48.** 设  $A$  为  $n$  阶实方阵.  $\mathcal{A}$  为  $\mathbf{R}^{(n)}$  的线性变换,  $\mathcal{T}$  为  $\mathbf{C}^{(n)}$  的线性变换, 二者在各自空间自然基下的方阵表示同为  $A$ . 证明: 若  $\mathcal{A}$  的不变子空间只有  $\mathbf{R}^{(n)}$  和  $0$ , 则  $\mathcal{T}$  可对角化.

**证** 因  $\mathcal{A}$  的不变子空间只有  $\mathbf{R}^{(n)}$  和  $0$ , 故  $f(\lambda) = \det(\lambda I - A)$  在  $\mathbf{R}$  上不可约 (因  $\mathbf{R}^{(n)}$  的每个非  $0$  向量  $\alpha$  生成一个不变子空间  $\mathbf{R}[\mathcal{A}]\alpha$ , 由已知  $\mathbf{R}[\mathcal{A}]\alpha$  只能为  $\mathbf{R}^{(n)}$ , 所以  $\alpha$  是循环向量, 故由 47 题知  $f(\lambda)$  不可约).

所以  $f(\lambda)$  在  $\mathbf{C}$  中有互异复根, 故  $\mathcal{T}$  可对角化. (由  $f(\lambda)$  是实系数多项式知它的复根共轭存在. 因此, 若有  $\lambda_1 = \lambda_2$  为  $f(\lambda)$  的根, 则  $\bar{\lambda}_1 = \bar{\lambda}_2$  也是  $f(\lambda)$  的根, 于是  $f(x)$  含  $[(\lambda - \lambda_1)(\lambda - \bar{\lambda}_1)]^2$  与  $f(x)$  在  $\mathbf{R}$  上不可约矛盾.)

**49.** 设复方阵

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ a & 2 & 0 \\ b & c & -1 \end{bmatrix},$$

证明  $A$  相似于对角形当且仅当  $a = 0$ .

**证**  $P_A(\lambda) = \det(\lambda I - A) = (\lambda - 2)^2(\lambda + 1)$ , 故特征值为  $\lambda_{1,2} = 2, \lambda_3 = -1$ .

因  $A$  相似对角阵  $\Leftrightarrow A$  有 3 个线性无关的特征向量  $\Leftrightarrow \dim V_{\lambda=2} = 2 \Leftrightarrow \dim \ker(2I - A) = 3 - r(2I - A) = 2 \Leftrightarrow r(2I - A) = 1 \Leftrightarrow a = 0$ .

由 
$$(2I - A) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -a & 0 & 0 \\ -b & -c & 3 \end{bmatrix},$$

知 
$$r(2I - A) = 1 \Leftrightarrow a = 0.$$

**50.** 设  $N_1$  和  $N_2$  是域  $F$  上 3 阶幂零方阵. 证明:  $N_1$  与  $N_2$  相似当且仅当它们的最小多项式相同.

**证**  $N_1$  与  $N_2$  的特征多项式相同均为  $f(\lambda) = \lambda^3$ , 所以  $\lambda = 0$ . 又因为三阶幂零方阵的 Jordan 标准形只有三种可能:

$$J_1 = \begin{bmatrix} 0 & & \\ 1 & 0 & \\ & & 0 \end{bmatrix}, J_2 = \begin{bmatrix} 0 & & \\ 1 & 0 & \\ & 1 & 0 \end{bmatrix}, J_3 = \begin{bmatrix} 0 & & \\ & 0 & \\ & & 0 \end{bmatrix},$$

它们的极小多项式分别为  $m(\lambda) = \lambda^2, m(\lambda) = \lambda^3, m(\lambda) = \lambda$ .

所以  $N_1 \sim N_2 \Leftrightarrow N_1$  与  $N_2$  的 Jordan 标准形同  $\Leftrightarrow N_1$  与  $N_2$  的极小多项式. 证毕.

**51.** 设  $A$  与  $B$  为域  $F$  上  $n$  阶方阵, 有相同的特征多项式  $f = (\lambda - \lambda_1)^{d_1} \cdots (\lambda - \lambda_s)^{d_s}$ , 也有相同的最小多项式. 证明若  $d_i \leq 3 (1 \leq i \leq s)$ , 则  $A$  与  $B$  相似.

**证** 记  $A$  与  $B$  的极小多项式为  $m(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{r_1} \cdots (\lambda - \lambda_s)^{r_s}$ , 其中  $r_i \leq d_i$ , 并设  $A, B$

的 Jordan 标准形分别为

$$J_1 = \begin{bmatrix} J_{11}(\lambda_1) & & \\ & \ddots & \\ & & J_{1s}(\lambda_s) \end{bmatrix}, J_2 = \begin{bmatrix} J_{21}(\lambda_1) & & \\ & \ddots & \\ & & J_{2s}(\lambda_s) \end{bmatrix},$$

由  $A$  与  $B$  的特征多项式相同, 极小多项式相同, 知  $J_{1i}(\lambda_i)$  与  $J_{2i}(\lambda_i)$  的阶数相同, 特征多项式相同, 极小多项式相同, 所以当  $d_i \leq 3$  时  $J_{1i}(\lambda_i)$  与  $J_{2i}(\lambda_i)$  相似 ( $i=1, \dots, s$ ). 事实上, 当  $d_i \leq 3$ , 极小多项式决定了 Jordan 块. 若  $d_i=3$ , 如 50 题; 若  $d_i=2$ , Jordan 块只有两种  $\begin{bmatrix} \lambda_i & \\ 1 & \lambda_i \end{bmatrix}$  和  $\begin{bmatrix} \lambda_i & \\ & \lambda_i \end{bmatrix}$ , 分别对应极小多项式  $(\lambda - \lambda_i)^2$  和  $(\lambda - \lambda_i)$ .

故  $J_1 \sim J_2 \Rightarrow A \sim B$ . 证毕.

52. 若 5 阶复方阵  $A$  的特征多项式为  $f = (\lambda - 2)^3 \cdot (\lambda + 7)^2$ , 最小多项式为  $m = (\lambda - 2)^2(\lambda + 7)$ , 求  $A$  的 Jordan 标准形.

解 由已知  $\lambda=2$  (三重根),  $\lambda=-7$  (二重) 为  $A$  的特征值, 故  $A$  的 Jordan 标准形中相对  $\lambda=2$  的子阵 (记为  $J_3(2)$ ) 为 3 阶, 相对  $\lambda=-7$  的子阵 ( $J_2(-7)$ ) 为 2 阶. 又由  $m(\lambda) = (\lambda - 2)^2(\lambda + 7)$ , 知  $J_3(2)$  中最大的 Jordan 块为 2 阶,  $J_2(-7)$  中最大的 Jordan 块是一阶. 即

$$A \sim \begin{bmatrix} J_3(2) & \\ & J_2(-7) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & & & & \\ 1 & 2 & & & \\ & & 2 & & \\ & & & -7 & \\ & & & & -7 \end{bmatrix}.$$

53. 若 6 阶复方阵  $A$  的特征多项式为  $f = (\lambda + 2)^4 \cdot (\lambda - 1)^2$ , 那么  $A$  的 Jordan 标准形有几种可能? (不计子块次序)

解 由已知得  $A$  的 Jordan 标准形中是两大块, 其中对应  $\lambda = -2$  的一大块是 4 阶方阵, 记为  $J_4(-2)$ ; 对应  $\lambda = 1$  的一大块是 2 阶方阵, 记为  $J_2(1)$ . 即

$$A \sim \begin{bmatrix} J_4(-2) & \\ & J_2(1) \end{bmatrix}.$$

$J_4(-2)$  有 5 种可能: ① 4 个 1 阶块即  $J_4(-2)$  为对角阵; ② 两个 1 阶块, 1 个 2 阶 Jordan 块; ③ 两个 2 阶块; ④ 一个 1 阶块, 一个 3 阶块; ⑤ 一个 4 阶块.  $J_2(1)$  有两种可能: ① 两个 1 阶块, 即  $J_2(1)$  为对角阵; ② 一个 2 阶 Jordan 块.

所以  $A$  的 Jordan 标准形有  $5 \times 2 = 10$  种可能.

54. 次数小于等于 3 的复系数多项式全体  $\mathbf{C}[X]_3$  是  $\mathbf{C}$  上线性空间, 求导变换  $\mathcal{D}$  的方阵表示  $D$  的若当标准形是什么?

解 取  $\mathbf{C}[X]_3$  的基  $\frac{1}{6}x^3, \frac{1}{2}x^2, x, 1$ , 则

$$\mathcal{D} \frac{1}{6}x^3 = \frac{1}{2}x^2, \quad \mathcal{D} \frac{1}{2}x^2 = x, \quad \mathcal{D}x = 1, \quad \mathcal{D}1 = 0,$$

于是  $\mathcal{D}$  在此基下的方阵表示为

$$J = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix},$$

这就是  $D$  的 Jordan 标准形, 显然  $D$  的特征值为 0,  $\mathcal{D}$  是幂零变换.

55. 设复方阵

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix},$$

求  $A$  在  $\mathbf{C}$  上 Jordan 标准形. 在  $\mathbf{R}$  或  $\mathbf{Q}$  上呢?

解 方法 1 由方阵  $A$  的特征多项式  $f(\lambda) = (\lambda - 2)^5(\lambda + 1)$ ,

所以知  $A \sim \begin{bmatrix} J_5(2) & \\ & J_1(-1) \end{bmatrix}$ ,

其中  $J_5(2)$  是 5 阶子阵,  $J_1(-1)$  是一阶子阵.

又因为

$$r(2I - A) = 4,$$

所以

$$\dim V_2 = 6 - 4 = 2,$$

即属于特征值  $\lambda = 2$  的特征子空间是 2 维的, 故  $J_5(2)$  中有两个若当块, 则只有两种可能:

1 阶与 4 阶各一个或 2 阶, 3 阶各一个. 再看

$$r(2I - A)^2 = r \begin{bmatrix} 0 & & & & & \\ 1 & 0 & & & & \\ -1 & 0 & 0 & & & \\ 0 & 1 & 0 & 0 & & \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 4 \end{bmatrix}^2 = r \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 4 & 16 \end{bmatrix} = 3,$$

故  $r(2I - J) - r(2I - J)^2 = r(2I - A) - r(2I - A)^2 = 4 - 3 = 1$ , 说明  $J_5(2)$  中阶数  $> 1$  的 Jordan 块只有一个. 所以  $J_5(2)$  是由一个 1 阶块和一个 4 阶块组成, 即

$$J_5(2) = \begin{bmatrix} 2 & & & & \\ & 2 & & & \\ & 1 & 2 & & \\ & & 1 & 2 & \\ & & & 1 & 2 \end{bmatrix}, \quad J_1(-1) = -1.$$

又因为  $A$  的特征值  $2, -1 \in \mathbf{Q} \subset \mathbf{R}$ , 所以在  $\mathbf{R}$  和  $\mathbf{Q}$  上  $A$  的 Jordan 标准形仍为

$$J = \begin{bmatrix} J_5(2) & \\ & J_1(-1) \end{bmatrix}.$$

$J_5(2), J_1(-1)$  同前.

方法 2 对  $(\lambda I - A)$  做初等变换化为对角阵, 确定  $A$  的不变因子.

$$\begin{aligned}
 \lambda I - A &= \begin{bmatrix} \lambda-2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & \lambda-2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & \lambda-2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & \lambda-2 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & -1 & -1 & \lambda-2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & \lambda+1 \end{bmatrix} \\
 &\xrightarrow{\textcircled{1}} \begin{bmatrix} 0 & 0 & -(\lambda-2)^2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda-2 & \lambda-2 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & \lambda-2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & \lambda-2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & \lambda-3 & -1 & \lambda-2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & \lambda+1 \end{bmatrix} \\
 &\xrightarrow{\textcircled{2}} \begin{bmatrix} 0 & 0 & -(\lambda-2)^2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda-2 & (\lambda-2)^2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & \lambda-2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda-3 & 1-\lambda & \lambda-2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & \lambda+1 \end{bmatrix} \\
 &\xrightarrow{\textcircled{3}} \begin{bmatrix} 1 & & & & & \\ & 1 & & & & \\ & & -(\lambda-2)^2 & & & \\ & & \lambda-2 & (\lambda-2)^2 & & \\ & & \lambda-3 & 1-\lambda & \lambda-2 & \\ & & & & -1 & \lambda+1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & & & & & \\ & 1 & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & A_4 \end{bmatrix}.
 \end{aligned}$$

- ① 做的是  $-(\lambda-2)r_3 + r_1, r_3 + r_1, r_3 + r_5$ , 把第一列除  $b_{31}$  以外的元素打成 0;  
 ②  $-(\lambda-3)c_1 + c_3, (\lambda-2)r_4 + r_2, -r_4 + r_5$ ; ③  $r_3 \leftrightarrow r_1, (\lambda-2)c_2 + c_4, r_2 \leftrightarrow -r_4$ ; 这里  $r_i$  表示第  $i$  行,  $c_j$  表示第  $j$  列. 继续化  $A_4$

$$\begin{aligned}
 A_4 &\xrightarrow{\textcircled{4}} \begin{bmatrix} 0 & (\lambda-2)^3 & 0 & 0 \\ \lambda-2 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & -(\lambda-2)^2 - 1 & \lambda-2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & \lambda+1 \end{bmatrix} \\
 &\xrightarrow{\textcircled{5}} \begin{bmatrix} 0 & (\lambda-2)^3 & 0 & 0 \\ 0 & -(\lambda-2) & (\lambda-2)^2 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & \lambda+1 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\xrightarrow{\textcircled{6}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -(\lambda-2) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & (\lambda-2)^4 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & \lambda+1 \end{bmatrix} \\ &\xrightarrow{\textcircled{7}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda-2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & (\lambda-2)^4(\lambda+1) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

以上各步做的初等变换分别为: ④  $(\lambda-2)r_2+r_1, -r_2+r_3, -(\lambda-2)c_1+c_2$ ; ⑤  $(\lambda-2)r_3+r_4, r_1+r_2, (-(\lambda-2)^2-1)c_1+c_2, (\lambda-2)c_1+c_3$ ; ⑥  $-r_3 \leftrightarrow r_1, (\lambda-2)^2r_2+r_3, (\lambda-2)c_2+c_3$ ; ⑦  $(\lambda-2)^4r_4+r_3, (\lambda+1)c_3+c_4, -c_3 \leftrightarrow c_4$ . 于是得  $\lambda I-A$  相抵于  $\text{diag}\{1, 1, 1, 1, (\lambda-2), (\lambda-2)^4(\lambda+1)\}$ ,

所以  $m(\lambda) = (\lambda-2)^4(\lambda+1)$ .

于是知  $A$  的 Jordan 标准形中, 相对特征值 2 的最大若当块为 4 阶的, 故  $J_5(2)$  中一个 1 阶块, 一个 4 阶块.

**56.** 设  $N$  为域  $F$  上  $n$  阶方阵,  $N^n=0$  而  $N^{n-1} \neq 0$ . 证明: 不存在  $n$  阶方阵  $A$  使  $A^2=N$ .

**证** 由  $N^n=0 \rightarrow \lambda^n=0$ , 所以  $N$  的特征值全为 0. 又  $N^{n-1} \neq 0$ , 故  $N$  的极小多项式  $m(\lambda)=\lambda^n$ , 故知  $N$  的 Jordan 标准形为

$$J = \begin{bmatrix} 0 & & & \\ 1 & \ddots & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & 1 & 0 \end{bmatrix},$$

显然  $r(N)=r(J)=n-1$ . 要  $A^2=N$ , 应有  $\det A = \det N = 0$ , 故  $A$  的特征值也全为 0, 因此,  $A$  的 Jordan 标准形为

$$J_A = \begin{bmatrix} J_{s_1}(0) & & \\ & \ddots & \\ & & J_{s_l}(0) \end{bmatrix}, \quad s \geq 1,$$

其中  $J_{s_i}(0)$  为 Jordan 块, 故  $r(A)=r(J_A)=n-s$ , 显然  $r(J_A^2) < n-s \leq n-1 = r(J)$ , 所以  $r(A^2) < r(N)$ , 即  $A^2 \neq N$ . 所以不存在  $n$  阶方阵  $A$ , 使  $A^2=N$ .

**57.** 设  $N_1$  与  $N_2$  为域  $F$  上 6 阶幂零方阵, 有相同的最小多项式和零度 (方阵  $A$  的零度即  $Ax=0$  的解空间维数). 证明  $N_1$  与  $N_2$  相似. 举例说明这对 7 阶方阵不成立.

**证** 由已知  $N_1$  与  $N_2$  是幂零方阵, 所以  $N_1$  与  $N_2$  的特征值相同 (全为 0); 由零度同, 知  $N_1$  与  $N_2$  的属于特征值 0 的特征子空间的维数相同, 故 Jordan 块的个数相同; 由极小多项式同知  $N_1$  与  $N_2$  的 Jordan 标准形中最大 Jordan 块的阶数同. 于是

(1) 若  $m(\lambda)=\lambda^6$ , ( $\text{null} N_1 = \text{null} N_2 = 1$ ) 则

$$N_1 \sim \begin{bmatrix} 0 & & & & \\ 1 & \ddots & & & \\ & \ddots & \ddots & & \\ & & \ddots & 1 & \\ & & & 1 & 0 \end{bmatrix} \sim N_2;$$

(2) 若  $m(\lambda) = \lambda^5$ , ( $\text{null} N_i = 2$ ) 则

$$N_1 \sim \begin{bmatrix} 0 & & & & \\ 1 & \ddots & & & \\ & \ddots & \ddots & & \\ & & \ddots & 1 & \\ & & & 1 & 0 \\ & & & & 0 \end{bmatrix} \sim N_2;$$

(3) 若  $m(\lambda) = \lambda^4$ , ( $\text{null} N_i = 3$  或  $\text{null} N_i = 2$ ) 则

$$N_1 \sim \begin{bmatrix} 0 & & & & \\ 1 & \ddots & & & \\ & \ddots & \ddots & & \\ & & \ddots & 1 & \\ & & & 1 & 0 \\ \hline & & & & 0 \\ & & & & 0 \end{bmatrix} \sim N_2,$$

或

$$N_1 \sim \begin{bmatrix} 0 & & & & \\ 1 & \ddots & & & \\ & \ddots & \ddots & & \\ & & \ddots & 1 & \\ & & & 1 & 0 \\ \hline & & & 0 & 0 \\ & & & 0 & 1 \end{bmatrix} \sim N_2;$$

前者  $\text{null} N_i = 3$ , 后者  $\text{null} N_i = 2$ .

(4)  $m(\lambda) = \lambda^3$  时,

$$J_1 = \begin{bmatrix} 0 & & & & \\ 1 & 0 & & & \\ & 1 & 0 & & \\ & & 0 & 0 & \\ & & & 0 & 0 \end{bmatrix}, J_2 = \begin{bmatrix} 0 & & & & \\ 1 & 0 & & & \\ & 1 & 0 & & \\ & & 0 & 0 & \\ & & & 0 & 1 \\ & & & 1 & 0 \end{bmatrix}, J_3 = \begin{bmatrix} 0 & & & & \\ 1 & 0 & & & \\ & 1 & 0 & & \\ & & 0 & 0 & \\ & & & 1 & 0 \\ & & & 1 & 0 \end{bmatrix};$$

$\text{null} J_1 = 4, \quad \text{null} J_2 = 3, \quad \text{null} J_3 = 2.$

(5)  $m(\lambda) = \lambda^2$  时,

$$J_1 = \begin{bmatrix} 0 & & & & & \\ 1 & 0 & & & & \\ & & 0 & & & \\ & & 1 & 0 & & \\ & & & & 0 & \\ & & & & 1 & 0 \end{bmatrix}, J_2 = \begin{bmatrix} 0 & & & & & \\ 1 & 0 & & & & \\ & & 0 & & & \\ & & 1 & 0 & & \\ & & & & 0 & \\ & & & & & 0 \end{bmatrix}, J_3 = \begin{bmatrix} 0 & & & & & \\ 1 & 0 & & & & \\ & & 0 & & & \\ & & & 0 & & \\ & & & & 0 & \\ & & & & & 0 \end{bmatrix};$$

$\text{null} J_1 = 3, \quad \text{null} J_2 = 4, \quad \text{null} J_3 = 5.$

由以上易知对 6 阶方阵(其特征值为 0)最小多项式和零度决定了唯一的 Jordan 形. 所以  $N_1$  与  $N_2$  相似.

而对于 7 阶幂零方阵, 当  $m(\lambda) = \lambda^3, \text{null} N = 3$  时, 有两个 Jordan 形满足此条件

$$J_1 = \begin{bmatrix} 0 & & & & & & \\ 1 & 0 & & & & & \\ & 1 & 0 & & & & \\ \hline & & & 0 & & & \\ & & & 1 & 0 & & \\ & & & & 1 & 0 & \\ \hline & & & & & & 0 \end{bmatrix}, J_2 = \begin{bmatrix} 0 & & & & & & \\ 1 & 0 & & & & & \\ & 1 & 0 & & & & \\ \hline & & & 0 & & & \\ & & & 1 & 0 & & \\ & & & & & 0 & \\ & & & & & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

因为  $J_1$  不相似于  $J_2$ , 所以不能保证有  $N_1$  相似于  $N_2$ .

**58.** 利用上题及 Jordan 形证明以下命题: 设  $A$  与  $B$  为域  $F$  上  $n$  阶方阵, 有相同的特征多项式  $f = (\lambda - \lambda_1)^{d_1} \cdots (\lambda - \lambda_k)^{d_k}$ , 也有相同的最小多项式. 设  $A - \lambda_i I$  与  $B - \lambda_i I$  有相同的零度, 且  $d_i \leq 6 (1 \leq i \leq k)$ , 则  $A$  与  $B$  相似.

**证**  $A$  与  $B$  的特征多项式和极小多项式分别为

$$f(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{d_1} \cdots (\lambda - \lambda_k)^{d_k},$$

$$m(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{r_1} \cdots (\lambda - \lambda_k)^{r_k}, \quad r_i \leq d_i \leq 6,$$

把  $A, B$  分别看成线性变换  $\mathcal{A}, \mathcal{B}$  在  $V$  中某基下的方阵表示, 故有准素分解

$$V = U_1 \oplus \cdots \oplus U_k,$$

其中  $U_i = \ker(\lambda - \lambda_i)^{r_i} = \epsilon_i V$  ( $\epsilon_i$  是正则投影  $V \rightarrow W_i$ )  $\mathcal{A}(\mathcal{B})$  在  $U_i$  上的限制  $\mathcal{A}_i(\mathcal{B}_i)$  的特征多项式和极小多项式分别为  $(\lambda - \lambda_i)^{d_i}, (\lambda - \lambda_i)^{r_i}$ .  $\mathcal{A}_i(\mathcal{B}_i)$  的方阵表示为  $A_i(B_i)$ , 则  $A_i, B_i$  满足 57 题条件: (1) 有相同的特征值; (2) 有相同的特征子空间 ( $= \text{null}(A - \lambda_i I) = \text{null}(B - \lambda_i I)$ ), 所以  $J_{d_i}(\lambda_i)$  中 Jordan 块的个数相同; (3) 最小多项式相同  $\rightarrow$  最大 Jordan 块的阶数相同, 故  $A_i$  相似于  $B_i$ . 而由准素分解有

$$A \sim \begin{bmatrix} A_1 & & \\ & \ddots & \\ & & A_k \end{bmatrix}, B \sim \begin{bmatrix} B_1 & & \\ & \ddots & \\ & & B_k \end{bmatrix},$$

又  $A_i \sim B_i$ , 所以

$$\begin{bmatrix} A_1 & & \\ & \ddots & \\ & & A_k \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} B_1 & & \\ & \ddots & \\ & & B_k \end{bmatrix} \rightarrow A \sim B.$$

**59.** 证明复方阵  $A$  的转置  $A^T$  与  $A$  相似.



证 设  $A$  的 Jordan 标准形为  $J$ , 即有可逆阵  $P$ , 使得

$$J = PAP^{-1} = \begin{bmatrix} J_1 & & \\ & J_2 & \\ & & \ddots \\ & & & J_s \end{bmatrix}, \quad (J_i \text{ 为 Jordan 块})$$

则

$$J^T = (P^T)^{-1} A^T P^T = \begin{bmatrix} J_1^T & & \\ & J_2^T & \\ & & \ddots \\ & & & J_s^T \end{bmatrix}.$$

故欲证  $A^T$  与  $A$  相似, 只要证  $J^T$  与  $J$  相似, 也即只要证  $J_i^T$  与  $J_i$  相似. 记

$$H_{k_i} = \begin{bmatrix} & & & 1 \\ & & \ddots & \\ & \ddots & & \\ 1 & & & \end{bmatrix}, \text{ 则 } H_{k_i}^2 = I, \text{ 所以 } H_{k_i} = H_{k_i}^{-1}$$

$$\text{因为 } H_{k_i} J_i H_{k_i}^{-1} = \begin{bmatrix} & & & 1 \\ & & \ddots & \\ & \ddots & & \\ 1 & & & \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_i & & & \\ & \ddots & & \\ & & \ddots & \\ & & & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} & & & 1 \\ & & \ddots & \\ & \ddots & & \\ 1 & & & \end{bmatrix} = J_i^T,$$

故只要取

$$H = \begin{bmatrix} H_{k_1} & & \\ & \ddots & \\ & & H_{k_s} \end{bmatrix},$$

则有  $H^{-1} J^T H = J$ , 故  $A^T$  相似于  $A$ .

60. 设  $N$  为 3 阶幂零方阵, 若设  $A = I + \frac{1}{2}N - \frac{1}{8}N^2$ , 则  $A^2 = I + N$ . 类似地证明: 对  $n$  阶幂零复方阵  $N$ , 有方阵  $A$  使  $A^2 = I + N$ .

证 当  $N$  是 3 阶幂零方阵时, 有

$$A^2 = \left( I + \frac{1}{2}N - \frac{1}{8}N^2 \right)^2 = I + \frac{1}{4}N^2 + \frac{1}{64}N^4 + N - \frac{1}{4}N^2 - \frac{1}{8}N^3 = I + N.$$

以上用到  $N^3 = N^4 = 0$ . 当  $N$  是  $n$  阶幂零方阵时, 设

$$A = I + a_1 N + a_2 N^2 + \cdots + a_{n-1} N^{n-1},$$

则

$$\begin{aligned}
A^2 = I + & a_1^2 N^2 + a_2^2 N^4 + a_3^2 N^6 + \cdots + a_{n-1}^2 N^{2(n-1)} + \\
& + 2a_1 N + 2a_2 N^2 + 2a_3 N^3 + 2a_4 N^4 + 2a_5 N^5 + 2a_6 N^6 + \cdots + 2a_{n-1} N^{n-1} + \\
& + 2a_1 a_2 N^3 + 2a_1 a_3 N^4 + 2a_1 a_4 N^5 + 2a_1 a_5 N^6 + \cdots + 2a_1 a_{n-1} N^n + \\
& + 2a_2 a_3 N^5 + 2a_2 a_4 N^6 + \cdots \\
& \cdots \\
& + 2a_{n-2} a_{n-1} N^{2n-3}
\end{aligned}$$

故要  
须有

$$A^2 = I + N,$$

$$a_1 = \frac{1}{2}, a_2 = -\frac{1}{2}a_1^2 = -\frac{1}{8}, a_3 = -a_1 a_2 = \frac{1}{16}, a_4 = -a_1 a_3 - \frac{1}{2}a_2^2 = -\frac{5}{128}, \cdots,$$

所以

$$A = I + \frac{1}{2}N - \frac{1}{8}N^2 + \frac{1}{16}N^3 - \frac{5}{128}N^4 + \cdots.$$

61. 证明: 每个可逆复方阵  $M$  均有平方根(即有方阵  $A$  使  $A^2 = M$ ).

证 方法 1 令

$$N = \begin{bmatrix} 0 & & & \\ \lambda^{-1} & \ddots & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & \lambda^{-1} & 0 \end{bmatrix}, N_1 = \lambda N = \begin{bmatrix} 0 & & & \\ 1 & \ddots & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

则由 60 题知  $\exists A$  使  $A^2 = I + N \rightarrow \lambda A^2 = \lambda I + \lambda N$  即

$$(\sqrt{\lambda}A)^2 = \lambda I + N_1 = J,$$

故每个特征值非零的 Jordan 块都有平方根.

对可逆方阵  $M$ ,  $\exists$  可逆阵  $P$  使得

$$P^{-1}MP = \begin{bmatrix} J_1(\lambda_1) & & \\ & \ddots & \\ & & J_s(\lambda_s) \end{bmatrix},$$

其中  $J_i = \lambda_i I + N_i$  是特征值  $\lambda_i$  的 Jordan 块,  $i=1, \cdots, s$ , 且由  $M$  是可逆阵知  $\lambda_i \neq 0 (i=1, \cdots, s)$ , 则

$$\begin{aligned}
M &= P \begin{bmatrix} J_1(\lambda_1) & & \\ & \ddots & \\ & & J_s(\lambda_s) \end{bmatrix} P^{-1} \\
&= P \begin{bmatrix} B_1^2 & & \\ & \ddots & \\ & & B_s^2 \end{bmatrix} P^{-1} = PB^2P^{-1} = (PBP^{-1})^2.
\end{aligned}$$

方法 2 设  $M$  的 Jordan 标准形为  $J$ , 故存在可逆阵  $P$  使

$$M = PJP^{-1} = P \begin{bmatrix} J_1(\lambda_1) & & \\ & \ddots & \\ & & J_s(\lambda_s) \end{bmatrix} P^{-1},$$

令

$$B = \begin{bmatrix} J_1(\sqrt{\lambda_1}) & & \\ & \ddots & \\ & & J_s(\sqrt{\lambda_s}) \end{bmatrix}, \text{ 则 } B^2 \sim J.$$

事实上只要证  $(J_i(\sqrt{\lambda_i}))^2 \sim J_i(\lambda_i)$ , 即证

$$\begin{bmatrix} \lambda_i & & & \\ 2\sqrt{\lambda_i} & \ddots & & \\ 1 & \ddots & \ddots & \\ \ddots & 1 & 2\sqrt{\lambda_i} & \lambda_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sqrt{\lambda_i} & & & \\ 1 & \ddots & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & 1 & \sqrt{\lambda_i} \end{bmatrix}^2 \sim \begin{bmatrix} \lambda_i & & & \\ 1 & \ddots & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & 1 & \lambda_i \end{bmatrix},$$

显然(1) 它们的特征值相同;(2) 左边方阵属于特征值  $\lambda_i$  的特征子空间是 1 维的, 所以其 Jordan 标准形只有一个 Jordan 块, 故  $(J_i(\sqrt{\lambda_i}))^2 \sim J_i(\lambda_i)$ , 于是有可逆阵  $Q_i$  使  $Q_i^{-1}(J_i(\sqrt{\lambda_i}))^2 Q_i = J_i(\lambda_i)$ . 取

$$Q = \text{diag}\{Q_1, Q_2, \dots, Q_s\},$$

则  $Q$  可逆, 且有

$$Q^{-1}B^2Q = J = P^{-1}MP,$$

故  $PQ^{-1}B^2QP^{-1} = M$ , 令  $S = QP^{-1}$ , 则有

$$S^{-1}B^2S = (S^{-1}BS)^2 = M.$$

证毕.

62. 设

$$N = \begin{bmatrix} 0 & & & \\ 1 & \ddots & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

为 14 阶方阵, 求  $N^4$  的 Jordan 标准形  $J$ , 并求  $P$  使  $P^{-1}N^4P = J$ .

解 记  $N^4 = A$ . 显然  $A$  的特征值全为 0. 因为  $r(A) = 10$ , 所以  $\dim V_0 = 4$ , 即  $A$  的属于特征值 0 的特征子空间是 4 维的, 故  $J$  有 4 个 Jordan 块.

因为  $r(A^4) = 0 \rightarrow r(J^4) = 0$ , 所以每个 Jordan 块的阶数  $\leq 4$ . 又  $r(A^3) = 2$ , 故  $J$  有两个 4 阶块, 由  $A$  是 14 阶方阵, 故易算得另两块是 3 阶块. 即

$$J = \begin{bmatrix} J_4 & & & \\ & J_4 & & \\ & & J_3 & \\ & & & J_3 \end{bmatrix}.$$

记  $P = (P_1, P_2, \dots, P_{14})$ , 由  $P^{-1}AP = J \rightarrow AP = PJ$ , 知应有如下 4 个 Jordan 链:

$$(1) AP_1 = P_2, AP_2 = P_3, AP_3 = P_4, AP_4 = 0;$$

$$(2) AP_5 = P_6, AP_6 = P_7, AP_7 = P_8, AP_8 = 0;$$

$$(3) AP_9 = P_{10}, AP_{10} = P_{11}, AP_{11} = 0;$$

$$(4) AP_{12} = P_{13}, AP_{13} = P_{14}, AP_{14} = 0.$$

因为对自然基  $e_1, e_2, \dots, e_{14}$  有

$$\begin{aligned} Ae_1 &= e_5, Ae_2 = e_6, Ae_3 = e_7, Ae_4 = e_8, Ae_5 = e_9, \\ Ae_6 &= e_{10}, Ae_7 = e_{11}, Ae_8 = e_{12}, Ae_9 = e_{13}, Ae_{10} = e_{14}, \\ Ae_{11} &= Ae_{12} = Ae_{13} = Ae_{14} = 0. \end{aligned}$$

故取  $P_1 = e_1, P_5 = e_2, P_9 = e_3, P_{11} = e_4$  则得上述 4 个 Jordan 链, 即

$$P = (e_1, e_5, e_9, e_{13}, e_2, e_6, e_{10}, e_{14}, e_3, e_7, e_{11}, e_4, e_8, e_{12}).$$

63. 求下列方阵  $A$  在  $\mathbb{C}$  上的 Jordan 标准形  $J$ , 并求复方阵  $P$  使  $P^{-1}AP = J$ :

$$\begin{aligned} (1) & \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}; (2) \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 2 & -1 & -2 \\ -1 & 1 & 2 \end{bmatrix}; (3) \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -4 & 4 & 0 \\ -2 & 1 & 2 \end{bmatrix}; \\ (4) & \begin{bmatrix} 2 & 6 & -15 \\ 1 & 1 & -5 \\ 1 & 2 & -6 \end{bmatrix}; (5) \begin{bmatrix} 9 & -6 & -2 \\ 18 & -12 & -3 \\ 18 & -9 & -6 \end{bmatrix}; (6) \begin{bmatrix} 4 & 6 & -15 \\ 1 & 3 & -5 \\ 1 & 2 & -4 \end{bmatrix}; \\ (7) & \begin{bmatrix} 0 & -4 & 0 \\ 1 & -4 & 0 \\ 1 & -2 & -2 \end{bmatrix}; (8) \begin{bmatrix} 12 & -6 & -2 \\ 18 & -9 & -3 \\ 18 & -9 & -3 \end{bmatrix}; (9) \begin{bmatrix} 4 & -5 & 2 \\ 5 & -7 & 3 \\ 6 & -9 & 4 \end{bmatrix}; \\ (10) & \begin{bmatrix} 1 & -3 & 3 \\ -2 & -6 & 13 \\ -1 & -4 & 8 \end{bmatrix}; (11) \begin{bmatrix} 1 & -3 & 4 \\ 4 & -7 & 8 \\ 6 & -7 & 7 \end{bmatrix}; (12) \begin{bmatrix} 1 & -3 & 0 & 3 \\ -2 & -6 & 0 & 13 \\ 0 & -3 & 1 & 3 \\ -1 & -4 & 0 & 8 \end{bmatrix}; \\ (13) & \begin{bmatrix} 3 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 5 & -3 \\ 4 & -1 & 3 & -1 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

解 (1) 显然, 特征值  $\lambda = 2$  (三重根), 又因为  $r(J - 2I) = r(A - 2I) = 2$ , 所以  $A$  的 Jordan 标准形是

$$J = \begin{bmatrix} 2 & & \\ 1 & 2 & \\ & 1 & 2 \end{bmatrix},$$

解齐次线性方程组  $(A - 2I)x = 0$ , 得  $x_3 = (1, 0, 0)^T$ , 再解  $(A - 2I)x = x_3 \rightarrow x_2 = (0, 1, 0)^T$ , 再解  $(A - 2I)x = x_2 \rightarrow x_1 = (0, 0, -1)^T$ , 故取

$$P = (x_1, x_2, x_3) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \text{ 则 } P^{-1}AP = J.$$

(2) 对  $\lambda I - A$  做初等变换

$$\lambda I - A = \begin{bmatrix} \lambda - 2 & 1 & 1 \\ -2 & \lambda + 1 & 2 \\ 1 & -1 & \lambda - 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{\oplus} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -2(\lambda - 1) & \lambda - 1 & 0 \\ -(\lambda - 1)^2 & -(\lambda - 1) & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\otimes}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & \lambda-1 & 0 \\ -(\lambda^2-1) & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\textcircled{3}} \begin{bmatrix} 1 & & \\ & \lambda-1 & \\ & & (\lambda-1)^2 \end{bmatrix},$$

①  $-c_3+c_2, -(\lambda-2)c_3+c_1, -2r_1+r_2, -(\lambda-2)r_1+r_3$ ; ②  $2c_2+c_1, r_2+r_3$ ; ③  $-c_1$ ;  
 $c_1 \leftrightarrow c_3$ .

A 的初等因子为  $(\lambda-1), (\lambda-1)^2$ , 所以 A 相似于

$$J = \begin{bmatrix} 1 & & \\ 1 & 1 & \\ & & 1 \end{bmatrix}$$

记  $P=(x_1, x_2, x_3)$ , 其中  $x_2, x_3$  应为特征向量, 满足  $Ax=x \rightarrow (A-I)x=0$ ,

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 2 & -2 & -2 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

所以 
$$x_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}, x_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix},$$

解  $(A-I)x=x_2$ , 得  $x_1=(0,0,1)^T$ ,

所以 
$$P = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 0 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \text{ 则 } P^{-1}AP = J.$$

(3) A 的特征多项式为  $f(\lambda)=(\lambda-2)^3$ , 故  $\lambda=2$ . 又  $r(A-2I)=r(J-2I)=1$ ,

所以 
$$J = \begin{bmatrix} 2 & & \\ 1 & 2 & \\ & & 2 \end{bmatrix}. \left[ \text{注意 } A-2I = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 \\ -4 & 2 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \end{bmatrix} \right]$$

解  $(A-2I)x=0$ , 得  $x_2=(1,2,1)^T, x_3=(0,0,1)^T$ , 再解  $(A-2I)x=x_2$ , 得  $x_1=(0,1,0)^T$ ,

故取 
$$P = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad \text{则 } P^{-1}AP = J.$$

(4)  $\det(\lambda I-A)=(\lambda+1)^3$ , 故特征值为  $\lambda=-1$ , 又

$$r(J+I) = r(A+I) = r \begin{bmatrix} 3 & 6 & -15 \\ 1 & 2 & -5 \\ 1 & 2 & -5 \end{bmatrix} = 1,$$

所以 
$$J = \begin{bmatrix} -1 & & \\ 1 & -1 & \\ & & -1 \end{bmatrix}.$$

令  $P=(x_1, x_2, x_3)$ , 由  $P^{-1}AP=J \rightarrow AP=PJ$ , 故  $x_1, x_2, x_3$  应满足  $(A+I)x_1=x_2$ ,  $(A+I)x_2=0, (A+I)x_3=0$ . 解  $(A+I)x=0$  得  $x=c_1(5,0,1)^T+c_2(-2,1,0)^T, c_1, c_2 \in \mathbb{C}$  取  $x_2=(3,1,1)^T, x_3=(-2,1,0)^T$ , 又解  $(A+I)x=x_2$ , 得  $x_1=(1,0,0)^T$ .

所以

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \text{使 } P^{-1}AP = J.$$

(5)  $\det(\lambda I - A) = \lambda^3 + 9\lambda^2 + 27\lambda + 27 = (\lambda + 3)^3$ , 故  $\lambda = -3$ . 因为  $r(A + 3I) = 1$ ,

所以

$$J = \begin{bmatrix} -3 & & \\ & 1 & -3 \\ & & -3 \end{bmatrix},$$

令  $P = (x_1, x_2, x_3)$ , 由  $P^{-1}AP = J \rightarrow AP = PJ$  知  $x_2, x_3$  为特征向量,  $x_1$  与  $x_2$  构成一 Jordan 链, 解得

$$P = \begin{bmatrix} 0 & 2 & \frac{1}{2} \\ 0 & 3 & 1 \\ -1 & 3 & 0 \end{bmatrix}.$$

$$(6) (\lambda I - A) = \begin{bmatrix} \lambda - 4 & -6 & 15 \\ -1 & \lambda - 3 & 5 \\ -1 & -2 & \lambda + 4 \end{bmatrix} \xrightarrow[\mathcal{Q}_1]{P_1} \begin{bmatrix} 0 & 2(1-\lambda) & \lambda^2 - 1 \\ 0 & \lambda - 1 & 1 - \lambda \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow[\mathcal{Q}_2]{P_2}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & (\lambda - 1)^2 \\ 0 & \lambda - 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{P_3} \begin{bmatrix} 1 & & \\ & \lambda - 1 & \\ & & (\lambda - 1)^2 \end{bmatrix}.$$

其中

$$P_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \lambda - 4 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, P_2 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, P_3 = \begin{bmatrix} & & -1 \\ & 1 & \\ 1 & & \end{bmatrix}.$$

故初等因子为  $(\lambda - 1), (\lambda - 1)^2$ ,

所以

$$J = \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{bmatrix}.$$

$$(\lambda I - J) = \begin{bmatrix} \lambda - 1 & & \\ & \lambda - 1 & \\ & -1 & \lambda - 1 \end{bmatrix} \xrightarrow[\tilde{\mathcal{Q}}_1]{\tilde{P}_1} \begin{bmatrix} \lambda - 1 & & \\ & 0 & (\lambda - 1)^2 \\ & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow[\tilde{\mathcal{Q}}_2]{\tilde{P}_2} \begin{bmatrix} 1 & & \\ & \lambda - 1 & \\ & & (\lambda - 1)^2 \end{bmatrix}$$

其中

$$\tilde{P}_1 = \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 1 & \lambda - 1 \\ & & 1 \end{bmatrix}, \tilde{P}_2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix},$$

所以

$$\lambda I - A \xrightarrow{P(\lambda)} \lambda I - J, P(\lambda) = \tilde{P}_1^{-1} \tilde{P}_2^{-1} P_3 P_2 P_1,$$

$$P^{-1}(\lambda) = P_1^{-1} P_2^{-1} P_3^{-1} \cdot \widetilde{P}_2 \widetilde{P}_1 = \begin{bmatrix} \lambda-4 & -2 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \lambda-1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

所以  $P = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ , 则  $P^{-1}AP = J$ .

$$(7) J = \begin{bmatrix} -2 & & \\ 1 & -2 & \\ & & -2 \end{bmatrix}, P = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

$$(8) J = \begin{bmatrix} 0 & & \\ 1 & 0 & \\ & & 0 \end{bmatrix}, P = \begin{bmatrix} 0 & 2 & \frac{1}{2} \\ 0 & 3 & 1 \\ -1 & 3 & 0 \end{bmatrix}.$$

$$(9) J = \begin{bmatrix} 0 & & \\ 1 & 0 & \\ & & 1 \end{bmatrix}, P = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & 1 \end{bmatrix}.$$

$$(10) J = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}, P = \begin{bmatrix} 10 & 6 & 3 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

$$(11) J = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}, P = \begin{bmatrix} 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

$$(12) \lambda I - A = \begin{bmatrix} \lambda-1 & 3 & 0 & -3 \\ 2 & \lambda+6 & 0 & -13 \\ 0 & 3 & \lambda-1 & -3 \\ 1 & 4 & 0 & \lambda-8 \end{bmatrix} \xrightarrow[\mathcal{Q}_1]{P_1} \begin{bmatrix} 0 & -4\lambda+7 & 0 & -\lambda^2+9\lambda-11 \\ 0 & \lambda-2 & 0 & 3-2\lambda \\ 0 & 3 & \lambda-1 & -3 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

$$\xrightarrow[\mathcal{Q}_2]{P_2} \begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{1}{3}(\lambda-1)(4\lambda-7) & (\lambda-1)(4-\lambda) \\ 0 & 0 & -\frac{1}{3}(\lambda-1)(\lambda-2) & 1-\lambda \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow[\mathcal{Q}_3]{P_3} \begin{bmatrix} (\lambda-1)^3 & & & \\ & (\lambda-1) & & \\ & & 1 & \\ & & & 1 \end{bmatrix},$$

其中

$$P_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -(\lambda-1) \\ & 1 & 0 & -2 \\ & & 1 & 0 \\ & & & 1 \end{bmatrix}, P_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 4\lambda-7 & 0 \\ & 1 & -(\lambda-2) & 0 \\ & & \frac{1}{3} & 0 \\ & & & 1 \end{bmatrix}, P_3 = \begin{bmatrix} 1 & 4-\lambda & 0 & 0 \\ & -1 & 0 & 0 \\ & & 1 & 0 \\ & & & 1 \end{bmatrix},$$

所以

$$J = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & 1 & 1 & \\ & & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

以下求  $P$ , 因为  $(A-I)^3 = (J-I)^3 = 0$ , 所以根子空间的基为:

$$\alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \alpha_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \alpha_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \alpha_4 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix},$$

$$(A-I)\alpha_1 = \begin{bmatrix} 0 & -3 & 0 & 3 \\ -2 & -7 & 0 & 13 \\ 0 & -3 & 0 & 3 \\ -1 & -4 & 0 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -2 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}, (A-I) \begin{bmatrix} 0 \\ -2 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix},$$

$$(A-I) \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix} = 0; \text{ 又 } (A-I)\alpha_3 = 0, \text{ 所以 } \alpha_3 \text{ 和 } \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix} \text{ 是特征向量.}$$

故取

$$P = (\alpha_3, \alpha_1, (A-I)\alpha_1, (A-I)^2\alpha_1) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & -2 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}.$$

$$\begin{aligned} (13) \quad |\lambda I - A| &= \begin{vmatrix} \lambda-3 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & \lambda-1 & 0 & 0 \\ -3 & 0 & \lambda-5 & 3 \\ -4 & 1 & -3 & \lambda+1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda-3 & 1 \\ -1 & \lambda-1 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} \lambda-5 & 3 \\ -3 & \lambda+1 \end{vmatrix} \\ &= (\lambda-2)^4, \end{aligned}$$

又  $r(A-2I)=2$ , 故

$$J = \begin{bmatrix} 2 & & & \\ 1 & 2 & & \\ & & 2 & \\ & & 1 & 2 \end{bmatrix}, P = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & \frac{1}{3} & 0 \end{bmatrix}.$$

64. 求下列  $\lambda$ -矩阵的相抵标准形:

解 在做初等变换中, 符号“ $\leftrightarrow$ ”表示两行(或两列)对换;  $r_i, c_j$  分别表示第  $i$  行, 第  $j$  列;  $ar_i + r_j$  ( $ac_i + c_j$ ) 表示第  $i$  行(列)的  $a$  倍加到第  $j$  行(列)上去;  $br_i$  ( $bc_i$ ) 表示第  $i$  行(列)乘  $b$ .

$$(1) \begin{bmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix} \xrightarrow{\oplus} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\lambda^2 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\otimes} \begin{bmatrix} 1 & \\ & \lambda^2 \end{bmatrix}.$$



①  $-\lambda r_1 + r_2, -c_2 \lambda + c_1$ ; ②  $-r_2, c_1 \leftrightarrow c_2$ .

$$(2) \begin{bmatrix} \lambda^2 - 1 & \lambda + 1 \\ \lambda + 1 & \lambda^2 + 2\lambda + 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\textcircled{1}} \begin{bmatrix} 0 & \lambda + 1 \\ (\lambda + 1)(2 - \lambda^2) & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\textcircled{2}} \begin{bmatrix} \lambda + 1 & \\ & (\lambda + 1)(\lambda^2 - 2) \end{bmatrix}.$$

①  $-(\lambda + 1)r_1 + r_2, -(\lambda - 1)c_2 + c_1$ ; ②  $c_1 \leftrightarrow c_2, -c_2$ .

$$(3) \begin{bmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda + 5 \end{bmatrix} \xrightarrow{c_1 + c_2} \begin{bmatrix} \lambda & \lambda \\ 0 & \lambda + 5 \end{bmatrix} \xrightarrow{-r_1 + r_2} \begin{bmatrix} \lambda & \lambda \\ -\lambda & 5 \end{bmatrix} \xrightarrow{\frac{4}{5}c_2 + c_1} \begin{bmatrix} \lambda + \frac{1}{5}\lambda^2 & 0 \\ 0 & 5 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & \\ & \lambda(\lambda + 5) \end{bmatrix}.$$

$$(4) \begin{bmatrix} \lambda^2 - 1 & 0 \\ 0 & (\lambda - 1)^3 \end{bmatrix} \xrightarrow{\textcircled{1}} \begin{bmatrix} \lambda^2 - 1 & \lambda^2 - 1 \\ 0 & (\lambda - 1)^3 \end{bmatrix} \xrightarrow{\textcircled{2}} \begin{bmatrix} \lambda^2 - 1 & \lambda^2 - 1 \\ -(\lambda^2 - 1)(\lambda - 3) & 4(\lambda - 1) \end{bmatrix} \xrightarrow{\textcircled{3}} \begin{bmatrix} (\lambda^2 - 1)(\lambda - 1)^2 & 0 \\ 0 & 4(\lambda - 1) \end{bmatrix} \xrightarrow{\textcircled{4}} \begin{bmatrix} (\lambda - 1) & \\ & (\lambda + 1)(\lambda - 1)^3 \end{bmatrix}.$$

①  $c_1 + c_2$ ; ②  $(\lambda - 3)r_1 + r_2$ ; ③  $\frac{1}{4}(\lambda + 1)r_2 + r_1, 4r_1$ ; ④  $\frac{1}{4}c_2, c_2 \leftrightarrow c_1, r_2 \leftrightarrow r_1$ .

$$(5) \begin{bmatrix} \lambda + 1 & \lambda^2 + 1 & \lambda^2 \\ 3\lambda - 1 & 3\lambda^2 - 1 & \lambda^2 + 2\lambda \\ \lambda - 1 & \lambda^2 - 1 & \lambda \end{bmatrix} \xrightarrow{\textcircled{1}} \begin{bmatrix} 2 & 2 & \lambda^2 - \lambda \\ 2 & 2 & \lambda^2 - \lambda \\ \lambda - 1 & \lambda^2 - 1 & \lambda \end{bmatrix} \xrightarrow{\textcircled{2}} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda^2 - \lambda & -\frac{1}{2}\lambda(\lambda - 1)^2 + \lambda \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\textcircled{3}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

①  $-r_3 + r_1, -3r_3 + r_2$ ; ②  $-r_1 + r_2, -\frac{1}{2}(\lambda - 1)r_1 + r_3, -c_1 + c_2, -\frac{1}{2}(\lambda^2 - \lambda)c_1 + c_3, r_2 \leftrightarrow r_3$ ; ③  $\frac{1}{2}r_1, \frac{1}{2}(\lambda - 1)c_2 + c_3, (\lambda - 1)c_3 + c_2, c_2 \leftrightarrow c_3$ .

$$(6) \begin{bmatrix} \lambda - 2 & -1 & 0 \\ 0 & \lambda - 2 & -1 \\ 0 & 0 & \lambda - 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{\textcircled{1}} \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ (\lambda - 2)^2 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & \lambda - 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{\textcircled{2}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & (\lambda - 2)^2 & -1 \\ 0 & (\lambda - 2)^3 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\textcircled{3}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & (\lambda - 2)^3 \end{bmatrix}.$$

①  $(\lambda - 2)c_2 + c_1, (\lambda - 2)r_1 + r_2$ ; ②  $c_1 \leftrightarrow c_2, -r_1, (\lambda - 2)r_2 + r_3$ ;

③  $(\lambda - 2)^2 c_3 + c_2, -c_3, c_3 \leftrightarrow c_2, r_2 \leftrightarrow r_3$ .

65. 求可逆  $\lambda$ -方阵  $P(\lambda)$  和  $Q(\lambda)$  使  $P(\lambda)AQ(\lambda)$  为相抵标准形:

$$(1) A = \begin{bmatrix} \lambda^2 - \lambda + 4 & \lambda^2 + 3 \\ \lambda^2 - 2\lambda + 3 & \lambda^2 - \lambda + 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{P_1} \begin{bmatrix} \lambda + 1 & \lambda + 1 \\ 6 & \lambda + 5 \end{bmatrix} \xrightarrow{Q_1} \begin{bmatrix} 0 & \frac{(\lambda + 1)(1 - \lambda)}{6} \\ 6 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{P_4} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & (\lambda + 1)(\lambda - 1) \end{bmatrix}.$$

其中

$$P_1 = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, P_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -\lambda+3 & 1 \end{bmatrix}, P_3 = \begin{bmatrix} 1 & -\frac{\lambda+1}{6} \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, P_4 = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{6} \\ -6 & 0 \end{bmatrix},$$

所以

$$P(\lambda) = P_4 P_3 P_2 P_1 = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{6} \\ 6 & -(\lambda+1) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -\lambda+3 & \lambda-2 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \frac{1}{6}(3-\lambda) & \frac{1}{6}(\lambda-2) \\ -\lambda^2+2\lambda-3 & \lambda^2-\lambda+4 \end{bmatrix},$$

$$Q(\lambda) = Q_1 = \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{6}(\lambda+5) \\ 0 & 1 \end{bmatrix},$$

$$P(\lambda)AQ(\lambda) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \lambda^2-1 \end{bmatrix}.$$

$$(2) A = \begin{bmatrix} \lambda^4+4\lambda^3+4\lambda^2+\lambda+2 & \lambda^3+4\lambda^2+4\lambda \\ \lambda^4+5\lambda^3+8\lambda^2+5\lambda+2 & \lambda^3+5\lambda^2+8\lambda+4 \end{bmatrix} \xrightarrow{P_1} \begin{bmatrix} \lambda^2(\lambda+2)^2+(\lambda+2) & \lambda(\lambda+2)^2 \\ \lambda(\lambda+2)^2 & (\lambda+2)^2 \end{bmatrix} \xrightarrow{P_2} \begin{bmatrix} \lambda+2 & 0 \\ \lambda(\lambda+2)^2 & (\lambda+2)^2 \end{bmatrix} \xrightarrow{Q_1} \begin{bmatrix} \lambda+2 & 0 \\ 0 & (\lambda+2)^2 \end{bmatrix}.$$

其中

$$P_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}, P_2 = \begin{bmatrix} 1 & -\lambda \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, Q_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -\lambda & 1 \end{bmatrix},$$

$$\text{所以 } P(\lambda)AQ(\lambda) = P_2 P_1 A Q_1 = \begin{bmatrix} 1+\lambda & -\lambda \\ -1 & 1 \end{bmatrix} A \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -\lambda & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda+2 & 0 \\ 0 & (\lambda+2)^2 \end{bmatrix}.$$

66. 对下列方阵  $A$ , 求  $\lambda I - A$  的相抵标准形, 从而求出其不变因子:

$$A_1 = \begin{bmatrix} 3 & 2 & -5 \\ 2 & 6 & -10 \\ 1 & 2 & -3 \end{bmatrix}, A_2 = \begin{bmatrix} 6 & 20 & -34 \\ 6 & 32 & -51 \\ 4 & 20 & -32 \end{bmatrix};$$

$$B_1 = \begin{bmatrix} 6 & 6 & -15 \\ 1 & 5 & -5 \\ 1 & 2 & -2 \end{bmatrix}, B_2 = \begin{bmatrix} 37 & -20 & -4 \\ 34 & -17 & -4 \\ 119 & -70 & -11 \end{bmatrix};$$

$$C_1 = \begin{bmatrix} 4 & 6 & -15 \\ 1 & 3 & -5 \\ 1 & 2 & -4 \end{bmatrix}, C_2 = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 3 \\ -2 & -6 & 13 \\ -1 & -4 & 8 \end{bmatrix}, C_3 = \begin{bmatrix} -13 & -70 & 119 \\ -4 & -19 & 34 \\ -4 & -20 & 35 \end{bmatrix};$$

$$D_1 = \begin{bmatrix} 14 & -2 & -7 & -1 \\ 20 & -2 & -11 & -2 \\ 19 & -3 & -9 & -1 \\ -6 & 1 & 3 & 1 \end{bmatrix}, D_2 = \begin{bmatrix} 4 & 10 & -19 & 4 \\ 1 & 6 & -8 & 3 \\ 1 & 4 & -6 & 2 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \end{bmatrix},$$

$$D_3 = \begin{bmatrix} 41 & -4 & -26 & -7 \\ 14 & -13 & -91 & -18 \\ 40 & -4 & -25 & -8 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

$$(1) \lambda I - A_1 = \begin{bmatrix} \lambda-3 & -2 & 5 \\ -2 & \lambda-6 & 10 \\ -1 & -2 & \lambda+3 \end{bmatrix} \xrightarrow{\textcircled{1}} \begin{bmatrix} 0 & 4-2\lambda & \lambda^2-4 \\ 0 & \lambda-2 & 4-2\lambda \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\textcircled{2}} \\ \begin{bmatrix} 0 & 0 & (\lambda-2)^2 \\ 0 & \lambda-2 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\textcircled{3}} \begin{bmatrix} 1 & & \\ & (\lambda-2) & \\ & & (\lambda-2)^2 \end{bmatrix}.$$

其中①  $-2r_3+r_2, (\lambda-3)r_3+r_1, -2c_1+c_2, (\lambda+3)c_1+c_3$ ; ②  $2r_2+r_1, 2c_2+c_3$ ; ③  $-c_1, r_1 \leftrightarrow r_3$ .

故  $A_1$  的不变因子为  $1, (\lambda-2), (\lambda-2)^2$ .

$$(2) \lambda I - A_2 = \begin{bmatrix} \lambda-6 & -20 & 34 \\ -6 & \lambda-32 & 51 \\ -4 & -20 & \lambda+32 \end{bmatrix} \xrightarrow{\textcircled{1}} \begin{bmatrix} 0 & 5(2-\lambda) & \frac{1}{4}(\lambda+28)(\lambda-2) \\ 0 & \lambda-2 & \frac{3}{2}(2-\lambda) \\ -4 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\textcircled{2}} \\ \begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{1}{4}(\lambda-2)^2 \\ 0 & \lambda-2 & 0 \\ -4 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\textcircled{3}} \begin{bmatrix} 1 & & \\ & \lambda-2 & \\ & & (\lambda-2)^2 \end{bmatrix},$$

其中各步所做的变换是: ①  $-5c_1+c_2, \frac{\lambda+32}{4}c_1+c_3, -\frac{3}{2}r_3+r_4, \frac{\lambda-6}{4}r_3+r_1$ ; ②  $5r_2+r_1, \frac{3}{2}c_2+c_3$ ; ③  $-\frac{1}{4}c_1, 4c_3, r_1 \leftrightarrow r_3$ .

故  $A_2$  的不变因子为  $1, (\lambda-2), (\lambda-2)^2$ .

$$(3) \lambda I - B_1 = \begin{bmatrix} \lambda-6 & -6 & 15 \\ -1 & \lambda-5 & 5 \\ -1 & -2 & \lambda+2 \end{bmatrix} \xrightarrow{\textcircled{1}} \begin{bmatrix} 0 & 6-2\lambda & \lambda^2-4\lambda+3 \\ 0 & \lambda-3 & 3-\lambda \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\textcircled{2}} \\ \begin{bmatrix} 0 & 0 & (\lambda-3)^2 \\ 0 & \lambda-3 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\textcircled{3}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda-3 & 0 \\ 0 & 0 & (\lambda-3)^2 \end{bmatrix}.$$

各步初等变换为: ①  $-r_3+r_2, (\lambda-6)r_3+r_1, -2c_1+c_2, (\lambda+2)c_1+c_3$ ; ②  $c_2+c_3, 2r_2+r_1$ ; ③  $-r_3, r_1 \leftrightarrow r_3$ .

故  $B_1$  的不变因子为  $1, \lambda-3, (\lambda-3)^2$ .

$$(4) \lambda I - B_2 = \begin{bmatrix} \lambda-37 & 20 & 4 \\ -34 & \lambda+17 & 4 \\ -119 & 70 & \lambda+11 \end{bmatrix} \xrightarrow{\textcircled{1}} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 4 \\ 3-\lambda & \lambda-3 & 0 \\ \frac{-\lambda^2+26\lambda-69}{4} & 15-5\lambda & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\textcircled{2}}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 4 \\ 0 & \lambda-3 & 0 \\ \frac{-\lambda^2+6\lambda-9}{4} & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\textcircled{3}} \begin{bmatrix} 1 & & \\ & \lambda-3 & \\ & & (\lambda-3)^2 \end{bmatrix}.$$

初等变换为: ①  $-r_1+r_2, -\frac{\lambda+11}{4}r_1+r_3, -5c_3+c_2, -\frac{\lambda-37}{4}c_3+c_1$ ; ②  $c_2+c_1, 5r_2+r_3$ ;

③  $\frac{1}{4}r_1, -4r_3, c_1 \leftrightarrow c_3$ .

故  $B_2$  的不变因子为  $1, \lambda-3, (\lambda-3)^2$ .

$$(5) \lambda I - C_1 = \begin{bmatrix} \lambda-4 & -6 & 15 \\ -1 & \lambda-3 & 5 \\ -1 & -2 & \lambda+4 \end{bmatrix} \xrightarrow{\textcircled{1}} \begin{bmatrix} 0 & 2-2\lambda & \lambda^2-1 \\ 0 & \lambda-1 & -\lambda+1 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\textcircled{2}}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & (\lambda-1)^2 \\ 0 & \lambda-1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\textcircled{3}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda-1 & 0 \\ 0 & 0 & (\lambda-1)^2 \end{bmatrix}.$$

所做初等变换为: ①  $-r_3+r_1, (\lambda-4)r_3+r_1, -2c_1+c_2, (\lambda+4)c_1+c_3$ ; ②  $c_2+c_3, 2r_2+r_1$ ; ③  $-c_1, r_1 \leftrightarrow r_3$ .

故  $C_1$  的不变因子为  $1, \lambda-1, (\lambda-1)^2$ .

$$(6) \lambda I - C_2 = \begin{bmatrix} \lambda-1 & 3 & -3 \\ 2 & \lambda+6 & -13 \\ 1 & 4 & \lambda-8 \end{bmatrix} \xrightarrow{\textcircled{1}} \begin{bmatrix} 0 & 7-4\lambda & -\lambda^2+9\lambda-11 \\ 0 & \lambda-2 & 3-2\lambda \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\textcircled{2}}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 7-4\lambda & -\lambda^2+\lambda+3 \\ 0 & \lambda-2 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\textcircled{3}} \begin{bmatrix} 0 & -(\lambda-1)^3 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\textcircled{4}}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & (\lambda-1)^3 \end{bmatrix}.$$

所做的初等变换为: ①  $-2r_3+r_2, -(\lambda-1)r_3+r_1, -4c_1+c_2, -(\lambda-8)c_1+c_3$ ; ②  $2c_2+c_3$ ; ③  $(\lambda-2)c_3+c_2, (-\lambda^2+\lambda+3)r_2+r_1$ ; ④  $-r_2, -r_1, c_2 \leftrightarrow c_3, r_1 \leftrightarrow r_3$ .

所以  $C_2$  的不变因子为  $1, 1, (\lambda-1)^3$ .

$$(7) \lambda I - C_3 = \begin{bmatrix} \lambda+13 & 70 & -119 \\ 4 & \lambda+19 & -34 \\ 4 & 20 & \lambda-35 \end{bmatrix} \xrightarrow{\textcircled{1}} \begin{bmatrix} 0 & 5-5\lambda & \frac{-\lambda^2+22\lambda-21}{4} \\ 0 & \lambda-1 & 1-\lambda \\ 4 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\textcircled{2}}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{-1}{4}(\lambda-1)^2 \\ 0 & \lambda-1 & 0 \\ 4 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\textcircled{3}} \begin{bmatrix} 1 & & \\ & \lambda-1 & \\ & & (\lambda-1)^2 \end{bmatrix}.$$

$$\textcircled{1} -r_3+r_2, -\frac{1}{4}(\lambda+13)r_3+r_1, -5c_1+c_2, -\frac{1}{4}(\lambda-35)c_1+c_3; \textcircled{2} c_2+c_3, 5r_2+r_1;$$

$$\textcircled{3} \frac{1}{4}r_3, -4r_1, r_1 \leftrightarrow r_3.$$

所以  $C_3$  的不变因子为  $1, (\lambda-1), (\lambda-1)^2$ .

$$\begin{aligned} (8) \lambda I - D_1 &= \begin{bmatrix} \lambda-14 & 2 & 7 & 1 \\ -20 & \lambda+2 & 11 & 2 \\ -19 & 3 & \lambda+9 & 1 \\ 6 & -1 & -3 & \lambda-1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\textcircled{1}} \\ &\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 8-2\lambda & \lambda-2 & -3 & 0 \\ -5-\lambda & 1 & \lambda+2 & 0 \\ -\lambda^2+15\lambda-8 & 1-2\lambda & 4-7\lambda & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\textcircled{2}} \\ &\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ \lambda^2+\lambda-2 & 0 & 1-\lambda^2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -3(\lambda-1)^2 & 0 & 2(\lambda-1)^2 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\textcircled{3}} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ \lambda-1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -(\lambda-1)^3 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\textcircled{4}} \\ &\begin{bmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & \lambda-1 & \\ & & & (\lambda-1)^3 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

$$\textcircled{1} -2r_1+r_2, -r_1+r_3, -(\lambda-1)r_1+r_4, -7c_4+c_3, -2c_4+c_2, -(\lambda-14)c_4+c_1;$$

$$\textcircled{2} -(\lambda-2)r_3+r_2, (2\lambda-1)r_3+r_4, -(\lambda+2)c_2+c_3, (5+\lambda)c_2+c_1; \textcircled{3} c_3+c_1, (\lambda+1)c_1+c_3, (\lambda-1)r_2+r_4; \textcircled{4} c_1 \leftrightarrow c_4, -c_3, c_3 \leftrightarrow c_4, r_2 \leftrightarrow r_3.$$

故  $D_1$  的不变因子为  $1, 1, \lambda-1, (\lambda-1)^3$ .

$$\begin{aligned} (9) \lambda I - D_2 &= \begin{bmatrix} \lambda-4 & -10 & 19 & -4 \\ -1 & \lambda-6 & 8 & -3 \\ -1 & -4 & \lambda+6 & -2 \\ 0 & 1 & -1 & \lambda \end{bmatrix} \xrightarrow{\textcircled{1}} \begin{bmatrix} \lambda-4 & 0 & 9 & 10\lambda-4 \\ -1 & 0 & \lambda+2 & -\lambda^2+6\lambda-3 \\ -1 & 0 & \lambda+2 & 4\lambda-2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\textcircled{2}} \\ &\begin{bmatrix} 0 & 0 & (\lambda-1)^2 & 4(\lambda-1)^2 \\ 0 & 0 & 0 & -(\lambda-1)^2 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\textcircled{3}} \begin{bmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & (\lambda-1)^2 & \\ & & & (\lambda-1)^2 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

$$\textcircled{1} c_2+c_3, -\lambda c_2+c_4, 4r_4+r_3, -(\lambda-6)r_4+r_2, 10r_4+r_1; \textcircled{2} -r_3+r_2, (\lambda-4)r_3+r_1,$$

$(\lambda-2)c_1+c_3, (4\lambda-2)c_1+c_4; \textcircled{3} 4r_2+r_1, -r_3, r_1 \leftrightarrow r_3, -r_2, r_2 \leftrightarrow r_4.$

故  $D_2$  的不变因子为  $1, 1, (\lambda-1)^2, (\lambda-1)^2$ .

$$\begin{aligned}
 (10) \lambda I - D_3 &= \begin{bmatrix} \lambda-41 & 4 & 26 & 7 \\ -14 & \lambda+13 & 91 & 18 \\ -40 & 4 & \lambda+25 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda-1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\textcircled{1}} \\
 &\begin{bmatrix} 8\lambda-48 & 4 & 33-7\lambda & 0 \\ 18\lambda-32 & \lambda+13 & 109-18\lambda & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ (\lambda-1)^2 & 0 & -(\lambda-1)^2 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\textcircled{2}} \\
 &\begin{bmatrix} 0 & 4 & 0 & 0 \\ -2\lambda^2+4\lambda+124 & 0 & \frac{7}{4}(\lambda-1)^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ (\lambda-1)^2 & 0 & -(\lambda-1)^2 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\textcircled{3}} \\
 &\begin{bmatrix} 0 & 4 & 0 & 0 \\ 126 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & \frac{(\lambda-1)^2}{126}(\lambda^2-2\lambda-503) & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\textcircled{4}} \\
 &\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & (\lambda-1)^2(\lambda^2-2\lambda-503) \end{bmatrix}.
 \end{aligned}$$

故  $D_3$  的不变因子为  $1, 1, 1, (\lambda-1)^2(\lambda^2-2\lambda-503)$ .

所做初等变换为:

- ①  $-r_1+r_3, -18r_3+r_2, -7r_3+r_1, -(\lambda-1)r_3+r_4, -(\lambda-1)c_4+c_3, (\lambda-1)c_4+c_1;$   
 ②  $-\frac{1}{4}(\lambda+13)r_1+r_2, -2(\lambda-6)c_2+c_1, -\frac{1}{4}(33-7\lambda)c_2+c_3; \textcircled{3} c_1+c_3, 2r_4+r_2,$   
 $-\frac{1}{126}(\lambda-1)^2r_2+r_4, \frac{1}{504}(\lambda^2-2\lambda-503)c_1+c_3; \textcircled{4} 504c_3, c_3 \leftrightarrow c_4, \frac{1}{4}r_1, \frac{1}{126}r_2, r_1 \leftrightarrow r_2.$

67. 对第 66 题中的方阵  $A_1$  与  $A_2$  是否相似? 同样,  $B_i, C_i, D_i$  是否相似?

解 由定理 7.12:  $F$  上方阵  $A$  与  $B$  相似  $\Leftrightarrow \lambda I - A$  与  $\lambda I - B$  相抵(在  $F[\lambda]$  上). 再利用 66 题计算结果知:

$A_1$  与  $A_2$  相似;  $B_1$  与  $B_2$  相似;  $C_1$  与  $C_3$  相似.

68. 对第 66 题中的方阵  $A$ , 求出可逆  $\lambda$ -方阵  $P(\lambda)$  和  $Q(\lambda)$  使  $P(\lambda)(\lambda I - A)Q(\lambda)$  为  $\lambda I - A$  的相抵标准形.

解 (1) 对  $A_1$

$$P_1 = \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 1 & -2 \\ & & 1 \end{bmatrix}, P_2 = \begin{bmatrix} 1 & \lambda-3 & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{bmatrix}, P_3 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{bmatrix}, P_4 = \begin{bmatrix} & & 1 \\ & 1 & \\ 1 & & \end{bmatrix};$$

$$Q_1 = \begin{bmatrix} 1 & -2 & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{bmatrix}, Q_2 = \begin{bmatrix} 1 & \lambda+3 & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{bmatrix}, Q_3 = \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 1 & 2 \\ & & 1 \end{bmatrix}, Q_4 = \begin{bmatrix} -1 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{bmatrix};$$

$$\text{所以 } P(\lambda) = P_4 P_3 P_2 P_1 = \begin{bmatrix} & 1 & \\ & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & \lambda-3 \\ & 1 & -2 \\ & & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} & 1 & \\ & 1 & -2 \\ 1 & 2 & \lambda-7 \end{bmatrix},$$

$$Q(\lambda) = Q_1 Q_2 Q_3 Q_4 = \begin{bmatrix} 1 & -2 & \lambda+3 \\ & 1 & 0 \\ & & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & & \\ & 1 & 2 \\ & & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & -2 & \lambda-1 \\ & 1 & 2 \\ & & 1 \end{bmatrix},$$

$$P(\lambda)(\lambda I - A_1)Q(\lambda) = \begin{bmatrix} 1 & & \\ & \lambda-2 & \\ & & (\lambda-2)^2 \end{bmatrix}.$$

(2) 对  $A_2$

$$P_1 = \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 1 & -\frac{3}{2} \\ & & 1 \end{bmatrix}, P_2 = \begin{bmatrix} 1 & \frac{\lambda-6}{4} & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{bmatrix}, P_3 = \begin{bmatrix} 1 & 5 & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{bmatrix}, P_4 = \begin{bmatrix} & & 1 \\ & 1 & \\ 1 & & \end{bmatrix};$$

$$Q_1 = \begin{bmatrix} 1 & -5 & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{bmatrix}, Q_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \frac{\lambda+32}{4} \\ & 1 & 0 \\ & & 1 \end{bmatrix}, Q_3 = \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 1 & \frac{3}{2} \\ & & 1 \end{bmatrix}, Q_4 = \begin{bmatrix} -\frac{1}{4} & & \\ & 1 & \\ & & 4 \end{bmatrix};$$

$$P(\lambda) = P_4 P_3 P_2 P_1 = \begin{bmatrix} & 1 & \\ & 1 & 0 \\ 1 & 5 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & \frac{\lambda-6}{4} \\ & 1 & -\frac{3}{2} \\ & & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} & 1 & \\ & 1 & -\frac{3}{2} \\ 1 & 5 & \frac{\lambda-36}{4} \end{bmatrix},$$

$$Q(\lambda) = Q_1 Q_2 Q_3 Q_4 = \begin{bmatrix} 1 & -5 & \frac{\lambda+32}{4} \\ & 1 & 0 \\ & & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -\frac{1}{4} & 0 & 0 \\ & 1 & 6 \\ & & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{4} & -5 & \lambda+2 \\ & 1 & 6 \\ & & 4 \end{bmatrix},$$

$$P(\lambda)(\lambda I - A_2)Q(\lambda) = \begin{bmatrix} 1 & & \\ & \lambda-2 & \\ & & (\lambda-2)^2 \end{bmatrix}.$$

(3) 对  $B_1$

$$P_1 = \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 1 & -1 \\ & & 1 \end{bmatrix}, P_2 = \begin{bmatrix} 1 & \lambda-6 & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{bmatrix}, P_3 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{bmatrix}, P_4 = \begin{bmatrix} & & -1 \\ & 1 & \\ 1 & & \end{bmatrix};$$

$$Q_1 = \begin{bmatrix} 1 & -2 & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{bmatrix}, Q_2 = \begin{bmatrix} 1 & \lambda+2 & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{bmatrix}, Q_3 = \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 1 & 1 \\ & & 1 \end{bmatrix};$$

$$P(\lambda) = P_4 P_3 P_2 P_1 = \begin{bmatrix} & -1 & \\ & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & \lambda-6 \\ & 1 & -1 \\ & & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} & -1 & \\ & 1 & -1 \\ 1 & 2 & \lambda-8 \end{bmatrix},$$

$$Q(\lambda) = Q_1 Q_2 Q_3 = \begin{bmatrix} 1 & -2 & \lambda+2 \\ & 1 & 0 \\ & & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ & 1 & 1 \\ & & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -2 & \lambda \\ & 1 & 1 \\ & & 1 \end{bmatrix},$$

$$P(\lambda)(\lambda I - B_1)Q(\lambda) = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -\lambda-2 \\ & \lambda-3 & 3-\lambda \\ & & (\lambda-3)^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -2 & \lambda \\ & 1 & 1 \\ & & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & & \\ & \lambda-3 & \\ & & (\lambda-3)^2 \end{bmatrix}.$$

(4) 对  $B_2$

$$P_1 = \begin{bmatrix} 1 & & \\ -1 & 1 & \\ & & 1 \end{bmatrix}, P_2 = \begin{bmatrix} 1 & & \\ 0 & 1 & \\ -\frac{\lambda+11}{4} & 0 & 1 \end{bmatrix}, P_3 = \begin{bmatrix} 1 & & \\ 0 & 1 & \\ 0 & 5 & 1 \end{bmatrix},$$

$$P_4 = \begin{bmatrix} \frac{1}{4} & & \\ & 1 & \\ & & -4 \end{bmatrix}; \quad Q_1 = \begin{bmatrix} 1 & & \\ 0 & 1 & \\ 0 & -5 & 1 \end{bmatrix},$$

$$Q_2 = \begin{bmatrix} 1 & & \\ 0 & 1 & \\ -\frac{\lambda-37}{4} & 0 & 1 \end{bmatrix}, Q_3 = \begin{bmatrix} 1 & & \\ 1 & 1 & \\ & & 1 \end{bmatrix}, Q_4 = \begin{bmatrix} & & 1 \\ & 1 & \\ 1 & & \end{bmatrix};$$

$$P(\lambda) = \begin{bmatrix} \frac{1}{4} & & \\ & 1 & \\ & -20 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & & \\ -1 & 1 & \\ -\frac{\lambda+11}{4} & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{4} & & \\ -1 & 1 & \\ \lambda+31 & -20 & -4 \end{bmatrix},$$

$$Q(\lambda) = Q_1 Q_2 Q_3 Q_4 = \begin{bmatrix} 1 & & \\ 0 & 1 & \\ \frac{37-\lambda}{4} & -5 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} & 1 & \\ & 1 & 1 \\ 1 & -5 & \frac{17-\lambda}{4} \end{bmatrix},$$

$$P(\lambda)(\lambda I - B_2)Q(\lambda) = \begin{bmatrix} 1 & & \\ 0 & \lambda-3 & \\ 0 & 0 & (\lambda-3)^2 \end{bmatrix}.$$



(5) 对  $C_1$  有

$$\begin{aligned}
 P_1 &= \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 1 & -1 \\ & & 1 \end{bmatrix}, P_2 = \begin{bmatrix} 1 & & \lambda-4 \\ & 1 & \\ & & 1 \end{bmatrix}, P_3 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{bmatrix}, P_4 = \begin{bmatrix} & & 1 \\ & 1 & \\ 1 & & \end{bmatrix}; \\
 Q_1 &= \begin{bmatrix} 1 & -2 & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{bmatrix}, Q_2 = \begin{bmatrix} 1 & & \lambda+4 \\ & 1 & \\ & & 1 \end{bmatrix}, Q_3 = \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 1 & 1 \\ & & 1 \end{bmatrix}, Q_4 = \begin{bmatrix} -1 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{bmatrix}; \\
 P(\lambda) &= \begin{bmatrix} & 1 & \\ & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & \lambda-4 \\ & 1 & -1 \\ & & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} & 1 & \\ & 1 & -1 \\ 1 & 2 & \lambda-6 \end{bmatrix}, \\
 Q(\lambda) &= \begin{bmatrix} 1 & -2 & \lambda+4 \\ & 1 & 0 \\ & & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ & 1 & 1 \\ & & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & -2 & \lambda+2 \\ & 1 & 1 \\ & & 1 \end{bmatrix}, \\
 P(\lambda)(\lambda I - C_1)Q(\lambda) &= \begin{bmatrix} 1 & & \\ & \lambda-1 & \\ & & (\lambda-1)^2 \end{bmatrix}.
 \end{aligned}$$

(6) 对  $C_2$  有

$$\begin{aligned}
 P_1 &= \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 1 & -2 \\ & & 1 \end{bmatrix}, P_2 = \begin{bmatrix} 1 & & -(\lambda-1) \\ & 1 & \\ & & 1 \end{bmatrix}, P_3 = \begin{bmatrix} 1 & -\lambda^2 + \lambda + 3 & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{bmatrix}, \\
 P_4 &= \begin{bmatrix} -1 & & \\ & -1 & \\ & & 1 \end{bmatrix}, P_5 = \begin{bmatrix} & & 1 \\ & 1 & \\ 1 & & \end{bmatrix}; \\
 Q_1 &= \begin{bmatrix} 1 & -4 & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{bmatrix}, Q_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -(\lambda-8) \\ & 1 & 0 \\ & & 1 \end{bmatrix}, Q_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ & 1 & 2 \\ & & 1 \end{bmatrix}, \\
 Q_4 &= \begin{bmatrix} 1 & & \\ 0 & 1 & \\ 0 & \lambda-2 & 1 \end{bmatrix}, Q_5 = \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 0 & 1 \\ & 1 & 0 \end{bmatrix}; \\
 P(\lambda) &= P_5 P_4 P_3 P_2 P_1 = \begin{bmatrix} & & 1 \\ & -1 & 2 \\ -1 & \lambda^2 - \lambda - 3 & -2\lambda^2 + 3\lambda + 5 \end{bmatrix}, \\
 Q(\lambda) &= Q_1 Q_2 Q_3 Q_4 Q_5 = \begin{bmatrix} 1 & -\lambda & -\lambda^2 + 2\lambda - 4 \\ 0 & 2 & 2\lambda - 3 \\ 0 & 1 & \lambda - 2 \end{bmatrix}, \\
 P(\lambda)(\lambda I - C_2)Q(\lambda) &= \begin{bmatrix} 1 & 4 & \lambda-8 \\ 0 & 2-\lambda & 2\lambda-3 \\ 0 & (\lambda-1)^3 & -2(\lambda-1)^3 \end{bmatrix} Q(\lambda) = \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & (\lambda-1)^3 \end{bmatrix}.
 \end{aligned}$$

(7) 对  $C_3$  有

$$\begin{aligned}
 P_1 &= \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 1 & -1 \\ & & 1 \end{bmatrix}, P_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -\frac{\lambda+13}{4} \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, P_3 = \begin{bmatrix} 1 & 5 & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{bmatrix}, \\
 P_4 &= \begin{bmatrix} -4 & & \\ & 1 & \\ & & \frac{1}{4} \end{bmatrix}, P_5 = \begin{bmatrix} & & 1 \\ & 1 & \\ 1 & & \end{bmatrix}; \\
 Q_1 &= \begin{bmatrix} 1 & -5 & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{bmatrix}, Q_2 = \begin{bmatrix} 1 & & \frac{35-\lambda}{4} \\ & 1 & \\ & & 1 \end{bmatrix}, Q_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}; \\
 P(\lambda) &= \begin{bmatrix} & & \frac{1}{4} \\ & 1 & -1 \\ -4 & -20 & \lambda+33 \end{bmatrix}, Q(\lambda) = \begin{bmatrix} 1 & -5 & \frac{15-\lambda}{4} \\ & 1 & 1 \\ & & 1 \end{bmatrix}, \\
 P(\lambda)(\lambda I - C_3)Q(\lambda) &= \begin{bmatrix} 1 & 5 & \frac{\lambda-35}{4} \\ & \lambda-1 & 1-\lambda \\ & & (\lambda-1)^2 \end{bmatrix} Q(\lambda) = \begin{bmatrix} 1 & & \\ & \lambda-1 & \\ & & (\lambda-1)^2 \end{bmatrix}.
 \end{aligned}$$

(8) 对  $D_1$  有

$$\begin{aligned}
 P_1 &= \begin{bmatrix} 1 & & & \\ -2 & 1 & & \\ -1 & & 1 & \\ 1-\lambda & & & 1 \end{bmatrix}, P_2 = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ & 1 & 2-\lambda & \\ & & 1 & \\ & & 2\lambda-1 & 1 \end{bmatrix}, P_3 = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ & 0 & 1 & \\ & 1 & 0 & \\ & \lambda-1 & & 1 \end{bmatrix}; \\
 Q_1 &= \begin{bmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & 1 & \\ 14-\lambda & -2 & -7 & 1 \end{bmatrix}, Q_2 = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ 5+\lambda & 1 & -\lambda-2 & \\ & & 1 & \\ & & & 1 \end{bmatrix}, \\
 Q_3 &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & \lambda+1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & \lambda+2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, Q_4 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}; \\
 P(\lambda) &= \begin{bmatrix} 1 & & & \\ -1 & & 0 & \\ \lambda-4 & 1 & 2-\lambda & \\ \lambda^2-8\lambda+6 & \lambda-1 & -\lambda^2+5\lambda-3 & 1 \end{bmatrix},
 \end{aligned}$$

$$Q(\lambda) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & -\lambda-1 \\ 0 & 1 & 3 & -2\lambda-1 \\ 0 & 0 & 1 & -\lambda-2 \\ 1 & -2 & 1-\lambda & \lambda^2-2\lambda+2 \end{bmatrix},$$

$$P(\lambda)(\lambda I - D_1)Q(\lambda) = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & \lambda-1 & \\ & & & (\lambda-1)^3 \end{bmatrix}.$$

(9) 对  $D_2$  有

$$P_1 = \begin{bmatrix} 1 & & 10 \\ & 1 & 6-\lambda \\ & & 1 & 4 \\ & & & 1 \end{bmatrix}, P_2 = \begin{bmatrix} 1 & & \lambda-4 \\ & 1 & -1 \\ & & 1 \\ & & & 1 \end{bmatrix}, P_3 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix};$$

$$Q_1 = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ & 1 & 1 & -\lambda \\ & & 1 & \\ & & & 1 \end{bmatrix}, Q_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \lambda+2 & 4\lambda-2 \\ & 1 & & \\ & & 1 & \\ & & & 1 \end{bmatrix};$$

$$P(\lambda) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 4 & \lambda-8 & 2 \\ 0 & -1 & 1 & \lambda-2 \end{bmatrix},$$

$$Q(\lambda) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \lambda+2 & 4\lambda-2 \\ & 1 & 1 & -\lambda \\ & & 1 & 0 \\ & & & 1 \end{bmatrix},$$

$$P(\lambda)(\lambda I - D_2)Q(\lambda) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ & 1 & 0 & 0 \\ & & (\lambda-1)^2 & 0 \\ & & & (\lambda-1)^2 \end{bmatrix}.$$

(10) 对  $D_3$  有

$$P_6 = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{126} \\ \frac{1}{4} & 0 \\ & & 1 \\ & & & 1 \end{bmatrix}, P_5 = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ 0 & 1 & & \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -\frac{(\lambda-1)^2}{126} & 0 & 1 \end{bmatrix}, P_4 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ & 1 & 0 & 2 \\ & & 1 & 0 \\ & & & 1 \end{bmatrix},$$

$$P_3 = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ -\frac{\lambda+13}{4} & 1 & & \\ & & 1 & \\ & & & 1 \end{bmatrix}, P_2 = \begin{bmatrix} 1 & -7 & & \\ & 1 & -18 & \\ & & 1 & \\ & & 1-\lambda & 1 \end{bmatrix}, P_1 = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ 0 & 1 & & \\ -1 & 0 & 1 & \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix};$$

$$Q_1 = \begin{bmatrix} & 1 & & \\ & & 1 & \\ & & & 1 \\ 1 & \lambda-1-\lambda & & 1 \end{bmatrix}, Q_2 = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ 12-2\lambda & 1 & \frac{7\lambda-33}{4} & \\ & & 1 & \\ & & & 1 \end{bmatrix}, Q_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ & 1 & 0 & 0 \\ & & 1 & 0 \\ & & & 1 \end{bmatrix},$$

$$Q_4 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \frac{\lambda^2-2\lambda-503}{504} & 0 \\ & 1 & 0 & 0 \\ & & 1 & 0 \\ & & & 1 \end{bmatrix}, Q_5 = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & 504 & \\ & & & 1 \end{bmatrix}, Q_6 = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & 0 & 1 \\ & & 1 & 0 \end{bmatrix};$$

$$P(\lambda) = \begin{bmatrix} \frac{-5}{63} & \frac{1}{126} & \frac{27-\lambda}{504} & \frac{1}{63} \\ 2 & 0 & -\frac{7}{4} & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ \lambda-1+\frac{5(\lambda-1)^2}{63} & -\frac{(\lambda-1)^2}{126} & \frac{(\lambda-1)^3-26(\lambda-1)^2}{504}+1-\lambda & -\frac{(\lambda-1)^2}{63}+1 \end{bmatrix},$$

$$Q(\lambda) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & (\lambda-1)^2 \\ 12-2\lambda & 1 & 0 & (12-2\lambda)(\lambda-1)^2+126(7\lambda-33) \\ 0 & 0 & 0 & 504 \\ \lambda-1 & 0 & 1 & (\lambda-1)^3-504(\lambda-1) \end{bmatrix},$$

$$P(\lambda)(\lambda I - D_3)Q(\lambda) = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & 1 & \\ & & & (\lambda-1)^2(\lambda^2-2\lambda-503) \end{bmatrix}.$$

69. 对第 66 题中相似的方阵  $M_1$  与  $M_2$ , 求出  $P$  使  $P^{-1}M_1P=M_2$ .

(1)  $M_1=A_1, M_2=A_2$ . 则由 68 题知存在可逆  $\lambda$ -方阵  $P_1(\lambda), Q_1(\lambda), P_2(\lambda), Q_2(\lambda)$  使

$$P_1(\lambda I - A_1)Q_1 = \begin{bmatrix} 1 & & \\ & \lambda-2 & \\ & & (\lambda-2)^2 \end{bmatrix} = P_2(\lambda I - A_2)Q_2.$$

记  $P(\lambda)=P_2^{-1}(\lambda)P_1(\lambda), Q(\lambda)=Q_1(\lambda)Q_2^{-1}(\lambda)$ , 有

$$P(\lambda)(\lambda I - A_1)Q(\lambda) = \lambda I - A_2,$$

$$P^{-1}(\lambda) = P_1^{-1}(\lambda)P_2(\lambda) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 1 & 2 & \lambda-7 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -\frac{3}{2} \\ 1 & 5 & \frac{\lambda-36}{4} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 3 & -3 - \frac{3}{4}\lambda \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

设  $A_1$  为线性空间  $V$  的线性变换  $\mathcal{A}$  在基  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  下的方阵表示, 令

$$(\beta_1, \beta_2, \beta_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)P(\lambda)^{-1},$$

则  $A_2$  是  $\mathcal{A}$  在基  $\beta_1, \beta_2, \beta_3$  下的方阵表示. 我们只需求出把  $\beta_1, \beta_2, \beta_3$  表为  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  的以  $F$  中元为系数的线性组合. 由上有

$$\begin{aligned} \beta_1 &= \alpha_1, \quad \beta_2 = 3\alpha_1 + \alpha_2, \\ \beta_3 &= \left(-3 - \frac{3}{4}\lambda\right)\alpha_1 + \frac{1}{2}\alpha_2 + \alpha_3 = -3\alpha_1 - \frac{3}{4}\mathcal{A}\alpha_1 + \frac{1}{2}\alpha_2 + \alpha_3 \\ &= -3\alpha_1 - \frac{3}{4}(3\alpha_1 + 2\alpha_2 + \alpha_3) + \frac{1}{2}\alpha_2 + \alpha_3 = -\frac{21}{4}\alpha_1 - \alpha_2 + \frac{1}{4}\alpha_3. \end{aligned}$$

所以

$$(\beta_1, \beta_2, \beta_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{bmatrix} 1 & 3 & -\frac{21}{4} \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix} = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)P,$$

即  $P$  是从基  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  到基  $\beta_1, \beta_2, \beta_3$  的过渡矩阵, 故

$$P^{-1}A_1P = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 9 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 2 & -5 \\ 2 & 6 & -10 \\ 1 & 2 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 3 & -\frac{21}{4} \\ 1 & -1 \\ \frac{1}{4} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 20 & -34 \\ 6 & 32 & -51 \\ 4 & 20 & -32 \end{bmatrix} = A_2.$$

(2)  $M_1 = B_1, M_2 = B_2$ , 则存在可逆  $\lambda$ -方阵  $P(\lambda), Q(\lambda)$ . 使

$$P(\lambda)(\lambda I - B_1)Q(\lambda) = \lambda I - B_2,$$

$$P(\lambda)^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & \lambda-8 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} \frac{1}{4} & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ \lambda+31 & -20 & -4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{5\lambda+126}{4} & -22 & -4 \\ -\frac{5}{4} & 1 & 0 \\ -\frac{1}{4} & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

设  $B_1$  为线性空间  $V$  的线性变换  $\mathcal{A}$  在基  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  下的方阵表示,  $B_2$  为  $\mathcal{A}$  在基  $\beta_1, \beta_2, \beta_3$  下的方阵表示, 从基  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  到  $\beta_1, \beta_2, \beta_3$  的过渡矩阵为  $P$ , 则

$$(\beta_1, \beta_2, \beta_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{bmatrix} 39 & -22 & -4 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

且有

$$\begin{aligned} P^{-1}B_1P &= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -\frac{1}{4} & -\frac{22}{4} & \frac{39}{4} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 6 & 6 & -15 \\ 1 & 5 & -5 \\ 1 & 2 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 39 & -22 & -4 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 37 & -20 & -4 \\ 34 & -17 & -4 \\ 119 & -70 & -11 \end{bmatrix} = B_2. \end{aligned}$$

其中  $P$  的计算过程类似(1)即其第 2, 3 列同  $P(\lambda)^{-1}$  的 2, 3 列, 第 1 列由  $P(\lambda)^{-1}$  的第一

列中把  $\lambda$  换为  $\mathcal{A}$  即  $\beta_1 = \frac{5}{4}\mathcal{A}\alpha_1 + \frac{63}{2}\alpha_1 - \frac{5}{4}\alpha_2 - \frac{1}{4}\alpha_3 = 39\alpha_1 + \alpha_3.$

(3)  $M_1 = C_1, M_2 = C_3$ . 由 66 题知存在可逆  $\lambda$ -方阵  $P(\lambda), Q(\lambda)$  使

$$P(\lambda)(\lambda I - C_1)Q(\lambda) = \lambda I - C_3,$$

$$P(\lambda)^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & \lambda - 6 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 1 & -1 \\ -4 & -20 & \lambda + 33 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4 & -22 & \frac{3}{4}\lambda + 36 \\ 0 & 1 & -\frac{3}{4} \\ 0 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix},$$

由  $(\beta_1, \beta_2, \beta_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)P(\lambda)^{-1},$

知有  $\beta_1 = -4\alpha_1, \beta_2 = -22\alpha_1 + \alpha_2,$

$$\beta_3 = \frac{3}{4}\mathcal{A}\alpha_1 + 36\alpha_1 - \frac{3}{4}\alpha_2 + \frac{1}{4}\alpha_3 = 39\alpha_1 + 0\alpha_2 + \alpha_3,$$

其中  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1, \beta_2, \beta_3, \mathcal{A}$  等说明见(1)或(2). 这里有

$$\mathcal{A}(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)C_1,$$

所以

$$\mathcal{A}\alpha_1 = 4\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3.$$

故

$$P = \begin{bmatrix} -4 & -22 & 39 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow P^{-1} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{4} & -\frac{11}{2} & \frac{39}{4} \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

$$P^{-1}C_1P = \begin{bmatrix} -13 & -70 & 119 \\ -4 & -19 & 34 \\ -4 & -20 & 35 \end{bmatrix} = C_3.$$

70. 求第 66 题中方阵的行列式因子.

解 设  $M$  的不变因子为  $d_1(\lambda), \dots, d_r(\lambda)$ , 则  $M$  的行列式因子为

$$d_1(\lambda), d_1(\lambda)d_2(\lambda), \dots, d_1(\lambda)\cdots d_r(\lambda).$$

在 66 题中, 我们已求出各方阵的不变因子, 故利用上述计算公式立得十个方阵的行列式因子如下:

$$A_1 \text{ 与 } A_2: 1, \lambda-2, (\lambda-2)^3;$$

$$B_1 \text{ 与 } B_2: 1, \lambda-3, (\lambda-3)^3;$$

$$C_1 \text{ 与 } C_3: 1, (\lambda-1), (\lambda-1)^3;$$

$$C_2: 1, 1, (\lambda-1)^3;$$

$$D_1: 1, 1, (\lambda-1), (\lambda-1)^4;$$

$$D_2: 1, 1, (\lambda-1)^2, (\lambda-1)^4;$$

$$D_3: 1, 1, 1, (\lambda-1)^2(\lambda^2-2\lambda-503).$$

71. 分别在  $\mathbf{Q}, \mathbf{R}, \mathbf{C}$  上求第 66 题中方阵的初等因子组.

解 设  $A$  的不等于 1 的不变因子为  $d_1(\lambda), \dots, d_r(\lambda)$ , 并设在  $F$  上有因子分解:

$$d_1(\lambda) = p_1(\lambda)^{k_{11}} p_2(\lambda)^{k_{12}} \cdots p_{s_1}(\lambda)^{k_{1s_1}},$$

...

$$d_r(\lambda) = p_1(\lambda)^{k_{r1}} p_2(\lambda)^{k_{r2}} \cdots p_{s_r}(\lambda)^{k_{rs_r}}.$$

其中  $p_j(\lambda)$  为  $F$  上互异首一不可约多项式,  $k_{ij}$  为正整数且  $k_{ij} \leq k_{(i+1)j}$  ( $i=1, \dots, r; j=1, \dots, s_i$ ). 则全体不可约因子幂

$$p_j(\lambda)^{k_{ij}} \quad (i=1, \dots, r; j=1, \dots, s_i)$$

称为  $A$  的在  $F$  上的初等因子组(相同者均重复计  $\lambda$ ).

又 66 题中除  $D_3$  外各方阵的不变因子在  $\mathbf{Q}, \mathbf{R}, \mathbf{C}$  上的因子分解相同, 故其在  $\mathbf{Q}, \mathbf{R}, \mathbf{C}$  上的初等因子组相同, 把相似的写在一起, 即有前 9 个方阵的初等因子组如下:

$$A_1 \text{ 与 } A_2: (\lambda-2), (\lambda-2)^2;$$

$$B_1 \text{ 与 } B_2: (\lambda-3), (\lambda-3)^2;$$

$$C_1 \text{ 与 } C_3: (\lambda-1), (\lambda-1)^2;$$

$$C_2: (\lambda-1)^3;$$

$$D_1: (\lambda-1), (\lambda-1)^3;$$

$$D_2: (\lambda-1)^2, (\lambda-1)^2;$$

而  $D_3$  在  $\mathbf{Q}$  上的初等因子组为:  $(\lambda-1)^2, (\lambda^2-2\lambda-503)$ ;

在  $\mathbf{R}, \mathbf{C}$  上的初等因子组为:  $(\lambda-1)^2, (\lambda-1-6\sqrt{14}), (\lambda-1+6\sqrt{14})$ .

72. 在域  $\mathbf{Q}$  上求第 66 题中各方阵的有理标准形, Jordan 标准形, 初等因子友阵形.

解 设  $A$  的不等于 1 的不变因子为  $d_1(\lambda), \dots, d_r(\lambda)$ , 在  $\mathbf{Q}$  上的初等因子为  $p_1(\lambda)^{k_1}, \dots, p_s(\lambda)^{k_s}$  (重者也计  $\lambda$ ), 则  $A$  的有理标准形, Jordan 标准形, 初等因子友阵形分别为

$$C = \begin{bmatrix} C(d_1) & & \\ & \ddots & \\ & & C(d_r) \end{bmatrix}, \quad J = \begin{bmatrix} J(p_1^{k_1}) & & \\ & \ddots & \\ & & J(p_s^{k_s}) \end{bmatrix},$$

$$G = \begin{bmatrix} C(p_1^{k_1}) & & \\ & \ddots & \\ & & C(p_s^{k_s}) \end{bmatrix}.$$

其中  $C(g)$  表示  $g(\lambda)$  的友阵, 而当  $p_i$  为一次时,  $J(p_i^{k_i})$  为  $k_i$  阶 Jordan 块, 当  $p_i$  为二次时 ( $k_i=1$ ),  $J(p_i)=C(p_i)$  是  $p_i$  的友阵.

由 66 题和 70 题我们已知各方阵的不变因子和  $\mathbf{Q}$  上的初等因子组, 故立得所要求的各类标准形:

(1)  $A_1$  与  $A_2$  的不变因子为  $1, \lambda-2, (\lambda-2)^2$ , 初等因子组为  $(\lambda-2), (\lambda-2)^2$ . 所以

$$C = \begin{bmatrix} C(\lambda-2) & \\ & C((\lambda-2)^2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & & \\ & 0 & -4 \\ & 1 & 4 \end{bmatrix};$$

$$J = \begin{bmatrix} J(\lambda-2) & \\ & J((\lambda-2)^2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & & \\ & 2 & \\ & 1 & 2 \end{bmatrix};$$

$$G = \begin{bmatrix} C(\lambda-2) & \\ & C((\lambda-2)^2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & & \\ & 0 & -4 \\ & 1 & 4 \end{bmatrix}.$$

(2)  $B_1$  与  $B_2$  的不变因子为  $1, (\lambda-3), (\lambda-3)^2$ , 初等因子组为  $\lambda-3, (\lambda-3)^2$ , 故

$$C = \begin{bmatrix} 3 & & \\ & 0 & -9 \\ & 1 & 6 \end{bmatrix}, J = \begin{bmatrix} 3 & & \\ & 3 & \\ & 1 & 3 \end{bmatrix}, G = \begin{bmatrix} 3 & & \\ & 0 & -9 \\ & 1 & 6 \end{bmatrix} = C.$$

(3)  $C_1$  与  $C_3$  的不变因子为  $1, \lambda-1, (\lambda-1)^2$ , 初等因子组为  $\lambda-1, (\lambda-1)^2$ , 故

$$C = \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 0 & -1 \\ & 1 & 2 \end{bmatrix}, J = \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & 1 & 1 \end{bmatrix}, G = C = \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 0 & -1 \\ & 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

(4)  $C_2$  的不变因子为  $1, 1, (\lambda-1)^3$ , 初等因子组为  $(\lambda-1)^3$ , 故

$$C = \begin{bmatrix} 0 & & 1 \\ 1 & 0 & -3 \\ & 1 & 3 \end{bmatrix}, J = \begin{bmatrix} 1 & & \\ 1 & 1 & \\ & 1 & 1 \end{bmatrix}, G = C = \begin{bmatrix} 0 & & 1 \\ 1 & 0 & -3 \\ & 1 & 3 \end{bmatrix}.$$

(5)  $D_1$  的不变因子为  $1, 1, \lambda-1, (\lambda-1)^3$ , 初等因子组为  $\lambda-1, (\lambda-1)^3$ , 故

$$C = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ & 0 & & 1 \\ & 1 & 0 & -3 \\ & & 1 & 3 \end{bmatrix}, J = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & 1 & 1 & \\ & & 1 & 1 \end{bmatrix}, G = C.$$

(6)  $D_2$  的不变因子为  $1, 1, (\lambda-1)^2, (\lambda-1)^2$ , 初等因子为  $(\lambda-1)^2, (\lambda-1)^2$ , 故

$$C = \begin{bmatrix} 0 & & 1 & \\ 1 & -2 & & \\ & & 0 & 1 \\ & & 1 & -2 \end{bmatrix}, J = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ 1 & 1 & & \\ & & 1 & \\ & & 1 & 1 \end{bmatrix}, G = C.$$

(7)  $D_3$  的不变因子为  $1, 1, 1, (\lambda-1)^2(\lambda^2-2\lambda-503)$ , 初等因子组为  $(\lambda-1)^2, (\lambda^2-2\lambda-503)$ , 故



$$C = \begin{bmatrix} 0 & & 503 \\ 1 & 0 & -1004 \\ & 1 & 0 & 498 \\ & & 1 & 4 \end{bmatrix}, J = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ 1 & 1 & & \\ & & 0 & 503 \\ & & 1 & 2 \end{bmatrix}, G = \begin{bmatrix} 0 & -1 & & \\ 1 & 2 & & \\ & & 0 & 503 \\ & & 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

注意  $d_4(\lambda) = (\lambda-1)^2(\lambda^2-2\lambda-503) = \lambda^4 - 4\lambda^3 - 498\lambda^2 + 1004\lambda - 503$ .

73. 在域  $\mathbf{R}$  上做如第 72 题.

解 因为方阵的不变因子不随基域的不同考虑而改变, 所以 10 个方阵在  $\mathbf{R}$  上的有理标准形均不变(同  $\mathbf{Q}$  上的).

前 9 个方阵在  $\mathbf{R}$  和  $\mathbf{Q}$  上的初等因子组也相同, 故其 Jordan 标准形与初等因子友阵形也均同 72 题. 唯有  $D_3$  在  $\mathbf{R}$  上的初等因子组变为

$$(\lambda-1)^2, \lambda-1-6\sqrt{14}, \lambda-1+6\sqrt{14},$$

所以

$$J = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ 1 & 1 & & \\ & & 1+6\sqrt{14} & \\ & & & 1-6\sqrt{14} \end{bmatrix},$$

$$G = \begin{bmatrix} 0 & -1 & & \\ 1 & 2 & & \\ & & 1+6\sqrt{14} & \\ & & & 1-6\sqrt{14} \end{bmatrix}.$$

74. 在域  $\mathbf{C}$  上做如第 72 题.

解 因为 10 个方阵在  $\mathbf{R}$  和  $\mathbf{C}$  上的初等因子组相同, 所以其在  $\mathbf{C}$  上的三种标准形均同于 73 题.

75. 计算下列方阵函数:

$$(1) A^{100}, A = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ -3 & 5 \end{bmatrix}; (2) A^{50}, A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}; (3) \sqrt{A}, A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 5 \end{bmatrix};$$

$$(4) \sqrt{A}, A = \begin{bmatrix} 6 & 2 \\ 3 & 7 \end{bmatrix}; (5) e^A, A = \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ 6 & -3 \end{bmatrix}, (6) \lg A, A = \begin{bmatrix} 4 & -15 & 6 \\ 1 & -4 & 2 \\ 1 & -5 & 3 \end{bmatrix};$$

$$(7) \sin A, A = \begin{bmatrix} \pi-1 & 1 \\ -1 & \pi+1 \end{bmatrix}; (8) e^A, A = \begin{bmatrix} 0 & c \\ -c & 0 \end{bmatrix}.$$

解 (1) 因为  $\det(\lambda I - A) = \begin{vmatrix} \lambda & -2 \\ 3 & \lambda-5 \end{vmatrix} = (\lambda-2)(\lambda-3)$ , 所以  $\lambda_1=2, \lambda_2=3$  为  $A$  的特征值, 故知  $A$  相似于对角阵.

解  $(A-2I)x=0$ , 得  $x_1=(1,1)^T$ , 解  $(A-3I)x=0$ , 得  $x_2=(2,3)^T$ , 则  $x_1, x_2$  线性无关(属于不同特征值的特征向量). 令  $P=(x_1, x_2) = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$ , 则

$$P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 2 & \\ & 3 \end{bmatrix}, \rightarrow A = P \begin{bmatrix} 2 & \\ & 3 \end{bmatrix} P^{-1},$$

$$\begin{aligned}\text{所以 } A^{100} &= \left( P \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} P^{-1} \right)^{100} = P \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}^{100} P^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2^{100} & \\ & 3^{100} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 2^{100} & 2 \times 3^{100} \\ 2^{100} & 3^{101} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \cdot 2^{100} - 2 \cdot 3^{100} & -2^{101} + 2 \cdot 3^{100} \\ 3 \cdot 2^{100} - 3^{101} & -2^{101} + 3^{101} \end{bmatrix}.\end{aligned}$$

$$(2) \lambda I - A = \begin{bmatrix} \lambda-1 & -1 \\ 1 & \lambda-3 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ (\lambda-2)^2 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & (\lambda-2)^2 \end{bmatrix},$$

故  $A$  的初等因子为  $(\lambda-2)^2$ ,  $A$  相似于  $J = \begin{bmatrix} 2 & \\ & 2 \end{bmatrix}$ . 令  $P = (x_1, x_2)$ , 则  $x_2$  为特征向量是  $(A-2I)x=0$  的解, 得  $x_2 = (1, 1)^T$ ;  $x_1$  满足  $(A-2I)x = x_2$ , 得  $x_1 = (0, 1)^T$ , 则

$$P = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, P^{-1} = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix},$$

故

$$\begin{aligned}A^{50} &= PJ^{50}P^{-1} = P \left( 2I + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \right)^{50} P^{-1} = P \left( 2^{50}I + 50 \cdot 2^{49} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \right) P^{-1} \\ &= 2^{50} + 2^{50} \cdot 25 P \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} P^{-1} = 2^{50} \left( I + 25 \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \right) \\ &= 2^{50} \begin{bmatrix} -24 & 25 \\ -25 & 26 \end{bmatrix}.\end{aligned}$$

$$(3) \det(\lambda I - A) = \begin{vmatrix} \lambda-3 & -1 \\ 1 & \lambda-5 \end{vmatrix} = (\lambda-4)^2, \text{ 所以 } \lambda=4 \text{ 为二重根. 解线性方程组}$$

$(4I-A)x=0$  知  $A$  的属于特征值 4 的特征子空间是一维的, 所以  $A \sim \begin{bmatrix} 4 & \\ & 4 \end{bmatrix}$ , 令  $P = (x_1, x_2)$ , 则  $x_2$  应为特征向量, 取  $x_2 = (1, 1)^T$ , 而  $x_1$  是非齐次线性方程组  $(A-4I)x = x_2$  的解, 取  $x_1 = (-1, 0)^T$ ,

$$\text{所以 } P = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow P^{-1} = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \text{ 且 } P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 4 & \\ & 4 \end{bmatrix},$$

$$\text{故 } \sqrt{A} = P \sqrt{J} P^{-1} = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & \\ \frac{1}{4} & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{7}{4} & \frac{1}{4} \\ -\frac{1}{4} & \frac{9}{4} \end{bmatrix}.$$

这里用到: 若  $J = \begin{bmatrix} \lambda & \\ & \lambda \end{bmatrix}$ , 则  $f(J) = \begin{bmatrix} f(\lambda) & \\ f'(\lambda) & f(\lambda) \end{bmatrix}$ , 此处  $f(x) = x^{\frac{1}{2}}$ .

$$(4) \det(\lambda I - A) = \begin{vmatrix} \lambda-6 & -2 \\ -3 & \lambda-7 \end{vmatrix} = \lambda^2 - 13\lambda + 36 = (\lambda-4)(\lambda-9), \text{ 所以 } \lambda_1 = 4, \lambda_2 = 9,$$

故  $A \sim \text{diag}\{4, 9\} = D$ .

解  $(4I-A)x=0$ , 得  $x = k_1(1, -1)^T$ , 取  $x_1 = (1, -1)^T$ ; 解  $(9I-A)x=0$ , 得  $x = k_2(2, 3)^T$ , 取  $x_2 = (2, 3)^T$ .

令  $P = (x_1, x_2) = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$ , 则  $P$  可逆且有  $P^{-1}AP = D \rightarrow A = PDP^{-1}$ .

所以  $\sqrt{A} = P \sqrt{D} P^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & \\ & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{3}{5} & -\frac{2}{5} \\ \frac{1}{5} & \frac{1}{5} \end{bmatrix} = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 12 & 2 \\ 3 & 13 \end{bmatrix}.$

(5)  $|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda-4 & 2 \\ -6 & \lambda+3 \end{vmatrix} = (\lambda-4)(\lambda+3)+12 = \lambda(\lambda-1)$ , 所以  $A$  相似于对角阵  $D = \text{diag}\{1, 0\}.$

令  $P = (x_1, x_2)$ , 解  $(A - I)x = 0$ , 取  $x_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}$ ; 解  $Ax = 0$ , 取  $x_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$ ,

故  $P = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$ ,  $P^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{bmatrix}$ , 且  $P^{-1}AP = D$ ,

所以 
$$e^A = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} A^k = P \left( \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} D^k \right) P^{-1} = P e^D P^{-1}$$

$$= \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e & \\ & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4e-3 & 2-2e \\ 6e-6 & 4-3e \end{bmatrix}.$$

(6) 由  $|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda-4 & 15 & -6 \\ -1 & \lambda+4 & -2 \\ -1 & 5 & \lambda-3 \end{vmatrix} = \lambda^3 - 3\lambda^2 + 3\lambda - 1 = (\lambda-1)^3$ , 知  $\lambda=1$  为三重

根. 又因为

$$r(I - J) = r(I - A) = r \begin{bmatrix} -3 & 15 & -6 \\ -1 & 5 & -2 \\ -1 & 5 & -2 \end{bmatrix} = 1, \text{ 所以 } A \sim J = \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{bmatrix}.$$

令  $P = (x_1, x_2, x_3)$ , 由  $P^{-1}AP = J \rightarrow AP = PJ$ , 所以应有

$$Ax_1 = x_1 + x_2, Ax_2 = x_2, Ax_3 = x_3.$$

解  $(A - I)x = 0$ , 得

$$x = k_1 \begin{bmatrix} 5 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + k_2 \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \text{ 取 } x_2 = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, x_3 = \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix},$$

再解  $(A - I)x = x_2$ , 得  $x = (1, 0, 0)^T + k_1(5, 1, 0)^T + k_2(-2, 0, 1)^T$ , 取  $x_1 = (1, 0, 0)^T$ . 于是

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow P^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -5 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}, \text{ 则有 } P^{-1}AP = J,$$

故  $\lg A = P \lg J P^{-1} = P \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} P^{-1} = \begin{bmatrix} 3 & -15 & 6 \\ 1 & -5 & 2 \\ 1 & -5 & 2 \end{bmatrix}.$

(7)  $|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda - \pi + 1 & -1 \\ 1 & \lambda - \pi - 1 \end{vmatrix} = (\lambda - \pi)^2$ , 所以  $\lambda = \pi$ . 又因为  $r(A - \pi I) = 1$ ,

故  $A \sim J = \begin{bmatrix} \pi & \\ 1 & \pi \end{bmatrix}$ .

解  $(A - \pi I)x = 0$ , 得  $x_2 = (1, 1)^T$ ; 解  $(A - \pi I)x = x_2$ , 得  $x_1 = (-1, 0)^T$ . 令

$$P = (x_1, x_2) = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow P^{-1} = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \text{ 则 } P^{-1}AP = J,$$

所以 
$$\sin A = P(\sin J)P^{-1} = P \begin{bmatrix} \sin \pi & \\ \cos \pi & \sin \pi \end{bmatrix} P^{-1} = P \begin{bmatrix} 0 & \\ -1 & 0 \end{bmatrix} P^{-1}$$

$$= \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}.$$

(8)  $|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda & -c \\ c & \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 + c^2$ , 所以  $\lambda = \pm ic$ ,

$$A \sim D = \begin{bmatrix} ic & \\ & -ic \end{bmatrix}.$$

解  $(A - ic)x = 0$ , 得  $x_1 = (1, i)^T$ ; 解  $(A + ic)x = 0$ , 得  $x_2 = (1, -i)^T$ , 令

$$P = (x_1, x_2) = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ i & -i \end{bmatrix}, \text{ 则 } P^{-1} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & -i \\ 1 & i \end{bmatrix}, \text{ 且 } P^{-1}AP = D,$$

于是得 
$$e^A = Pe^DP^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ i & -i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e^{ic} & \\ & e^{-ic} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -i \\ 1 & i \end{bmatrix} \frac{1}{2}$$

$$= \begin{bmatrix} \frac{1}{2}(e^{ic} + e^{-ic}) & \frac{1}{2i}(e^{ic} - e^{-ic}) \\ \frac{-1}{2i}(e^{ic} - e^{-ic}) & \frac{1}{2}(e^{ic} + e^{-ic}) \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \csc & \sinh \\ -\sinh & \csc \end{bmatrix}.$$

76. 证明: 对任何方阵  $A$ , 方阵  $e^A$  是非奇异的.

证 对任方阵  $A$  都有可逆阵  $P$  使得

$$P^{-1}AP = J = \begin{bmatrix} J_1(\lambda_1) & & \\ & \ddots & \\ & & J_s(\lambda_s) \end{bmatrix}, \text{ 其中 } J_i = \begin{bmatrix} \lambda_i & & \\ 1 & \ddots & \\ & \ddots & \ddots \\ & & 1 & \lambda_i \end{bmatrix}$$

为若当块.  $\lambda_1, \dots, \lambda_s$  为  $A$  的特征值.

又

$$e^A = Pe^JP^{-1} = P \begin{bmatrix} e^{J_1} & & \\ & \ddots & \\ & & e^{J_s} \end{bmatrix} P^{-1}, \text{ 其中 } e^{J_i} = \begin{bmatrix} e^{\lambda_i} & 0 & \cdots & 0 \\ * & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ * & \cdots & * & e^{\lambda_i} \end{bmatrix},$$

所以  $\det e^A = \det e^J = e^J$  的对角线元素之积. 因为对任  $\lambda_i \in F$ ,  $e^{\lambda_i} \neq 0$ , 所以  $e^J$  的对角线元均非 0, 故  $\det e^A \neq 0$ , 即  $e^A$  可逆, 故  $e^A$  非奇异.

77. 求  $e^A$  的行列式, 其中  $A$  为  $n$  阶方阵.

解 设  $A$  的特征值为  $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ , 由第 76 题知  $e^A$  的特征值为  $e^{\lambda_1}, e^{\lambda_2}, \dots, e^{\lambda_n}$ , 故

$$\begin{aligned}\det e^A &= e^{\lambda_1} \cdot e^{\lambda_2} \cdots e^{\lambda_n} = e^{(\lambda_1 + \cdots + \lambda_n)} \\ &= e^{\operatorname{tr} A} = e^{a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn}}.\end{aligned}$$

倒数第二个等号是因为相似的方阵有相同的迹, 即若  $A \sim B$ , 则  $\operatorname{tr} A = \operatorname{tr} B$ .

78. 对第 66 题中每个方阵, 写出与其可交换的所有方阵.

解 由第 74 题我们已知每个方阵  $M$  的 Jordan 标准形  $J$ , 再求出可逆阵  $P$ , 使得  $P^{-1}MP = J$ , 则由定理 7.19 可得与  $M$  可交换的所有方阵为

$$B = PB_1P^{-1} = P(B_{ij})P^{-1},$$

其中  $B_1 = (B_{ij})$  是与  $J$  相应分块的方阵, 且

$$B_{ij} = \begin{cases} 0, & \text{当 } \lambda_i \neq \lambda_j, \\ \text{下三角分层矩阵}, & \text{当 } \lambda_i = \lambda_j. \end{cases}$$

以下对每个方阵给出具体计算表达式, 其中  $a_i, b_i, c_i, d_i$  任意.

$$(1) A_1 \sim J = \begin{bmatrix} 2 & & \\ 1 & 2 & \\ & & 2 \end{bmatrix}, P = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, P^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -5 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \end{bmatrix},$$

则

$$B = P \begin{bmatrix} a_1 & & \\ a_2 & a_1 & c_1 \\ d_1 & & b_1 \end{bmatrix} P^{-1}.$$

$$(2) A_2 \sim J = \begin{bmatrix} 2 & & \\ 1 & 2 & \\ & & 2 \end{bmatrix}, P = \begin{bmatrix} 1 & 4 & -5 \\ 0 & 6 & 1 \\ 0 & 4 & 0 \end{bmatrix}, P^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 5 & -\frac{17}{2} \\ 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 1 & -\frac{3}{2} \end{bmatrix},$$

则

$$B = P \begin{bmatrix} a_1 & 0 & 0 \\ a_2 & a_1 & c_1 \\ d_1 & 0 & b_1 \end{bmatrix} P^{-1}.$$

$$(3) B_1 \sim J = \begin{bmatrix} 3 & & \\ 1 & 3 & \\ & & 3 \end{bmatrix}, P = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, P^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix},$$

则

$$B = P \begin{bmatrix} a_1 & & \\ a_2 & a_1 & c_1 \\ d_1 & & b_1 \end{bmatrix} P^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 & 0 & 0 \\ a_2 & a_1 & c_1 \\ d_1 & 0 & b_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}.$$

$$(4) B_2 \sim J = \begin{bmatrix} 3 & & \\ 1 & 3 & \\ & & 3 \end{bmatrix}, P = \begin{bmatrix} 1 & 34 & 2 \\ 0 & 34 & 0 \\ 0 & 119 & 17 \end{bmatrix}, P^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -\frac{20}{34} & -\frac{2}{17} \\ 0 & \frac{1}{34} & 0 \\ 0 & -\frac{7}{34} & \frac{1}{17} \end{bmatrix},$$

则

$$B = P \begin{bmatrix} a_1 & & \\ a_2 & a_1 & c_1 \\ d_1 & & b_1 \end{bmatrix} P^{-1}.$$

$$(5) C_1 \sim J = \begin{bmatrix} 1 & & \\ 1 & 1 & \\ & & 1 \end{bmatrix}, P = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, P^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix},$$

所以

$$B = P \begin{bmatrix} a_1 & & \\ a_2 & a_1 & c_1 \\ d_1 & & b_1 \end{bmatrix} P^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 & 0 & 0 \\ a_2 & a_1 & c_1 \\ d_1 & 0 & b_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

$$(6) C_2 \sim J = \begin{bmatrix} 1 & & \\ 1 & 1 & \\ & & 1 \end{bmatrix}, P = \begin{bmatrix} 10 & 6 & 3 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}, P^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -6 \\ -2 & -7 & 13 \\ 1 & 4 & -6 \end{bmatrix},$$

所以

$$B = PB_1P^{-1} = \begin{bmatrix} 10 & 6 & 3 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 & & \\ a_2 & a_1 & \\ a_3 & a_2 & a_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 3 & -6 \\ -2 & -7 & 13 \\ 1 & 4 & -6 \end{bmatrix}.$$

$$(7) C_3 \sim J = \begin{bmatrix} 1 & & \\ 1 & 1 & \\ & & 1 \end{bmatrix}, P = \begin{bmatrix} -1 & 14 & -5 \\ 0 & 4 & 1 \\ 0 & 4 & 0 \end{bmatrix}, P^{-1} = \begin{bmatrix} -1 & -5 & \frac{17}{2} \\ 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix},$$

所以

$$B = PB_1P^{-1} = \begin{bmatrix} -1 & 14 & -5 \\ 0 & 4 & 1 \\ 0 & 4 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 & 0 & 0 \\ a_2 & a_1 & c_1 \\ d_1 & 0 & b_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & -5 & \frac{17}{2} \\ 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}.$$

$$(8) D_1 \sim J = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ 1 & 1 & & \\ & 1 & 1 & \\ & & & 1 \end{bmatrix}, P = \begin{bmatrix} 0 & -1 & -2 & 1 \\ 0 & -2 & -3 & 3 \\ 0 & -1 & -3 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix},$$

$$P^{-1} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 & 1 \\ -6 & 1 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ -3 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \text{ 所以 } B = P \begin{bmatrix} a_1 & & & \\ a_2 & a_1 & & \\ a_3 & a_2 & a_1 & c_1 \\ d_1 & & & b_1 \end{bmatrix} P^{-1}.$$

$$(9) D_2 \sim J = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & 1 & \\ & & & 1 \end{bmatrix}, P = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix},$$

$$P^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -5 & 0 \\ 0 & -2 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}, \text{ 所以 } B = P \begin{bmatrix} a_1 & & c_1 & \\ a_2 & a_1 & c_2 & c_1 \\ d_1 & & b_1 & \\ d_2 & d_1 & b_2 & b_1 \end{bmatrix} P^{-1}.$$

$$(10) D_3 \sim J = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ 1 & 1 & & \\ & & 1+6\sqrt{14} & \\ & & & 1-6\sqrt{14} \end{bmatrix}, \text{ 则 } B = P \begin{bmatrix} a_1 & & & \\ a_2 & a_1 & & \\ & & & b_1 \\ & & & c_1 \end{bmatrix} P^{-1},$$

记  $\alpha_1 = 13 + 3\sqrt{14}, \alpha_2 = 13 - 3\sqrt{14}, \beta_1 = 252 + 120\sqrt{14}, \beta_2 = 252 - 120\sqrt{14}$ , 则

$$P = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{\alpha_1}{20} - \frac{1820 - 14\alpha_1}{10\beta_1} & \frac{\alpha_2}{20} - \frac{1820 - 14\alpha_2}{10\beta_2} \\ -3 & -13 & \frac{-1820 + 14\alpha_1}{\beta_1} & \frac{-1820 + 14\alpha_2}{\beta_2} \\ 1 & 2 & 1 & 1 \\ -2 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

\* 79. 证明: 两个可交换的奇数阶实方阵必有公共的实特征向量.

证 设  $A, B \in M_n(\mathbf{R}), AB = BA$ . 把  $A, B$  分别看成  $\mathbf{R}^n$  上的线性变换. 则  $A$  的特征多项式是奇数次实系数多项式, 故必有实根 (因复根成共轭对出现) 也即  $A$  必有重数为奇数的实特征根  $\lambda_0$ . 记  $W_{\lambda_0}$  是属于  $\lambda_0$  的根子空间, 则  $W_{\lambda_0}$  也是  $B$  的不变子空间 (因为  $\forall \alpha \in W_{\lambda_0}$ , 有  $(A - \lambda_0 I)^k B\alpha = B(A - \lambda_0 I)^k \alpha = B0 = 0$ , 所以  $B\alpha \in W_{\lambda_0}$ ) 记  $B|_{W_{\lambda_0}} = B_1$ , 因为  $\dim W_{\lambda_0} = \text{奇数} = \lambda_0$  的重数, 所以  $B_1$  的特征多项式为奇数次的, 故  $B_1$  必有实特征值  $\mu_0$ . 设  $V_{\mu_0}$  是属于  $\mu_0$  的特征子空间, 记  $A_1 = A|_{W_{\lambda_0}}$ , 则  $V_{\mu_0}$  是  $A_1$  的不变子空间 (因为任  $x \in V_{\mu_0}$ ,  $B_1(A_1 x) = A_1 B_1 x = A_1 \mu_0 x = \mu_0(A_1 x)$ ) 令  $A_2 = A_1|_{V_{\mu_0}}$ , 则  $A_2$  在  $V_{\mu_0}$  上有实特征值  $\lambda_0$ , 所以有实特征向量  $\beta$ , 且  $\beta$  也是  $B_1$  的实特征向量, 故  $\beta$  是  $A_2, B_1$  的公共特征向量, 又  $A\beta = A_2\beta = \lambda_0\beta, B\beta = B_1\beta = \mu_0\beta$ , 所以  $\beta$  是  $A, B$  的公共的实特征向量.

80. 证明:  $n$  阶方阵  $A$  的多项式全体所成线性空间的维数, 等于  $A$  的最小多项式  $m(\lambda)$  的次数.

证 设  $m(\lambda) = \lambda^d - a_{d-1}\lambda^{d-1} - \cdots - a_1\lambda - a_0$ , 则

$I, A, \dots, A^{d-1}$  线性无关.

(否则与  $m(\lambda)$  是最小多项式矛盾) 且  $A^d$  可由  $I, A, \dots, A^{d-1}$  线性表出.

任  $f(\lambda) \in F[\lambda]$ , 若  $\deg f \leq d$ , 则  $f(A)$  可由  $I, A, \dots, A^{d-1}$  线性表出; 若  $\deg f > d$ , 由带余除法设

$$f(\lambda) = m(\lambda)q(\lambda) + r(\lambda), \quad \deg r < \deg m,$$

于是有

$$f(A) = m(A)q(A) + r(A) = r(A) \text{ 是 } I, A, \dots, A^{d-1} \text{ 的线性组合,}$$

故  $I, A, \dots, A^{d-1}$  是  $W(A \text{ 的多项式全体所成线性空间})$  的基.

所以

$$\dim W = d = \deg m(\lambda).$$

## 7.4 补充题与解答

1. 已知线性空间  $V$  上的线性变换  $\mathcal{A}$  在基  $\epsilon_1, \epsilon_2, \epsilon_3, \epsilon_4$  下的方阵表示为

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 1 & -1 \\ 1 & -2 & -2 & -1 \end{bmatrix},$$

求  $\mathcal{A}$  的包含向量  $\epsilon_1$  的最小不变子空间.

解 方法 1 因为  $\epsilon_1 \in W$ , 所以  $\mathcal{A}\epsilon_1 \in W \rightarrow F[\mathcal{A}]\epsilon_1 \in W$ .  $\mathcal{A}\epsilon_1 = \epsilon_1 + 2\epsilon_3 + \epsilon_4$ , (且  $\epsilon_1, \mathcal{A}\epsilon_1$  线性无关);  $\mathcal{A}^2\epsilon_1 = \mathcal{A}\epsilon_1 + 2\mathcal{A}\epsilon_3 + \mathcal{A}\epsilon_4 = \epsilon_1 + 3\epsilon_3 - 4\epsilon_4 \neq k_1\epsilon_1 + k_2\mathcal{A}\epsilon_1$ , 所以  $\epsilon_1, \mathcal{A}\epsilon_1, \mathcal{A}^2\epsilon_1$  线性无关;  $\mathcal{A}^3\epsilon_1 = \mathcal{A}\epsilon_1 + 3\mathcal{A}\epsilon_3 - 4\mathcal{A}\epsilon_4 = -10\epsilon_1 + 9\epsilon_3 - \epsilon_4 = -14\epsilon_1 + 3\mathcal{A}\epsilon_1 + \mathcal{A}^2\epsilon_1$ , 故  $\epsilon_1, \mathcal{A}\epsilon_1, \mathcal{A}^2\epsilon_1, \mathcal{A}^3\epsilon_1$  线性相关, 于是含  $\epsilon_1$  的  $\mathcal{A}$  的最小不变子空间为

$$W = L(\epsilon_1, \mathcal{A}\epsilon_1, \mathcal{A}^2\epsilon_1) = L(\epsilon_1, \epsilon_1 + 2\epsilon_3 + \epsilon_4, \epsilon_1 + 3\epsilon_3 - 4\epsilon_4).$$

$$= L \left( (\epsilon_1, \epsilon_2, \epsilon_3, \epsilon_4) \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & -4 \end{bmatrix} \right).$$

$$\text{方法 2 因为 } (\mathcal{A}\epsilon_1, \mathcal{A}\epsilon_2, \mathcal{A}\epsilon_3, \mathcal{A}\epsilon_4) = (\epsilon_1, \epsilon_2, \epsilon_3, \epsilon_4) \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 1 & -1 \\ 1 & -2 & -2 & -1 \end{bmatrix}, \text{ 直观易知}$$

$\mathcal{A}\epsilon_1, \mathcal{A}\epsilon_3, \mathcal{A}\epsilon_4$  只是  $\epsilon_1, \epsilon_3, \epsilon_4$  的线性组合. 即  $\epsilon_1, \epsilon_3, \epsilon_4$  生成一个含  $\epsilon_1$  的  $\mathcal{A}$  的不变子空间, 它是 3 维的. 而  $\mathcal{A}^2\epsilon_1$  不能由  $\epsilon_1, \mathcal{A}\epsilon_1$  线性表出, 故  $\mathcal{A}$  的含  $\epsilon_1$  的最小不变子空间为

$$W = L(\epsilon_1, \epsilon_3, \epsilon_4) = L(\epsilon_1, \mathcal{A}\epsilon_1, \mathcal{A}^2\epsilon_1).$$

2. 证明: 对任  $n$  阶复方阵  $A$  都存在可逆阵  $P$ , 使得  $P^{-1}AP = GS$ , 其中  $G, S$  都是对称方阵并且  $G$  可逆.

证 因为对任  $n$  阶复方阵  $A$  都有可逆阵  $P$  使



$$P^{-1}AP = J = \begin{bmatrix} J_1(\lambda_1) & & \\ & \ddots & \\ & & J_k(\lambda_k) \end{bmatrix},$$

其中  $J_i(\lambda_i)$  是 Jordan 块,  $i=1, \dots, k$ . 则对每个  $J_i(\lambda_i)$  有

$$J_i(\lambda_i) = H_i \cdot H_i \cdot J_i(\lambda_i), \text{ 其中 } H_i = \begin{bmatrix} & & 1 \\ & \ddots & \\ 1 & & \end{bmatrix},$$

显然  $H_i^2 = I$ , 且  $H_i^T = H_i$ , 所以  $H_i$  是对称方阵并且可逆. 又

$$\begin{aligned} H_i J_i &= \begin{bmatrix} & & 1 \\ & \ddots & \\ 1 & & \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_i & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & \lambda_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} & & & \lambda_i \\ & & \ddots & 1 \\ & \ddots & \ddots & \\ \lambda_i & 1 & & \end{bmatrix}, \\ (H_i J_i)^T &= J_i^T H_i^T = \begin{bmatrix} \lambda_i & & & \\ 1 & \ddots & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & 1 & \lambda_i \end{bmatrix} H_i = \begin{bmatrix} & & & \lambda_i \\ & & \ddots & 1 \\ & \ddots & \ddots & \\ \lambda_i & 1 & & \end{bmatrix} = H_i J_i, \end{aligned}$$

故知  $H_i J_i$  是对称阵 ( $i=1, \dots, k$ ). 令

$$G = \text{diag}\{H_1, \dots, H_k\},$$

则  $\det G \neq 0$ , 故  $G$  可逆, 且有

$$G^T = \text{diag}\{H_1^T, \dots, H_k^T\} = G,$$

$$G^2 = \text{diag}\{H_1^2, \dots, H_k^2\} = I,$$

又令  $S = GJ$ , 则  $S = \text{diag}\{H_1 J_1, \dots, H_k J_k\}$ ,

$$S^T = \text{diag}\{(H_1 J_1)^T, \dots, (H_k J_k)^T\} = S,$$

故知  $G, S$  均是对称方阵, 且有

$$P^{-1}AP = J = IJ = G^2 J = G(GJ) = GS.$$

命题得证.

3. 设  $\{\varphi_i\} (i \in S)$  为域  $F$  上的  $n$  维线性空间  $V$  的一组线性变换, 均可对角化且两两可交换. 试证明  $V$  可分解为直和

$$V = V_1 \oplus V_2 \oplus \dots \oplus V_r,$$

其中

$V_k = \{\alpha \in V \mid \varphi_i \alpha = \lambda_k(\varphi_i) \alpha, \text{ 对任意 } i \in S, \text{ 某 } \lambda_k(\varphi_i) \in F \text{ 成立}\} (1 \leq k \leq r)$ . 并指出  $\lambda_k(\varphi_i)$  的意义. ( $\varphi$  可对角化的意思是, 存在  $V$  的基使  $\varphi$  的方阵表示为对角形.)

证 由于  $\{\varphi_i\}$  均可对角化且两两可交换, 故  $\{\varphi_i\}$  可同时对角化, 即存在  $V$  的基  $e_1, \dots, e_n$  使得  $\varphi_i$  的方阵表示  $A_i$  均为对角形 (对  $n$  归纳即可证明, 见《高等代数学》第 160 页). 设  $\varphi_i$  的方阵表示为

$$A_i = \begin{bmatrix} c_{1i} & & & \\ & c_{2i} & & \\ & & \ddots & \\ & & & c_{ni} \end{bmatrix},$$

于是知道,  $e_1$  是  $\{\varphi_i\}$  的公共特征向量, 相应的  $\varphi_i$  的特征根为  $c_{1i}$ , 即  $\varphi_i e_1 = c_{1i} e_1$ . 同样可知

$$\varphi_i e_j = c_{ji} e_j \quad (1 \leq j \leq n).$$

设  $V_1$  为  $\{\varphi_i\}$  的含  $e_1$  的特征子空间的交, 则  $V_1$  由  $e_1, \dots, e_n$  中的一些向量 (不妨设为  $e_1, \dots, e_{s_1}$ ) 生成. 事实上, 对于一个固定的  $i \in S$ ,  $\varphi_i$  的特征根中与  $c_{1i}$  相等的记为  $c_{1i}, c_{j_2 i}, \dots, c_{j_{p(i)} i}$  (即  $\lambda_1(\varphi_i) = c_{1i}$  为  $p(i)$  重根), 则  $\varphi_i$  的含  $e_1$  的特征子空间 (即  $\lambda_1(\varphi_i)$  的特征子空间)  $W_{1i}$  恰由  $e_1, e_{j_2}, \dots, e_{j_{p(i)}}$  生成, 从而  $\{\varphi_i\}$  的含  $e_1$  的公共特征子空间

$$V_1 = \bigcap_{i \in S} W_{1i},$$

由诸  $\{e_1, e_{j_2}, \dots, e_{j_{p(i)}}\}$  的交集生成, 我们设  $V_1$  由  $e_1, \dots, e_{s_1}$  生成. 记  $U_2 = Fe_{s_1+1} + \dots + Fe_n$ , 则

$$V = V_1 \oplus U_2,$$

$U_2$  为  $\{\varphi_i\}$  的公共不变子空间. 继续上述讨论知可得  $U_2 = V_2 \oplus U_3$ , 再继续, 则可得

$$V = V_1 \oplus V_2 \oplus \dots \oplus V_r,$$

其中任一  $V_k$  均由  $e_1, \dots, e_n$  中一些向量生成 (我们可以记为由  $e_{s_{k-1}+1}, \dots, e_{s_k}$  生成), 且  $V_k$  中向量为任一  $\varphi_i$  的相对于某一特征根 (记为  $\lambda_k(\varphi_i)$ ) 的特征向量. 这也就是说, 经过  $e_1, \dots, e_n$  的可能重新排序后,  $\varphi_i$  在此基下的方阵表示为

$$\tilde{A}_i = \begin{bmatrix} \lambda_1(\varphi_i) I_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_r(\varphi_i) I_r \end{bmatrix},$$

其中  $I_k$  为  $s_k$  阶单位方阵.  $\varphi_i$  的这种方阵表示 ( $i \in S$ ) 与空间的分解  $V = V_1 \oplus \dots \oplus V_r$  相互对应. 每一个子空间  $V_k$  ( $1 \leq k \leq r$ ) 中的向量  $\alpha$  均满足  $\varphi_i \alpha = \lambda_k(\varphi_i) \alpha$ , 故是  $\{\varphi_i\}$  的公共特征向量.  $\varphi_i$  在  $V_k$  上的限制是数乘变换  $\lambda_k(\varphi_i)$ . (注. 当  $\{\varphi_i\}$  为乘法 (即变换的复合) 阿贝尔群时, 对任一  $1 \leq k \leq r, \lambda_k: \{\varphi_i\} \rightarrow F, \varphi_i \mapsto \lambda_k(\varphi_i)$  是群  $\{\varphi_i\}$  的一个特征).



$$P^T A P = \begin{bmatrix} I_p & & \\ & -I_q & \\ & & O \end{bmatrix},$$

其中  $I_p$  表示  $p$  阶单位方阵, 而且  $p$  与  $q$  由  $A$  唯一决定 ( $p, q$  分别称为  $A$  的正、负惯性指数,  $p-q$  称为  $A$  的符号差).

特别  $\mathbf{R}^{(n)}$  上的二次型  $Q(\alpha)$  (称为实二次型) 和其对应的对称双线性型  $g(\alpha, \beta)$  可经坐标变换化为

$$g(\alpha, \beta) = x_1 y_1 + \cdots + x_p y_p - x_{p+1} y_{p+1} - \cdots - x_{p+q} y_{p+q},$$

$$Q(\alpha) = x_1^2 + \cdots + x_p^2 - x_{p+1}^2 - \cdots - x_{p+q}^2,$$

其中  $(x_1, \cdots, x_n)^T$  和  $(y_1, \cdots, y_n)^T$  是  $\alpha, \beta$  的坐标列.

**定理 8.3 (Witt 消去定理)** 设  $A_1 = \begin{bmatrix} R_1 & \\ & S_1 \end{bmatrix}$  与  $A_2 = \begin{bmatrix} R_2 & \\ & S_2 \end{bmatrix}$  为数域  $F$  上两个对称方阵, 若在  $F$  上方阵  $A_1$  相合于  $A_2$ , 方阵  $R_1$  相合于  $R_2$ , 则方阵  $S_1$  相合于  $S_2$ .

系 若方阵

$$\begin{bmatrix} I_p & & \\ & -I_q & \\ & & O \end{bmatrix} \text{ 与 } \begin{bmatrix} I_{p_1} & & \\ & -I_{q_1} & \\ & & O \end{bmatrix}$$

实相合, 则  $p = p_1, q = q_1$ .

**定义 8.5** 设  $Q(\alpha)$  是  $\mathbf{R}^{(n)}$  上的二次型, 若对任意  $0 \neq \alpha \in \mathbf{R}^{(n)}$  均有  $Q(\alpha) > 0$ , 则称  $Q$  是正定的; 设  $Q(\alpha) = \alpha^T S \alpha$ , 则当  $Q(\alpha) > 0$  时, 称  $S$  是正定的.

**定理 8.4** 设  $S$  为  $n$  阶实对称方阵, 则以下命题等价:

- (1)  $S$  是正定的 (记为  $S > 0$ );
- (2)  $S$  实相合于单位方阵  $I$  (即正惯性指数  $p = n$ );
- (3) 存在可逆实方阵  $P$ , 使  $S = P^T P$ ;
- (4)  $S$  的特征值均为正数;
- (5)  $S$  的  $n$  个顺序主子式均为正数;
- (6)  $S$  的所有主子式均为正数.

**定理 8.5** 设  $S$  为  $n$  阶实对称方阵, 则以下命题等价:

- (1)  $S$  是半正定的 (记为  $S \geq 0$ );
- (2)  $S$  实相合于  $\begin{pmatrix} I_r & O \\ O & O \end{pmatrix}$ ;
- (3)  $S = Q^T Q$ , 其中  $Q$  为实方阵;
- (4)  $S$  的特征值均非负 (即  $\geq 0$ );
- (5)  $S$  的所有主子式均为正数或 0.

**定义 8.6** 若域  $F$  上方阵  $A$  满足  $A^T = -A$  且对角线元素均为 0, 则称  $A$  为交错方阵 (又称为反对称方阵或斜对称方阵, 当  $F$  是数域时, 条件可仅写为  $A^T = -A$ ). 对双线性型  $g(\alpha, \beta) = \alpha^T A \beta$ , 若  $g(\alpha, \alpha) = 0 (\alpha \in V)$ , 则称  $g$  为交错型.

**定理 8.6** 设  $A$  是域  $F$  上交错方阵, 则存在  $F$  上可逆方阵  $T$  使得

$$T^T A T = \begin{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} & & & \\ & \ddots & & \\ & & \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} & \\ & & & O \\ & & & & \ddots \\ & & & & & O \end{bmatrix}.$$

**系 1** 设  $g(\alpha, \beta) = \alpha^T A \beta$  为一交错型, 其中  $A$  为实方阵,  $\alpha, \beta \in \mathbf{R}^{(n)}$ . 则存在  $\mathbf{R}^{(n)}$  的一个基  $\{\alpha_i\}$  使

$$g(\alpha, \beta) = (x_1 y_2 - x_2 y_1) + \cdots + (x_{2s-1} y_{2s} - x_{2s} y_{2s-1}),$$

其中  $x = (x_1, \cdots, x_n)^T, y = (y_1, \cdots, y_n)^T$  为  $\alpha$  和  $\beta$  在基  $\{\alpha_i\}$  下的坐标列.

**系 2** 交错方阵的秩定为偶数.

**定义 8.7** 设  $V$  是域  $F$  上的线性空间. 若  $V$  到  $F$  的一个映射  $f$  满足: 对任  $\alpha, \beta \in V, k \in F$  有

$$\begin{aligned} f(\alpha + \beta) &= f(\alpha) + f(\beta), \\ f(k\alpha) &= kf(\alpha). \end{aligned}$$

则称  $f$  为  $V$  上的一个线性函数 (或线性型, 或线性泛函).

**定义 8.8** 线性空间  $V$  上的线性函数全体记为  $V^*$  (或  $\text{Hom}(V, F)$ , 或  $L(V; F)$ ), 它对如下定义加法和数乘是  $F$  上的线性空间:

$$\begin{cases} (f+g)(\alpha) = f(\alpha) + g(\alpha), \\ (kf)(\alpha) = kf(\alpha), \end{cases} \quad (\forall f, g \in V^*, k \in F)$$

称  $V^*$  为  $V$  的对偶空间.

**引理 8.1** 任取  $V$  的基  $\alpha_1, \cdots, \alpha_n$ , 可决定线性函数  $f_1, \cdots, f_n \in V^*$  如下:

$$f_i(\alpha_j) = \delta_{ij} = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases}, \quad (1 \leq i, j \leq n)$$

则  $f_1, \cdots, f_n$  是  $V^*$  的基, 称为  $\alpha_1, \cdots, \alpha_n$  的对偶基, 且任  $f \in V^*$  在此基下的坐标行  $(k_1, \cdots, k_n) = (f(\alpha_1), \cdots, f(\alpha_n))$ . 又对任  $\alpha \in V$ , 设  $\alpha$  的坐标列为  $(a_1, \cdots, a_n)^T$ , 则

$$f(\alpha) = f(\alpha_1)a_1 + \cdots + f(\alpha_n)a_n = k_1 a_1 + \cdots + k_n a_n.$$

**定理 8.7** 设  $V$  是有限维线性空间, 定义函数

$$\begin{aligned} \varphi_\alpha: V^* &\rightarrow F \\ f &\mapsto f(\alpha), \end{aligned}$$

由定义 8.8 中公式知  $\varphi_\alpha$  是线性函数. 则有线性空间的自然同构

$$\begin{aligned} \tau: V &\rightarrow V^{**} \\ \alpha &\mapsto \varphi_\alpha, \end{aligned}$$

因此, 常将对应  $\tau$  视为等同, 即视  $\alpha$  与  $\varphi_\alpha$  等同,  $V$  与  $V^{**}$  等同. 亦即  $V$  与  $V^*$  互为对偶

空间.

**定义 8.9** 设  $V^*$  与  $V$  的元素之间的运算  $\langle f, \alpha \rangle$ :

$$\begin{aligned} V^* \times V &\rightarrow F \\ (f, \alpha) &\mapsto \langle f, \alpha \rangle = f(\alpha) \end{aligned}$$

这一运算称为“内积”或双线性型或配对.

**定义 8.10** 设  $V$  是  $F$  上有限维线性空间. 对  $V$  的任一子空间  $W$ , 记

$$W^\perp = \{f \in V^* \mid \langle f, w \rangle = 0, \text{ 对任 } w \in W\}.$$

$W^\perp$  显然是  $V^*$  的子空间, 称为与  $W$  正交的子空间. 又对  $V$  的任一子集  $S$ , 设  $S$  (中向量) 生成子空间  $W$ , 则记  $S^\perp = W^\perp$ , 称为  $S$  的正交(补)子空间.

**引理 8.2**  $\dim W + \dim W^\perp = \dim V$ .

**定理 8.8** 设  $W$  是  $V$  的子空间, 则有以下线性空间的两个自然同构:

$$\begin{aligned} W^\perp &\cong (V/W)^*, & f &\mapsto \bar{f} \\ W^* &\cong V^*/W^\perp, & f|_W &\mapsto \bar{f} \end{aligned}$$

**定理 8.9** (对偶基本定理) 设  $V$  是域  $F$  上有限维线性空间,  $V^*$  是其对偶空间, 则映射

$$W \mapsto W^\perp$$

是  $V$  的子空间集到  $V^*$  的子空间集之间的(反序)一一对应, 其逆为

$$W' \mapsto W'^\perp,$$

而且

- (1)  $(W^\perp)^\perp = W$ ; (2)  $W_1 \subset W_2 \Leftrightarrow W_1^\perp \supset W_2^\perp$ ;  
(3)  $(W_1 + W_2)^\perp = W_1^\perp \cap W_2^\perp$ ,  $(W_1 \cap W_2)^\perp = W_1^\perp + W_2^\perp$ .

**定义 8.11** 设  $V', V$  和  $W$  是域  $F$  上线性空间, 若映射(函数)

$$g: V' \times V \rightarrow W$$

满足:  $g(\alpha_1 + \alpha_2, \beta) = g(\alpha_1, \beta) + g(\alpha_2, \beta)$ ,  $g(k\alpha, \beta) = kg(\alpha, \beta)$ ;  
 $g(\alpha, \beta_1 + \beta_2) = g(\alpha, \beta_1) + g(\alpha, \beta_2)$ ,  $g(\alpha, k\beta) = kg(\alpha, \beta)$ .

(对任意  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha \in V'$ ,  $\beta_1, \beta_2, \beta \in V$ ,  $k \in F$ ), 则称  $g$  是  $V' \times V$  到  $W$  的一个双线性型. 常记为

$$g(\alpha, \beta) = \langle \alpha, \beta \rangle = \alpha\beta.$$

**定理 8.10** 设  $V'$  和  $V$  分别是域  $F$  上的  $m$  维和  $n$  维线性空间, 取定  $V'$  和  $V$  的基之后,  $V' \times V$  上的双线性型集与  $F$  上  $m \times n$  矩阵集间有 1:1 对应, 即双线性型  $g$  对应于其矩阵  $G$ , 且  $g(\alpha, \beta) = x^T G y$  ( $x, y$  为  $\alpha, \beta$  的坐标).

**定义 8.12** 设  $g$  是  $V' \times V$  上的双线性型, 若存在非 0 的  $\alpha \in V'$  使  $g(\alpha, \beta) = 0$  对任  $\beta \in V_1$  均成立, 则称  $g$  是左退化的. 类似定义右退化. 若  $g$  非左退化, 也非右退化, 则称  $g$  非退化.

**定理 8.11**  $V' \times V$  上双线性型  $g$  非退化的充分必要条件为  $V'$  与  $V$  的维数相等且  $g$  的方阵非奇异.

**定理 8.12** (1) 线性空间  $V$  的每个线性变换  $\mathcal{A}$ , 诱导出对偶空间  $V'$  的一个线性变换  $\mathcal{A}^*$ , 称为  $\mathcal{A}$  的伴随变换, 即

$$\mathcal{A}^* : V' \rightarrow V', \quad \alpha \mapsto \alpha \circ \mathcal{A},$$

亦即对任  $\alpha \in V', \beta \in V$  有

$$(\mathcal{A}^* \alpha) \beta = \alpha(\mathcal{A} \beta) \quad \text{或} \quad \langle \mathcal{A}^* \alpha, \beta \rangle = \langle \alpha, \mathcal{A} \beta \rangle.$$

(2) 若  $\mathcal{A}$  在  $V$  的某基下的方阵表示为  $A$ , 则  $\mathcal{A}^*$  在  $V'$  中对偶基下的方阵表示为  $A^T$ .

**定义 8.13** 设  $V$  是数域  $F$  上  $n$  维线性空间.  $V \times V$  上的双线性型  $g$  也称为  $V$  上双线性型, 或者称为  $V$  的(广义)内积或数量积. 取  $V$  的基  $\epsilon_1, \dots, \epsilon_n$ , 设  $\alpha, \beta \in V$  的坐标列分别为  $x, y$ , 则

$$\begin{aligned} g(\alpha, \beta) &= \langle \alpha, \beta \rangle = \left( \sum_i x_i \epsilon_i, \sum_j y_j \epsilon_j \right) \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_i y_j \langle \epsilon_i, \epsilon_j \rangle = x^T G y. \end{aligned}$$

其中  $G = (g_{ij})$ , ( $g_{ij} = \langle \epsilon_i, \epsilon_j \rangle$ ) 称为  $g$  在基  $\epsilon_1, \dots, \epsilon_n$  下的方阵表示, 也称为向量  $\epsilon_1, \dots, \epsilon_n$  的 Gram 方阵.

**定义 8.14** 设  $g$  是线性空间  $V$  上双线性型, 若对任  $\alpha, \beta \in V$  有

$$g(\alpha, \beta) = g(\beta, \alpha)$$

则称  $g$  为对称双线性型(此时, 它的对应方阵是对称方阵).

**定义 8.15**  $V$  上每个对称双线性型  $g$  对应  $V$  上一个函数  $Q$ : 对任  $\alpha \in V$ ,

$$Q(\alpha) = g(\alpha, \alpha) = x^T G x.$$

函数  $Q$  称为  $V$  上一个二次型. (其中  $x$  为  $\alpha$  的坐标列,  $G$  为  $g$  的方阵) 它是  $\alpha$  的坐标  $x_1, \dots, x_n$  的二次齐次函数.

**引理 8.3** 设  $V$  是数域  $F$  上线性空间.  $V$  上函数  $Q$  是  $V$  上二次型当且仅当以下两条条件成立:

$$(1) \quad g(\alpha, \beta) = \frac{1}{2}(Q(\alpha + \beta) - Q(\alpha) - Q(\beta)) \text{ 是 } V \text{ 上(对称)双线性型; (极化等式)}$$

$$(2) \quad Q(2\alpha) = 4Q(\alpha) \quad (\text{对任 } \alpha \in V).$$

**系 1(有理标准形)** 设  $V$  是数域  $F$  上  $n$  维线性空间.

(1) 若  $g$  是  $V$  上对称双线性型, 则存在  $V$  的基  $\epsilon_1, \dots, \epsilon_n$  使

$$g(\epsilon_i, \epsilon_j) = \delta_{ij} a_i, \quad (a_i \in F)$$

且

$$g(\alpha, \beta) = a_1 x_1 y_1 + \dots + a_n x_n y_n,$$

其中  $x_1, \dots, x_n$  和  $y_1, \dots, y_n$  分别是  $\alpha$  和  $\beta$  的坐标,  $\delta_{ij}$  是 Kronecker delta.

(2) 若  $Q$  是  $V$  上二次型, 则存在  $V$  的基使

$$Q(\alpha) = a_1 x_1^2 + \dots + a_n x_n^2,$$

其中  $x_1, \dots, x_n$  是  $\alpha$  的坐标.

**系 2(实标准形)** 实线性空间  $V$  上的对称双线性型  $g$  和二次型  $Q$  分别在适当取基下可表为

$$\begin{aligned} g(\alpha, \beta) &= x_1 y_1 + \dots + x_p y_p - x_{p+1} y_{p+1} - \dots - x_r y_r, \\ Q(\alpha) &= x_1^2 + \dots + x_p^2 - x_{p+1}^2 - \dots - x_r^2, \end{aligned}$$

其中  $x_1, \dots, x_n$  和  $y_1, \dots, y_n$  分别是  $\alpha$  和  $\beta$  在相应基下的坐标.

**定义 8.16** 设  $g(\alpha, \beta)$  是实线性空间  $V$  上对称双线性型. 若对任  $0 \neq \alpha \in V$  均有  $g(\alpha, \alpha) > 0$ , 则称  $g$  为正定的.

若  $Q(\alpha)$  是  $V$  上二次型且对非 0 的  $\alpha \in V$  均有  $Q(\alpha) > 0$ , 则称  $Q$  是正定的.

**定义 8.17** 设  $g$  是域  $F$  上线性空间  $V$  上的双线性型, 若对任  $\alpha \in V$  总有  $g(\alpha, \alpha) = 0$ , 则称  $g$  为交错型 ( $g$  的方阵  $G$  是交错方阵)

**系 3** 设  $V$  是域  $F$  上线性空间,  $g$  是  $V$  上交错型, 则存在  $V$  的基使

$$g(\alpha, \beta) = (x_1 y_2 - x_2 y_1) + \dots + (x_{2s-1} y_{2s} - x_{2s} y_{2s-1}),$$

其中  $x_1, \dots, x_n$  和  $y_1, \dots, y_n$  分别是  $\alpha$  和  $\beta$  的坐标.

## 8.2 解题方法介绍

求线性空间  $V$  的基  $\epsilon_1, \dots, \epsilon_n$  的对偶基的方法.

任  $\alpha \in V$ , 设  $\alpha = \sum_{i=1}^n x_i \epsilon_i$ , 则对任  $f \in V^*$  (是  $V$  上线性函数全体) 有

$$f(\alpha) = x_1 f(\epsilon_1) + \dots + x_n f(\epsilon_n) = (f(\epsilon_1), \dots, f(\epsilon_n)) \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}.$$

又设  $f_1, f_2, \dots, f_n$  是  $\epsilon_1, \dots, \epsilon_n$  的对偶基.

则有  $f_i(\alpha) = x_1 f_i(\epsilon_1) + \dots + x_n f_i(\epsilon_n)$ ,  $i = 1, 2, \dots, n$ ,

即有

$$\begin{bmatrix} f_1(\alpha) \\ \vdots \\ f_n(\alpha) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_1(\epsilon_1) & \dots & f_1(\epsilon_n) \\ \dots & \dots & \dots \\ f_n(\epsilon_1) & \dots & f_n(\epsilon_n) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = (f_i(\epsilon_j)) \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \quad (*)$$

由对偶基的定义知

$$f_i(\epsilon_j) = \delta_{ij} = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$$

故得  $(f_i(\epsilon_j)) = I_n$ , 由  $(*)$  式立得

$$f_1(\alpha) = x_1, \quad f_2(\alpha) = x_2, \dots, f_n(\alpha) = x_n.$$

且对任  $f \in V^*$ :

$$f(\alpha) = f(\epsilon_1) f_1 + f(\epsilon_2) f_2 + \dots + f(\epsilon_n) f_n$$

也就是说,  $f$  在对偶基上的坐标即为  $f(\epsilon_1), \dots, f(\epsilon_n)$ .

## 8.3 习题与解答

1. 设  $\epsilon_1, \dots, \epsilon_n$  是线性空间  $V$  的基. 设  $f_i$  是“取坐标”行动, 即对  $\alpha \in V$ ,  $f_i \alpha$  就是  $\alpha$  的坐标的第  $i$  分量, 证明  $f_1, \dots, f_n$  就是  $\epsilon_1, \dots, \epsilon_n$  的对偶基.

**证** 任  $\alpha \in V$ , 设  $\alpha = \sum_{i=1}^n a_i \epsilon_i$ , 则  $f_i(\alpha) = a_i$ . 首先  $f_i$  是线性函数: 因为对任  $\alpha, \beta \in V$ ,



(记  $\beta = \sum_{i=1}^n b_i \epsilon_i$ , 则  $f_i \beta = b_i$ ) 有

$$f_i(\alpha + \beta) = f_i\left(\sum_{i=1}^n (a_i + b_i) \epsilon_i\right) = a_i + b_i = f_i \alpha + f_i \beta,$$

$$f_i(k\alpha) = f_i\left(\sum_{i=1}^n k a_i \epsilon_i\right) = k a_i = k f_i \alpha.$$

所以  $f_i \in V^*$ ,  $i=1, \dots, n$ . 其次, 任  $f \in V^*$ , 对任  $\alpha \in V$  有

$$f(\alpha) = f\left(\sum_{i=1}^n a_i \epsilon_i\right) = \sum_{i=1}^n a_i f(\epsilon_i) = f(\epsilon_1) f_1(\alpha) + \dots + f(\epsilon_n) f_n(\alpha),$$

所以  $f = f(\epsilon_1) f_1 + \dots + f(\epsilon_n) f_n$ .

故  $f_1, \dots, f_n$  是  $V^*$  的基. 又

因为  $\epsilon_i = 0 \cdot \epsilon_1 + \dots + 0 \cdot \epsilon_{i-1} + 1 \cdot \epsilon_i + 0 \cdot \epsilon_{i+1} + \dots + 0 \cdot \epsilon_n$ ,

所以  $f_i(\epsilon_i) = 1, f_i(\epsilon_j) = 0 \quad (i \neq j)$

即  $f_i(\epsilon_j) = \delta_{ij}, i, j = 1, \dots, n$ . 故  $f_1, \dots, f_n$  是  $\epsilon_1, \dots, \epsilon_n$  的对偶基.

2. 设  $\epsilon_1, \dots, \epsilon_n$  是域  $F$  上线性空间  $V$  的基,  $b_1, \dots, b_n$  是  $F$  中任意常数. 证明有唯一的线性函数  $f$  使  $f(\epsilon_i) = b_i (1 \leq i \leq n)$ . 求出  $f$ .

证 任  $\alpha \in V$ , 设  $\alpha = \sum_{i=1}^n a_i \epsilon_i$ , 定义  $f$  为

$$f(\alpha) = a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_n b_n,$$

则  $f$  是线性函数. 事实上, 对任  $\alpha, \beta \in V$ , (设  $\beta = \sum_{i=1}^n \tilde{a}_i \epsilon_i$ ) 则

$$f(\alpha + \beta) = (a_1 + \tilde{a}_1) b_1 + \dots + (a_n + \tilde{a}_n) b_n = f(\alpha) + f(\beta),$$

$$f(k\alpha) = k a_1 b_1 + \dots + k a_n b_n = k f(\alpha).$$

且有

$$f(\epsilon_i) = 0 \cdot b_1 + \dots + 0 \cdot b_{i-1} + 1 \cdot b_i + 0 \cdot b_{i+1} + \dots + 0 \cdot b_n = b_i \quad (1 \leq i \leq n),$$

唯一性: 若有  $g \in V^*$ , 使  $g(\epsilon_i) = b_i$ , 则由  $g$  为线性函数, 故对任  $\alpha \in V$  有

$$g(\alpha) = g\left(\sum_{i=1}^n a_i \epsilon_i\right) = \sum_{i=1}^n a_i g(\epsilon_i) = \sum_{i=1}^n a_i b_i = a_1 b_1 + \dots + a_n b_n = f(\alpha),$$

所以  $g = f$ .

如上, 我们已给出  $f$  的表达式. 即对任  $\alpha \in V$  有

$$f(\alpha) = a_1 b_1 + \dots + a_n b_n$$

其中  $a_1, \dots, a_n$  为  $\alpha$  在基  $\epsilon_1, \dots, \epsilon_n$  下的坐标.

3. 对  $x = (x_1, \dots, x_n)^T \in F^{(n)}$ , 令

$$f(x) = b_1 x_1 + \dots + b_n x_n, \quad (b_1, \dots, b_n \in F \text{ 固定}).$$

(1) 试证明: ①  $f$  是  $F^{(n)}$  的线性函数; ②  $F^{(n)}$  的线性函数必为某  $f$ ;

(2) 若记上述  $f$  为  $\langle (b_1, \dots, b_n), (\ ) \rangle$ , (即  $f(x) = \langle b, x \rangle = \langle (b_1, \dots, b_n), (x_1, \dots, x_n)^T \rangle$ ), 用此写出  $F^{(n)}$  的自然基的对偶基  $f_1, \dots, f_n$ .

解 (1) ① 对任  $x = (x_1, \dots, x_n)^T, y = (y_1, \dots, y_n)^T$  有

$$f(x+y) = \sum_{i=1}^n b_i(x_i+y_i) = \sum_{i=1}^n b_i x_i + \sum_{i=1}^n b_i y_i = f(x) + f(y)$$

$$f(kx) = b_1 kx_1 + \cdots + b_n kx_n = kf(x), \quad k \in F, x, y \in F^{(n)},$$

所以  $f$  是线性函数.

② 设  $g$  为  $F^{(n)}$  的线性函数, 则由定义有

$$g(x) = x_1 g(\epsilon_1) + \cdots + x_n g(\epsilon_n) = \sum_{i=1}^n (g(\epsilon_i)) x_i,$$

记  $g(\epsilon_i) = b_i$ , 注意  $b_i$  只与基向量有关, 与  $x$  的选取无关, 所以当  $g$  取定后,  $b_1, \cdots, b_n$  固定, 且有

$$g(x) = b_1 x_1 + \cdots + b_n x_n. \quad (\text{即 } g \text{ 为某 } f \text{ 型的}).$$

(2) 令

$$f_1 = \langle (1, 0, \cdots, 0), (\quad) \rangle \rightarrow f_1(x) = x_1$$

$$f_2 = \langle (0, 1, 0, \cdots, 0), (\quad) \rangle \rightarrow f_2(x) = x_2,$$

.....

$$f_n = \langle (0, \cdots, 0, 1), (\quad) \rangle \rightarrow f_n(x) = x_n$$

故  $f_i$  是“取坐标”行动, 由 1 题知  $f_1, \cdots, f_n$  恰为自然基的对偶基. 且

$$f(x) = b_1 x_1 + \cdots + b_n x_n = b_1 f_1(x) + \cdots + b_n f_n(x),$$

对任  $x \in F^{(n)}$  成立, 故

$$f = b_1 f_1 + \cdots + b_n f_n$$

于是知  $n$  个固定的数  $b_1, \cdots, b_n$  恰为  $f$  在对偶基  $f_1, \cdots, f_n$  上的坐标.

4. (1) 设  $W$  是  $n$  维线性空间  $V$  的  $k$  维子空间,  $W' \subset V^*$  是  $\bar{f}W$  的零化子 (即  $V^*$  是  $V$  的对偶空间而  $W' = \{f \in V^* \mid f(\alpha) = 0 \text{ 对任意 } \alpha \in W \text{ 成立}\}$ ). 证明  $W'$  是  $V^*$  的  $n-k$  维子空间.

(2) 把  $V$  的子空间  $W$  对应于其在对偶空间  $V^*$  中的零化子  $W'$ , 证明此对应满足:

$$(W')' = W, (W_1 + W_2)' = W'_1 \cap W'_2, (W_1 \cap W_2)' = W'_1 + W'_2.$$

证 (1) 在  $W$  中取基  $\alpha_1, \cdots, \alpha_k$  扩充为整个空间的基  $\alpha_1, \cdots, \alpha_k, \alpha_{k+1}, \cdots, \alpha_n$ , 则  $W$  中任  $\alpha$  的坐标形如

$$(x_1, \cdots, x_k, 0, \cdots, 0)^T$$

所以

$$f_{k+1} = \langle (0, \cdots, 0, \underset{k+1}{1}, 0, \cdots, 0), (\quad) \rangle$$

$\vdots$

$$f_n = \langle (0, \cdots, 0, 1) (\quad) \rangle$$

使  $f_i(\alpha) = 0, k+1 \leq i \leq n$ , 且是  $V^*$  中对偶基中的  $n-k$  个. 所以  $\dim W' = n-k$ .

(2) 把  $\alpha$  看成  $f$  的函数 (即每个  $\alpha$  决定了  $V^*$  上的线性函数  $\varphi_\alpha$ ), 则  $W$  是  $W'$  的零化子. 故①  $(W')' = W$ .

解法 1 ②由 1 题  $f_i$  为“取坐标”行动, 即  $f_i \alpha = \alpha$  的第  $i$  分量. 在  $W_1$  中取基  $\alpha_1, \cdots, \alpha_k$ , 扩充为  $W_1 + W_2$  的基  $\alpha_1, \cdots, \alpha_k, \alpha_{k+1}, \cdots, \alpha_{k+r-s}$  ( $W_1 \cap W_2$  为  $s$  维). 再扩充为  $V$  的基

$$\alpha_1, \cdots, \alpha_k, \alpha_{k+1}, \cdots, \alpha_{k+r-s}, \cdots, \alpha_n \quad (r > s)$$

则

$$f_i \alpha_j = 0 \quad \begin{matrix} j = 1, \dots, k+r-s \\ i = k+r-s+1, \dots, n. \end{matrix}$$

所以  $(W_1 + W_2)'$  是  $n - (k+r-s)$  维, 基为  $f_{k+r-s+1}, \dots, f_n$ . 而

$$W_1' = \langle f_{k+1}, \dots, f_n \rangle, \quad W_2' = \langle f_1, \dots, f_{k-s}, f_{k+r-s+1}, \dots, f_n \rangle$$

故  $W_1' \cap W_2' = \langle f_{k+r-s+1}, \dots, f_n \rangle$

③ 由 ②  $\alpha_{k-s+1}, \dots, \alpha_k$  为  $W_1 \cap W_2$  的基, 故

$$(W_1 \cap W_2)' = \langle f_1, \dots, f_{k-s}, f_{k+1}, \dots, f_n \rangle$$

$$W_1' = \langle f_{k+1}, \dots, f_n \rangle, \quad W_2' = \langle f_1, \dots, f_{k-s}, f_{k+r-s+1}, \dots, f_n \rangle$$

故

$$W_1' + W_2' = \langle f_1, \dots, f_{k-s}, f_{k+1}, \dots, f_n \rangle = (W_1 \cap W_2)'.$$

解法 2 ② 任  $f \in (W_1 + W_2)'$ , 则对任  $\alpha \in W_1 + W_2$  有  $f(\alpha) = 0$ . 又  $W_1 \subset W_1 + W_2$  所以任  $\alpha_1 \in W_1$  有  $f(\alpha_1) = 0$ , 故  $f \in W_1'$ . 同理  $f \in W_2'$ , 故  $f \in W_1' \cap W_2'$ . 于是得  $(W_1 + W_2)' \subseteq W_1' + W_2'$ . 另一方面, 任  $g \in W_1' \cap W_2'$ , 有  $g \in W_1'$  且  $g \in W_2'$ , 故对任  $\alpha_1 \in W_1$ , 有  $g(\alpha_1) = 0$ , 且对任  $\alpha_2 \in W_2$  有  $g(\alpha_2) = 0$ . 于是  $\forall \beta \in W_1 + W_2$ , 设  $\beta = \beta_1 + \beta_2$ , 其中  $\beta_1 \in W_1, \beta_2 \in W_2$ , 则

$$g(\beta) = g(\beta_1) + g(\beta_2) = 0 + 0 = 0, \quad \text{故} \quad g \in (W_1 + W_2)',$$

所以

$$W_1' \cap W_2' \subseteq (W_1 + W_2)'$$

即得

$$(W_1 + W_2)' = W_1' \cap W_2'.$$

③ 令  $W_1' = V_1, W_2' = V_2$  代入 ② 式中得

$$V_1 \cap V_2 = (V_1' + V_2')'$$

两边取它们的正交补并利用 ① 式即得

$$(V_1 \cap V_2)' = V_1' + V_2'.$$

5. 设  $V$  是域  $F$  上  $n$  维线性空间, 以  $S(V)$  记  $V$  的子空间全体. 证明  $S(V)$  有到自身的双射  $W \rightarrow W'$ , 使得  $W_1 \subset W_2$  时  $W_1' \supset W_2'$  且满足第 4 题中诸等式.

证 取定  $V$  的基  $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n$ , 定义  $V$  上双线性型

$$\langle \alpha, \beta \rangle = x^T y = x_1 y_1 + \dots + x_n y_n$$

其中  $x = (x_1, \dots, x_n)^T, y = (y_1, \dots, y_n)^T$  是  $\alpha, \beta$  的坐标. 对  $W \in S(V)$ , 令

$$W' = \{ \alpha \in V \mid \langle \alpha, \beta \rangle = 0, \text{ 对任意 } \beta \in W \text{ 成立} \},$$

( $W'$  是  $W$  的零化子, 事实上  $W' = W^\perp$  是与  $W$  正交的子空间). 则  $W' \in S(V)$ . 易知, 若  $W$  是  $k$  维, 则  $W'$  是  $n-k$  维: 设  $W$  的基为  $\alpha_1, \dots, \alpha_k$ , 坐标行分别为  $\underline{\alpha}_1, \dots, \underline{\alpha}_k$ , 则

$$\begin{pmatrix} \underline{\alpha}_1 \\ \vdots \\ \underline{\alpha}_k \end{pmatrix} x = 0$$

的解空间恰为  $W'$  的坐标向量全体.

(1)  $W \mapsto W'$  是  $S(V)$  到自身的双射: ① 单射: 若  $W_1' = W_2'$  而  $W_1 \neq W_2$ , 则  $W_1$  与  $W_2$  张成一个子空间  $U$ , 维数大于  $k = \dim W$ . 显然  $U' = W'$ , 维数  $= \dim W' = n - k$ , 故  $\dim U + \dim U' > n$ , 矛盾.

② 满射:  $\forall U$ , 令  $W = U'$ , 则  $W' = (U')' = U$ .

(2) 设  $W_1 \subset W_2, \alpha \in W_2'$ , 则  $\langle \alpha, \beta_2 \rangle = 0 (\forall \beta_2 \in W_2)$  故  $\langle \alpha, \beta_1 \rangle = 0 (\forall \beta_1 \in W_1 \subset W_2)$ , 所以

$\alpha \in W_1'$ , 故  $W_2' \subset W_1'$

(3) 满足第 4 题各等式. 即有:

$$(W')' = W, (W_1 + W_2)' = W_1' \cap W_2', (W_1 \cap W_2)' = W_1' + W_2';$$

证明如下:

① 任  $\alpha \in (W')'$ , 对任  $\beta \in W'$  有  $\langle \alpha, \beta \rangle = 0$ , 故  $\alpha \in W$ , 所以  $(W')' \subset W$ ; 反之任  $\alpha \in W$ , 则对任  $\beta \in W'$  有  $\langle \alpha, \beta \rangle = 0$ , 所以  $\alpha \in (W')'$ , 故  $W \subset (W')'$ ,  $(W')' = W$ .

② 因为  $W_1 \subset W_1 + W_2, W_2 \subset W_1 + W_2$ , 故  $(W_1 + W_2)' \subset W_1'$ , 且  $(W_1 + W_2)' \subset W_2'$ . 于是有  $(W_1 + W_2)' \subset W_1' \cap W_2'$ ; 反之, 任  $\alpha \in W_1' \cap W_2'$ , 有  $\alpha \in W_1'$  且  $\alpha \in W_2'$ , 即对任  $\beta_1 \in W_1$ , 有  $\langle \alpha, \beta_1 \rangle = 0$ ; 对任  $\beta_2 \in W_2$ , 有  $\langle \alpha, \beta_2 \rangle = 0$ . 故对任  $\beta \in W_1 + W_2$ , 若有  $\beta = \beta_1 + \beta_2$ , 其中  $\beta_1 \in W_1, \beta_2 \in W_2$  则因为  $\langle \alpha, \beta \rangle = \langle \alpha, \beta_1 \rangle + \langle \alpha, \beta_2 \rangle = 0 + 0 = 0$ , 所以  $\alpha \in (W_1 + W_2)'$ , 故  $W_1' \cap W_2' \subset (W_1 + W_2)'$ , 得证.

③ 在②中用  $W_1'$  代  $W_1, W_2'$  代  $W_2$  并利用①可得.

6. 对  $f, g \in \mathbf{R}[X]$ , 令  $h(X) = f(X)g'(X)$ , 证明  $\varphi(f, g) = h$  是多项式空间  $\mathbf{R}[X]$  上的双线性型.

证 由已知  $\varphi(f, g) = f(X)g'(X)$ . 则对任  $f_1, f_2, f, g, g_1, g_2 \in \mathbf{R}[X], k \in \mathbf{R}$  有:

$$\varphi((f_1 + f_2), g) = (f_1 + f_2)g' = f_1g' + f_2g' = \varphi(f_1, g) + \varphi(f_2, g);$$

$$\varphi(f, g_1 + g_2) = f(g_1 + g_2)' = fg_1' + fg_2' = \varphi(f, g_1) + \varphi(f, g_2);$$

$$\varphi(kf, g) = kfg' = k\varphi(f, g); \quad \varphi(f, kg) = k\varphi(f, g).$$

所以  $\varphi(f, g)$  是  $\mathbf{R}[X]$  上的双线性型.

7. 令  $\varphi(A, B) = \text{tr}(AB)$ , 证明  $\varphi$  是  $M_{n \times r}(F) \times M_{r \times n}(F)$  上的双线性型.

证 对任  $A_1, A_2, A \in M_{n \times r}, B, B_1, B_2 \in M_{r \times n}, k \in F$  有

$$\varphi(A_1 + A_2, B) = \text{tr}((A_1 + A_2)B) = \text{tr}(A_1B + A_2B)$$

$$= \text{tr}A_1B + \text{tr}A_2B = \varphi(A_1, B) + \varphi(A_2, B);$$

$$\varphi(A, B_1 + B_2) = \text{tr}(A(B_1 + B_2)) = \text{tr}(AB_1 + AB_2)$$

$$= \text{tr}AB_1 + \text{tr}AB_2 = \varphi(A, B_1) + \varphi(A, B_2);$$

$$\varphi(kA, B) = \text{tr}(kAB) = k\text{tr}(AB) = k\varphi(A, B);$$

$$\varphi(A, kB) = \text{tr}(AkB) = k\text{tr}(AB) = k\varphi(A, B).$$

(以上各式倒数第二个等式分别用到: 设  $C, D$  为  $n$  阶方阵,  $k \in F$  则因为  $\text{tr}C = \sum_{i=1}^n c_{ii}$ ,

所以 
$$\text{tr}(C + D) = \sum_{i=1}^n (c_{ii} + d_{ii}) = \sum_{i=1}^n c_{ii} + \sum_{i=1}^n d_{ii} = \text{tr}C + \text{tr}D$$

$$\text{tr}(kC) = \sum_{i=1}^n kc_{ii} = k \sum_{i=1}^n c_{ii} = k\text{tr}C. )$$

8.  $V$  是  $[0, 1]$  上连续实函数全体所成  $\mathbf{R}$  上线性空间, 设  $k(s, t)$  是二元连续实函数,  $0 \leq s \leq 1, 0 \leq t \leq 1$ , 对  $f, g \in V$  令

$$\varphi(f, g) = \iint f(s)K(s, t)g(t)dsdt$$

(二重积分在单位正方形内进行). 证明  $\varphi$  是  $V \times V$  上双线性型.

证 由于二重积分对被积函数有线性性,故  $\varphi$  是双线性型显然.

9. 设  $V'$  和  $V$  均为域  $F$  上  $n$  维线性空间,  $g: V' \times V \rightarrow F$  是双线性型,证明以下条件等价:

- (1)  $g$  非左退化;
- (2)  $g$  非右退化;
- (3)  $g$  非退化;
- (4)  $g$  在任意基下的方阵均是可逆的.

证 因为  $\dim V' = \dim V$ , 所以双线性型在任基下的矩阵  $G$  是  $n$  阶方阵, 故 (由定义 8.12)

$g$  非左退化  $\Leftrightarrow G$  是行满秩的, 即  $r(G) = n \Leftrightarrow G$  是列满秩的  $\Leftrightarrow g$  非右退化  $\Leftrightarrow r(G) = n \Leftrightarrow g$  非退化  $\Leftrightarrow G$  是满秩的 ( $r(G) = n$ )  $\Leftrightarrow g$  非退化.

\* 10. 设  $g: V' \times V \rightarrow F$  是双线性型, 定义  $g$  的左核:  $kl(g) = \{\alpha \in V' \mid g(\alpha, \beta) = 0 \text{ 对所有 } \beta \in V \text{ 成立}\}$ . 同样定义  $g$  的右核  $kr(g)$ . 证明:

- (1)  $kl(g)$  是  $V'$  的线性子空间,  $kr(g)$  是  $V$  的子空间.
- (2) 自然定义双线性型  $\bar{g}: V'/kl(g) \times V \rightarrow F$ , 且  $\bar{g}$  非左退化.
- (3) 自然定义双线性型  $\bar{g}: V'/kl(g) \times V/kr(g) \rightarrow F$ , 且  $\bar{g}$  非退化.

证 (1) 要证某一子集  $S$  是子空间只须证: ①  $S$  非空; ②  $S$  对原空间定义的加法和数乘封闭.

因为  $g(0, \beta) = 0$  对任  $\beta \in V$  成立, 所以  $0 \in kl(g)$ . 又对任  $\alpha_1, \alpha_2 \in kl(g), \lambda \in F$  由双线性性有

$$\begin{aligned} g(\alpha_1 + \alpha_2, \beta) &= g(\alpha_1, \beta) + g(\alpha_2, \beta) = 0 + 0 = 0, \\ g(\lambda \alpha_1, \beta) &= \lambda g(\alpha_1, \beta) = \lambda \cdot 0 = 0, \end{aligned}$$

所以  $kl(g)$  是  $V'$  的子空间.

显然右核定义为:

$$kr(g) = \{\beta \in V \mid g(\alpha, \beta) = 0, \text{ 对所有 } \alpha \in V' \text{ 成立}\}$$

因为  $g(\alpha, 0) = 0$ , 对任  $\alpha \in V'$  成立, 所以  $0 \in kr(g)$ . 又对任  $\beta_1, \beta_2 \in kr(g), \mu \in F$ , 由双线性性有

$$\begin{aligned} g(\alpha, \beta_1 + \beta_2) &= g(\alpha, \beta_1) + g(\alpha, \beta_2) = 0 + 0 = 0, \\ g(\alpha, \mu \beta_1) &= \mu g(\alpha, \beta_1) = \mu \cdot 0 = 0, \end{aligned}$$

所以  $kr(g)$  是  $V$  的子空间.

$$\begin{aligned} (2) \text{ 定义 } \bar{g}: & \quad V'/kl(g) \times V \rightarrow F \\ & (\bar{\alpha}, \beta) \mapsto \bar{g}(\bar{\alpha}, \beta) = g(\alpha, \beta) \end{aligned}$$

其中  $\bar{\alpha} = \alpha + kl(g)$ . 显然  $\bar{g}$  是双线性型. 又

任  $\bar{\alpha} \in V'/kl(g)$ , 若  $\bar{\alpha} \neq 0$ , 即  $\alpha \notin kl(g)$ , 则对任  $\beta \in V, \bar{g}(\bar{\alpha}, \beta) = g(\alpha, \beta) \neq 0$ , 所以  $\bar{g}$  非左退化.

(3) 定义

$$\begin{aligned} \bar{g}: & \quad V'/kl(g) \times V/kr(g) \rightarrow F \\ & (\bar{\alpha}, \bar{\beta}) \mapsto \bar{g}(\bar{\alpha}, \bar{\beta}) = g(\alpha, \beta) \end{aligned}$$

其中  $\bar{\alpha} = \alpha + kl(g)$ ,  $\bar{\beta} = \beta + kr(g)$ , 显然  $\bar{g}$  是双线性型. 又因为对任  $0 \neq \bar{\alpha} \in V'/kl(g)$ ,  $0 \neq \bar{\beta} \in V/kr(g)$ , (即  $\alpha \notin kl(g)$ ,  $\beta \notin kr(g)$ ),  $\bar{g}(\bar{\alpha}, \bar{\beta}) = g(\alpha, \beta) \neq 0$ , 所以  $\bar{g}$  非退化.

11. 双线性型  $g: V' \times V \rightarrow F$  在  $V'$  和  $V$  的不同基下的对应矩阵  $A$  和  $B$  有何关系? 即若  $g$  在  $V'$  和  $V$  的基  $\epsilon_1, \dots, \epsilon_n$  及  $\eta_1, \dots, \eta_n$  下的矩阵为  $A$ , 在  $V'$  和  $V$  的基  $\tilde{\epsilon}_1, \dots, \tilde{\epsilon}_n$  和  $\tilde{\eta}_1, \dots, \tilde{\eta}_n$  下的矩阵为  $B$ , 且

$$(\tilde{\epsilon}_1, \dots, \tilde{\epsilon}_n) = (\epsilon_1, \dots, \epsilon_n)P, (\tilde{\eta}_1, \dots, \tilde{\eta}_n) = (\eta_1, \dots, \eta_n)Q,$$

求  $B$  与  $A$  的关系.

解 任  $\alpha \in V'$ ,  $\beta \in V$ , 设  $\alpha$  在  $V'$  的两组基  $\epsilon_1, \dots, \epsilon_n$  及  $\tilde{\epsilon}_1, \dots, \tilde{\epsilon}_n$  下的坐标列分别为  $x$ ,  $\tilde{x}$ ;  $\beta$  在  $V$  的两组基  $\eta_1, \dots, \eta_n$  及  $\tilde{\eta}_1, \dots, \tilde{\eta}_n$  下的坐标分别为  $y$ ,  $\tilde{y}$ . 又由  $V'$  和  $V$  的两组基的过渡矩阵分别为  $P, Q$ , 故由坐标变换式有:

$$x = P\tilde{x}, \quad y = Q\tilde{y},$$

于是

$$g(x, y) = x^T A y = (P\tilde{x})^T A Q \tilde{y} = \tilde{x}^T P^T A Q \tilde{y} = \tilde{x}^T B \tilde{y},$$

故

$$B = P^T A Q.$$

即  $B$  与  $A$  相抵.

12. 第 7~9 题中双线性型何时是对称的? 何时可决定二次型? 写出此二次型.

解 (1) 第 7 题中双线性型为: 对任  $A \in M_{n \times r}(F)$ ,  $B \in M_{r \times n}(F)$ , 有  $\varphi(A, B) = \text{tr}(AB)$ . 当  $r=n$  时, 因为对任  $A, B \in M_n(F)$ , 有

$$\text{tr}(AB) = \sum_{i=1}^n c_{ii} = \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{ki} = \sum_{k=1}^n \sum_{i=1}^n b_{ki} a_{ik} = \text{tr}(BA),$$

故

$$\varphi(A, B) = \varphi(B, A).$$

即  $\varphi(A, B)$  为  $M_n(F)$  上的对称双线性型. 又

$$\varphi(A, A) = \text{tr}(AA) = \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n a_{ik} a_{ki},$$

即  $r=n$  时,  $\varphi(A, A) = Q(A)$  为  $M_n(F)$  上的二次型.

(2) 第 8 题中双线性型为: 对任  $f, g \in V$  有:

$$\varphi(f, g) = \iint f(s) K(s, t) g(t) dt ds.$$

故① 当  $K(s, t) = K(t, s)$  时, 有  $\varphi(f, g) = \varphi(g, f)$ , 即是对称双线性型.

② 当  $K(s, t) = K(t, s)$  时,  $Q(f) = \varphi(f, f) = \iint f(s) K(s, t) f(t) ds dt$  是  $V$  上二次型.

(3) 第 9 题中当  $V' = V$  且  $G' = G$  时,  $g(\alpha, \beta) = g(\beta, \alpha)$ , 即  $g$  为对称双线性型. (其中  $G$  为双线性型  $g$  在任基下的方阵,  $\alpha, \beta$  为  $V$  中任向量). 记  $\alpha$  的坐标为  $x$ , 则

$$Q(\alpha) = g(\alpha, \alpha) = x^T G x$$

是  $V$  上二次型.

13. 对实系数多项式  $f(X) = \sum_{i=0}^{\infty} a_i X^i$  和  $g(X) = \sum_{j=0}^{\infty} b_j X^j$  定义:

$$\langle f, g \rangle = \sum_{i,j} \frac{a_i b_j}{i+j+1}.$$

- (1) 证明这是  $\mathbf{R}$  上线性空间  $\mathbf{R}[X]$  上的内积(即正定对称双线性型);  
 (2) 把此内积限制到子空间  $\mathbf{R}[X]_n$  上(这里  $\mathbf{R}[X]_n$  是次数小于或等于  $n$  的多项式全体), 给出它在基  $1, x, \dots, x^n$  下的方阵.

证(1)

因为

$$\begin{aligned}\int_0^1 f(x)g(x)dx &= \int_0^1 \sum_i a_i \sum_j b_j x^{i+j} dx \\ &= \sum_{i,j} a_i b_j \frac{x^{i+j+1}}{i+j+1} \Big|_0^1 = \sum_{i,j} \frac{a_i b_j}{i+j+1} = \langle f, g \rangle,\end{aligned}$$

所以双线性性, 对称性显然. 又

因为  $\langle f, f \rangle = \int_0^1 f^2(x)dx > 0$

故是正定的. 所以  $\langle f, g \rangle$  是  $\mathbf{R}[X]$  上的内积.

- (2) 在次数  $\leq n$  的多项式全体构成的子空间  $\mathbf{R}[X]_n$  上,  $1, x, \dots, x^n$  是基, 任

$$f(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i,$$

因为

$$\langle x^i, x^j \rangle = \int_0^1 x^i \cdot x^j dx = \frac{1}{i+j+1} = \begin{cases} \frac{1}{i+j+1} & i \neq j \\ \frac{1}{2i+1} & i = j \end{cases}$$

所以

$$G = (g_{ij}) = \langle x^i, x^j \rangle = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \cdots & \cdots & \frac{1}{n+1} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{1}{4} & & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \ddots & \frac{1}{2n} \\ \frac{1}{n+1} & \cdots & \cdots & \frac{1}{2n} & \frac{1}{2n+1} \end{bmatrix}.$$

14. 用可逆线性代换化下列二次型为有理标准形, 并利用矩阵验算所得结果.

(1)  $Q(x_1, x_2, x_3) = 4x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - 4x_1x_2 + 4x_1x_3 - 3x_2x_3;$

(2)  $Q(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 5x_2^2 - 4x_3^2 + 2x_1x_2 - 4x_2x_3;$

(3)  $Q(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 - 3x_2^2 - 2x_1x_2 + 2x_1x_3 - 6x_2x_3;$

(4)  $Q(x_1, x_2, x_3, x_4) = x_1x_2 + x_2x_3 + x_3x_4 + x_4x_1;$

(5)  $Q(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + 3x_3^2 + 4x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3;$

(6)  $Q(x_1, \dots, x_n) = x_1x_{2n} + x_2x_{2n-1} + \cdots + x_nx_{n+1};$

(7)  $Q(x_1, \dots, x_n) = x_1x_2 + x_2x_3 + \cdots + x_{n-1}x_n;$

(8)  $Q(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n x_i^2 + \sum_{1 \leq i < j \leq n} x_i x_j;$

$$(9) Q(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2, \text{ 其中 } \bar{x} = \frac{x_1 + \dots + x_n}{n}.$$

解 (1)  $Q(x_1, x_2, x_3) = x^T A x$ ,

$$\begin{aligned} (AI) &= \begin{bmatrix} 4 & -2 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & -\frac{3}{2} & 0 & 1 & 0 \\ 2 & -\frac{3}{2} & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow[\frac{1}{2}c_1]{\frac{1}{2}r_1} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ -1 & 1 & -\frac{3}{2} & 0 & 1 & 0 \\ 1 & -\frac{3}{2} & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow[\begin{smallmatrix} r_1+r_3 \\ -r_1+r_3 \\ c_1+c_2 \\ -c_1+c_3 \end{smallmatrix}]{\begin{smallmatrix} r_1+r_3 \\ -r_1+r_3 \\ c_1+c_2 \\ -c_1+c_3 \end{smallmatrix}} \\ &\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 1 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow[\begin{smallmatrix} r_3+r_2 \\ c_3+c_2 \end{smallmatrix}]{\begin{smallmatrix} r_3+r_2 \\ c_3+c_2 \end{smallmatrix}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -\frac{1}{2} & 0 & 1 & 1 \\ 0 & -\frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} & 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &\xrightarrow[\begin{smallmatrix} -\frac{1}{2}r_2+r_3 \\ -\frac{1}{2}c_2+c_3 \end{smallmatrix}]{\begin{smallmatrix} -\frac{1}{2}r_2+r_3 \\ -\frac{1}{2}c_2+c_3 \end{smallmatrix}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & \frac{1}{4} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \xrightarrow[\begin{smallmatrix} 2r_3, 2c_3 \\ r_2 \leftrightarrow r_3 \\ c_2 \leftrightarrow c_3 \end{smallmatrix}]{\begin{smallmatrix} 2r_3, 2c_3 \\ r_2 \leftrightarrow r_3 \\ c_2 \leftrightarrow c_3 \end{smallmatrix}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \\ &= (D, P^T) \end{aligned}$$

所以  $Q(x_1, x_2, x_3)|_{x=P_y} = y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$ ,

其中

$$P = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad \text{且} \quad P^T A P = \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & -1 \end{bmatrix}.$$

(2)  $Q(x_1, x_2, x_3)|_{x=P_y} = y_1^2 + y_2^2 - 5y_3^2$ ,

其中

$$P = \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \text{且} \quad P^T A P = \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & -5 \end{bmatrix}.$$

(3)

$$P = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} & -\frac{3}{2} \\ & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ & & 1 \end{bmatrix}, \quad D = \begin{bmatrix} 1 & & \\ & -1 & \\ & & 0 \end{bmatrix} = P^T A P$$

所以

$$Q(x_1, x_2, x_3)|_{x=P_y} = y_1^2 - y_2^2.$$



(4) 作代换

$$\begin{cases} x_1 = y_1 + y_2 \\ x_2 = y_1 - y_2 \\ x_3 = y_3 \\ x_4 = y_4 \end{cases} \quad \text{即} \quad x = P_1 y = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} y,$$

有

$$\begin{aligned} Q(\alpha) &= y_1^2 - y_2^2 + y_1 y_3 - y_2 y_3 + y_3 y_4 + y_4 y_1 + y_4 y_2 \\ &= \left[ y_1 + \frac{1}{2}(y_3 + y_4) \right]^2 - \left[ \frac{1}{2}(y_3 + y_4) \right]^2 \\ &\quad - \left[ y_2 + \frac{1}{2}(y_3 - y_4) \right]^2 + \left[ \frac{1}{2}(y_3 - y_4) \right]^2 + y_3 y_4 \\ &= \left[ y_1 + \frac{1}{2}(y_3 + y_4) \right]^2 - \left[ y_2 + \frac{1}{2}(y_3 - y_4) \right]^2 \end{aligned}$$

进一步作代换

$$\begin{cases} z_1 = y_1 + \frac{1}{2}(y_3 + y_4) \\ z_2 = y_2 + \frac{1}{2}(y_3 - y_4) \\ z_3 = y_3 \\ z_4 = y_4 \end{cases} \quad \text{即} \quad z = P_2^{-1} y = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ & & 1 & 0 \\ & & & 1 \end{bmatrix} y$$

$$\text{所以 } P_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ & 1 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ & & 1 & 0 \\ & & & 1 \end{bmatrix}, \quad \text{令 } P = P_1 P_2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

则  $Q(x_1, x_2, x_3, x_4) |_{x=Pz} = z_1^2 - z_2^2$ , 则  $P^T A P = \text{diag}\{1, -1, 0, 0\}$ .

(5)

$$P = \begin{bmatrix} 1 & -2 & -\frac{1}{3} \\ 0 & 1 & -\frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad D = \begin{bmatrix} 1 & & \\ & -3 & \\ & & \frac{7}{3} \end{bmatrix} = P^T A P,$$

$$Q(x_1, x_2, x_3) |_{x=Py} = y_1^2 - 3y_2^2 + \frac{7}{3}y_3^2.$$

$$(6) \quad Q(x_1, \dots, x_n) |_{x=Py} = y_1^2 + \dots + y_n^2 - y_{n+1}^2 - \dots - y_{2n}^2,$$

$$P = \begin{bmatrix} 1 & & & & & 1 \\ & \ddots & & & & \\ & & 1 & & 1 & \\ & & 1 & & -1 & \\ & \ddots & & & & \ddots \\ 1 & & & & & -1 \end{bmatrix}, \quad P^T A P = \begin{bmatrix} I_n & \\ & -I_n \end{bmatrix}.$$

(7)  $Q(x_1, \dots, x_n)|_{x=P_y} = y_1^2 - y_2^2 + \dots + y_{2k-1}^2 - y_{2k}^2, k = \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor$  即  $\frac{n}{2}$  的整数部分.

令

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \\ & & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -\frac{1}{2} \\ & 1 & -\frac{1}{2} \\ & & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \\ & & 1 \end{bmatrix},$$

当  $n=2k+1$  时, 只要取

$$P = \begin{bmatrix} C & \\ & I_{n-3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_2 & \\ & C \\ & & I_{n-5} \end{bmatrix} \dots \begin{bmatrix} I_{n-3} & \\ & C \end{bmatrix},$$

则  $P^T A P = \text{diag}\{1, -1, 1, -1, \dots, 1, -1, 0\}$ .

当  $n=2K$  时, 只要取

$$P = \begin{bmatrix} C & \\ & I_{n-3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_2 & \\ & C \\ & & I_{n-5} \end{bmatrix} \dots \begin{bmatrix} I_{n-5} & \\ & C \\ & & I_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_{n-2} & & \\ & 1 & 1 \\ & 1 & -1 \end{bmatrix},$$

则

$$P^T A P = \text{diag}\{1, -1, \dots, 1, -1\}.$$

(8)

$$A = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \dots & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \dots & \frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix}, \quad \text{取 } P = \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{3} & \dots & -\frac{1}{n} \\ & 1 & -\frac{1}{3} & \dots & \vdots \\ & & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & & 1 & -\frac{1}{n} \\ & & & & 1 \end{bmatrix}$$

则

$$P^T A P = \text{diag}\left\{1, \frac{3}{4}, \frac{2}{3}, \dots, \frac{n+1}{2n}\right\}.$$

(9)

$$Q(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n (x_i^2 + \bar{x}^2 - 2x_i \bar{x})$$

$$\begin{aligned}
&= x_1^2 + \cdots + x_n^2 + n \left( \frac{x_1 + \cdots + x_n}{n} \right)^2 - 2 \frac{x_1 + \cdots + x_n}{n} \sum_{i=1}^n x_i \\
&= x_1^2 + \cdots + x_n^2 - \frac{(x_1 + \cdots + x_n)^2}{n},
\end{aligned}$$

所以

$$A = \begin{bmatrix} 1 - \frac{1}{n} & -\frac{1}{n} & \cdots & -\frac{1}{n} \\ -\frac{1}{n} & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & -\frac{1}{n} \\ -\frac{1}{n} & \cdots & -\frac{1}{n} & 1 - \frac{1}{n} \end{bmatrix}$$

$$\det A = \det \left[ I_n - \frac{1}{n} \begin{bmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix} (1, \cdots, 1) \right] = \det \left[ 1 - (1, \cdots, 1) \begin{bmatrix} \frac{1}{n} \\ \vdots \\ \frac{1}{n} \end{bmatrix} \right] = 0$$

而

$$\det A_m = \det \left[ I_m - \frac{1}{n} \begin{bmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix} (1, \cdots, 1) \right] = 1 - \frac{m}{n} = \frac{n-m}{n} \neq 0, \quad (m \leq n-1)$$

故  $A$  的所有  $\leq n-1$  阶顺序主子式均为正,

所以

$$A \sim \text{diag}(1, \cdots, 1, 0)$$

具体化法: 令  $y_i = x_i - \bar{x}, i=1, \cdots, n-1, y_n = x_n$ , 则

$$\begin{aligned}
x^T A x \big|_{x=Py} &= \sum_{i=1}^{n-1} y_i^2 + (y_1 + \cdots + y_{n-1})^2 = 2 \left[ \sum_{i=1}^{n-1} y_i + \sum_{1 \leq i < j \leq n-1} y_i y_j \right] \\
&\stackrel{\text{利用第 8 题}}{=} 2 \left( z_1^2 + \frac{3}{4} z_2^2 + \cdots + \frac{n}{2n-2} z_{n-1}^2 \right)
\end{aligned}$$

(从已知还可以看出: 当  $x_1 = \cdots = x_n$  时,  $x^T A x = 0$ , 所以其正惯性指数一定小于  $n$ ), 令

$$P = \begin{bmatrix} 1 - \frac{1}{n} & -\frac{1}{n} & \cdots & \cdots & -\frac{1}{n} \\ -\frac{1}{n} & \ddots & \ddots & & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ -\frac{1}{n} & \cdots & -\frac{1}{n} & 1 - \frac{1}{n} & -\frac{1}{n} \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{3} & \cdots & -\frac{1}{n-1} & 0 \\ & 1 & -\frac{1}{3} & \cdots & \vdots & \vdots \\ & & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots \\ & & & \ddots & -\frac{1}{n-1} & \vdots \\ 0 & \cdots & \cdots & \cdots & 1 & 0 \\ & & & & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

则

$$P^T A P = \text{diag} \left\{ 2, \frac{3}{2}, \cdots, \frac{n}{n-1}, 0 \right\}.$$

15. 设  $A = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix}$  是一对称方阵, 且  $\det A_{11} \neq 0$ , 证明: 存在  $T = \begin{bmatrix} I & X \\ O & I \end{bmatrix}$ ,

使  $T^T A T = \begin{bmatrix} A_{11} & O \\ O & * \end{bmatrix}$ , 其中  $*$  表示一个与  $A_{22}$  同阶的方阵.

证 因为  $A^T = A$ , 所以  $A_{12}^T = A_{21}$ , 则取块初等方阵

$$T = \begin{bmatrix} I & -A_{11}^{-1}A_{12} \\ O & I \end{bmatrix},$$

有

$$\begin{aligned} T^T A T &= \begin{bmatrix} I & O \\ -A_{12}^T A_{11}^{-1} & I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I & -A_{11}^{-1}A_{12} \\ O & I \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ O & A_{22} - A_{12}^T A_{11}^{-1} A_{12} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I & -A_{11}^{-1}A_{12} \\ O & I \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} A_{11} & O \\ O & A_{22} - A_{12}^T A_{11}^{-1} A_{12} \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

这里用到  $(A_{11}^{-1})^T = (A_{11}^T)^{-1} = A_{11}^{-1}$ .

16. 设  $A$  为实对称阵, 求证: 对任意实列向量  $x$  均有  $x^T A x = 0$  的充要条件是  $A = 0$ .

证  $\Leftarrow$  充分性显然.

$\Rightarrow$  方法 1 分别取  $x_i = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0)^T$ , 得  $a_{ii} = 0, i = 1, 2, \dots, n$ ; 再分别取  $x_{ij} = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0)^T$ , 得

$$x^T A x = a_{ii} + a_{jj} + 2a_{ij} = 0 \rightarrow a_{ij} = 0, \quad \begin{matrix} i \neq j \\ i, j = 1, 2, \dots, n \end{matrix}$$

所以  $A = 0$ .

方法 2  $x^T A x|_{x=Py} = c_1 y_1^2 + \dots + c_n y_n^2 = y^T P^T A P y$ ,

分别取  $y_i = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0)^T$  知  $c_i = 0, i = 1, \dots, n$ .

所以  $A = (P^{-1})^T O P^{-1} = 0$ .

17. 证明: 秩等于  $r$  的对称方阵可以表示成  $r$  个秩等于 1 的对称方阵之和.

证 因为  $\text{rank} A = r$ , 则  $\exists$  可逆阵  $P$ , 使

$$\begin{aligned} A &= P^T \begin{bmatrix} \mu_1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & \mu_r & \\ & & & 0 & \\ & & & & \ddots \end{bmatrix} P \\ &= P^T \begin{bmatrix} \mu_1 & & & \\ & 0 & & \\ & & \ddots & \\ & & & 0 \end{bmatrix} P + \dots + P^T \begin{bmatrix} \ddots & & & \\ & 0 & & \\ & & \mu_r & \\ & & & 0 & \\ & & & & \ddots \end{bmatrix} P, \end{aligned}$$

显然右边每个方阵秩等于1,且均对称.得证.

18. 证明: $A$ 是 $n$ 阶反对称阵的充分必要条件是对任一个 $n$ 维列向量 $x$ ,有 $x^T Ax=0$ .

证  $\Rightarrow$  当 $A^T = -A$ 时,对任 $x$ 有 $x^T Ax = (x^T Ax)^T = x^T A^T x = -x^T Ax$ ,所以 $x^T Ax=0$ ;

$\Leftarrow$  取 $x_i = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0)^T$ ,则 $x_i^T Ax_i = a_{ii} = 0$ ,所以 $a_{ii} = 0, i=1, 2, \dots, n$ .

取 $x_{ij} = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0)^T$ ,则

$$0 = x_{ij}^T Ax_{ij} = a_{ii} + a_{ij} + a_{ji} + a_{jj}, \rightarrow a_{ij} = -a_{ji} \quad i, j = 1, \dots, n, i \neq j.$$

所以 $A^T = -A$ . 即 $A$ 是反对称阵.

19. 设二次型 $Q(x_1, \dots, x_n)$ 的矩阵为 $A$ ,  $\lambda$ 是 $A$ 的特征根. 证明, 存在 $\mathbf{R}^{(n)}$ 中的非零向量 $(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)^T$ , 使得

$$Q(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n) = \lambda(\xi_1^2 + \dots + \xi_n^2).$$

证 因为 $\lambda$ 是 $A$ 的特征根, 所以 $A$ 有属于此特征值的特征向量 $x$ , 即有 $Ax = \lambda x$ , 设 $x = (\xi_1, \dots, \xi_n)^T$ , 则

$$Q(\xi_1, \dots, \xi_n) = x^T Ax = x^T \lambda x = \lambda x^T x = \lambda(\xi_1^2 + \dots + \xi_n^2).$$

20. 试求下列实对称阵在实相合下的标准形:

$$(1) A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix}; \quad (2) A = \begin{bmatrix} O^{(n)} & I^{(n)} \\ I^{(n)} & O \end{bmatrix}; \quad (3) A = \begin{bmatrix} & & & 1 \\ & & \ddots & \\ & \ddots & & \\ 1 & & & \end{bmatrix}_{2n};$$

$$(4) A = \begin{bmatrix} O^{(n)} & I^{(n)} & O \\ I^{(n)} & O^{(n)} & O \\ O & O & 1 \end{bmatrix}_{2n+1}; \quad (5) A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 3 & 3 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{bmatrix}.$$

解 (1) 取

$$P = \begin{bmatrix} 1 & -1 & \frac{-3}{\sqrt{2}} \\ & 1 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ & & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}, \quad \text{则} \quad P^T A P = \begin{bmatrix} 1 & & \\ & -1 & \\ & & -1 \end{bmatrix};$$

(2) 取

$$P = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} I^{(n)} & -I^{(n)} \\ I^{(n)} & I^{(n)} \end{bmatrix}, \quad \text{则} \quad P^T A P = \begin{bmatrix} I_n & \\ & -I_n \end{bmatrix};$$

(3) 取

$$P = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} I_n & -H_n \\ H_n & I_n \end{bmatrix},$$

其中

$$H_n = \begin{bmatrix} & & & 1 \\ & & \ddots & \\ & \ddots & & \\ 1 & & & \end{bmatrix}_n; P^T A P = \begin{bmatrix} I_n & \\ & -I_n \end{bmatrix}.$$

(4)

$$P_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} I_n & -I_n & O \\ I_n & I_n & O \\ O & O & 1 \end{bmatrix}, P_2 = \begin{bmatrix} I_n & O & O & O \\ O & 0 & O & 1 \\ O & O & I_{n-1} & O \\ O & 1 & O & 0 \end{bmatrix}, \text{ 令 } P = P_1 P_2,$$

则

$$P^T A P = \begin{bmatrix} I_{n+1} & \\ & -I_n \end{bmatrix},$$

(5)

$$P = \begin{bmatrix} 1 & -1 & & \\ & 1 & -1 & \\ & & 1 & -1 \\ & & & 1 \end{bmatrix}, \text{ 则 } P^T A P = I_4.$$

以上(1),(5)用初等变换法;(2),(4)相当于块初等变换;(3)用二次型写出即为

$$Q(x_1, \dots, x_n) = 2x_1x_{2n} + 2x_2x_{2n-1} + \dots + 2x_nx_{n+1}$$

所以 令  $\begin{cases} x_1 = y_1 - y_{2n} \\ x_{2n} = y_1 + y_{2n} \\ \vdots \\ x_n = y_n - y_{n+1} \\ x_{n+1} = y_n + y_{n+1} \end{cases}$  即  $P_1 = \begin{bmatrix} 1 & & & & -1 \\ & \ddots & & & \\ & & 1 & -1 & \\ & & 1 & -1 & \\ & \ddots & & & \ddots \\ 1 & & & & & -1 \end{bmatrix},$

取  $P_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}I$ , 则令  $P = P_1 P_2$  即可.

21. 设  $A$  为  $n$  阶实系数方阵, 且满足  $A^2 = A$ . 证明:  $A$  可以写成实对称方阵之积.

证 因为  $A^2 = A$ , 设  $A$  的特征值为  $\lambda$ , 则有  $\lambda^2 = \lambda$ , 所以  $\lambda = 1, 0$ . 又由  $A(A - I) = O$  知有

$$\text{rank}(A - I) + \text{rank} A \leq n$$

(见 4.3 节 32 题). 设  $r(A) = r$ , 则  $r(A - I) \leq n - r$ , 于是线性方程组  $Ax = 0$  的解空间是  $n - r$  维的, 由于 0 是特征值, 故特征子空间  $V_0$  是  $n - r$  维的, 即  $A$  的属于特征值 0 的线性无关的特征向量有  $n - r$  个; 而  $(A - I)x = 0$  的解空间的维数  $= n - r(A - I) \geq r$ , 故特征子空间  $V_1$  是大于等于  $r$  维的 (从  $\dim V_1 + \dim V_0 = n$ , 可知  $\dim V_1 = r$ ), 又属于不同特征值的特征向量是线性无关的. 从  $V_1$  中选取  $r$  个线性无关的特征向量  $\xi_1, \dots, \xi_r$ , 从  $V_0$  中选取  $n - r$  个线性无关的特征向量  $\xi_{r+1}, \dots, \xi_n$ . 令

$$P = (\xi_1, \dots, \xi_r, \xi_{r+1}, \dots, \xi_n)$$

则有

$$P^{-1}AP = \begin{bmatrix} I_r & O \\ O & O \end{bmatrix}$$

所以  $A = P \begin{bmatrix} I_r & O \\ O & O \end{bmatrix} P^{-1} = P \begin{bmatrix} I_r & O \\ O & O \end{bmatrix} P^T (P^{-1})^T \begin{bmatrix} I_r & O \\ O & O \end{bmatrix} P^{-1} = S_1 \cdot S_2$  其中

$$S_1 = P \begin{bmatrix} I_r & O \\ O & O \end{bmatrix} P^T, \quad S_2 = (P^T)^{-1} \begin{bmatrix} I_r & O \\ O & O \end{bmatrix} P^{-1},$$

且  $S_1^T = S_1, S_2^T = S_2$ .

注  $A$  相似于对角阵的证明也可以用 Jordan 标准形来证, 见《高等代数学》例 7.28.

22. 如果二次型  $Q(x_1, \dots, x_n)$  对应的方阵  $S$  的主子式:

$$d_j = \left| S \begin{pmatrix} 1, \dots, j \\ 1, \dots, j \end{pmatrix} \right| \neq 0, \quad (j = 1, 2, \dots, n).$$

试证  $Q(x_1, \dots, x_n)$  的标准形为

$$d_1 y_1^2 + \frac{d_2}{d_1} y_2^2 + \dots + \frac{d_n}{d_{n-1}} y_n^2.$$

证 设

$$S = \begin{bmatrix} A_{n-1} & \beta \\ \beta^T & a_m \end{bmatrix},$$

则因为

$$\det A_{n-1} = d_j = \left| S \begin{pmatrix} 1, \dots, n-1 \\ 1, \dots, n-1 \end{pmatrix} \right| \neq 0,$$

所以  $A_{n-1}^{-1}$  存在. 令

$$P_1 = \begin{bmatrix} I_{n-1} & -A_{n-1}^{-1}\beta \\ O & 1 \end{bmatrix},$$

则有

$$\begin{aligned} P_1^T S P_1 &= \begin{bmatrix} I_{n-1} & O \\ -\beta^T A_{n-1}^{-1} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_{n-1} & \beta \\ \beta^T & a_m \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_{n-1} & -A_{n-1}^{-1}\beta \\ O & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} A_{n-1} & O \\ O & a_m - \beta^T A_{n-1}^{-1}\beta \end{bmatrix}, \end{aligned}$$

两边取行列式, 因为  $\det P_1 = 1$ , 且记  $b = a_m - \beta^T A_{n-1}^{-1}\beta$ ,

所以  $\det S = \det A_{n-1} \cdot b$ ,

故

$$b = \frac{\det S}{\det A_{n-1}} = \frac{d_n}{d_{n-1}}$$

继续做下去(依次对  $A_{n-1}, A_{n-2}, \dots, A_2$  重复如上的过程)就可以得到

$$S \approx \begin{bmatrix} d_1 & & & & \\ & \frac{d_2}{d_1} & & & \\ & & \ddots & & \\ & & & \frac{d_{n-1}}{d_{n-2}} & \\ & & & & \frac{d_n}{d_{n-1}} \end{bmatrix},$$

即  $Q(x_1, \dots, x_n)$  的标准形为

$$d_1 y_1^2 + \frac{d_2}{d_1} y_2^2 + \dots + \frac{d_n}{d_{n-1}} y_n^2.$$

23. 证明: 一个实二次型可以分解成两个实系数的一次齐次多项式的乘积的充要条件是: 它的秩等于 2 和符号差等于 0, 或者秩等于 1.

证  $\Rightarrow$  设  $f(x_1, \dots, x_n) = (a_1 x_1 + \dots + a_n x_n)(b_1 x_1 + \dots + b_n x_n)$

(1) 若  $b_i = k a_i, i = 1, \dots, n$ , 不妨设  $a_1 \neq 0$ , 令

$$\begin{cases} y_1 = a_1 x_1 + a_2 x_2 + \dots + a_n x_n \\ y_i = x_i, \quad i = 2, \dots, n \end{cases}$$

则有  $f(x_1, \dots, x_n)|_{x=P_y} = k y_1^2$ , 所以  $f(x_1, \dots, x_n)$  的秩为 1.

(2) 若两个一次式系数不成比例, 不妨设

$$\frac{a_1}{b_1} \neq \frac{a_2}{b_2}$$

令

$$\begin{cases} y_1 = a_1 x_1 + a_2 x_2 + \dots + a_n x_n \\ y_2 = b_1 x_1 + b_2 x_2 + \dots + b_n x_n, \\ y_i = x_i, \quad i = 3, \dots, n \end{cases}$$

即

$$P_1^{-1} = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & \cdots & \cdots & a_n \\ b_1 & b_2 & \cdots & \cdots & \cdots & b_n \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & 0 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

则有  $f(x_1, \dots, x_n)|_{x=P_y} = y_1 y_2$ , 再令

$$\begin{cases} y_1 = z_1 + z_2 \\ y_2 = z_1 - z_2, \quad i = 3, \dots, n \\ y_i = z_i \end{cases}$$

即



$$P_2 = \begin{bmatrix} 1 & & & & \\ & 1 & & & \\ & & -1 & & \\ & & & 1 & \\ & & & & \ddots \\ & & & & & 1 \end{bmatrix},$$

则得

$$f(x_1, \dots, x_n) \big|_{x=P_1 y} = y_1 y_2 \big|_{y=P_2 z} = z_1^2 - z_2^2.$$

故二次型  $f(x_1, \dots, x_n)$  的秩等于 2, 符号差为 0.

$\Leftarrow$  (1) 若  $f(x_1, \dots, x_n)$  的秩为 1, 则可经非退化(可逆)线性替换化为  $f(x_1, \dots, x_n) \big|_{x=Py} = ky_1^2$ , 由  $y=P^{-1}x$ , 可知有  $y_1 = a_1 x_1 + a_2 x_2 + \dots + a_n x_n$ , 即得

$$f(x_1, \dots, x_n) = k(a_1 x_1 + \dots + a_n x_n)^2.$$

(2) 若  $f(x_1, \dots, x_n)$  的秩为 2, 符号差为零, 则必存在可逆阵  $P$  使

$$f(x_1, \dots, x_n) \big|_{x=Py} = y_1^2 - y_2^2 = (y_1 + y_2)(y_1 - y_2),$$

其中  $y_1, y_2$  均为  $x_1, \dots, x_n$  的线性函数(一次齐次式). 这由  $y=P^{-1}x$  显然. 于是可设

$$y_1 + y_2 = a_1 x_1 + a_2 x_2 + \dots + a_n x_n,$$

$$y_1 - y_2 = b_1 x_1 + b_2 x_2 + \dots + b_n x_n.$$

故  $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$  可表成两个一次齐次式的乘积.

24. 设  $f(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^s (a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \dots + a_{in}x_n)^2$ , 证明  $f(x_1, \dots, x_n)$  的秩等于矩阵  $A = (a_{ij})$  的秩.

证 令  $y_i = a_{i1}x_1 + \dots + a_{in}x_n$  ( $1 \leq i \leq s$ ), 记  $x = (x_1, \dots, x_n)^T$ ,  $y = (y_1, \dots, y_s)^T$ , 则有  $y = Ax$ , 所以

$$f = \sum_{i=1}^s y_i^2 = y^T y = x^T A^T A x,$$

故  $f(x_1, \dots, x_n)$  的秩等于  $A^T A$  的秩. 而由 3.3 节第 9 题知  $r(A^T A) = r(A)$ , 故  $f(x_1, \dots, x_n)$  的秩等于  $A$  的秩.

25. 设  $f(x_1, \dots, x_n) = h_1^2 + h_2^2 + \dots + h_p^2 - h_{p+1}^2 - \dots - h_{p+q}^2$ , 其中  $h_i$  ( $i=1, \dots, p+q$ ) 是  $x_1, \dots, x_n$  的一次齐次式, 证明:  $f(x_1, \dots, x_n)$  的正惯性指数  $\leq p$ , 负惯性指数  $\leq q$ .

证 设  $f(x_1, \dots, x_n)$  的正惯性指数为  $p'$ , 负惯性指数为  $q'$ . 并设  $f(x_1, \dots, x_n)$  经可逆线性代换  $x=Cy$  化为规范型

$$f(x_1, \dots, x_n) = y_1^2 + \dots + y_{p'}^2 - y_{p'+1}^2 - \dots - y_{p'+q'}^2 \quad (2)$$

记已知中表达式为①. 设  $C^{-1} = (c_{ij})$ , 由  $y=C^{-1}x$  知

$$y_i = c_{i1}x_1 + c_{i2}x_2 + \dots + c_{in}x_n \quad 1 \leq i \leq n$$

又由已知  $h_i$  也都是  $x_1, \dots, x_n$  的一次齐次式. 故若  $p' > p$ , 令  $y_{p'+1} = \dots = y_n = 0$ ,  $h_1 = \dots = h_p = 0$ , 则  $n$  个未知量  $x_1, \dots, x_n$  的齐次线性方程组

$$\begin{cases} y_i = c_{i1}x_1 + \dots + c_{in}x_n = 0, & p' + 1 \leq i \leq n \\ h_1 = 0 \\ \vdots \\ h_p = 0 \end{cases}$$

方程的个数  $= p + (n - p') < n$ , 所以有非零解  $x^*$ , 此非零解代入①中得  $f(x_1, \dots, x_n) \leq 0$ ; 代入②中得  $f(x_1, \dots, x_n) > 0$ , 矛盾.

所以必有  $p' \leq p$ , 同理可证  $q' \leq q$ .

26. 如果把实  $n$  阶对称方阵按相合分类(即两个实  $n$  阶对称阵属于同一类当且仅当它们相合), 问共有几类?

解 因为两个实对称阵  $A, B$  相合的充要条件是正、负惯性指数分别相同; 或  $\text{rank } A = \text{rank } B$ ,  $p_1 - q_1 = p_2 - q_2$ , 所以列举出正、负惯性指数的选取可能即可算出

(1)	正项数	负项数	类
	$p=0,$	$q=0, 1, \dots, n,$	共 $n+1$ 类
	$p=1,$	$q=0, 1, \dots, n-1,$	共 $n$ 类
	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
	$p=n-1$	$q=0, 1$	2 类
	$p=n$	$q=0$	1 类

所以共有  $1+2+\dots+n+n+1 = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$  类. 或用

(2)	秩	正惯性指数	类
	$r=0$	$p=0$	1
	$r=1$	$p=0, 1$	2
	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
	$r=n-1$	$p=0, 1, \dots, n-1$	$n$
	$r=n$	$p=0, 1, \dots, n,$	$n+1$

27. 设  $A$  是  $n$  阶实对称阵, 证明: 存在一正实数  $c$  使对任一个实  $n$  维列向量  $X$  都有  $|X^T A X| \leq c X^T X$ .

证 方法 1 因为对  $A$  存在正交方阵  $Q$ , 使  $Q^T A Q = \text{diag}\{\lambda_1, \dots, \lambda_n\}$ , 其中  $\lambda_1, \dots, \lambda_n$  为  $A$  的特征值, 即

$$X^T A X|_{X=QY} = \lambda_1 y_1^2 + \dots + \lambda_n y_n^2,$$

则

$$\min \lambda_i (y_1^2 + \dots + y_n^2) \leq X^T A X \leq \max \lambda_i (y_1^2 + \dots + y_n^2),$$

令  $c = \max(|\min \lambda_i|, |\max \lambda_i|)$ , 又  $y_1^2 + \dots + y_n^2 = Y^T Y = X^T X$ , 故有

$$|X^T A X| \leq c X^T X.$$

(因为  $Q$  是正交方阵, 所以  $X^T X = (QY)^T QY = Y^T Q^T QY = Y^T Y$ ).

方法 2 (利用 28 题)① 因为  $A$  是实对称阵, 所以  $\exists t_1$ , 使  $t_1 I + A > 0$ , 即对任  $x$ , 有  $x^T (t_1 I + A) x > 0$ , 即

$$x^T A x \geq -t_1 x^T x.$$

② 又  $-A$  亦是对称阵, 所以  $\exists t_2$ , 使  $t_2 I - A > 0$ , 故对任  $x$ , 有  $x^T (t_2 I - A) x > 0$ , 故

$$x^T A x \leq t_2 x^T x.$$

取  $c = \max(t_1, t_2)$ , 则有  $-c x^T x \leq x^T A x \leq c x^T x$ , 即

$$|x^T A x| \leq c x^T x.$$

28. 设  $A$  是实对称阵, 证明: 当实数  $t$  充分大后,  $tI + A$  是正定矩阵.

证 方法 1 用 2.3 节 27 题, 当  $t$  充分大时, 可使  $tI + A$  是对角优的, 这只要取  $t$  大于各列和的绝对值的最大值即

$$t > \max_j \left| \sum_{i=1}^n a_{ij} \right|.$$

方法 2 用定理 9.5 系 2. 对任实对称方阵  $A$ , 存在实正交方阵  $Q$ , 使

$$Q^T A Q = \text{diag}\{\lambda_1, \dots, \lambda_n\},$$

其中  $\lambda_1, \dots, \lambda_n$  为实数, 均为  $A$  的特征根. 故

$$Q^T (tI + A) Q = \text{diag}\{t + \lambda_1, \dots, t + \lambda_n\},$$

所以只要选取  $t \geq \max |\lambda_i|$  即可.

29. 判别下列二次型是否正定:

$$(1) 99x_1^2 - 12x_1x_2 + 48x_1x_3 + 130x_2^2 - 60x_2x_3 + 71x_3^2;$$

$$(2) 10x_1^2 + 8x_1x_2 + 24x_1x_3 + 2x_2^2 - 28x_2x_3 + x_3^2;$$

$$(3) \sum_{i=1}^n x_i^2 + \sum_{1 \leq i < j \leq n} x_i x_j;$$

$$(4) \sum_{i=1}^n x_i^2 + \sum_{i=1}^{n-1} x_i x_{i+1}.$$

解 (1) 因为

$$A = \begin{bmatrix} 99 & -6 & 24 \\ -6 & 130 & -30 \\ 24 & -30 & 71 \end{bmatrix},$$

其各阶顺序主子式

$$d_1 = 99 > 0, \quad d_2 = \begin{vmatrix} 99 & -6 \\ -6 & 130 \end{vmatrix} > 0, \quad d_3 = \det A = 18 \times 49 \times 2283 > 0,$$

所以  $A > 0$ , 即二次型正定.

$$(2) d_1 = 10 > 0, \quad d_2 = \begin{vmatrix} 10 & 4 \\ 4 & 2 \end{vmatrix} > 0,$$

$$d_3 = \begin{vmatrix} 10 & 4 & 12 \\ 4 & 2 & -14 \\ 12 & -14 & 1 \end{vmatrix} = 2^2(5 - 2 \times 14 \times 12 - 12 \times 6 - 14 \times 35 - 4) < 0,$$

所以  $Q(x_1, x_2, x_3)$  不是正定的.

这里是用顺序主子式来判断的. 要算一个三阶行列式, 计算量较大. 本题也可这样做: 利用若  $A$  正定, 则  $A$  的所有主子式大于 0. 而我们一眼就可以看出有一个二阶主子式  $< 0$ , 即

$$\begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & -14 \\ -14 & 1 \end{vmatrix} < 0.$$

所以  $A$  必不正定.

(3)

$$A = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \cdots & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \cdots & \frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix},$$

$$d_m = \frac{1}{2^m} \begin{vmatrix} 2 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 1 \\ 1 & \cdots & 1 & 2 \end{vmatrix}_m = \frac{1}{2^m} \left( I_m + \begin{bmatrix} 1 \\ \vdots \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix} (1, \cdots, 1) \right)$$

$$= \frac{1}{2^m} \left( 1 + (1, \cdots, 1) \begin{bmatrix} 1 \\ \vdots \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix} \right) = \frac{m+1}{2^m} > 0, \quad m = 1, \cdots, n.$$

所以  $Q(x_1, \cdots, x_n)$  正定.

$$(4) \quad Q(x_1, \cdots, x_n) = \frac{1}{2} \left[ x_1^2 + \sum_{i=1}^{n-1} (x_i + x_{i+1})^2 + x_n^2 \right] > 0;$$

或用

$$A = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} & & \\ \frac{1}{2} & \ddots & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & \frac{1}{2} \\ & & \frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix},$$

$$d_m = \frac{1}{2^m} \begin{vmatrix} 2 & 1 & & \\ 1 & \ddots & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & 1 \\ & & 1 & 2 \end{vmatrix} = \frac{1}{2^m} \frac{\alpha^{m+1} - \beta^{m+1}}{\alpha - \beta} = \frac{m+1}{2^m} > 0$$

上面是三对角线行列式,  $\alpha, \beta$  满足  $x^2 - 2x + 1 = 0$ , 当  $\alpha = \beta$  时, 值为  $\alpha^m + \alpha^{m-1}\beta + \cdots + \alpha\beta^{m-1} + \beta^m$ , 这里  $\alpha = \beta = 1$ , 故其值为  $m+1$ .

30.  $t$  取什么值时, 下列二次型是正定的:

$$(1) \quad x_1^2 + x_2^2 + 5x_3^2 + 2tx_1x_2 - 2x_1x_3 + 4x_2x_3;$$

$$(2) \quad x_1^2 + 4x_2^2 + x_3^2 + 2tx_1x_2 + 10x_1x_3 + 6x_2x_3;$$

解 (1)

$$A = \begin{bmatrix} 1 & t & -1 \\ t & 1 & 2 \\ -1 & 2 & 5 \end{bmatrix},$$

要

$$d_1 = 1 > 0, d_2 = 1 - t^2 > 0, d_3 = -t(4 + 5t) > 0,$$

必有

$$\begin{cases} -1 < t < 1 \\ -t > 0 \\ 4 + 5t > 0 \end{cases} \rightarrow -\frac{4}{5} < t < 0; \text{ 或 } \begin{cases} -1 < t < 1 \\ -t < 0 \\ 4 + 5t < 0 \end{cases} \quad \text{无解.}$$

故 当  $-\frac{4}{5} < t < 0$  时,  $Q(x_1, x_2, x_3)$  正定.

(2)

$$A = \begin{bmatrix} 1 & t & 5 \\ t & 4 & 3 \\ 5 & 3 & 1 \end{bmatrix}, d_1 = 1, d_2 = 4 - t^2, d_3 = 30t - 105 - t^2;$$

要  $d_1 > 0, d_2 > 0, d_3 > 0$ , 必须

$$\begin{cases} -2 < t < 2 \\ -15 - \sqrt{120} < t < -15 + \sqrt{120} \end{cases} \quad \text{无解.}$$

所以  $t$  为任何值时,  $Q(x_1, x_2, x_3)$  均不正定.

31. 在  $Q(x, y, z) = \lambda(x^2 + y^2 + z^2) + 2xy + 2xz - 2yz$  中, 问:

(1)  $\lambda$  取什么值时,  $Q$  为正定的?

(2)  $\lambda$  取什么值时,  $Q$  为负定的?

(3) 当  $\lambda = 2$  和  $\lambda = -1$  时,  $Q$  为什么类型?

解 (1) 用  $Q$  正定  $\Leftrightarrow$  它的矩阵的各阶顺序主子式皆为正数.

$$A = \begin{bmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ 1 & \lambda & -1 \\ 1 & -1 & \lambda \end{bmatrix}, d_1 = \lambda, d_2 = \lambda^2 - 1, d_3 = (\lambda - 2)(\lambda + 1)^2,$$

所以要  $Q$  正定必须,  $\lambda > 0, \lambda^2 > 1, \lambda > 2$ , 故  $\lambda > 2$  为解答.

(2)  $Q$  负定  $\Leftrightarrow d_1 < 0, d_2 > 0, d_3 < 0$ , 即  $\lambda < 0, \lambda^2 > 1, \lambda < 2$ , 所以  $\lambda < -1$  为解.

(3) 当  $\lambda = 2$  时,  $A$  的所有主子式均为正数或 0, 所以  $Q$  是半正定的. (因  $a_{11} = a_{22} = a_{33} = 2 > 0, \det A = 0$ , 二阶主子式有三个值均为 3)

或用配方法:

$$Q = 2\left[x + \frac{1}{2}(y + z)\right]^2 + \left(2 - \frac{1}{2}\right)(y - z)^2$$

所以  $Q$  半正定.

当  $\lambda = -1$  时

$$Q = -(x - y - z)^2, \quad \text{故 } Q \text{ 半负定.}$$

$$32. \text{ 设 } A = \begin{bmatrix} a & \lambda & \cdots & \lambda \\ \lambda & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \lambda \\ \lambda & \cdots & \lambda & a \end{bmatrix}, \text{ 其中 } a > 0, n \geq 2,$$

试问,当 $\lambda$ 取何值时,实二次型 $x^T A x$ 正定?

解  $x^T A x$  正定 $\Leftrightarrow A$  正定 $\Leftrightarrow A$  的各阶顺序主子式大于 0,而  $K$  阶顺序主子式

$$\det A_k = \det \left[ (a - \lambda) I_k + \begin{bmatrix} \lambda \\ \vdots \\ \lambda \end{bmatrix} (1, \dots, 1) \right] = (a - \lambda)^{k-1} [a + (k - 1)\lambda],$$

其中  $\det A_1 = a > 0$ , 当  $k \geq 2$ ,

$$\det A_k > 0 \Leftrightarrow \begin{cases} a - \lambda > 0 \\ a + (k - 1)\lambda > 0 \end{cases} \rightarrow a > \lambda > -\frac{a}{k - 1},$$

$k = 2, \dots, n$  代入得当

$a > \lambda > -\frac{a}{n-1}$  时, 二次型  $x^T A x$  正定.

33. 试求下列实二次型的相合标准形:

$$(1) \sum_{1 \leq j < k \leq n} (-1)^{j+k} x_j x_k; \quad (2) \sum_{1 \leq j < k \leq n} |j - k| x_j x_k.$$

解 (1)

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \cdots & (-1)^{n-1} \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \frac{1}{2} & \ddots & \ddots & \ddots & \frac{1}{2} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & -\frac{1}{2} \\ (-1)^{n-1} \frac{1}{2} & \cdots & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \\ \vdots \\ \vdots \end{bmatrix} (1, -1, 1, -1, \dots) - \frac{1}{2} I_n,$$

所以  $A$  的  $m$  阶顺序主子式

$$\det A_m = \left(-\frac{1}{2}\right)^m \left[ 1 - (1, -1, 1, -1, \dots) \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} \\ \vdots \end{bmatrix} \right] = \frac{(-1)^{m-1}}{2^{m+1}} (m - 2),$$

故当  $m > 2$  时,  $m$  为奇时  $\det A_m > 0$ ,  $m$  为偶时,  $\det A_m < 0$ . 由 22 题可知

$$A \approx \text{diag}\{-1, 1, -1, \dots, -1\}.$$

或由作可逆线性代换

$$\begin{cases} x_1 = y_1 + y_2 \\ x_2 = y_1 - y_2 \\ x_i = y_i \end{cases} \quad i = 3, \dots, n.$$

则

$$\begin{aligned} Q(x_1, \dots, x_n) |_{x=P_1 y} &= -y_1^2 + y_2^2 + 2y_2(y_3 - y_4 + y_5 - \dots) + \sum_{3 \leq j < k \leq n} y_j y_k (-1)^{j+k} \\ &= -y_1^2 + [y_2 + (y_3 - y_4 + \dots)]^2 - \sum_{j=3}^n y_j^2 - \sum_{3 \leq j < k \leq n} y_j y_k (-1)^{j+k} \\ &\stackrel{y=P_2 z}{=} z_1^2 + z_2^2 - \sum_{j=3}^n z_j^2 - \sum_{3 \leq j < k \leq n} z_j z_k (-1)^{j+k} \end{aligned}$$

而  $n-2$  个变量的二次型

$$\sum_{j=3}^n z_j^2 + \sum_{3 \leq j < k \leq n} z_j z_k (-1)^{j+k}$$

是正定的, 这很容易由它的各阶顺序主子式为正得出, 事实上  $\det A'_m = \frac{(m+2)}{2^m} > 0$ .

故二次型的标准形为(变量记为  $\tilde{x}$ )

$$\tilde{x}_1^2 - \tilde{x}_2^2 - \tilde{x}_3^2 - \dots - \tilde{x}_n^2.$$

$$(x = P\tilde{x}, P = P_1 P_2 P_3)$$

(2) 看  $A$  的  $m$  阶顺序主子式

$$\begin{aligned} d_m &= \begin{vmatrix} 0 & \frac{1}{2} & 1 & \dots & \frac{m-1}{2} \\ \frac{1}{2} & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 1 & \ddots & \ddots & \ddots & 1 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \frac{1}{2} \\ \frac{m-1}{2} & \dots & 1 & \frac{1}{2} & 0 \end{vmatrix} \\ &= \frac{1}{2^m} \begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 & \dots & m-1 \\ 1 & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 2 & \ddots & \ddots & \ddots & 2 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 1 \\ m-1 & \dots & 2 & 1 & 0 \end{vmatrix} = \frac{(-1)^{m-1}(m-1)}{2}, \end{aligned}$$

所以当  $m > 1$  时有  $\begin{cases} d_m < 0 & m \text{ 为偶数} \\ d_m > 0 & m \text{ 为奇数} \end{cases}$

故当  $m > 1$  后,  $A$  的顺序主子式正、负相间, 由 22 题知

$$A \approx \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{2} & & \\ \frac{1}{2} & 0 & & \\ & & \frac{d_3}{d_2} & \\ & & & \ddots \\ & & & & \frac{d_n}{d_{n-1}} \end{bmatrix}$$

$$\approx \begin{bmatrix} 1 & \\ & -I_{n-1} \end{bmatrix}.$$

故二次型的相合标准形为

$$Q(\alpha) |_{x=Py} = y_1^2 - y_2^2 - \cdots - y_n^2.$$

34. 判定下列实对称阵属于什么相合类(正定, 负定, 半正定, 半负定, 不定)

$$(1) A = \begin{bmatrix} n & -1 & \cdots & -1 \\ -1 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & -1 \\ -1 & \cdots & -1 & n \end{bmatrix};$$

$$(2) A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 1 \\ 1 & \cdots & 1 & 2 \end{bmatrix};$$

$$(3) A = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{2} & \cdots & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \cdots & \frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix}.$$

解 (1)

$$d_k = \begin{vmatrix} n & -1 & \cdots & -1 \\ -1 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & -1 \\ -1 & \cdots & -1 & n \end{vmatrix} = \det \left[ (n+1)I_k - \begin{bmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix} (1, \cdots, 1) \right]$$

$$= (n+1)^k \left| I_k - \frac{1}{n+1} \alpha \alpha^T \right| = (n+1)^k \left( 1 - \frac{1}{n+1} \alpha^T \alpha \right)$$

$$= (n+1)^k \left( 1 - \frac{n}{n+1} \right) = (n+1)^{k-1} > 0$$

其中  $\alpha = (1, \cdots, 1)^T$ .



所以  $k > 1$  时  $d_k > 0, k=1, d_1=n > 0$ , 故  $A$  正定.

(2)

$$d_k = \det \left( I + \begin{bmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix} (1, \dots, 1) \right) = 1 + k > 0 \quad k \geq 1$$

故  $A$  正定.

(3)

$$d_k = \frac{1}{2^k} \det \left( \begin{bmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix} (1, \dots, 1) - I \right) = (-1)^{k-1} \frac{(k-1)}{2^k}.$$

所以当  $k > 1$  时,  $A$  的各阶顺序主子式正、负相间 (即  $k$  为偶数  $d_k < 0$ ;  $k$  为奇数  $d_k > 0$ ) 故  $A$  是不定的.

35. 设  $n$  阶实方阵  $A = \begin{bmatrix} \lambda+3 & 2 & \cdots & \cdots & 2 \\ 2 & \lambda & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & 1 & \ddots & & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & 1 \\ 2 & 1 & \cdots & 1 & \lambda \end{bmatrix}, n \geq 2,$

试求  $\lambda$  的取值范围使  $A$  正定.

解 记  $\alpha = (2, 1, \dots, 1)^T$ , 则

$$\begin{aligned} \det A_k &= \det \left( (\lambda - 1)I_k + \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix} (2, 1, \dots, 1) \right) = \det((\lambda - 1)I_k + \alpha\alpha^T) \\ &= (\lambda - 1)^k \det \left( I_k + \frac{1}{\lambda - 1} \alpha\alpha^T \right) = (\lambda - 1)^k \left( I_1 + \frac{1}{\lambda - 1} \alpha^T \alpha \right) \\ &= (\lambda - 1)^{k-1} (\lambda - 1 + k + 3) = (\lambda - 1)^{k-1} (\lambda + k + 2), \end{aligned}$$

$$\text{由 } A \text{ 正定} \Leftrightarrow \det A_k > 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \lambda > 1, \\ \lambda > -(k+2), \quad k=1, \dots, n, \end{cases} \quad \text{所以 } \lambda > 1.$$

36. 证明: 如果  $A$  是正定实对称阵, 那么  $A^{-1}$  和  $A^*$  (古典伴随方阵) 也是正定方阵.

证 方法 1 因为  $(A^{-1})^T = (A^T)^{-1} = A^{-1}$ , 所以  $A^{-1}$  是实对称阵. 设  $\lambda_i$  为  $A$  的特征根. ( $i=1, \dots, n$ ), 则  $\lambda_i^{-1}$  是  $A^{-1}$  的特征根. (因由  $Ax_i = \lambda_i x_i$  可得  $A^{-1}x_i = \frac{1}{\lambda_i}x_i$ ).

$$\text{所以} \quad A > 0 \Leftrightarrow \lambda_i > 0 \Leftrightarrow \frac{1}{\lambda_i} > 0 \Leftrightarrow A^{-1} > 0.$$

方法 2 因为  $A > 0$ , 所以对任  $x \neq 0$ , 有  $x^T A x > 0$ , 作可逆线性代换  $x = A^{-1}y$ , 得

$$0 < x^T A x = (A^{-1}y)^T A (A^{-1}y) = y^T (A^{-1})^T A A^{-1}y = y^T A^{-1}y,$$

所以  $A^{-1} > 0$ . (因为上式对任  $y \neq 0$  成立)

又

$$\text{因为} \quad A^* = (\det A) A^{-1},$$

故对任  $x \neq 0$ , 有

$$x^T A^* x = x^T (\det A) A^{-1} x = (\det A) x^T A^{-1} x > 0$$

所以  $A^*$  正定.

最后一个大于号是因为  $\det A > 0$ , (因为  $A$  正定) 及  $x^T A x > 0$  对任  $x \neq 0$  成立 (因  $A^{-1}$  正定).

37. 如果  $A, B$  都是  $n$  阶正定方阵, 证明  $A+B$  也是正定方阵.

证 由已知, 对任  $x \neq 0$ , 有  $x^T A x > 0, x^T B x > 0$ , 于是有

$$x^T (A+B) x = x^T A x + x^T B x > 0,$$

对任  $x \neq 0$  成立, 故  $A+B$  是正定的.

38. 设  $A$  为  $n$  阶实对称阵, 且  $|A| < 0$ , 证明: 必存在实  $n$  维向量  $x \neq 0$ , 使  $x^T A x < 0$ .

证 方法 1 (反证法) 若对任  $x$  均有  $x^T A x \geq 0$  则  $A$  是半正定的. 由定理 8.5 知  $A$  的所有主子式  $\geq 0$ , 与已知  $|A| < 0$  矛盾, 故必有  $x \neq 0$ , 使  $x^T A x < 0$ .

方法 2 设  $\lambda_1, \dots, \lambda_n$  为  $A$  的特征值, 则有  $\det A = \lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_n$ . (见定理 6.11). 由已知  $|A| < 0$ , 故必有某个  $\lambda_i < 0$ , 即  $A$  的负惯性指数  $\neq 0$ . 故存在可逆线性代换  $x = Py$  使

$$x^T A x |_{x=Py} = y_1^2 + \cdots + y_r^2 - (y_{r+1}^2 + \cdots + y_n^2), \quad r < n$$

取  $y_1 = \cdots = y_r = 0, y_{r+1} = \cdots = y_n = 1$ , 则

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = P \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix} \neq 0$$

且使

$$x^T A x = 0 + \cdots + 0 - (1 + \cdots + 1) = -(n-r) < 0.$$

39. 试证: 任一秩为 1 半正定对称方阵  $S$  必有  $S = \alpha^T \alpha$ , 其中  $\alpha$  是  $1 \times n$  非零矩阵.

证 因为对任实对称阵  $S$  都存在可逆阵  $P$ , 使

$$P^T A P = \begin{bmatrix} I_r & & \\ & -I_q & \\ & & O \end{bmatrix}.$$

这里, 由  $S$  半正定, 所以  $q=0$ , 又因为  $r(S)=1$ , 所以  $r=1$ . 即

$$P^T S P = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ & 0 & & \\ & & \ddots & \\ & & & 0 \end{bmatrix} \rightarrow S = (P^{-1})^T \begin{bmatrix} 1 & & & \\ & 0 & & \\ & & \ddots & \\ & & & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & & & \\ & 0 & & \\ & & \ddots & \\ & & & 0 \end{bmatrix} P^{-1}$$

记  $P^{-1} = (b_{ij}), \alpha = (b_{11}, \dots, b_{1n})$ , 则

$$S = \begin{bmatrix} b_{11} \\ \vdots \\ b_{1n} \end{bmatrix} (b_{11}, \dots, b_{1n}) = \alpha^T \alpha.$$

40. 设  $A$  是正定实对称方阵, 试证: 对任两向量  $x$  和  $y$ , 成立着

$$(x^T A y)^2 \leq (x^T A x)(y^T A y).$$

又等式成立的必要充分条件为  $x$  和  $y$  线性相关.

证 当  $y=0$  时, 不等式显然成立. 当  $y \neq 0$ , 引入参数  $t$ , 则由  $A$  是正定实对称阵有

$$0 \leq (x + ty)^T A (x + ty) = x^T A x + t^2 y^T A y + 2tx^T A y, (*)$$

对一切实数  $t$  成立. 视右边为  $t$  的二次三项式, 故应有其判别式  $\leq 0$ , 即  $(b^2 - 4ac \leq 0)$

$$(x^T A y)^2 \leq (x^T A x)(y^T A y)$$

等号成立  $\Leftrightarrow$  判别式  $= 0 \Leftrightarrow (*)$  式等号成立  $\Leftrightarrow (x + ty) = 0$  (因  $A$  正定)  $\Leftrightarrow x, y$  线性相关.

41. 如果二次型  $Q(x_1, \dots, x_n)$  等于 0 的充要条件为  $(x_1, \dots, x_n) = 0$ , 那么  $Q(x_1, \dots, x_n)$  是正定的或负定的.

证 反证法: 若  $Q(x_1, \dots, x_n)$  不是正定的或负定的, 则或①它是不定的, 或②它是半正定的, 或③它是半负定的.

① 若它是不定的, 则  $\exists$  可逆阵  $P$ , 使

$$Q(x_1, \dots, x_n) |_{x=Py} = y_1^2 + \dots + y_r^2 - (y_{r+1}^2 + \dots + y_n^2), \text{ 其中 } r < n.$$

取  $y_1 = y_n = 1$ , 而  $y_i = 0, i = 2, \dots, n-1$ , 于是有

$$\tilde{x} = \begin{bmatrix} \tilde{x}_1 \\ \vdots \\ \tilde{x}_n \end{bmatrix} = P \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \neq 0,$$

而  $Q(\tilde{x}_1, \dots, \tilde{x}_n) = 1 - 1 = 0$ , 与已知矛盾.

② 若它是半正定的, 则  $\exists$  可逆阵  $P$ , 使

$$Q(x_1, \dots, x_n) |_{x=Py} = y_1^2 + \dots + y_r^2, \quad r < n,$$

取  $y_1 = \dots = y_r = 0, y_{r+1} = \dots = y_n = 1$ ,

则有

$$x^{(1)} = \begin{bmatrix} x_1^{(1)} \\ \vdots \\ x_n^{(1)} \end{bmatrix} = P \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix} \neq 0,$$

而  $Q(x_1^{(1)}, \dots, x_n^{(1)}) = 0$ , 与已知  $Q(\alpha) = 0$  仅当  $\alpha = 0$  矛盾.

③ 与②类似, 故证得.

42. 试证: 实线性空间  $L$  上线性函数的平方是半正定二次型, 一些线性函数的平方和也是半正定二次型.

证 (1) 设  $f$  为  $L$  上的线性函数,  $e_1, \dots, e_n$  为空间  $L$  的基, 则对  $\forall x \in L$  (设其坐标列为  $(x_1, \dots, x_n)^T$ ) 有:

$$f(x) = x_1 f(e_1) + \cdots + x_n f(e_n) = (x_1, \cdots, x_n) \begin{bmatrix} f(e_1) \\ \vdots \\ f(e_n) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f(e_1) \\ \vdots \\ f(e_n) \end{bmatrix}^T (x_1, \cdots, x_n),$$

$$\text{所以} \quad [f(x)]^2 = (x_1, \cdots, x_n) \begin{bmatrix} f(e_1) \\ \vdots \\ f(e_n) \end{bmatrix} (f(e_1), \cdots, f(e_n)) \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \quad (*)$$

方阵  $A = \begin{bmatrix} f(e_1) \\ \vdots \\ f(e_n) \end{bmatrix} (f(e_1), \cdots, f(e_n))$  为半正定的, 所以  $[f(x)]^2$  是半正定二次型.

(2) 由(\*)式显然有

$$f_1^2(x) + \cdots + f_s^2(x) = (x_1, \cdots, x_n) \sum_{i=1}^s \begin{bmatrix} f_i(e_1) \\ \vdots \\ f_i(e_n) \end{bmatrix} (f_i(e_1), \cdots, f_i(e_n)) \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

所以  $f_1^2(x) + f_2^2(x) + \cdots + f_s^2(x)$  是半正定二次型.

43. 证明:  $n \sum_{i=1}^n x_i^2 - \left( \sum_{i=1}^n x_i \right)^2$  是半正定的, 且等号成立的充要条件为  $x_1 = x_2 = \cdots = x_n$ .

证 方法 1 因为对任  $x_1, \cdots, x_n$ , 有

$$n \sum_{i=1}^n x_i^2 - \left( \sum_{i=1}^n x_i \right)^2 = \sum_{1 \leq i < j \leq n} (x_i - x_j)^2 \geq 0,$$

且等号成立  $\Leftrightarrow x_i = x_j, i \neq j$ .

方法 2 在第 40 题中, 取  $A = I, x = (x_1, \cdots, x_n)^T, y = (1, \cdots, 1)$ , 则有

$$(x^T x)(y^T y) \geq (x^T y)^2,$$

因为这里  $x^T x = \sum_{i=1}^n x_i^2, y^T y = n, x^T y = \sum_{i=1}^n x_i$ , 代入上式即得

$$n \sum_{i=1}^n x_i^2 - \left( \sum_{i=1}^n x_i \right)^2 \geq 0$$

等号成立  $\Leftrightarrow x$  和  $y$  线性相关, 所以  $x = ky = (k, \cdots, k)^T$ .

44. 设  $Q(x_1, \cdots, x_n) = X^T A X$  是一实二次型, 若有实  $n$  维向量  $X_1, X_2$ , 使  $X_1^T A X_1 > 0, X_2^T A X_2 < 0$ . 证明: 必存在实  $n$  维向量  $X_0 \neq 0$ , 使  $X_0^T A X_0 = 0$ .

证 方法 1 因为对任  $\lambda \in R$  有

$$(X_1 + \lambda X_2)^T A (X_1 + \lambda X_2) = X_1^T A X_1 + 2\lambda (X_1^T A X_2) + \lambda^2 X_2^T A X_2,$$

上式右边是关于  $\lambda$  的二次三项式, 其判别式为

$$\Delta = 4(X_1^T A X_2)^2 - 4(X_1^T A X_1)(X_2^T A X_2), \text{ 由已知条件得 } \Delta > 0,$$

所以有两个不同的实根  $\lambda_1, \lambda_2$ , 故  $X_1 + \lambda_1 X_2 \neq X_1 + \lambda_2 X_2$ , 取  $X_0$  等于其中不为 0 者, 如  $X_0 = X_1 + \lambda_1 X_2$ , 则由上面讨论知  $X_0^T A X_0 = 0$ .

方法 2 由  $X^T A X = f(x_1, \cdots, x_n)$  是  $x_1, \cdots, x_n$  的连续函数,  $\frac{X_1^T}{|X_1|} A \frac{X_1}{|X_1|} > 0$  与

$\frac{X_2^T}{|X_2|} A \frac{X_2}{|X_2|} < 0$ , 所以  $f$  在  $|X|^2 = (X_1^2 + \cdots + X_n^2) = 1$  这个  $n$  维的“单位球”上, 已有两点的函数值异号, 而  $|X| = 1$  是一个  $n$  维闭球, 由中值定理, 必有  $X_0$  且  $|X_0| = 1$ , 使  $X_0^T A X_0 = 0$ .

45. 设  $A = (a_{ij})$  和  $B = (b_{ij})$  都是  $n$  阶正定对称方阵, 试证: 方阵  $C = (a_{ij}b_{ij})$  也是  $n$  阶正定对称方阵.

证 显然  $C$  也是对称方阵, 今任取  $x = (x_1, \cdots, x_n)^T \neq 0$ , 则由  $A > 0, B > 0$ , 可知同时有

$$x^T A x = \sum_{j,k=1}^n a_{jk} x_j x_k > 0; \quad x^T B x = \sum_{j,k=1}^n b_{jk} x_j x_k > 0,$$

现在需要证明

$$\sum_{j,k=1}^n a_{ij} b_{jk} x_j x_k > 0,$$

由  $B > 0$ , 知存在  $n$  阶可逆阵  $Q = (q_{ij})$ , 使  $B = Q^T Q$ , 即

$$b_{jk} = \sum_{l=1}^n q_{lj} q_{lk} \quad (j, k = 1, \cdots, n)$$

所以

$$\begin{aligned} \sum_{j,k=1}^n a_{jk} b_{jk} x_j x_k &= \sum_{j,k=1}^n a_{jk} \left( \sum_{l=1}^n q_{lj} q_{lk} \right) x_j x_k \\ &= \sum_{l=1}^n \sum_{j,k=1}^n a_{jk} (x_j q_{lj}) (x_k q_{lk}) \end{aligned}$$

对任  $x = (x_1, \cdots, x_n)^T \neq 0$ , 因为  $Q$  可逆, 所以总存在一个  $l$ , 使得

$$(x_1 q_{l1}, x_2 q_{l2}, \cdots, x_n q_{ln})^T \neq 0,$$

(实因若  $x_1 \neq 0$ , 则由  $Q$  可逆知  $Q$  的第一列中总有一元素不为 0, 设为  $q_{l1}$ , 于是  $x_1 q_{l1} \neq 0$ )

又因为  $A > 0$ , 知

$$\sum_{j,k=1}^n a_{jk} (x_j q_{lj}) (x_k q_{lk}) > 0 \quad \text{对某 } l \text{ 成立.}$$

所以  $\sum_{j,k=1}^n a_{jk} b_{jk} x_j x_k > 0$ , 所以  $C = (a_{jk} b_{jk}) > 0$ .

46. 证明: 如果  $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} x_i x_j$  ( $a_{ij} = a_{ji}$ ) 是正定二次型, 那末

$$f(y_1, \cdots, y_n) = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} & y_1 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} & y_n \\ y_1 & \cdots & y_n & 0 \end{vmatrix}$$

是负定二次型.

证 记  $A = (a_{ij}), y = (y_1, \cdots, y_n)^T, B = \begin{bmatrix} A & y \\ y^T & 0 \end{bmatrix}$  取  $P = \begin{bmatrix} I_n & -A^{-1}y \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ , 则

$$P^T B P = \begin{bmatrix} A & \\ & -y^T A^{-1} y \end{bmatrix}$$

两边取行列式, 因为  $\det P = 1$  所以

$$f(y_1, \dots, y_n) = \det B = (\det A)(-y^T A^{-1} y) < 0$$

对任  $y_1, \dots, y_n$  不全为 0 成立

所以  $f(y_1, \dots, y_n)$  是负定二次型.

(因  $A > 0, A^{-1} > 0$ , 所以  $\det A > 0, y^T A^{-1} y > 0$ , 对任  $y \neq 0$  成立).

47. 设  $A$  为实对称正定方阵, 则

$$\det A \leq a_{11} a_{22} \cdots a_{nn}.$$

等号仅当  $A$  为对角阵时成立.

证 用归纳法: 当  $n=2$  时,  $\det A = a_{11} a_{22} - a_{12}^2 \leq a_{11} a_{22}$ , 今设结论对  $n-1$  阶方阵成立, 则对  $n$  阶方阵  $A$ , 记

$$A = \begin{bmatrix} A_{n-1} & \beta \\ \beta^T & a_{nn} \end{bmatrix},$$

其中  $A_{n-1}$  为  $n-1$  阶正定对称阵. 取

$$P = \begin{bmatrix} I_{n-1} & -A_{n-1}^{-1}\beta \\ O & I \end{bmatrix}, \text{ 则 } P^T A P = \begin{bmatrix} A_{n-1} & O \\ O & a_{nn} - \beta^T A_{n-1}^{-1} \beta \end{bmatrix}.$$

因为  $\det P = 1$ , 所以在右边两边取行列式得

$$\det A = (\det A_{n-1})(a_{nn} - \beta^T A_{n-1}^{-1} \beta) \leq (\det A_{n-1}) \cdot a_{nn},$$

由  $A_{n-1} > 0 \rightarrow A_{n-1}^{-1} > 0$  所以  $\beta^T A_{n-1}^{-1} \beta \geq 0$ , 等号成立  $\Leftrightarrow \beta = 0$ , 由归纳假设有  $\det A_{n-1} \leq a_{11} \cdots a_{n-1, n-1}$ , 等号仅当  $A_{n-1}$  为对角阵. 于是得

$$\det A \leq (\det A_{n-1}) \cdot a_{nn} \leq a_{11} \cdots a_{nn}$$

等号仅当  $A$  为对角阵时成立.

48. 对任意实系数  $n$  阶可逆阵  $B = (b_{ij})$  有

$$|\det B| \leq \prod_{i=1}^n \left( \sum_{k=1}^n b_{ik}^2 \right)^{1/2} \quad (\text{Hadamard 不等式}),$$

等号仅当  $b_{i1}b_{j1} + b_{i2}b_{j2} + \cdots + b_{in}b_{jn} = 0 (i \neq j)$  时成立.

证 因为  $B$  可逆, 所以  $A = B^T B$  是正定实对称阵. 其中

$$a_{ii} = b_{1i}^2 + \cdots + b_{ni}^2 = \sum_{k=1}^n b_{ki}^2,$$

故由 47 题有

$$(\det B)^2 = \det A \leq a_{11} \cdots a_{nn} = \prod_{i=1}^n a_{ii} = \prod_{i=1}^n \sum_{k=1}^n b_{ki}^2,$$

所以

$$|\det B| \leq \prod_{i=1}^n \left( \sum_{k=1}^n b_{ki}^2 \right)^{1/2}.$$

等号成立  $\Leftrightarrow A$  为对角阵, 即  $a_{ij} = 0 (i \neq j) \Leftrightarrow \sum_{k=1}^n b_{ki} \cdot b_{kj} = 0. (i \neq j).$

49. 设  $A$  和  $B$  都是实对称阵,  $A$  半正定,  $\det(A + iB) = 0$ .

求证: 存在  $1 \times n$  非零实矩阵  $\alpha$ , 使得  $\alpha(A+iB)=0$ .

证 由已知  $\det(A+iB)=0$ , 所以  $\exists$  复向量  $z=\beta+i\gamma$ , 使  $z(A+iB)=0$ . 此时若  $\beta, \gamma$  中有一个为 0, 则已得证.

今设  $\beta \neq 0, \gamma \neq 0$ , 由  $z(A+iB)=0$  分开实, 虚部得:

$$\begin{cases} \beta A - \gamma B = 0, & \textcircled{1} \\ \beta B + \gamma A = 0, & \textcircled{2} \end{cases} \quad \textcircled{1} \times \beta^T + \textcircled{2} \times \gamma^T \text{ 得 } \beta A \beta^T + \gamma A \gamma^T = 0$$

因为  $A \geq 0$ , 所以必有  $\beta A \beta^T = \gamma A \gamma^T = 0$ , 又由定理 8.5, 存在方阵  $Q$ , 使得  $A = Q^T Q$ , 所以  $0 = \beta Q^T Q \beta^T = (Q \beta^T)^T Q \beta^T \rightarrow Q \beta^T = 0$  或  $\beta Q^T = 0$ , 同理得  $\gamma Q^T = 0$ .

所以  $\beta A = \beta Q^T Q = 0 \xrightarrow{\text{由}\textcircled{1}} \gamma B = 0,$

$$\gamma A = \gamma Q^T Q = 0 \xrightarrow{\text{由}\textcircled{2}} \beta B = 0,$$

所以  $\beta(A+iB)=0, \quad \gamma(A+iB)=0,$

且  $\beta, \gamma$  均为  $1 \times n$  实向量.

50. 试证: 对一切  $1 \times n$  非零矩阵  $x = (x_1, \dots, x_n)$ , 成立着

$$\sum_{i=1}^n x_i^2 - \sum_{i=1}^{n-1} x_i x_{i+1} > 0,$$

试求它的最小值, 并求它在限制条件  $x_n=1$  下的最小值.

解 设  $Q(x) = \sum_{i=1}^n x_i^2 - \sum_{i=1}^{n-1} x_i x_{i+1} = x A x^T$ , 则显然

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & & \\ -\frac{1}{2} & \ddots & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & -\frac{1}{2} \\ & & -\frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix}$$

其各阶顺序主子式满足

$$\det A_m = \frac{m+1}{2^m} > 0, \quad \text{所以 } A > 0$$

故当  $x \neq 0$  时,  $Q(x) > 0$ , 无极小值, 二次型  $x A x^T$  仅当  $x=0$  时达到最小值 0.

当  $x_n=1$  时, 记  $A = \begin{bmatrix} A_{n-1} & \alpha^T \\ \alpha & 1 \end{bmatrix}$ , 其中  $\alpha = (0, \dots, 0, -\frac{1}{2})$ , 取  $P = \begin{bmatrix} I_{n-1} & O \\ -\alpha A_{n-1}^{-1} & 1 \end{bmatrix}$ , 则

$$P A P^T = \begin{bmatrix} A_{n-1} & \\ & a \end{bmatrix}, \quad \text{其中 } a = 1 - \alpha A_{n-1}^{-1} \alpha^T,$$

所以

$$Q(x) = x A x^T = (x_1, \dots, x_{n-1}, 1) P^{-1} \begin{bmatrix} A_{n-1} & \\ & a \end{bmatrix} (P^{-1})^T \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_{n-1} \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$=(\tilde{x}_1, \dots, \tilde{x}_{n-1}, 1) \begin{bmatrix} A_{n-1} & \\ & a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_{n-1} \\ 1 \end{bmatrix} = \tilde{x} A_{n-1} \tilde{x}^T + a,$$

因为  $A_{n-1}$  正定, 所以  $\tilde{x} A_{n-1} \tilde{x}^T \geq 0$ , (因为  $\tilde{x} = (\tilde{x}_1, \dots, \tilde{x}_{n-1})$  可能为 0) 故最小值为  $a$ .

## 8.4 补充题与解答

1. 设  $A$  是  $n$  阶实对称方阵,  $S = \{x | x^T A x = 0, x \in \mathbf{R}^n\}$ .

(1) 试给出  $S$  为  $\mathbf{R}^n$  的子空间的充分必要条件, 并加以证明.

(2) 当  $S$  是子空间且  $r(A) = r < n$  时, 试求  $\dim S$ .

解 设存在可逆阵  $P$ , 使

$$A = P^T \begin{bmatrix} I_p & & \\ & -I_q & \\ & & O \end{bmatrix} P,$$

则

$$x^T A x = x^T P^T \begin{bmatrix} I_p & & \\ & -I_q & \\ & & O \end{bmatrix} P x = y^T \begin{bmatrix} I_p & & \\ & -I_q & \\ & & O \end{bmatrix} y,$$

其中  $y = P x$ , 故

$$\begin{aligned} x^T A x = 0 &\Leftrightarrow y^T \begin{bmatrix} I_p & & \\ & -I_q & \\ & & O \end{bmatrix} y = 0 \\ &\Leftrightarrow y_1^2 + \dots + y_p^2 - y_{p+1}^2 - \dots - y_{p+q}^2 = 0 \end{aligned}$$

以下分情况讨论:

①  $q=0$  时,

$$\begin{aligned} x^T A x = 0 &\Leftrightarrow y_1^2 + \dots + y_p^2 = 0 \\ &\Leftrightarrow y_1 = \dots = y_p = 0 \end{aligned}$$

$$\Leftrightarrow y = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ * \\ \vdots \\ * \end{bmatrix} \Leftrightarrow x = P^{-1} \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ * \\ \vdots \\ * \end{bmatrix}$$

故  $S$  是子空间,  $\dim S = n - p = n - r$ .

②  $p=0$  时, 同上知  $S$  是子空间,  $\dim S = n - q = n - r$ .

(因为  $x^T A x = 0 \Leftrightarrow y_{p+1}^2 + \dots + y_{p+q}^2 = 0 \Leftrightarrow y_{p+1} = \dots = y_{p+q} = 0 \Leftrightarrow y = (y_1, \dots, y_p, 0, \dots, 0,$



$$y_{p+q+1}, \dots, y_n)^T \Leftrightarrow x = P^{-1}(y_1, \dots, y_p, 0, \dots, 0, y_{p+q+1}, \dots, y_n)^T).$$

③  $p$  和  $q$  均非零时,  $S$  不是子空间: 因为  $S$  对加法不封闭, 如设

$$\alpha = P^{-1}(1, 0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0)^T \in S$$

$$\beta = P^{-1}(1, 0, \dots, 0, -1, 0, \dots, 0)^T \in S,$$

以上  $\alpha$  中第二个 1 及  $\beta$  中的 -1 都是第  $p+1$  位分量. 显然  $\alpha^T A \alpha = 0, \beta^T A \beta = 0$ , 但  $\alpha + \beta \notin S$ :

$$(\alpha + \beta)^T A (\alpha + \beta) = (2, 0, \dots) \begin{bmatrix} I_p & & \\ & -I_q & \\ & & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ \vdots \end{bmatrix} = 4 \neq 0.$$

于是得结论:

(1)  $S$  为  $\mathbf{R}^n$  的子空间的充要条件是  $A$  是半定的 (即半正定或半负定)

(2) 当  $S$  是子空间时,  $\dim S = n - r(A) = n - r$ .

2. 设  $A, B$  都是  $n$  阶正定实对称阵, 证明  $AB$  的特征值均为正数.

证 方法 1 因为  $A > 0, B > 0$ , 所以必存在可逆阵  $P, Q$ , 使得  $A = P^T P, B = Q^T Q$ , 则

$$AB = P^T P Q^T Q = P^T P Q^T Q P^T (P^T)^{-1}$$

所以  $AB$  相似于  $P Q^T Q P^T = (Q P^T)^T (Q P^T)$  而后者是正定实对称阵 (因  $Q P^T$  可逆), 其特征值为正, 又相似的方阵有相同的特征值,

所以  $AB$  的特征值均为正数.

方法 2 由  $\det(\lambda I - AB) = \det(\lambda I - BA)$  对任  $n$  阶方阵  $A, B$  成立. 知  $AB$  与  $BA$  的特征值相同. 故

$AB = (P^T)(P Q^T Q)$  与  $(P Q^T Q) P^T$  的特征值相同. 后者  $= (Q P^T)^T (Q P^T)$  是正定的, 特征值均正,

所以  $AB$  的特征值均为正数.

3. 设  $\epsilon_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix}^T, \epsilon_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}^T, \epsilon_3 = \begin{bmatrix} 2 \\ -4 \\ 7 \end{bmatrix}^T$ , 是  $\mathbf{R}^{(3)}$  的基, 试求  $\epsilon_1, \epsilon_2, \epsilon_3$  的对偶基.

解:  $\forall \alpha \in \mathbf{R}^{(3)}$ , 设  $\alpha = (a_1, a_2, a_3)^T = x_1 \epsilon_1 + x_2 \epsilon_2 + x_3 \epsilon_3$  解此非线性方程组, 得

$$\begin{cases} x_1 = -3a_1 - 5a_2 - 2a_3, \\ x_2 = 2a_1 + a_2 \\ x_3 = a_1 + 2a_2 + a_3 \end{cases}$$

于是由 8.2 节知  $\epsilon_1, \epsilon_2, \epsilon_3$  的对偶基为

$$f_1(\alpha) = -3a_1 - 5a_2 - 2a_3 \quad (= x_1)$$

$$f_2(\alpha) = 2a_1 + a_2 \quad (= x_2)$$

$$f_3(\alpha) = a_1 + 2a_2 + a_3 \quad (= x_3).$$

## 第9章

### 欧几里得空间

#### 9.1 定义与定理

**定义 9.1** 设  $V$  是实数域  $\mathbf{R}$  上的线性空间, 若  $V$  上定义着正定对称双线性型  $g$ , 即对任  $\alpha, \beta, \alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2 \in V, k \in \mathbf{R}$  有 (记  $g(\alpha, \beta) = \langle \alpha, \beta \rangle$ )

1.  $\langle \alpha, \alpha \rangle > 0, \alpha \neq 0$ ;
2.  $\langle \alpha, \beta \rangle = \langle \beta, \alpha \rangle$ ;
3.  $\langle \alpha_1 + \alpha_2, \beta \rangle = \langle \alpha_1, \beta \rangle + \langle \alpha_2, \beta \rangle$ ;  $\langle k\alpha, \beta \rangle = k\langle \alpha, \beta \rangle$ ;  
 $\langle \alpha, \beta_1 + \beta_2 \rangle = \langle \alpha, \beta_1 \rangle + \langle \alpha, \beta_2 \rangle$ ;  $\langle \alpha, k\beta \rangle = k\langle \alpha, \beta \rangle$ .

$g$  称为内积, 则  $V$  称为 (对于  $g$  的) 欧几里得空间

**定义 9.2** 设  $V$  是欧几里得空间, 则

- (1) 向量  $\alpha \in V$  的长度定义为  $\|\alpha\| = \sqrt{\langle \alpha, \alpha \rangle}$ .
- (2) 非 0 向量  $\alpha, \beta \in V$  的夹角定义为  $\theta = \cos^{-1} \frac{\langle \alpha, \beta \rangle}{\|\alpha\| \|\beta\|}$ .
- (3) 长度为 1 的向量称为单位向量, 向量  $\alpha, \beta$  的距离定义为  $\|\alpha - \beta\|$ .

**引理 9.1** (Cauchy-Schwarz 不等式) 对于任意非 0 向量  $\alpha, \beta \in V$  都有

$$|\langle \alpha, \beta \rangle| \leq \|\alpha\| \|\beta\|.$$

**引理 9.2** (三角形不等式) 对任意  $\alpha, \beta \in V$  均有

$$\|\alpha + \beta\| \leq \|\alpha\| + \|\beta\|.$$

**定义 9.3** 若向量  $\alpha, \beta$  满足  $\langle \alpha, \beta \rangle = 0$ , 则称  $\alpha$  与  $\beta$  正交, 记为  $\alpha \perp \beta$ . 若  $\alpha$  与子空间  $W$  中的向量均正交, 则记为  $\alpha \perp W$ . 若子空间  $W_1$  与  $W_2$  的任二向量均正交, 则称  $W_1$  与  $W_2$  正交, 记为  $W_1 \perp W_2$ .

**引理 9.3** 两两正交的非 0 向量组一定线性无关.

**定义 9.4** 欧几里得空间  $V$  中由两两正交的向量构成的基称为正交基. 若正交基中每个向量长度均为 1, 则称为标准正交基或笛卡尔基.

**定理 9.1** (Gram-Schmidt 正交化) 设  $\alpha_1, \dots, \alpha_n$  是欧几里得空间  $V$  的基, 则存在  $V$  的标准正交基  $\epsilon_1, \dots, \epsilon_n$  使

$$\mathbf{R}\alpha_1 + \dots + \mathbf{R}\alpha_s = \mathbf{R}\epsilon_1 + \dots + \mathbf{R}\epsilon_s \quad (1 \leq s \leq n).$$

**系 1** 设  $\alpha_1, \dots, \alpha_n$  是欧几里得空间  $V$  的基, 则存在标准正交基  $\epsilon_1, \dots, \epsilon_n$  和实的上三角过渡方阵  $T$  使得

$$(\epsilon_1, \dots, \epsilon_n) = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)T$$

而且  $T$  的对角线元素均为正数.

**系 2** 对每个正定实对称方阵  $G$ , 总存在实上三角方阵  $T = (t_{ij}), t_{ii} > 0 (1 \leq i \leq n)$ , 使得

$$T^T G T = I.$$

**系 3** 欧几里得空间中任一两两正交的单位向量组可扩充为一个标准正交基.

**定义 9.5** 若  $n$  阶方阵  $\Omega$  满足  $\Omega^T \Omega = I$ , 则称  $\Omega$  为正交方阵.

**定理 9.2** 设欧几里得空间  $V$  的标准正交基  $\epsilon_1, \dots, \epsilon_n$  经过渡方阵  $Q$  变换为基  $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ , 即

$$(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = (\epsilon_1, \dots, \epsilon_n) Q,$$

则当且仅当  $Q$  为实正交方阵时,  $\alpha_1, \dots, \alpha_n$  为标准正交基.

**系 4** 对任一可逆实方阵  $A$ , 唯一地存在着主对角线元素为正数的上三角形实方阵  $T$ , 使得  $\Omega = AT$  为实正交方阵.

**系 5** 设  $W$  是欧几里得空间  $V$  的任一子空间, 则

$$V = W \oplus W^\perp,$$

其中  $W^\perp$  由所有与  $W$  正交的向量  $\alpha \in V$  组成 ( $W^\perp$  称为  $W$  的正交补).

**定义 9.6** 设  $V_1$  和  $V_2$  是两个欧几里得空间, 内积各为  $g_1$  和  $g_2$ . 若存在双射线性映射

$$\varphi: V_1 \rightarrow V_2$$

使  $g_1(\alpha, \beta) = g_2(\varphi(\alpha), \varphi(\beta))$ , 则称  $\varphi$  是欧几里得空间  $V_1$  与  $V_2$  间的同构映射, 此时称  $V_1$  同构于  $V_2$ .

**定理 9.3** 任一  $n$  维欧几里得空间  $V$  同构于  $\mathbf{R}^{(n)} = E_n$ , 这里列向量空间  $\mathbf{R}^{(n)}$  的内积为

$$\langle x, y \rangle = x^T y = x_1 y_1 + \dots + x_n y_n.$$

(对于  $x = (x_1, \dots, x_n)^T, y = (y_1, \dots, y_n)^T \in \mathbf{R}^{(n)}, E_n$  称为  $n$  维经典欧几里得空间).

**引理 9.4** 实数域  $\mathbf{R}$  上的线性空间  $V$  上的线性变换  $\mathcal{A}$  定有一维或二维不变子空间.

**定理 9.4** 设  $A$  为实方阵, 则存在实正交方阵  $\Omega$  使

$$\Omega^T A \Omega = \begin{bmatrix} A_1 & * & \cdots & \cdots & * \\ & \ddots & & & \vdots \\ & & A_s & \ddots & \vdots \\ & & & \lambda_1 & \ddots & \vdots \\ & & & & \ddots & * \\ & & & & & \lambda_t \end{bmatrix}$$

为准上三角形, 其中  $\lambda_1, \dots, \lambda_t$  为实数,  $A_1, \dots, A_t$  为二阶实方阵且均无实特征根.

**定义 9.7** 若  $n$  阶实方阵  $N$  满足  $NN^T = N^T N$ , 则称  $N$  为规范方阵.

**引理 9.5** 若实规范方阵  $N = \Omega \begin{bmatrix} N_1 & N_3 \\ 0 & N_2 \end{bmatrix} \Omega^T$ , 其中  $\Omega$  为实正交方阵, 则  $N_3 = 0$ .

**定理 9.5**  $N$  为实规范方阵的充分必要条件是存在实正交方阵  $\Omega$  使

$$\Omega^T N \Omega = \begin{bmatrix} A_1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & A_s & & \\ & & & \lambda_1 & \\ & & & & \ddots \\ & & & & & \lambda_s \end{bmatrix},$$

其中  $\lambda_1, \dots, \lambda_s \in \mathbf{R}$ ,  $A_k = \begin{bmatrix} a_k & b_k \\ -b_k & a_k \end{bmatrix}$  的特征值为复数  $a_k \pm ib_k$  ( $k=1, \dots, s$ ).

**系 1** 对每个实正交方阵  $\Omega$ , 存在实正交方阵  $\Omega_1$ , 使得

$$\Omega_1^T \Omega \Omega_1 = \text{diag} \left\{ \begin{bmatrix} \cos \theta_1 & \sin \theta_1 \\ -\sin \theta_1 & \cos \theta_1 \end{bmatrix}, \dots, \begin{bmatrix} \cos \theta_s & \sin \theta_s \\ -\sin \theta_s & \cos \theta_s \end{bmatrix}, \pm 1, \dots, \pm 1 \right\},$$

其中  $0 \leq \theta_i \leq \pi$  为实数 ( $1 \leq i \leq s$ ).

**系 2 (对称方阵的谱定理)** 对每个实对称方阵  $S$ , 存在实正交方阵  $\Omega$  使

$$\Omega^T S \Omega = \text{diag} \{ \lambda_1, \dots, \lambda_n \},$$

其中  $\lambda_1, \dots, \lambda_n$  为实数, 都是  $S$  的特征根.

**系 3** 对每个交错(斜对称)实方阵  $K$ , 存在实正交方阵  $\Omega$  使

$$\Omega^T K \Omega = \text{diag} \left\{ \begin{bmatrix} 0 & b_1 \\ -b_1 & 0 \end{bmatrix}, \dots, \begin{bmatrix} 0 & b_s \\ -b_s & 0 \end{bmatrix}, 0, \dots, 0 \right\}, \quad (b_k \in \mathbf{R}, k=1, \dots, s).$$

**系 4** 两个  $n$  阶实规范方阵实正交相似的充分必要条件为其  $n$  个(复)特征根均相同.

**定义 9.8** 设  $\mathcal{A}$  为欧几里得空间  $V$  的线性变换,  $A$  为  $\mathcal{A}$  在一标准正交基下的方阵表示, 若  $A$  为规范(正交、对称、交错或反对称)方阵, 则相应地称  $\mathcal{A}$  为规范(正交、对称、交错或反对称)变换. 对称变换也称为自伴随变换.

**引理 9.5'** 欧几里得空间  $V$  的规范变换  $\mathcal{N}$  的不变子空间  $W$  的正交补  $W^\perp$  也为不变子空间.

**定理 9.5'** 设  $\mathcal{N}$  为欧几里得空间  $V$  的规范变换, 则存在  $V$  的标准正交基  $e_1, \dots, e_n$  使得

$$\begin{cases} \mathcal{N}e_k = a_k e_k - b_k e_{k+1} \\ \mathcal{N}e_{k+1} = b_k e_k + a_k e_{k+1} \end{cases} \quad (k=1, 3, 5, \dots, 2s-1)$$

而  $e_{2s+1}, \dots, e_n$  为  $\mathcal{N}$  的特征向量, 从而  $V$  分解为相互正交的二维和一维不变子空间的直和:

$$V = (\mathbf{R}e_1 + \mathbf{R}e_2) \oplus \dots \oplus (\mathbf{R}e_{2s-1} + \mathbf{R}e_{2s}) \oplus \mathbf{R}e_{2s+1} \oplus \dots \oplus \mathbf{R}e_n.$$

**系 1'** 设  $\Omega_1$  为欧几里得空间  $V$  的正交变换, 则存在  $V$  的标准正交基  $e_1, \dots, e_n$  使得

$$\begin{cases} \Omega_1 e_k = (\cos \theta_k) e_k - (\sin \theta_k) e_{k+1}, \\ \Omega_1 e_{k+1} = (\sin \theta_k) e_k + (\cos \theta_k) e_{k+1}, \end{cases} \quad (k=1, 3, 5, \dots, 2s-1),$$

而  $\Omega_1 e_k = \pm e_k$  ( $k=2s+1, \dots, n$ ), 也就是说,  $V$  分解为相互正交的二维和一维不变子空间

$W_j$  的直和, 而  $\Omega_1$  在  $W_j = \mathbf{R}e_{2j-1} + \mathbf{R}e_{2j}$  上限制为旋转变换 ( $j=1, \dots, s$ ), 在  $W_j = \mathbf{R}e_{j+s}$  上限制为反射或恒等变换 ( $j=s+1, \dots, n-s$ ).

**系 2'** 设  $\mathcal{S}$  为欧几里得空间  $V$  的对称变换, 则存在由  $\mathcal{S}$  的特征向量组成的  $V$  的标准正交基.

**系 3'** 设  $\mathcal{K}$  为欧几里得空间  $V$  的交错变换, 则存在  $V$  的标准正交基  $e_1, \dots, e_n$  使得

$$\begin{cases} \mathcal{K}e_k = -b_k e_{k+1} \\ \mathcal{K}e_{k+1} = b_k e_k \quad (k=1, 3, \dots, 2s-1), \\ \mathcal{K}e_k = 0 \quad (k=2s+1, \dots, n). \end{cases}$$

**定理 9.6** 设  $\mathcal{A}$  为欧几里得空间  $V$  的线性变换, 则以下命题等价:

- (1)  $\mathcal{A}$  为正交变换 (即  $\mathcal{A}$  在标准正交基下方阵为正交方阵).
- (2)  $\mathcal{A}$  保持内积不变, 即对任意  $\alpha, \beta \in V$  有

$$\langle \mathcal{A}\alpha, \mathcal{A}\beta \rangle = \langle \alpha, \beta \rangle$$

特别知道  $\mathcal{A}$  保持向量的长度和夹角不变, 即  $\|\mathcal{A}\alpha\| = \|\alpha\|$ , 且  $\mathcal{A}\alpha$  与  $\mathcal{A}\beta$  夹角等于  $\alpha$  与  $\beta$  夹角.

(3)  $\mathcal{A}$  为有限次旋转和反射变换的复合 (积). ( $\mathcal{R}$  为旋转变换是指存在  $V$  的标准正交基  $e_1, \dots, e_n$  使  $\mathcal{R}$  在其不变子空间  $\mathbf{R}e_1 + \mathbf{R}e_2$  上限制为旋转, 而  $\mathcal{R}e_k = e_k$  ( $k=3, \dots, n$ ).  $\mathcal{R}$  为反射变换是指存在  $V$  的标准正交基  $e_1, \dots, e_n$  使  $\mathcal{R}e_1 = -e_1, \mathcal{R}e_k = e_k$  ( $k=2, \dots, n$ )).

**引理 9.6** 设  $\mathcal{A}$  与  $\mathcal{A}^*$  为欧几里得空间  $V$  的两个线性变换, 则以下命题等价:

- (1) 在  $V$  的一标准正交基下, 若  $\mathcal{A}$  的方阵为  $A$ , 则  $\mathcal{A}^*$  的方阵为  $A^T$ ;
- (2) 对任意  $\alpha, \beta \in V$ , 有

$$\langle \mathcal{A}^* \alpha, \beta \rangle = \langle \alpha, \mathcal{A}\beta \rangle,$$

其中  $g(\alpha, \beta) = \langle \alpha, \beta \rangle$  为  $V$  的内积.  $\mathcal{A}^*$  称为  $\mathcal{A}$  的伴随变换.

**系** 规范、正交、对称、交错变换  $\mathcal{N}, \Omega, \mathcal{S}, \mathcal{K}$  分别是满足下列关系的变换:

$$\mathcal{N}\mathcal{N}^* = \mathcal{N}^*\mathcal{N}, \quad \Omega\Omega^* = I, \quad \mathcal{S}^* = \mathcal{S}, \quad \mathcal{K}^* = -\mathcal{K}.$$

**定理 9.7** 设  $S$  为  $n$  阶实对称方阵, 则下列命题等价:

- (1)  $S > 0$  (即  $S$  正定);
- (2)  $S$  的特征根  $\lambda_i > 0$  ( $i=1, \dots, n$ );
- (3)  $S = S_1^2$ , 其中  $S_1$  为正定实对称方阵;
- (4)  $S$  实正交相合于  $\text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ ,  $\lambda_i > 0$  ( $1 \leq i \leq n$ );
- (5)  $S = P^T P$ , 其中  $P$  为可逆实方阵 (即  $S$  相合于  $I$ );
- (6)  $S$  的主子式皆正数;
- (7)  $S$  的顺序主子式皆正数;
- (8)  $S$  的同阶主子式之和皆正数.

**定理 9.8** 设  $S$  为  $n$  阶实对称方阵, 则下列命题等价:

- (1)  $S \geq 0$  (即  $S$  半正定);
- (2)  $S$  的特征根  $\lambda_i \geq 0$  ( $i=1, \dots, n$ );
- (3)  $S = S_1^2$ , 其中  $S_1$  为半正定实对称方阵;
- (4)  $S$  实正交相合于  $\text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_r, 0, \dots, 0)$ ,  $\lambda_i > 0$  ( $1 \leq i \leq r$ );

- (5)  $S=Q^TQ$ ,  $Q$  为实方阵;  
 (6)  $S$  的主子式皆正数或 0;  
 (7)  $S$  的同阶主子式之和都为正数或 0.

**定理 9.9** 设  $S$  为半正定实对称方阵, 则有惟一的半正定实对称方阵  $S_1$  使  $S=S_1^2$ , 且与  $S$  可交换的方阵与  $S_1$  也可交换.

**定理 9.10** (正交相抵标准形) 对任一  $m \times n$  实矩阵  $A$ , 存在实正交方阵  $P$  和  $Q$  使

$$A = P \begin{bmatrix} \sqrt{\lambda_1} & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & \sqrt{\lambda_r} & & \\ & & & 0 & \\ & & & & \ddots \\ & & & & & 0 \end{bmatrix} Q.$$

其中  $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_r > 0$  是  $A^T A$  的非 0 特征根.

**定理 9.11** (极分解 polar factorization) 任一实方阵  $A$  可表为

$$A = S\Omega = \Omega_1 S_1,$$

其中  $S$  和  $S_1$  为半正定实对称方阵,  $\Omega$  与  $\Omega_1$  为实正交方阵, 而且  $S$  和  $S_1$  均是唯一的.

**定义 9.9** 设  $V$  为  $n$  维欧几里得空间, 二次方程

$$f(x) = x^T S x + 2\alpha^T x + a = 0$$

的解  $x \in V$  的集合称为  $V$  中二次超曲面. 其中  $S$  为实对称方阵,  $\alpha$  和  $x$  为列向量,  $a \in \mathbf{R}$ .

**定理 9.12** 设欧几里得空间  $V$  中二次超曲面在一标准正交基下的方程为

$$x^T S x + 2\alpha^T x + a = 0,$$

实对称方阵  $S$  的非 0 特征根为  $\lambda_1 \geq \dots \geq \lambda_r$ , 则可经正交变换化此曲面为下列情形之一:

- (1)  $\lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \dots + \lambda_r y_r^2 = 0$  [当  $r = \tilde{r}$ ,  $\tilde{r}$  为  $\tilde{S} = \begin{bmatrix} S & \alpha^T \\ \alpha & a \end{bmatrix}$  的秩];  
 (2)  $\lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \dots + \lambda_r y_r^2 - c = 0$  (当  $r = \tilde{r} - 1$ ) ( $c \in \mathbf{R}$ )  
 (3)  $\lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \dots + \lambda_r y_r^2 + 2by_n = 0$  (当  $r = \tilde{r} - 2$ ).

(在情形(1)总有  $\det \tilde{S} = 0$ , 在情形(3)总有  $\det S = 0$ )

**定理 9.13** 设  $A$  与  $B$  为  $n$  阶实对称方阵且  $A$  正定, 则存在可逆方阵  $P$  使得  $P^T A P = I_n$ ,  $P^T B P$  为对角阵.

**定理 9.14** 欧几里得空间  $V$  中保持向量内积不变的变换  $\sigma$  一定是线性变换, 从而是正交变换. 这里  $\sigma$  保持内积不变的意义为对任意  $\alpha, \beta \in V$  均有

$$\langle \sigma(\alpha), \sigma(\beta) \rangle = \langle \alpha, \beta \rangle.$$

**定理 9.15** (Schur 定理) 设实方阵  $A$  的复特征根为  $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ , 则

$$\text{tr}(AA^T) \geq |\lambda_1|^2 + \dots + |\lambda_n|^2.$$

并且当且仅当  $A$  为规范方阵时等号成立.

**定理 9.16** (Rayleigh 定理) 设  $S$  为实对称  $n$  阶方阵, 则

$$\frac{x^T S x}{x^T x} \quad (x \in \mathbf{R}^{(n)})$$

的最小值和最大值分别为  $S$  的最小特征根  $\lambda_1$  和最大特征根  $\lambda_n$ , 且分别当  $x$  为  $\lambda_1$  和  $\lambda_n$  的特征向量时取得.

## 9.2 解题方法介绍

### 9.2.1 Gram-Schmidt 正交化程序

设  $\alpha_1, \dots, \alpha_n$  为欧几里得空间  $V$  的基, 则令

$$\beta_1 = \alpha_1, \quad e_1 = \frac{\beta_1}{|\beta_1|};$$

$$\beta_2 = \alpha_2 - (\alpha_2, e_1)e_1, \quad e_2 = \frac{\beta_2}{|\beta_2|};$$

$$\beta_k = \alpha_k - (\alpha_k, e_1)e_1 - (\alpha_k, e_2)e_2 - \dots - (\alpha_k, e_{k-1})e_{k-1}, \quad e_k = \frac{\beta_k}{|\beta_k|};$$

其中  $k=3, \dots, n$ , 则  $e_1, \dots, e_n$  为  $V$  的标准正交基.

### 9.2.2 实二次型在可逆线性代换下化为平方和(标准形)的方法

此问题也等价于实对称方阵相合对角化, 即存在可逆阵  $P$ , 使  $P^T A P = D$ , 这里  $A$  为实对称阵,  $D$  为对角阵. 在此总结的三个方法中, 有的用矩阵的运算给出, 有的用二次型的语言给出.

方法 1 由定理 9.5 的系 2, 对每个  $n$  阶实对称阵  $A$ , 总存在实正交方阵  $\Omega$ , 使  $\Omega^T A \Omega$  为对角阵. 记  $\Omega = (\tau_1, \dots, \tau_n)$ , 由

$$\Omega^{-1} A \Omega = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{bmatrix},$$

知  $\tau_i$  满足  $A\tau_i = \lambda_i \tau_i, i=1, \dots, n$ , 故  $\lambda_1, \dots, \lambda_n$  为特征值,  $\tau_i$  为相应的特征向量. 于是用此方法的步骤是: (1) 求  $A$  的特征值, (2) 求特征向量(解方程组  $(\lambda_i I - A)x = 0$ ), (3) 属于同一特征值的特征向量要 Schmidt 正交化(而属于不同特征值的特征向量原本正交). 这里  $\Omega^{-1} = \Omega^T$ , 故是正交相合对角阵. 如已知给的是二次型形式, 写成  $Q(x) = x^T A x$  后, 以上步骤对  $A$  进行, 得到对角阵  $D$  后, 就可以写出二次型的标准形.

方法 2 大块配方法, 见定理 8.1. 证明(步骤)可用方阵运算, 也可用二次型写出, 我们这里用后者, 即关键要会两种情况:

(1) 若  $a_{11} \neq 0$ , 则

$$\begin{aligned} Q(x) &= a_{11} \left[ x_1^2 + \frac{2}{a_{11}} (a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n)x_1 \right] + \sum_{i,j=2}^n a_{ij}x_i x_j \\ &= a_{11} \left[ x_1 + \frac{1}{a_{11}} (a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n) \right]^2 - \frac{1}{a_{11}} \left[ \sum_{j=2}^n a_{1j}x_j \right]^2 + \sum_{i,j=2}^n a_{ij}x_i x_j, \end{aligned}$$

令

$$\begin{cases} y_1 = x_1 + \frac{a_{12}}{a_{11}}x_2 + \dots + \frac{a_{1n}}{a_{11}}x_n \\ y_i = x_i, & i=2, \dots, n. \end{cases}$$

即 
$$\begin{cases} x_1 = y_1 - \frac{a_{12}}{a_{11}}y_2 - \cdots - \frac{a_{1n}}{a_{11}}y_n \\ x_i = y_i, & i=2, \cdots, n. \end{cases}$$

则  $Q(\alpha) = a_{11}y_1^2 + Q_1(y_2, \cdots, y_n)$ .

(2) 若  $a_{11} = 0$ , 而  $a_{1j} \neq 0$ , 不妨设  $a_{12} \neq 0$ , 则

令 
$$\begin{cases} x_1 = y_1 + y_2, \\ x_2 = y_1 - y_2, \\ x_i = y_i, & i=3, \cdots, n \end{cases}$$

则 
$$\begin{aligned} Q(\alpha) &= 2a_{12}y_1^2 - 2a_{12}y_2^2 + a_{22}(y_1 - y_2)^2 + \cdots \\ &= (2a_{12} + a_{22})y_1^2 + (a_{22} - 2a_{12})y_2^2 - 2a_{22}y_1y_2 + \cdots \end{aligned}$$

一般来说, 做如上的变换可把(2)化为情况(1), 可当  $a_{22} \neq 0$  时, 若  $2a_{12} + a_{22} = 0$ , 则此步骤无用. 这就是教材上证明中多讨论的一种情况: 若  $a_{11} = 0$ , 而  $a_{ii} \neq 0$  时, 对换  $1, i$ , 使  $a_{11} \neq 0$  的原因. 另外在具体配方时一定要“大块配”, 即当  $a_{11} \neq 0$  时, 一次把含  $x_1$  的项全部配完 (这是与中学的配方法不同的), 或按(2)的程序进行, 这里有一个反例, 没按程序做导致错误的结论.

$$\begin{aligned} Q(x_1, x_2, x_3, x_4) &= x_1x_2 + x_2x_3 + x_3x_4 + x_4x_1 \\ &= \frac{1}{2}[2x_1x_2 + 2x_2x_3 + 2x_3x_4 + 2x_4x_1 + x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \\ &\quad + x_4^2 - x_1^2 - x_2^2 - x_3^2 - x_4^2] \\ &= \frac{1}{2}[(x_1 + x_2)^2 + (x_3 + x_4)^2 - (x_2 - x_3)^2 - (x_1 - x_4)^2] \end{aligned}$$

令 
$$\begin{cases} y_1 = x_1 + x_2 \\ y_2 = x_3 + x_4 \\ y_3 = x_2 - x_3 \\ y_4 = x_1 - x_4 \end{cases}, y = P^{-1}x, P^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

但我们很容易看出  $P^{-1}$  不是可逆阵. 事实上我们把原题的方阵写出即是

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \text{rank} A = 2.$$

$A$  相合于  $\text{diag}\{1, -1, 0, 0\}$ , 而上面的对角阵是秩为 4. 错误根源在  $P$  不可逆 (没按(1), (2)要求做), 改变二次型的属性了.

方法 3 初等变换法. 即对

$$(A, I)$$

同时做初等行变换, 且在做每个行变换时, 对列做相应的变换, 则当  $A$  处得对角阵  $D$  时,  $I$  处得的是  $P^T$ . 理论依据

$$P^T(A, I) = (P^T A, P^T I) \xrightarrow{\text{①}} (P^T A P, P^T) = (D, P^T)$$

①是在做每个行变换后, 接着做一个相应的列变换. (即若  $1, i$  行对换, 则做一个  $1, i$  列对



换; $i$ 行乘 $k$ 倍,则 $i$ 列乘 $k$ 倍; $i$ 行的 $\lambda$ 倍加到 $j$ 行上去,则 $i$ 列的 $\lambda$ 倍加到 $j$ 列上去).这里行、列变换是一对一的,千万不能漏一个列变换.有时为了计算方便起见可以连做几个行变换,再连做几个列变换,由于矩阵乘法有结合律,故是容许的,由存在初等方阵 $P_1, \dots, P_r$ 使

$$P_r^T \cdots P_1^T A P_1 \cdots P_r = \begin{bmatrix} d_1 & & \\ & \ddots & \\ & & d_n \end{bmatrix} = D.$$

它的原理是左乘一个,右乘一个,当然可以左边先连乘几个,再右边连乘几个了.但千万注意不能忘了右边的乘积,即不能漏掉列变换.

注 若要求找正交方阵 $\Omega$ ,使 $\Omega^T A \Omega = D$ ,只能用方法1,而不能用方法3,也就是说,即使用方法3得到的 $D$ 的对角线都是 $A$ 的特征值,也不能保证 $P$ 为正交方阵.

### 9.3 习题与解答

1. 证明 $n$ 维欧几里得空间中的勾股定理: 向量 $\alpha$ 与 $\beta$ 正交的充分必要条件为:

$$\|\alpha\|^2 + \|\beta\|^2 = \|\alpha - \beta\|^2.$$

证 因为 $\|\alpha - \beta\|^2 = \langle \alpha - \beta, \alpha - \beta \rangle = \langle \alpha, \alpha \rangle - \langle \beta, \alpha \rangle - \langle \alpha, \beta \rangle + \langle \beta, \beta \rangle = \|\alpha\|^2 - 2\langle \alpha, \beta \rangle + \|\beta\|^2$

所以 $\alpha, \beta$ 正交 $\Leftrightarrow \langle \alpha, \beta \rangle = 0 \Leftrightarrow \|\alpha - \beta\|^2 = \|\alpha\|^2 + \|\beta\|^2$ .

2. (1) 应用 Gram-Schmidt 正交化程序把 $E_4$ 中下列基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 化为标准正交基 $\epsilon_1, \dots, \epsilon_4$ :

$$\textcircled{1} (1, 3, 2, 3)^T, (2, 8, 2, 8)^T, (-1, 0, -4, -1)^T, (-2, -4, -3, -6)^T;$$

$$\textcircled{2} (0, 0, 2, 1)^T, (0, 3, 7, 2)^T, (1, 1, 6, 2)^T, (-1, 4, -1, -1)^T;$$

$$\textcircled{3} (1, 1, 1, 1)^T, (1, 0, 1, 1)^T, (1, 1, 0, 1)^T, (1, 1, 1, 0)^T.$$

(2) 求上三角方阵 $T = (t_{ij})$ 使 $t_{ii} > 0$ 对(1)中的 $\alpha_i$ 和 $\epsilon_i$ 有:

$$(\epsilon_1, \epsilon_2, \epsilon_3, \epsilon_4) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)T;$$

(3) 设方阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$ ,  $\alpha_i$ 如(1). 求上三角方阵 $T = (t_{ij})$  ( $t_{ii} > 0$ )使 $AT$ 为正交方阵.

解 (1) ① 记 $\beta_1 = \alpha_1$ , 则 $\epsilon_1 = \frac{\beta_1}{\|\beta_1\|} = \frac{1}{\sqrt{23}}(1, 3, 2, 3)^T$ ;

$$\beta_2 = \alpha_2 - \langle \alpha_2, \epsilon_1 \rangle \epsilon_1 = \alpha_2 - \frac{54}{23}(1, 3, 2, 3)^T = \frac{2}{23}(-4, 11, -31, 11)^T,$$

故

$$\epsilon_2 = \frac{1}{\sqrt{1219}}(-4, 11, -31, 11)^T;$$

$$\begin{aligned} \beta_3 &= \alpha_3 - \langle \alpha_3, \epsilon_1 \rangle \epsilon_1 - \langle \alpha_3, \epsilon_2 \rangle \epsilon_2 \\ &= \alpha_3 + \frac{12}{23}(1, 3, 2, 3)^T - \frac{117}{1219}(-4, 11, -31, 11)^T \\ &= \frac{1}{53}(-5, 27, 1, -26)^T, \end{aligned}$$

所以

$$\epsilon_3 = \frac{1}{\sqrt{1431}}(-5, 27, 1, -26)^T;$$

$$\begin{aligned}\beta_4 &= \alpha_4 + \frac{38}{23}(1, 3, 2, 3)^T + \frac{9}{1219}(-4, 11, -31, 11)^T - \frac{55}{1431}(-5, 27, 1, -26)^T \\ &= \frac{1}{27}(-5, 0, 1, 1)^T,\end{aligned}$$

故

$$\epsilon_4 = \frac{1}{3\sqrt{3}}(-5, 0, 1, 1)^T.$$

$$\textcircled{2} \quad \epsilon_1 = \frac{1}{\sqrt{5}}(0, 0, 2, 1)^T;$$

$$\beta_2 = \frac{3}{5}(0, 5, 1, -2)^T, \quad \text{所以 } \epsilon_2 = \frac{1}{\sqrt{30}}(0, 5, 1, -2)^T;$$

$$\beta_3 = \frac{1}{6}(6, -1, 1, -2)^T, \quad \text{所以 } \epsilon_3 = \frac{1}{\sqrt{42}}(6, -1, 1, -2)^T;$$

$$\beta_4 = \frac{2}{7}(1, 1, -1, 2)^T; \quad \text{所以 } \epsilon_4 = \frac{1}{\sqrt{7}}(1, 1, -1, 2)^T.$$

$$\textcircled{3} \quad \epsilon_1 = \frac{1}{2}(1, 1, 1, 1)^T;$$

$$\beta_2 = \frac{1}{4}(1, -3, 1, 1)^T, \quad \epsilon_2 = \frac{1}{2\sqrt{3}}(1, -3, 1, 1)^T;$$

$$\beta_3 = \frac{1}{3}(1, 0, -2, 1)^T, \quad \epsilon_3 = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, 0, -2, 1)^T;$$

$$\beta_4 = \frac{1}{2}(1, 0, 0, -1)^T, \quad \epsilon_4 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 0, 0, -1)^T.$$

$$(2) \textcircled{1} \quad \epsilon_1 = \frac{1}{\sqrt{23}}(1, 3, 2, 3)^T = \frac{1}{\sqrt{23}}\alpha_1;$$

$$\epsilon_2 = \frac{23}{2\sqrt{1219}}\alpha_2 - \frac{27}{\sqrt{1219}}\alpha_1;$$

$$\epsilon_3 = \frac{1}{\sqrt{1431}}\left[53\alpha_3 - \frac{117}{2}\alpha_2 + 165\alpha_1\right];$$

$$\epsilon_4 = 3\sqrt{3}\alpha_4 - \frac{55}{3\sqrt{3}}\alpha_3 + 7\sqrt{3}\alpha_2 - \frac{44}{\sqrt{3}}\alpha_1.$$

令  $\sqrt{1219}=a$ ,  $\sqrt{1431}=b$ , 则有

$$T = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{23}} & -\frac{27}{a} & \frac{165}{b} & -\frac{44}{\sqrt{3}} \\ & \frac{23}{2a} & -\frac{117}{2b} & 7\sqrt{3} \\ & & \frac{53}{b} & -\frac{55}{3\sqrt{3}} \\ & & & 3\sqrt{3} \end{bmatrix}.$$

$$\textcircled{2} \quad \epsilon_1 = \frac{1}{\sqrt{5}}(0, 0, 2, 1)^T = \frac{1}{\sqrt{5}}\alpha_1; \quad \epsilon_2 = \frac{1}{3\sqrt{30}}(5\alpha_2 - 16\alpha_1);$$

$$\epsilon_3 = \frac{1}{\sqrt{42}}\left[6\alpha_3 - \frac{7}{3}\alpha_2 - \frac{28}{3}\alpha_1\right]; \quad \epsilon_4 = \frac{\sqrt{7}}{2}\left[\alpha_4 + \frac{9}{7}\alpha_3 - \frac{5}{3}\alpha_2 + \frac{7}{3}\alpha_1\right].$$

所以

$$T = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} & -\frac{16}{3\sqrt{30}} & -\frac{28}{3\sqrt{42}} & \frac{7\sqrt{7}}{6} \\ & \frac{5}{3\sqrt{30}} & -\frac{7}{3\sqrt{42}} & -\frac{5\sqrt{7}}{6} \\ & & \frac{6}{\sqrt{42}} & \frac{9}{2\sqrt{7}} \\ & & & \frac{\sqrt{7}}{2} \end{bmatrix}.$$

$$\textcircled{3} \quad \epsilon_1 = \frac{1}{2}\alpha_1; \quad \epsilon_2 = \frac{1}{\sqrt{12}}(4\alpha_2 - 3\alpha_1);$$

$$\epsilon_3 = \frac{\sqrt{6}}{2}\alpha_3 + \frac{\sqrt{6}}{6}\alpha_2 - \frac{\sqrt{6}}{2}\alpha_1;$$

$$\epsilon_4 = \sqrt{2}\alpha_4 + \frac{\sqrt{2}}{2}\alpha_3 + \frac{1}{\sqrt{2}}\alpha_2 - \frac{3}{\sqrt{2}}\alpha_1.$$

所以

$$T = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{6}}{2} & -\frac{3}{\sqrt{2}} \\ & \frac{2}{\sqrt{3}} & \frac{\sqrt{6}}{6} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ & & \frac{\sqrt{6}}{2} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ & & & \sqrt{2} \end{bmatrix}.$$

(3)  $T$  如(2)中各式, 为了区别起见分别记为  $A_i, T_i \quad i=1, 2, 3$ .

①

$$A_1 = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4), \quad T_1 = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{23}} & -\frac{27}{a} & \frac{165}{b} & -\frac{44}{\sqrt{3}} \\ & \frac{23}{2a} & -\frac{117}{2b} & 7\sqrt{3} \\ & & \frac{53}{b} & -\frac{55}{3\sqrt{3}} \\ & & & 3\sqrt{3} \end{bmatrix},$$

$$Q_1 = A_1 T_1 = (\epsilon_1, \epsilon_2, \epsilon_3, \epsilon_4);$$

②

$$A_2 = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4), \quad T_2 = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} & -\frac{16}{3\sqrt{30}} & -\frac{28}{3\sqrt{42}} & \frac{7\sqrt{7}}{6} \\ & \frac{5}{3\sqrt{30}} & -\frac{7}{3\sqrt{42}} & -\frac{5\sqrt{7}}{6} \\ & & \frac{6}{\sqrt{42}} & \frac{9}{2\sqrt{7}} \\ & & & \frac{\sqrt{7}}{2} \end{bmatrix},$$

$$Q_2 = A_2 T_2 = (\epsilon_1, \epsilon_2, \epsilon_3, \epsilon_4);$$

③

$$A_3 = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4), \quad T_3 = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{6}}{2} & -\frac{3}{\sqrt{2}} \\ & \frac{2}{\sqrt{3}} & \frac{\sqrt{6}}{6} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ & & \frac{\sqrt{6}}{2} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ & & & \sqrt{2} \end{bmatrix},$$

$$Q_3 = A_3 T_3 = (\epsilon_1, \epsilon_2, \epsilon_3, \epsilon_4).$$

3. (1) 应用 Gram-Schmidt 正交化程序, 在  $E_4$  中构造出用下列向量组张成的子空间  $W$  的标准正交基  $\epsilon_1, \dots, \epsilon_n$ .

$$\textcircled{1} (1, 2, 2, -1)^T, (1, 1, -5, 3)^T, (3, 2, 8, -7)^T;$$

$$\textcircled{2} (1, 1, -1, -2)^T, (5, 8, -2, -3)^T, (3, 9, 3, 8)^T;$$

$$\textcircled{3} (2, 1, 3, -1)^T, (7, 4, 3, -3)^T, (1, 1, -6, 0)^T, (5, 7, 7, 8)^T;$$

$$\textcircled{4} (1, 0, 0, 0)^T, (1, 1, 0, 0)^T, (0, 1, 1, 0)^T, (0, 0, 1, 1)^T.$$

(2) 在(1)的每组向量中选出  $W$  的基  $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ . 求上三角方阵  $T = (t_{ij}) (t_{ii} > 0)$  使

$$(\epsilon_1, \dots, \epsilon_m) = (\alpha_1, \dots, \alpha_m) T.$$

解 (1) 用  $\{\alpha_i\}$  记已知各向量组.

$$\textcircled{1} (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & -5 & 8 \\ -1 & 3 & -7 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{初等行变换}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & -4 \\ 0 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

所以  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性无关, 即  $W = \langle \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \rangle$ ,

$$\epsilon_1 = \frac{1}{\sqrt{10}}(1, 2, 2, -1)^T;$$

$$\beta_2 = \alpha_2 - \langle \alpha_2, \epsilon_1 \rangle \epsilon_1 = (2, 3, -3, 2)^T, \text{ 所以 } \epsilon_2 = \frac{1}{\sqrt{26}}(2, 3, -3, 2)^T;$$

$$\beta_3 = \alpha_3 - \langle \alpha_3, \epsilon_1 \rangle \epsilon_1 - \langle \alpha_3, \epsilon_2 \rangle \epsilon_2 = (2, -1, -1, -2)^T,$$

所以  $\epsilon_3 = \frac{1}{\sqrt{10}}(2, -1, -1, -2)^T$ .

故  $W$  的标准正交基为  $\epsilon_1, \epsilon_2, \epsilon_3$ .

$$\textcircled{2} (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = \begin{bmatrix} 1 & 5 & 3 \\ 1 & 8 & 9 \\ -1 & -2 & 3 \\ -2 & -3 & 8 \end{bmatrix} \xrightarrow[\text{行变换}]{\text{经初等}} \begin{bmatrix} 1 & 5 & 3 \\ 0 & 3 & 6 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

所以  $W = \langle \alpha_1, \alpha_2 \rangle$ , (或  $\langle \alpha_1, \alpha_3 \rangle$ , 或  $\langle \alpha_2, \alpha_3 \rangle$ )

$$\epsilon_1 = \frac{1}{\sqrt{7}}(1, 1, -1, -2)^T;$$

$$\beta_2 = \alpha_2 - \langle \alpha_2, \epsilon_1 \rangle \epsilon_1 = (2, 5, 1, 3)^T,$$

故  $\epsilon_2 = \frac{1}{\sqrt{39}}(2, 5, 1, 3)^T$ ;

$\epsilon_1, \epsilon_2$  是  $W$  的标准正交基.

$$\textcircled{3} (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = \begin{bmatrix} 2 & 7 & 1 & 5 \\ 1 & 4 & 1 & 7 \\ 3 & 3 & -6 & 7 \\ -1 & -3 & 0 & 8 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 4 & 1 & 7 \\ 0 & 1 & 1 & 9 \\ 0 & 0 & 0 & 67 \\ 0 & 0 & 0 & 6 \end{bmatrix}$$

因为右边方阵的第 1, 2, 4 列线性无关, 故

$$W = \langle \alpha_1, \alpha_2, \alpha_4 \rangle.$$

从  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$  出发用 Schmidt 正交化程序构造标准正交向量组得

$$\epsilon_1 = \frac{1}{\sqrt{15}}(2, 1, 3, -1)^T;$$

$$\beta_2 = (3, 2, -3, -1)^T, \quad \epsilon_2 = \frac{1}{\sqrt{23}}(3, 2, -3, -1)^T;$$

$$\beta_3 = (1, 5, 1, 10)^T, \quad \epsilon_3 = \frac{1}{\sqrt{127}}(1, 5, 1, 10)^T;$$

所以  $W = \langle \epsilon_1, \epsilon_2, \epsilon_3 \rangle$ .

$$\textcircled{4} \text{ 因为 } \det(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = \det \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = 1 \neq 0,$$

所以  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$  是  $W$  的基.

$$\epsilon_1 = \alpha_1; \quad \beta_2 = \alpha_2 - \alpha_1 = (0, 1, 0, 0)^T, \text{ 故 } \epsilon_2 = \beta_2,$$

$$\beta_3 = \alpha_3 - \epsilon_2 = (0, 0, 1, 0)^T, \text{ 故 } \epsilon_3 = \beta_3,$$

$$\beta_4 = \alpha_4 - \epsilon_3 = (0, 0, 0, 1)^T, \text{ 故 } \epsilon_4 = \beta_4,$$

所以  $\epsilon_1, \epsilon_2, \epsilon_3, \epsilon_4$  是  $W$  的标准正交基.

$$(2) \textcircled{1} \epsilon_1 = \frac{1}{\sqrt{10}}\alpha_1; \quad \epsilon_2 = \frac{1}{\sqrt{26}}(\alpha_2 + \alpha_1);$$

$$\epsilon_3 = \frac{1}{\sqrt{10}}(\alpha_3 - 3\alpha_1 + \beta_2) = \frac{1}{\sqrt{10}}(\alpha_3 + \alpha_2 - 2\alpha_1);$$

所以  $(\epsilon_1, \epsilon_2, \epsilon_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)T = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{10}} & \frac{1}{\sqrt{26}} & -\frac{2}{\sqrt{10}} \\ & \frac{1}{\sqrt{26}} & \frac{1}{\sqrt{10}} \\ & & \frac{1}{\sqrt{10}} \end{bmatrix}.$

$$\textcircled{2} \quad \epsilon_1 = \frac{1}{\sqrt{7}}\alpha_1; \quad \epsilon_2 = \frac{1}{\sqrt{39}}(\alpha_2 - 3\alpha_1),$$

所以  $(\epsilon_1, \epsilon_2) = (\alpha_1, \alpha_2)T = (\alpha_1, \alpha_2) \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{7}} & -\frac{3}{\sqrt{39}} \\ & \frac{1}{\sqrt{39}} \end{bmatrix}.$

$$\textcircled{3} \quad \epsilon_1 = \frac{1}{\sqrt{15}}\alpha_1; \quad \epsilon_2 = \frac{1}{\sqrt{23}}(\alpha_2 - 2\alpha_1);$$

$$\epsilon_3 = \frac{1}{\sqrt{127}}(\alpha_4 - 2\alpha_1),$$

所以

$$(\epsilon_1, \epsilon_2, \epsilon_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4) \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{15}} & -\frac{2}{\sqrt{23}} & -\frac{2}{\sqrt{127}} \\ & \frac{1}{\sqrt{23}} & 0 \\ & & \frac{1}{\sqrt{127}} \end{bmatrix}.$$

$$\textcircled{4} \quad \epsilon_1 = \alpha_1; \quad \epsilon_2 = \alpha_2 - \alpha_1;$$

$$\epsilon_3 = \alpha_3 - (\alpha_2 - \alpha_1) = \alpha_3 - \alpha_2 + \alpha_1;$$

$$\epsilon_4 = (\alpha_4 - (\alpha_3 - (\alpha_2 - \alpha_1))) = \alpha_4 - \alpha_3 + \alpha_2 - \alpha_1,$$

所以  $(\epsilon_1, \epsilon_2, \epsilon_3, \epsilon_4) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 \\ & 1 & -1 & 1 \\ & & 1 & -1 \\ & & & 1 \end{bmatrix},$

4. 用向量  $\alpha_1 = (1, 0, 2, 1), \alpha_2 = (2, 1, 2, 3), \alpha_3 = (0, 1, -2, 1)$  张成的子空间为  $W$ , 求  $W$  的正交补  $W^\perp$  的标准正交基.

解 设

$$A = \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \end{bmatrix}$$

则  $W = R(A^T)$  即  $A^T$  的列空间. 故  $W^\perp$  就是齐次线性方程组  $AX = 0$  的解空间 (也就是

$N(A))$ ,

$$A \longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \text{ 所以 } \eta_1 = \begin{bmatrix} -2 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \eta_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix},$$

又因为  $\langle \eta_1, \eta_2 \rangle = 0$ , 所以  $\eta_1, \eta_2$  正交.

$$\text{故 } \epsilon_1 = \frac{1}{3} \eta_1 = \frac{1}{3} (-2, 2, 1, 0)^T, \quad \epsilon_2 = \frac{1}{\sqrt{3}} \eta_2 = \frac{1}{\sqrt{3}} (1, 1, 0, 1)^T,$$

是  $W^\perp$  的标准正交基.

5. 线性子空间  $W$  用下列方程给出

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + 3x_3 - x_4 = 0 \\ 3x_1 + 2x_2 - 2x_4 = 0 \\ 3x_1 + x_2 + 9x_3 - x_4 = 0. \end{cases}$$

求给出正交补  $W^\perp$  的诸方程.

解 用消元法解齐次线性方程组得

$$\eta_1 = \begin{bmatrix} -6 \\ 9 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \eta_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, W = L\langle \eta_1, \eta_2 \rangle,$$

则  $W^\perp$  由方程组

$$\begin{bmatrix} \eta_1^T \\ \eta_2^T \end{bmatrix} X = 0, \text{ 即 } \begin{cases} 6x_1 - 9x_2 - x_3 = 0 \\ x_2 + x_4 = 0 \end{cases}$$

给出.

6. 证明任何二阶正交方阵, 必取下面两种形式之一.

$$\begin{bmatrix} \cos\varphi & \sin\varphi \\ -\sin\varphi & \cos\varphi \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \cos\varphi & \sin\varphi \\ \sin\varphi & -\cos\varphi \end{bmatrix}, (-\pi \leq \varphi < \pi)$$

证 设  $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ , 则由  $A^T A = I$  知有

$$\begin{cases} a^2 + c^2 = b^2 + d^2 = 1, \\ ab + cd = 0, \end{cases} \quad (1)$$

由(1)可得  $|a| < 1$ , 所以  $\exists \varphi$ , 使  $\cos\varphi = a$ ,

代入  $a^2 + c^2 = 1$  中有  $c^2 = 1 - \cos^2\varphi = \sin^2\varphi$ , 所以  $c = \pm \sin\varphi$ . 又由  $\det A = ad - bc = \pm 1$  与(1)联立可得

$$(a \pm d)^2 + (c \mp b)^2 = 0 \rightarrow a = \pm d, \quad b = \mp c.$$

又因  $\varphi$  可正可负, 故必有

$$A_1 = \begin{bmatrix} \cos\varphi & \sin\varphi \\ -\sin\varphi & \cos\varphi \end{bmatrix}, \quad A_2 = \begin{bmatrix} \cos\varphi & \sin\varphi \\ \sin\varphi & -\cos\varphi \end{bmatrix},$$

其中  $\det A_1 = 1, \det A_2 = -1$ . 且  $A_1$  中  $a, d$  同号,  $b, c$  异号;  $A_2$  中  $a, d$  异号,  $b, c$  同号.

7. 设  $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ -2 & 2 & -2 \\ 0 & -2 & 3 \end{bmatrix}$ , 求正交方阵  $T$ , 使  $T^{-1}AT$  是对角阵, 并求  $A^k$  ( $k$  是自然数).

然数).

解  $\det(\lambda I - A) = \lambda^3 - 6\lambda^2 + 3\lambda + 10 = (\lambda + 1)(\lambda - 2)(\lambda - 5)$ , 所以  $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 5$  为  $A$  的特征值.

对  $\lambda = -1$ , 解  $(A + I)x = 0$  得  $x_1 = (2, 2, 1)^T$ ; 对  $\lambda = 2$ , 解  $(A - 2I)x = 0$ , 得  $x_2 = (-2, 1, 2)^T$ ; 对  $\lambda = 5$  解  $(A - 5I)x = 0$ , 得  $x_3 = (1, -2, 2)^T$ . 把  $x_1, x_2, x_3$  单位化 (因为它们已是正交的) 得  $e_1 = \frac{x_1}{|x_1|}, e_2 = \frac{x_2}{|x_2|}, e_3 = \frac{x_3}{|x_3|}$ , 令

$$P = (e_1, e_2, e_3) = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 2 & -2 & 1 \\ 2 & 1 & -2 \\ 1 & 2 & 2 \end{bmatrix},$$

则

$$P^T A P = \begin{bmatrix} -1 & & \\ & 2 & \\ & & 5 \end{bmatrix} \rightarrow A = P \begin{bmatrix} -1 & & \\ & 2 & \\ & & 5 \end{bmatrix} P^T,$$

且  $P$  为正交方阵, 即有  $P^T P = I$ . 于是

$$A^k = P \begin{bmatrix} -1 & & \\ & 2 & \\ & & 5 \end{bmatrix}^k P^T = \frac{1}{9} \begin{bmatrix} 2 & -2 & 1 \\ 2 & 1 & -2 \\ 1 & 2 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} (-1)^k & & \\ & 2^k & \\ & & 5^k \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 2 & 1 \\ -2 & 1 & 2 \\ 1 & -2 & 2 \end{bmatrix}.$$

8. 证明: 下列三个条件中只要有两个成立, 另一个也必成立.

(1)  $A$  是对称的; (2)  $A$  是正交的; (3)  $A^2 = I$ .

证 ① 由 (1), (2) 推出 (3): 因为  $A^T = A, A^T A = I$ , (1) 代入 (2) 中得  $A^2 = I$ .

② 由 (1), (3) 推出 (2):  $A^T = A, A^2 = I \rightarrow A^T A = I$ .

③ 因为  $A^T A = I$ , 两边右乘  $A$  得  $A^T A A = A$ , 又因为  $A^2 = I$ , 所以  $A^T = A$ .

9. 已知  $\mathcal{A}$  是  $n$  维欧几里得空间  $V$  的一个正交变换,  $W$  是  $\mathcal{A}$  的不变子空间, 证明  $W$  的正交补  $W^\perp$  也是  $\mathcal{A}$  的不变子空间.

证 设  $\alpha_1, \dots, \alpha_m$  是  $W$  的标准正交基, 扩充后  $\alpha_1, \dots, \alpha_m, \beta_{m+1}, \dots, \beta_n$  是  $V$  的标准正交基. 因为  $\mathcal{A}$  是正交变换, 所以  $\mathcal{A}\alpha_1, \dots, \mathcal{A}\alpha_m, \mathcal{A}\beta_{m+1}, \dots, \mathcal{A}\beta_n$  亦是  $V$  的标准正交基.

故  $L(\mathcal{A}\alpha_1, \dots, \mathcal{A}\alpha_m) \perp L(\mathcal{A}\beta_{m+1}, \dots, \mathcal{A}\beta_n)$ ,

又因为  $W$  是  $\mathcal{A}$  的不变子空间, 即

$$\mathcal{A}\alpha_i \in W, i = 1, \dots, m, \text{ 所以 } L(\mathcal{A}\alpha_1, \dots, \mathcal{A}\alpha_m) = W,$$

于是

$$L(\mathcal{A}\beta_{m+1}, \dots, \mathcal{A}\beta_n) \perp W, \text{ 所以 } L(\mathcal{A}\beta_{m+1}, \dots, \mathcal{A}\beta_n) \subset W^\perp,$$

任  $\gamma \in W^\perp = \langle \beta_{m+1}, \dots, \beta_n \rangle$ , 设  $\gamma = x_{m+1}\beta_{m+1} + \dots + x_n\beta_n$ , 则

$$\begin{aligned} \mathcal{A}\gamma &= \mathcal{A}(x_{m+1}\beta_{m+1} + x_{m+2}\beta_{m+2} + \dots + x_n\beta_n) \\ &= x_{m+1}\mathcal{A}\beta_{m+1} + x_{m+2}\mathcal{A}\beta_{m+2} + \dots + x_n\mathcal{A}\beta_n \end{aligned}$$



$$\in L(\mathcal{A}\beta_{m+1}, \dots, \mathcal{A}\beta_n) \subset W^\perp,$$

所以  $W^\perp$  也是  $\mathcal{A}$  的不变子空间.

10. 试求可逆线性代换  $x=py$ , 把下列二次型偶, 同时化为平方和.

$$(1) \begin{cases} f = x_1^2 + 4x_1x_2 - 15x_2^2 - 2x_1x_3 + 6x_2x_3, \\ g = x_1^2 + 4x_1x_2 + 17x_2^2 - 2x_1x_3 - 14x_2x_3 + 3x_3^2; \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} f = x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_2^2 + 2x_2x_3 + 2x_3^2, \\ g = x_1^2 + 4x_1x_2 + 2x_1x_3 + 4x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2; \end{cases}$$

$$(3) \begin{cases} f = 2x_4^2 + x_1x_2 + x_1x_3 - 2x_2x_3 + 2x_2x_4, \\ g = \frac{1}{4}x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 2x_4^2 + 2x_2x_4; \end{cases}$$

解 (1)  $f, g$  的方阵分别为:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & -15 & 3 \\ -1 & 3 & 0 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 17 & -7 \\ -1 & -7 & 3 \end{bmatrix},$$

① 对方阵  $A$ , 各阶顺序主子式  $d_1 > 0, d_2 < 0$ , 所以  $A$  不是正定的, 考查  $B$  的顺序主子式,  $d_1 = 1 > 0, d_2 = 13 > 0, d_3 = 1 > 0$ , 所以  $B$  正定.

② 求  $P_1$  使  $P_1^T B P_1 = I$ , 用初等变换法进行:

$$(B, I) = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 17 & -7 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & -7 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow[\substack{-2c_1+c_2 \\ c_1+c_3}]{\substack{-2r_1+r_2 \\ r_1+r_3}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 13 & -5 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & -5 & 2 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow[\substack{2r_3+r_2 \\ 2c_3+c_2}]{\substack{2r_3+r_2 \\ 2c_3+c_2}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & 2 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow[\substack{r_2+r_3 \\ c_2+c_3}]{\substack{r_2+r_3 \\ c_2+c_3}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 3 \end{bmatrix},$$

所以  $P_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \end{bmatrix}$ , 而  $P_1^T A P_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ ,

③ 取

$$P_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \text{且令 } P = P_1 P_2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 2 \end{bmatrix},$$

则

$$P^T A P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{bmatrix}, \quad P^T B P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

即  $f|_{x=Py} = y_1^2 + 2y_2^2 - 3y_3^2, g|_{x=Py} = y_1^2 + y_2^2 + y_3^2.$

(2)  $f, g$  的方阵分别为:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix},$$

① 通过计算各阶顺序主子式,可知  $A$  正定(因  $d_1=d_2=d_3=1>0$ )

② 求  $P_1$ ,使  $P_1^T A P_1 = I$ ,对  $(A, I)$  做初等变换得

$$(A, I) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \end{bmatrix},$$

所以  $P_1 = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ , 而  $B_1 = P_1^T B P_1 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ ,

③ 对二阶方阵  $B_{11} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ , 求正交方阵  $Q$ , 使  $Q^T B_{11} Q$  为对角阵. 为此, 求  $B_{11}$  的特征值和特征向量. 有  $\det(\lambda I - B_{11}) = \lambda(\lambda - 2)$ , 所以  $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = 0$  为特征根.

对  $\lambda_1 = 2$ , 解  $(\lambda I - B_{11})x = 0 \rightarrow x = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ ,  $\rightarrow e_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ ,

对  $\lambda_2 = 0$ , 解  $B_{11}x = 0 \rightarrow x = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$ , 故  $e_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$ ,

取  $Q = (e_1, e_2)$ , 则  $Q^T B_{11} Q = \text{diag}\{2, 0\}$ , 故取

$$P_2 = \begin{bmatrix} Q & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

则

$$P_2^T B_1 P_2 = \begin{bmatrix} 2 & & \\ & 0 & \\ & & 0 \end{bmatrix},$$

故

$$P = P_1 P_2 = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \sqrt{2} & 1 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

使

$$f|_{x=P_y} = y_1^2 + y_2^2 + y_3^2, \quad g|_{x=P_y} = 2y_1^2.$$

(3) 设  $f, g$  的方阵分别为  $A, B$ , 则

$$A = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & -1 & 1 \\ \frac{1}{2} & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} \frac{1}{4} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \end{bmatrix},$$

① 因为  $d_1=d_2=d_3=d_4=\frac{1}{4}>0$ , 所以  $B$  正定.

② 求  $P_1$ , 使  $P_1^T B P_1 = I$ ,

$$(B, I) = \begin{bmatrix} \frac{1}{4} & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

所以  $P_1 = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ , 且  $P_1^T A P_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} = A_1$ ,

③ 求  $A_1$  的特征值和特征向量.

$$\det(\lambda I - A_1) = \lambda^4 - 3\lambda^2 + 2\lambda - 3(\lambda - 1)^2 = (\lambda - 1)^3(\lambda + 3).$$

对  $\lambda=1$ , 解  $(\lambda I - A_1)x=0$ ,

$$(I - A_1) \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

所以  $\eta_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ ,  $\eta_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ ,  $\eta_3 = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ ,

将  $\eta_1, \eta_2, \eta_3$  Schmidt 正交化得  $e_1 = \frac{1}{2}\eta_1, e_2 = \eta_2 - e_1, e_3 = \eta_3 + e_2$ ;

对  $\lambda=-3$ , 解  $(\lambda I - A_1)x=0$ ,

$$(-3I - A_1) \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \text{ 故 } \eta_4 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}, e_4 = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix},$$

故取  $P_2 = (e_1, e_2, e_3, e_4)$ , 有  $P_2^T A_1 P_2 = \text{diag}\{1, 1, 1, -3\}$ .

所以

$$P = P_1 P_2 = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

使

$$f|_{x=P_y} = y_1^2 + y_2^2 + y_3^2 - 3y_4^2, \quad g|_{x=P_y} = y_1^2 + y_2^2 + y_3^2 + y_4^2.$$

即有

$$P^T A P = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & 1 & \\ & & & -3 \end{bmatrix}, \quad P^T B P = I_4.$$

11. 对下列实正交方阵  $A$ , 求实正交方阵  $\Omega$  使  $\Omega^T A \Omega$  为标准形 (定理 9.5 系 1):

$$(1) A = \begin{bmatrix} \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & \frac{2}{3} \end{bmatrix}; \quad (2) A = \begin{bmatrix} \frac{3}{4} & \frac{1}{4} & -\frac{\sqrt{6}}{4} \\ \frac{1}{4} & \frac{3}{4} & \frac{\sqrt{6}}{4} \\ \frac{\sqrt{6}}{4} & -\frac{\sqrt{6}}{4} & \frac{1}{2} \end{bmatrix};$$

$$(3) A = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}; \quad (4) A = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}.$$

解 (1) ① 求  $A$  的特征值

$$f(\lambda) = \det(\lambda I - A) = (\lambda - 1)(\lambda^2 - \lambda + 1)$$

所以  $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = \frac{1 + \sqrt{3}i}{2}, \lambda_3 = \frac{1 - \sqrt{3}i}{2}$

② 分别求  $A$  的属于特征值  $\lambda_i$  的特征向量得

$$x_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad x_2 = \begin{bmatrix} -\frac{1 + \sqrt{3}i}{2} \\ \frac{\sqrt{3}i - 1}{2} \\ 1 \end{bmatrix}, \quad x_3 = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{3}i - 1}{2} \\ -\frac{1 + \sqrt{3}i}{2} \\ 1 \end{bmatrix},$$

故由定理 9.5 系 1,  $A$  实正交相合于

$$A \sim \begin{bmatrix} 1 & & \\ & \cos\theta & \sin\theta \\ & -\sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & & \\ & \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ & -\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} = B$$

③ 把  $x_1$  单位化得  $\epsilon_1$ , 取  $x_2, (x_3)$  的实部、虚部得两个向量, 它们构成二维子空间  $L(x_2, x_3)$  的两个实的基向量, 再把它们单位化得  $\epsilon_2, \epsilon_3$ , 取

$$\Omega = (\epsilon_1, \epsilon_2, \epsilon_3) = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & +\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{2}{\sqrt{6}} & 0 \end{bmatrix}$$

则有

$$\Omega^T A \Omega = \Omega^{-1} A \Omega = B$$

注 此题要求的是实正交方阵  $\Omega$ , 故只能得标准形为  $B$ , 由于  $A$  有一对共轭复根, 所以只有在复数域中  $A$  才能正交相合于对角阵.

(2)  $A$  的特征值为:  $\lambda_1 = 1, \lambda_{2,3} = \frac{1 \pm \sqrt{3}i}{2}$ , 求  $A$  的属于特征值  $\lambda_1, \lambda_{2,3}$  的特征向量;

$$x_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, x_2 = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}}i \\ -\frac{1}{\sqrt{2}}i \\ 1 \end{bmatrix}, x_3 = \begin{bmatrix} -\frac{i}{\sqrt{2}} \\ \frac{i}{\sqrt{2}} \\ 1 \end{bmatrix}$$

事实上  $x_3 = \overline{x_2}$ , 故求特征向量  $x_3$  时不必另解线性方程组, 同(1)得  $\epsilon_1, \epsilon_2, \epsilon_3$  故

$$\Omega = (\epsilon_1, \epsilon_2, \epsilon_3) = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

且

$$\Omega^T A \Omega = \begin{bmatrix} 1 & & \\ & \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ & -\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}.$$

(3)  $A$  的特征值为  $\lambda = 1$  (三重),  $\lambda = -1$ , 属于特征值 1 的特征向量为  $\epsilon_1, \epsilon_2, \epsilon_3$ ; 属于特征值  $-1$  的特征向量为  $\epsilon_4$ , 令  $\Omega = (\epsilon_1, \epsilon_2, \epsilon_3, \epsilon_4)$ , 故有

$$\Omega = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \Omega^{-1} A \Omega = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & 1 & \\ & & & -1 \end{bmatrix}.$$

(4)  $A$  的特征值为  $1, -1, i, -i$ . 特征向量分别取为

$$x_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, x_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}, x_3 = \begin{bmatrix} -i \\ i \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, x_4 = \begin{bmatrix} i \\ -i \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

把  $x_1, x_2$  单位化得  $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ , 取  $x_3$  的实部和虚部并单位化得  $\varepsilon_3, \varepsilon_4$ . 令  $\Omega = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4)$ , 即有

$$\Omega = \frac{\sqrt{2}}{2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \Omega^{-1}A\Omega = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ & -1 & & \\ & & 0 & 1 \\ & & -1 & 0 \end{bmatrix}.$$

12. 设欧几里得空间  $V$  中, 对称线性变换  $\mathcal{S}$  在标准正交基  $\alpha_1, \dots, \alpha_n$  下由以下方阵  $S$  给出. 求由  $\mathcal{S}$  的特征向量  $e_1, \dots, e_n$  组成的标准正交基, 及在此基下变换  $\mathcal{S}$  的方阵表示.

$$(1) \begin{bmatrix} 11 & 2 & -8 \\ 2 & 2 & 10 \\ -8 & 10 & 5 \end{bmatrix}; (2) \begin{bmatrix} 17 & -8 & 4 \\ -8 & 17 & -4 \\ 4 & -4 & 11 \end{bmatrix}; (3) \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

解 (1) 由  $\det(\lambda I - S) = (\lambda - 18)(\lambda - 9)(\lambda + 9) = 0$ , 知  $\mathcal{S}$  的特征值为  $\lambda_1 = 18, \lambda_2 = 9, \lambda_3 = -9$ . 求  $S$  的分别属于  $\lambda_i$  的特征向量得

$$\eta_1 = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \eta_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \eta_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 2 \end{bmatrix}$$

把它们单位化, 故知

$$e_1 = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{bmatrix} -\frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} \end{bmatrix} = -\frac{2}{3}\alpha_1 + \frac{1}{3}\alpha_2 + \frac{2}{3}\alpha_3;$$

$$e_2 = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{bmatrix} \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} \end{bmatrix} = \frac{2}{3}\alpha_1 + \frac{2}{3}\alpha_2 + \frac{1}{3}\alpha_3;$$

$$e_3 = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{bmatrix} \frac{1}{3} \\ -\frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} \end{bmatrix} = \frac{1}{3}\alpha_1 - \frac{2}{3}\alpha_2 + \frac{2}{3}\alpha_3.$$

是  $V$  的标准正交基,  $\mathcal{S}$  在此基下的方阵表示为

$$\begin{bmatrix} 18 & & \\ & 9 & \\ & & -9 \end{bmatrix}.$$

(2)  $S$  的特征值为  $\lambda_1 = 27, \lambda_2 = \lambda_3 = 9$ . 特征子空间的基分别为  $x_1 = (2, -2, 1)^T$ ;  $x_2 = (1, 1, 0)^T$ ;  $x_3 = (-1, 0, 2)^T$ , 正交化后得  $\eta_1 = \frac{1}{3}x_1, \eta_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}x_2, \eta_3 = \frac{1}{\sqrt{18}}(-1, 1, 4)^T$ .

记从  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  到  $e_1, e_2, e_3$  的过渡矩阵为  $Q$ , 则有

$$(e_1, e_2, e_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)Q = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{bmatrix} \frac{2}{3} & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{18}} \\ -\frac{2}{3} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{18}} \\ \frac{1}{3} & 0 & \frac{4}{\sqrt{18}} \end{bmatrix},$$

$\mathcal{S}$  在  $e_1, e_2, e_3$  下的方阵表示为

$$\begin{bmatrix} 27 & & \\ & 9 & \\ & & 9 \end{bmatrix}.$$

(其中  $Q$  是正交方阵, 所以  $e_1, e_2, e_3$  是标准正交基).

(3)  $S$  的特征值为  $\lambda_1 = \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 4$ ; 特征向量分别为

$$x_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, x_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, x_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

把  $x_1, x_2$  Schmidt 正交化, 把  $x_3$  单位化得

$$\eta_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(-1, 0, 1)^T;$$

$$\eta_2 = \frac{1}{\sqrt{6}}(-1, 2, -1)^T;$$

$$\eta_3 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)^T,$$

故令

$$e_1 = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)\eta_1; e_2 = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)\eta_2; e_3 = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)\eta_3;$$

则  $e_1, e_2, e_3$  为  $V$  的标准正交基, 且  $\mathcal{S}$  在此基下的方阵表示为

$$\begin{bmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 4 \end{bmatrix}.$$

13. 对下列实对称方阵  $S$ , 求实正交方阵  $\Omega$  使  $\Omega^T S \Omega$  为对角形:

$$(1) \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 3 & -4 \end{bmatrix}; (2) \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{bmatrix}; (3) \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & -2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix};$$

$$(4) \begin{bmatrix} 3 & 2 & 0 \\ 2 & 4 & -2 \\ 0 & -2 & 5 \end{bmatrix}; (5) \begin{bmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & -4 \\ -2 & -4 & 5 \end{bmatrix}; (6) \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

解 (1)  $S$  的特征值为  $\lambda_1=5, \lambda_2=-5$ ,  $S$  的属于特征值  $5, -5$  的特征向量分别为  $x_1=(3,1)^T, x_2=(-1,3)^T$ , 单位化得  $e_1=\frac{1}{\sqrt{10}}(3,1)^T, e_2=\frac{1}{\sqrt{10}}(-1,3)^T$ , 则

$$\Omega = \frac{1}{\sqrt{10}} \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}, \text{ 使 } \Omega^T S \Omega = \begin{bmatrix} 5 & \\ & -5 \end{bmatrix}.$$

$$(2) \det(\lambda I - S) = (\lambda+1)(\lambda^2-6\lambda+7)=0,$$

$$\text{所以 } \lambda_1=-1, \lambda_2=3-\sqrt{2}, \lambda_3=3+\sqrt{2}$$

因为实对称阵属于不同特征值的特征向量是正交的, 所以分别求解齐次线性方程组  $(\lambda_i I - S)x=0$ , 得相应的特征向量, 再单位化即可

$$x_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, e_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}x_1; x_2 = \begin{bmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ 1 \end{bmatrix}, e_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}x_2; x_3 = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 1 \end{bmatrix}, e_3 = \frac{1}{\sqrt{2}}x_3.$$

令  $\Omega=(e_1, e_2, e_3)$ , 则有

$$\Omega^T S \Omega = \Omega^T S \begin{bmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & & \\ & 3-\sqrt{2} & \\ & & 3+\sqrt{2} \end{bmatrix}.$$

(3) 特征值为  $\lambda_1=-1, \lambda_2=\frac{1-\sqrt{33}}{2}, \lambda_3=\frac{1+\sqrt{33}}{2}$ .  $S$  的特征向量分别为  $x_1=(-1, 0, 1)^T; x_2=(1, -\frac{5+\sqrt{33}}{2}, 1)^T; x_3=(1, -\frac{5-\sqrt{33}}{2}, 1)^T$ . 又  $|x_1|=\sqrt{2}, |x_2|^2=\frac{33+5\sqrt{33}}{2}, |x_3|^2=\frac{33-5\sqrt{33}}{2}$ , 记  $\frac{1}{|x_2|}=a, \frac{1}{|x_3|}=b$ , 则得:

$$e_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}x_1, e_2 = ax_2, e_3 = bx_3.$$

故

$$\Omega = (e_1, e_2, e_3) = \begin{bmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} & a & b \\ 0 & -\frac{5+\sqrt{33}}{2}a & -\frac{5-\sqrt{33}}{2}b \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & a & b \end{bmatrix},$$



且有  $\Omega^T S \Omega = \text{diag} \left\{ -1, \frac{1-\sqrt{33}}{2}, \frac{1+\sqrt{33}}{2} \right\}$ .

(4)  $S$  的特征值为  $\lambda_1=1, \lambda_2=4, \lambda_3=7$ . 相对应的特征向量分别为

$$x_1 = \begin{bmatrix} -2 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}, x_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}, x_3 = \begin{bmatrix} -1 \\ -2 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$e_1 = \frac{1}{3}x_1, e_2 = \frac{1}{3}x_2, e_3 = \frac{1}{3}x_3$ , 令  $\Omega = (e_1, e_2, e_3)$ , 则有

$$\Omega^T S \Omega = \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 4 & \\ & & 7 \end{bmatrix}.$$

(5)  $S$  的特征值为  $1, 1, 10$ . 特征向量分别为  $x_1 = (2, 0, 1)^T, x_2 = (-2, 1, 0)^T, x_3 = (-1, -2, 2)^T$ . 经 Schmidt 正交化得:  $e_1 = \frac{1}{\sqrt{5}}x_1, e_2 = \frac{\sqrt{5}}{3} \left( -\frac{2}{5}, 1, \frac{4}{5} \right)^T, e_3 = \frac{1}{3}x_3$ , 令  $\Omega = (e_1, e_2, e_3)$ , 则有

$$\Omega^T S \Omega = \text{diag}\{1, 1, 10\}.$$

(6)  $S$  的特征值为  $\lambda = -1$  (三重根),  $\lambda = -3$ , 相应的特征向量分别为

$$x_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, x_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, x_3 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, x_4 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

把  $x_1, x_2, x_3$  经 Schmidt 正交化,  $x_4$  单位化得:  $e_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}x_1; e_2 = \frac{1}{\sqrt{6}}(-1, 0, 2, -1)^T; e_3 = \frac{1}{\sqrt{12}}(-1, 3, -1, -1)^T; e_4 = \frac{1}{2}x_4$ . 令  $\Omega = (e_1, e_2, e_3, e_4)$  则有

$$\Omega^T S \Omega = \text{diag}\{-1, -1, -1, -3\}.$$

14. 设在欧几里得空间  $V$  中, 正交线性变换  $\mathcal{A}$  在某标准正交基  $\alpha_1, \dots, \alpha_n$  下的方阵表示为以下方阵  $A$ . 求  $V$  的标准正交基  $e_1, \dots, e_n$  使  $V$  分解为 1 维和 2 维不变子空间直和,  $\mathcal{A}$  在二维子空间上作用为旋转 (如定理 9.5' 系 1').

解 (1)  $A$  的特征值为  $\lambda_1 = \lambda_2 = 1, \lambda_3 = -1$ , 解齐次线性方程组  $(I - A)x = 0$ , 得两正交特征向量  $x_1 = (1, 1, 1)^T, x_2 = (-1, 0, 1)^T$ , 各自单位化得

$$\eta_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)^T, \eta_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(-1, 0, 1)^T$$

又解  $(-I - A)x = 0$ , 得属于  $\lambda_3 = -1$  的特征向量  $x_3 = (1, -2, 1)^T$ , 单位化得  $\eta_3 = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, -2, 1)^T$ . 故

$$e_1 = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)\eta_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}(\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3);$$

$$e_2 = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \eta_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(-\alpha_1 + \alpha_3);$$

$$e_3 = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \eta_3 = \frac{1}{\sqrt{6}}(\alpha_1 - 2\alpha_2 + \alpha_3),$$

是  $V$  的标准正交基, 且

$$V = \langle e_1 \rangle \oplus \langle e_2 \rangle \oplus \langle e_3 \rangle$$

即  $V$  分解为 3 个 1 维不变子空间的直和. (每个  $\langle e_i \rangle$  都是  $V$  的特征向量生成的子空间, 任  $\alpha (\neq 0) \in \langle e_i \rangle$  都有  $\mathcal{A}\alpha = \lambda_i \alpha \in \langle e_i \rangle$ ).  $\mathcal{A}$  在基  $e_1, e_2, e_3$  下的方阵表示为

$$A_1 = \text{diag}\{1, 1, -1\}.$$

(2) 由  $\det(\lambda I - A) = 0$ , 解得  $A$  的特征值为  $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = i, \lambda_3 = -i$ , 相应的特征向量为

$$x_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, x_2 = \begin{bmatrix} \frac{i}{\sqrt{2}} \\ -\frac{i}{\sqrt{2}} \\ 1 \end{bmatrix}, x_3 = \begin{bmatrix} -\frac{i}{\sqrt{2}} \\ \frac{i}{\sqrt{2}} \\ 1 \end{bmatrix},$$

故取  $\eta_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}x_1, \eta_2 = \text{Re}x_2, \eta_3 = \text{Im}x_2$ , 于是

$$e_1 = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \eta_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(\alpha_1 + \alpha_2);$$

$$e_2 = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \eta_2 = \alpha_3;$$

$$e_3 = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \eta_3 = \frac{1}{\sqrt{2}}(\alpha_1 - \alpha_2),$$

则  $e_1, e_2, e_3$  是  $V$  的标准正交基, 且

$$V = \langle e_1 \rangle + \langle e_2, e_3 \rangle,$$

即  $V$  分解为一个 1 维不变子空间和一个 2 维不变子空间的直和.  $\mathcal{A}$  在基  $e_1, e_2, e_3$  下的方阵表示为

$$B = (\eta_1, \eta_2, \eta_3)^T A (\eta_1, \eta_2, \eta_3) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}.$$

(3)  $A$  的特征值为  $\lambda_1 = 1, \lambda_{2,3} = \frac{-2+7\sqrt{2} \pm i\sqrt{42+28\sqrt{2}}}{12}$ . 相应的特征向量为

$$x_1 = \begin{bmatrix} -1-\sqrt{2} \\ -3-2\sqrt{2} \\ 1 \end{bmatrix}, x_2 = a+ib, x_3 = a-ib, \text{ 其中 } a = \frac{1}{\sqrt{42}} \begin{bmatrix} 6 \\ -1-\sqrt{2} \\ \sqrt{2}-1 \end{bmatrix}, b = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{bmatrix} 0 \\ 1-\sqrt{2} \\ 1+\sqrt{2} \end{bmatrix}.$$

故取  $\eta_1 = \frac{1}{\sqrt{21+14\sqrt{2}}}x_1, \eta_2 = a, \eta_3 = b$ , 令

$$e_1 = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \eta_1 = \frac{1}{\sqrt{7}}[-\alpha_1 + (1+\sqrt{2})\alpha_2 + (\sqrt{2}-1)\alpha_3];$$

$$e_2 = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \eta_2 = \frac{1}{\sqrt{42}} [6\alpha_1 - (1 + \sqrt{2})\alpha_2 + (\sqrt{2} - 1)\alpha_3];$$

$$e_3 = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \eta_3 = \frac{1}{\sqrt{6}} [(1 - \sqrt{2})\alpha_2 + (1 + \sqrt{2})\alpha_3].$$

则  $e_1, e_2, e_3$  是  $V$  的标准正交基, 且

$$V = \langle e_1 \rangle + \langle e_2, e_3 \rangle,$$

即  $V$  分解成两个不变子空间  $W_1 = \langle e_1 \rangle$  (1 维) 和  $W_2 = \langle e_2, e_3 \rangle$  (2 维) 的直和, 记从基  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  到基  $e_1, e_2, e_3$  的过渡矩阵为  $P$ , 则  $P = (\eta_1, \eta_2, \eta_3)$  是正交方阵, 且有

$$P^T A P = \begin{bmatrix} 1 & & \\ \frac{-2 + 7\sqrt{2}}{12} & \frac{\sqrt{42 + 28\sqrt{2}}}{12} & \\ -\frac{\sqrt{42 + 28\sqrt{2}}}{12} & \frac{-2 + 7\sqrt{2}}{12} & \end{bmatrix} = B,$$

$B$  是  $\mathcal{A}$  在基  $e_1, e_2, e_3$  下的方阵表示.

15. 对第 11 题中方阵  $A$ , 做如第 14 题.

解 设  $\mathcal{A}$  在标准正交基  $\alpha_1, \dots, \alpha_n$  下的方阵为  $A$ , 则由 11 题知有:  $\Omega$  的列就是所求标准正交基  $e_1, \dots, e_n$  在  $\alpha_1, \dots, \alpha_n$  下的坐标列. 即

$$(e_1, \dots, e_n) = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \Omega.$$

而  $\Omega$  的第  $j$  列为  $\epsilon_j$ , 由此得

$$e_j = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \epsilon_j, \quad j = 1, 2, \dots, n.$$

故

$$(1) \quad e_1 = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \epsilon_1 = \frac{1}{\sqrt{3}} (\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3);$$

$$e_2 = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \epsilon_2 = \frac{1}{\sqrt{6}} (-\alpha_1 - \alpha_2 + 2\alpha_3);$$

$$e_3 = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \epsilon_3 = \frac{1}{\sqrt{2}} (-\alpha_1 + \alpha_2);$$

$$V = \langle e_1 \rangle + \langle e_2, e_3 \rangle$$

且  $\mathcal{A}$  在不变子空间  $\langle e_2, e_3 \rangle$  上的作用为旋转 (因为  $\cos \theta = \frac{1}{2}$ ,  $\sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$ , 所以  $\theta = \frac{\pi}{3}$ , 即是  $\langle e_2, e_3 \rangle$  绕  $e_1$  转  $\frac{\pi}{3}$ . 或说成是  $oyz$  平面绕  $x$  轴旋转  $\frac{\pi}{3}$ ).

$$(2) \quad e_1 = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \epsilon_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} (\alpha_1 + \alpha_2); \quad e_2 = \alpha_3;$$

$$e_3 = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \epsilon_3 = \frac{1}{\sqrt{2}} (\alpha_1 - \alpha_2);$$

$$V = \langle e_1 \rangle + \langle e_2, e_3 \rangle$$

$\mathcal{A}$  在不变子空间  $\langle e_2, e_3 \rangle$  上的作用为旋转,  $\mathcal{A}$  在  $e_1, e_2, e_3$  上的方阵表示为

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta & \sin\theta \\ 0 & -\sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}, \quad \text{其中 } \theta = \frac{\pi}{3}.$$

$$(3) \quad e_1 = \frac{1}{2}(\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 - \alpha_4); \quad e_2 = \frac{1}{2}(\alpha_1 + \alpha_2 - \alpha_3 + \alpha_4);$$

$$e_3 = \frac{1}{2}(\alpha_1 - \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4); \quad e_4 = \frac{1}{2}(-\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4);$$

$$V = \langle e_1 \rangle + \langle e_2 \rangle + \langle e_3 \rangle + \langle e_4 \rangle.$$

$$(4) \quad e_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(\alpha_1 + \alpha_2); \quad e_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(-\alpha_3 + \alpha_4); \quad e_3 = \frac{1}{\sqrt{2}}(\alpha_3 + \alpha_4); \quad e_4 = \frac{1}{\sqrt{2}}(-\alpha_1 + \alpha_2);$$

$$V = \langle e_1 \rangle + \langle e_2 \rangle + \langle e_3, e_4 \rangle$$

$\mathcal{A}$  在  $e_1, e_2, e_3, e_4$  上的方阵表示为

$$\begin{bmatrix} 1 & & & \\ & -1 & & \\ & & \cos\theta & \sin\theta \\ & & -\sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}, \quad \text{其中 } \theta = \frac{\pi}{2}.$$

16. 设  $A$  是  $n$  阶实对称阵, 且  $A^2 = I$ , 证明: 存在正交方阵  $T$ , 使得

$$T^{-1}AT = \begin{bmatrix} I_r & \\ & -I_{n-r} \end{bmatrix}, \quad (0 \leq r < n).$$

证 因为  $A^2 = I$ , 所以  $\lambda^2 = 1$ ,  $\lambda = \pm 1$ , 故  $A$  的特征值为  $\pm 1$ , 又  $A$  是实对称阵, 故由定理 9.5 系 2 知存在正交方阵  $T$ , 使

$$T^{-1}AT = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & 1 & \\ & & & -1 \\ & & & & \ddots \\ & & & & & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_r & \\ & -I_{n-r} \end{bmatrix}.$$

其中  $r$  是特征值 1 的重数.

注 此题若不用定理 9.5 系 2, 也可以这样考虑, 由  $A^2 = I \rightarrow r(A+I) + r(A-I) = n \rightarrow A$  的属于特征值 1 的特征子空间与属于特征值 -1 的特征子空间维数和等于  $n$ . 故  $A$  有  $n$  个线性无关特征向量, 又  $A$  是实对称阵, 所以属于不同特征值的特征向量相互正交, 而属于同一特征值的特征向量经 Schmidt 正交化后得正交向量组, 故得正交方阵  $T$ , 使  $T^{-1}AT$  为对角阵.

17. 非奇异二次型可以用正交变换化为标准形式(即元素为  $\pm 1$  的对角形)当且仅当它的矩阵是正交阵.

设二次型为  $Q(x_1, \dots, x_n) = x^T Ax$ , 且有  $A^T = A$ ,  $\det A \neq 0$ . 则原命题就是要证: 存在正交方阵  $\Omega$ , 使  $\Omega^T A \Omega = \text{diag}(1, \dots, 1, -1, \dots, -1) \Leftrightarrow A^T A = I$ .

$\Leftarrow$  由  $A^T A = I$ , 又  $A^T = A$ , 所以  $A^2 = I$ , 故由 16 题可知, 存在正交方阵  $\Omega$ , 使  $\Omega^T A \Omega =$

$$\begin{bmatrix} I_r & \\ & -I_{n-r} \end{bmatrix}.$$

$\Rightarrow$  由  $\Omega^T A \Omega = \begin{bmatrix} I_r & \\ & -I_{n-r} \end{bmatrix} \rightarrow A = \Omega \begin{bmatrix} I_r & \\ & -I_{n-r} \end{bmatrix} \Omega^T \rightarrow A^2 = I$ , 又因为  $A^T = A$ , 所以

$A^T A = A^2 = I$ , 所以  $A$  是正交方阵.

18. 设  $A$  为  $n$  阶实对称方阵, 证明:

(1)  $A$  正定的充要条件是  $A$  的特征值全大于零;

(2)  $A$  正定, 则对任意正整数  $k$ ,  $A^k$  为正定.

证 由已知存在正交方阵  $T$  使

$$T^T A T = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{bmatrix}$$

或

$$Q(x_1, \dots, x_n) |_{x=Ty} = \lambda_1 y_1^2 + \dots + \lambda_n y_n^2 \quad (*)$$

(1)  $\Leftarrow$  若  $\lambda_i > 0, i=1, \dots, n$ , 则对任  $x=Ty \neq 0, \rightarrow y \neq 0$ , 故  $\lambda_1 y_1^2 + \dots + \lambda_n y_n^2 > 0$ , 故  $A$  正定.

$\Rightarrow$  当  $A$  正定时, 若有  $\lambda_i \leq 0$ , 不妨设为  $\lambda_n \leq 0$ , 则取  $y=(0, \dots, 0, 1)^T$  有  $x=Ty \neq 0$ , 代入  $(*)$  式得  $Q(x_1, \dots, x_n) \leq 0$ , 与  $A$  正定矛盾. 故必所有  $\lambda_i > 0$ .

(2) 因为  $A$  正定, 所以  $\lambda_i > 0, i=1, \dots, n$ , 又由

$$T^T A T = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{bmatrix} \rightarrow T^T A^k T = \begin{bmatrix} \lambda_1^k & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n^k \end{bmatrix}$$

$\lambda_i^k > 0, i=1, \dots, n$ , 又由(1)充分性知  $A^k > 0$ .

19. 设  $Q(x_1, \dots, x_n) = X^T A X$  是一实二次型,  $\lambda_1, \dots, \lambda_n$  是  $A$  的特征根, 且  $\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots \leq \lambda_n$ , 证明, 对任一  $X \in \mathbf{R}^{(n)}$  有,

$$\lambda_1 X^T X \leq X^T A X \leq \lambda_n X^T X;$$

又等号成立的条件是什么?

证 因为  $A$  是实对称阵, 所以存在实正交方阵  $\Omega$  使

$$\Omega^T A \Omega = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{bmatrix},$$

适当重排  $\Omega$  的列, 可设  $\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots \leq \lambda_n$ . 即有

$$X^T A X |_{X=\Omega Y} = \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \dots + \lambda_n y_n^2$$

又因为

$$X^T X = (\Omega Y)^T (\Omega Y) = Y^T Y$$

$$\text{且 } \lambda_1 Y^T Y = \lambda_1 (Y_1^2 + \dots + Y_n^2) \leq \lambda_1 Y_1^2 + \dots + \lambda_n Y_n^2 \leq \lambda_n (Y_1^2 + \dots + Y_n^2) = \lambda_n Y^T Y$$

故知

$$\lambda_1 X^T X = \lambda_1 Y^T Y \leq X^T A X \leq \lambda_n Y^T Y = \lambda_n X^T X.$$

当  $X$  分别取为  $A$  的属于特征值  $\lambda_1$  和  $\lambda_n$  的特征向量时等号成立:

$$\begin{aligned} \text{因为} \quad X^T A X &= X^T \lambda_n X = \lambda_n X^T X, \\ X^T A X &= X^T \lambda_1 X = \lambda_1 X^T X. \end{aligned}$$

20. 设  $A, B$  都是  $n$  阶正定实对称阵, 证明:

- (1)  $AB$  正定的充要条件是  $AB=BA$ ;  
 (2) 如果  $A-B$  正定则  $B^{-1}-A^{-1}$  亦正定.

证 (1)  $\Rightarrow$  因为  $A, B, AB$  都是正定实对称阵,

所以  $AB=(AB)^T=B^T A^T=BA$ .

$\Leftarrow$  当  $AB=BA$  时,  $(AB)^T=B^T A^T=BA=AB$ , 所以  $AB$  是实对称阵.

又因为  $A, B$  是正定实对称阵, 所以存在可逆阵  $P, Q$ , 使  $A=P^T P, B=Q^T Q$ , 于是

$$AB = P^T P Q^T Q = P^T P Q^T Q P^T (P^T)^{-1},$$

故  $AB$  相似于  $PQ^T Q P^T$ , 于是知两者特征值相同, 而后者是正定实对称阵 (因为  $PQ^T Q P^T = (QP^T)^T (QP^T)$ ,  $QP^T$  是可逆阵), 其特征值均为正, 所以  $AB$  的特征值均为正, 故  $AB$  正定.

(2) 用定理 9.13 知, 存在可逆阵  $P$  使

$$P^T A P = I, P^T B P = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{bmatrix} \quad (*)$$

由  $B$  正定, 所以  $\lambda_i > 0, i=1, \dots, n$ . 又

$$P^T (A-B) P = \text{diag}\{1-\lambda_1, \dots, 1-\lambda_n\},$$

由已知  $A-B$  正定得  $1-\lambda_1 > 0, \dots, 1-\lambda_n > 0$ , 即  $\lambda_i < 1$ , 对任  $i$  成立. 又由  $(*)$  式得

$$P^{-1} A^{-1} (P^{-1})^T = I, P^{-1} B^{-1} (P^{-1})^T = \text{diag}\left\{\frac{1}{\lambda_1}, \dots, \frac{1}{\lambda_n}\right\},$$

所以

$$P^{-1} (B^{-1} - A^{-1}) (P^{-1})^T = \begin{bmatrix} \frac{1}{\lambda_1} - 1 & & \\ & \ddots & \\ & & \frac{1}{\lambda_n} - 1 \end{bmatrix},$$

因为  $\lambda_i < 1$ , 所以  $\frac{1}{\lambda_i} > 1$ , 即  $\frac{1}{\lambda_i} - 1 > 0, i=1, \dots, n$ .

故  $B^{-1} - A^{-1}$  正定.

21. 设半正定对称方阵  $S_1$  和  $S_2$  可交换, 试证  $S_1 S_2 \geq 0$ .

证 方法 1 首先由  $S_1 S_2 = S_2 S_1$  可知  $(S_1 S_2)^T = S_1 S_2$ , 故  $S_1 S_2$  为实对称阵, 再证其特征值  $\geq 0$ , 证法与 20 题类似: 因为  $S_1, S_2$  半正定, 所以  $\exists$  方阵  $P, Q$  使  $S_1 = P^T P, S_2 = Q^T Q$ , 于是

$$S_1 S_2 = P^T P Q^T Q,$$

再利用对任  $n$  阶方阵  $A, B, \det(\lambda I_n - AB) = \det(\lambda I_n - BA)$ , 知

$P^T(PQ^TQ)$  与  $(PQ^TQ)P^T = (QP^T)^T(QP^T)$  的特征值相同,而后者是半正定的,其特征值  $\geq 0$ ,故知  $S_1S_2$  的特征值  $\geq 0$ .

所以  $S_1S_2 \geq 0$  (半正定).

方法 2 用两个可交换的规范阵可以同时正交相似(相合)于对角阵.(此命题在补充题中给出).

因为  $S_1$  与  $S_2$  可交换,所以  $\exists$  正交方阵  $\Omega$ ,使

$$\Omega^T S_1 \Omega = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{bmatrix}, \quad \Omega^T S_2 \Omega = \begin{bmatrix} \mu_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \mu_n \end{bmatrix}.$$

于是

$$\Omega^T S_1 S_2 \Omega = \begin{bmatrix} \lambda_1 \mu_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \mu_n \end{bmatrix}.$$

且  $\lambda_i \mu_i \geq 0 \quad i=1,2,\dots,n$ , (因  $\lambda_i \geq 0, \mu_i \geq 0$ )

所以  $S_1S_2 \geq 0$  (半正定).

22.  $S$  是实对称正定方阵,证明: 存在上三角阵  $T$ , 使  $S=T^T T$ .

证 方法 1 因为  $A$  正定,所以存在可逆阵  $P$ , 使  $A=P^T P$ . 又由任一可逆阵均有  $QR$  分解, 即  $P=QR$ , 其中  $Q$  为正交方阵,  $R$  为上三角阵. 于是有

$$A = P^T P = R^T Q^T Q R = R^T R.$$

方法 2 (归纳法)  $n=2$  时, 设

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \quad \text{其中 } a_{12} = a_{21},$$

则有

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{a_{12}}{a_{11}} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -\frac{a_{12}}{a_{11}} \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & 0 \\ 0 & a_{22} - \frac{a_{12}a_{21}}{a_{11}} \end{bmatrix},$$

所以

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \frac{a_{12}}{a_{11}} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sqrt{a_{11}} & \\ & \sqrt{\frac{a_{11}a_{22}-a_{12}^2}{a_{11}}} \end{bmatrix}^2 \begin{bmatrix} 1 & \frac{a_{12}}{a_{11}} \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = R^T R.$$

假设对  $n-1$  阶方阵结论成立, 即  $A_{n-1} = R_{n-1}^T R_{n-1}$ , 其中  $R_{n-1}$  是上三角阵.

则当  $A$  为  $n$  阶方阵时, 设  $A = \begin{bmatrix} A_{n-1} & \beta \\ \beta^T & a_m \end{bmatrix}$ , 取

$$P = \begin{bmatrix} I_{n-1} & -A_{n-1}^{-1}\beta \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \text{ 则有 } P^T A P = \begin{bmatrix} A_{n-1} & 0 \\ 0 & a_m - \beta^T A_{n-1}^{-1} \beta \end{bmatrix}$$

记  $b = a_m - \beta^T A_{n-1}^{-1} \beta$ , 所以

$$A = (P^{-1})^T \begin{bmatrix} R_{n-1}^T R_{n-1} & 0 \\ 0 & b \end{bmatrix} P^{-1} = (P^{-1})^T \begin{bmatrix} R_{n-1}^T & 0 \\ 0 & \sqrt{b} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R_{n-1} & 0 \\ 0 & \sqrt{b} \end{bmatrix} P^{-1} = R^T R,$$

其中

$$R = \begin{bmatrix} R_{n-1} & \\ & \sqrt{b} \end{bmatrix} P^{-1} = \begin{bmatrix} R_{n-1} & R_{n-1} A_{n-1}^{-1} \beta \\ O & \sqrt{b} \end{bmatrix}$$

是上三角阵. (因为  $R_{n-1}$  是上三角阵, 且  $R_{n-1} A_{n-1}^{-1} \beta$  为  $n-1$  维列向量)

注 从证法上来说方法 1 很漂亮, 但不利于理解这个命题的本质, 也不易具体操作: 给一个具体的正定实对阵怎么去找  $R$ , 使  $A = R^T R$ . 方法 2 虽书写较长, 但恰恰解决了这两个问题: 因为  $A$  正定, 所以  $a_{11} \neq 0$ , 于是取

$$P_1 = \begin{bmatrix} 1 - \frac{a_{12}}{a_{11}} & \cdots & -\frac{a_{1n}}{a_{11}} \\ & \ddots & \\ & & 1 \end{bmatrix}, \text{ 有 } P_1^T A P_1 = \begin{bmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a'_{22} & \cdots & a'_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & a'_{n2} & \cdots & a'_{nn} \end{bmatrix}$$

又因为  $a'_{22} > 0$ , 所以再取

$$P_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ & 1 - \frac{a'_{23}}{a'_{22}} & \cdots & \frac{a'_{2n}}{a'_{22}} \\ & & \ddots & \\ & & & 1 \end{bmatrix}, \text{ 使 } A \sim \begin{bmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ 0 & a'_{22} & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & 0 & & & \\ \vdots & \vdots & & * & \\ 0 & 0 & & & \end{bmatrix},$$

继续做下去得

$$P_s^T \cdots P_1^T A P_1 \cdots P_s = \begin{bmatrix} a_{11} & & & \\ & a_{22}^{(1)} & & \\ & & \ddots & \\ & & & a_{nn}^{(s)} \end{bmatrix}$$

其中  $s \leq n-1$ , 且  $P_1, \dots, P_s$  均为上三角阵, 其积也是上三角阵, 记  $P = (P_1 \cdots P_s)^{-1}$  则

$$R = \begin{bmatrix} \sqrt{a_{11}} & & \\ & \ddots & \\ & & \sqrt{a_{nn}^{(s)}} \end{bmatrix} P, \quad \text{且} \quad A = R^T R.$$

(条件  $A > 0$ , 保证了每一步得到的新方阵的对角线元素均大于 0, 故可以继续仅用如  $P_1, P_2$  这样的方阵去化对角线, 这就是此题的本质。)

23. 设  $\alpha_1, \dots, \alpha_m$  是  $n$  维欧氏空间  $V$  中一组向量, 而其 Gram 方阵为

$$G = \begin{bmatrix} \langle \alpha_1, \alpha_1 \rangle & \langle \alpha_1, \alpha_2 \rangle & \cdots & \langle \alpha_1, \alpha_m \rangle \\ \langle \alpha_2, \alpha_1 \rangle & \langle \alpha_2, \alpha_2 \rangle & \cdots & \langle \alpha_2, \alpha_m \rangle \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \langle \alpha_m, \alpha_1 \rangle & \langle \alpha_m, \alpha_2 \rangle & \cdots & \langle \alpha_m, \alpha_m \rangle \end{bmatrix}$$

证明: 当且仅当  $\det G \neq 0$  时,  $\alpha_1, \dots, \alpha_m$  线性无关.

证  $\Leftarrow$  若  $\alpha_1, \dots, \alpha_m$  线性无关, 则可将它扩充成  $V$  的一组基  $\alpha_1, \dots, \alpha_m, \alpha_{m+1}, \dots, \alpha_n$ . 而这个基向量的内积所构成的矩阵



$$A = \begin{bmatrix} \langle \alpha_1, \alpha_1 \rangle & \cdots & \langle \alpha_1, \alpha_n \rangle \\ \vdots & & \\ \langle \alpha_n, \alpha_1 \rangle & \cdots & \langle \alpha_n, \alpha_n \rangle \end{bmatrix}$$

是此内积的度量矩阵,  $A$  是正定的, 而  $\det G$  是  $A$  的  $m$  阶主子式, 故其大于 0.

$\Rightarrow$  反证法, 若  $\alpha_1, \dots, \alpha_m$  线性相关, 那末其中一定有一个  $\alpha_i (1 \leq i \leq m)$  可被其余向量线性表出, 于是  $\det G$  的第  $i$  行也可以被其余各行线性表出, 所以  $\det G = 0$ , 与已知矛盾, 所以  $\alpha_1, \dots, \alpha_m$  必线性无关.

24. 试证: 实对称阵  $A$  的特征根全部落在区间  $[a, b]$  上的充要条件是  $A - aI \geq 0$ ,  $bI - A \geq 0$ .

证 方法 1 因为  $A$  是实对称阵, 所以存在正交方阵  $P$ , 使得  $P^T A P = \text{diag}\{\lambda_1, \dots, \lambda_n\}$ .

于是有

$$P^T (A - aI) P = \begin{bmatrix} \lambda_1 - a & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n - a \end{bmatrix}, \quad P^T (bI - A) P = \begin{bmatrix} b - \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & b - \lambda_n \end{bmatrix},$$

故  $A - aI \geq 0, bI - A \geq 0 \Leftrightarrow \lambda_i - a \geq 0, b - \lambda_i \geq 0, i = 1, \dots, n.$

$$\Leftrightarrow a \leq \lambda_i \leq b, i = 1, \dots, n.$$

方法 2 设  $\lambda, \mu, \gamma$  分别为方阵  $A, A - aI, bI - A$  的特征根. 由

$$0 = |\mu I - (A - aI)| = |(\mu + a)I - A|, \rightarrow \mu + a = \lambda,$$

$$0 = |\gamma I - (bI - A)| = (-1)^n |(b - \gamma)I - A|, \rightarrow b - \gamma = \lambda,$$

所以  $\mu = \lambda - a, \gamma = b - \lambda$ ,

故  $A - aI \geq 0, bI - A \geq 0 \Leftrightarrow \mu \geq 0, \gamma \geq 0 \Leftrightarrow \lambda - a \geq 0, b - \lambda \geq 0$

$$\Leftrightarrow a \leq \lambda \leq b.$$

25. 设对称方阵  $S_1$  和  $S_2$  的特征根分别落在  $[a, b]$  和  $[c, d]$  内, 试证: 对称方阵  $S_1 + S_2$  的特征根落在区间  $[a + c, b + d]$  内.

证 由 24 题的必要性的有

$$S_1 - aI \geq 0, \quad bI - S_1 \geq 0,$$

$$S_2 - cI \geq 0, \quad dI - S_2 \geq 0,$$

于是有

$$(S_1 - aI) + (S_2 - cI) \geq 0, \quad (bI - S_1) + (dI - S_2) \geq 0,$$

即

$$(S_1 + S_2) - (a + c)I \geq 0, \quad (b + d)I - (S_1 + S_2) \geq 0$$

又由上题的充分性知  $S_1 + S_2$  的特征根落入  $[a + c, b + d]$  中.

注 上面证明中用到两个半正定方阵的和是半正定方阵. 事实上若  $A \geq 0, B \geq 0$ , 则对任  $x$  有

$$x^T (A + B)x = x^T A x + x^T B x \geq 0.$$

26. 设  $A$  是  $n$  阶正定对称方阵, 试证  $n$  维空间  $\mathbf{R}^{(n)}$  中由不等式  $x^T A x \leq 1$  所定义的区域是有界的, 且它的体积

$$V = \int_{x^T A x \leq 1} dx_1 dx_2 \cdots dx_n = \frac{\pi^{n/2}}{\Gamma\left(\frac{n}{2} + 1\right)} (\det A)^{-\frac{1}{2}}$$

证 设有正交方阵  $T$ , 使  $T^T A T$  为对角阵, 即

$$X^T A X \mid_{X=TY} = \lambda_1 y_1^2 + \cdots + \lambda_n y_n^2 = \frac{y_1^2}{\frac{1}{\lambda_1}} + \cdots + \frac{y_n^2}{\frac{1}{\lambda_n}} \leq 1$$

显然  $n=3$  时为椭球, 故原区域为  $n$  维椭球. 以下用归纳法证明结论,  $n=3$  时有

$$\text{左边} = \text{椭球体的体积} = \frac{4}{3} \pi abc = \frac{4}{3} \pi \frac{1}{\sqrt{\lambda_1 \lambda_2 \lambda_3}}$$

$$\text{右边} = \frac{\pi^{3/2} (\lambda_1 \lambda_2 \lambda_3)^{-\frac{1}{2}}}{\Gamma\left(\frac{3}{2} + 1\right)} = \frac{\pi^{3/2} (\lambda_1 \lambda_2 \lambda_3)^{-\frac{1}{2}}}{\frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right)} = \text{左边}.$$

这里用到  $\det A = \lambda_1 \lambda_2 \lambda_3$ ,  $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$ ,  $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$ .

设当  $n-1$  时结论成立, 则当  $n$  时, 由

$$\frac{y_1^2}{\frac{1}{\lambda_1}} + \cdots + \frac{y_{n-1}^2}{\frac{1}{\lambda_{n-1}}} \leq 1 - \frac{y_n^2}{\frac{1}{\lambda_n}}, \text{ 所以 } n-1 \text{ 时各半轴长为 } \sqrt{\frac{1}{\lambda_i} \left(1 - \frac{y_n^2}{1/\lambda_n}\right)}$$

故

$$\begin{aligned} V &= 2 \int_0^{\frac{1}{\sqrt{\lambda_n}}} (1 - \lambda_n y_n^2)^{\frac{n-1}{2}} \cdot \frac{\pi^{\frac{n-1}{2}}}{\Gamma\left(\frac{n-1}{2} + 1\right) \sqrt{\lambda_1 \cdots \lambda_{n-1}}} dy_n \\ &= \frac{2\pi^{\frac{n-1}{2}}}{\Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right) \sqrt{\lambda_1 \cdots \lambda_{n-1}}} \int_0^{\frac{1}{\sqrt{\lambda_n}}} (1 - \lambda_n y_n^2)^{\frac{n-1}{2}} dy_n \end{aligned}$$

最后一个积分中令  $\sqrt{\lambda_n} y_n = \cos \theta$ , 有

$$\int_0^{\frac{1}{\sqrt{\lambda_n}}} f(y_n) dy = \frac{1}{\sqrt{\lambda_n}} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n \theta d\theta = \frac{1}{\sqrt{\lambda_n}} \frac{\sqrt{\pi}}{2} \frac{\Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{n}{2} + 1\right)},$$

所以

$$V = \frac{\pi^{\frac{n}{2}} (\lambda_1 \cdots \lambda_n)^{-\frac{1}{2}}}{\Gamma\left(\frac{n}{2} + 1\right)} = \frac{\pi^{-\frac{n}{2}}}{\Gamma\left(\frac{n}{2} + 1\right)} (\det A)^{-\frac{1}{2}}.$$

注

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n \theta d\theta = \begin{cases} \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdots \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} & (n = \text{奇数}) \\ \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdots \frac{4}{5} \cdot \frac{2}{3} & (n = \text{偶数}) \end{cases}$$

$$\Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right) = \begin{cases} \frac{n-1}{2} \cdot \frac{n-3}{2} \cdots \frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) & (n=2k) \\ \frac{n-1}{2} \cdot \frac{n-3}{2} \cdots 1 \cdot \Gamma(1) & (n=2k+1) \end{cases}$$

$$\Gamma\left(\frac{n}{2} + 1\right) = \begin{cases} \frac{n}{2} \cdot \frac{n-2}{2} \cdots \frac{2}{2} & n=2k \\ \frac{n}{2} \cdot \frac{n-2}{2} \cdots \frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) & n=2k+1 \end{cases}$$

其中  $\Gamma(1)=1$ , 且显然有

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n \theta d\theta = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \frac{\Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{n}{2} + 1\right)}.$$

27. 设  $A=(a_{ij})$  是三阶正交方阵, 且  $\det A=1$ , 求证:

(1)  $\lambda=1$  必为  $A$  的特征值;

(2) 存在正交阵  $T$ , 使  $T^T A T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \varphi & \sin \varphi \\ 0 & -\sin \varphi & \cos \varphi \end{bmatrix}$ ;

(3)  $\varphi = \cos^{-1} \frac{a_{11} + a_{22} + a_{33} - 1}{2}$ .

证 (1) 因为  $A$  是正交方阵, 所以  $A^T A = I$ , 故

$$|I - A| = |A^T A - A| = |A^T - I| |A| = |A - I| = (-1)^3 |I - A| = -|I - A|,$$

所以  $\det(I - A) = 0$ , 故  $\lambda_1 = 1$  是  $A$  的特征根.

(2) 对  $\lambda_1 = 1$ , 存在  $x$ , 使  $Ax = \lambda_1 x = x$ , 把  $x$  单位化得  $\epsilon_1$ , 当然  $A\epsilon_1 = \epsilon_1$ . 把  $\epsilon_1$  扩充  $\epsilon_2, \epsilon_3$ , 使  $\epsilon_1, \epsilon_2, \epsilon_3$  为标准正交向量组 (即  $\mathbf{R}^3$  中标准正交基), 则取  $T = (\epsilon_1, \epsilon_2, \epsilon_3)$ , 有

$$B = T^{-1} A T = \begin{bmatrix} 1 & \alpha \\ 0 & A_2 \end{bmatrix}$$

其中  $A_2$  为 2 阶方阵,  $\alpha$  为行向量. 因为  $T$  为正交方阵, 所以  $T^T T = I, (T^{-1})^T T^{-1} = I$ .

故  $B^T B = (T^{-1} A T)^T (T^{-1} A T) = T^T A^T (T^{-1})^T T^{-1} A T = I$ , 即  $B$  仍为正交方阵. 由此知

$$I_3 = B^T B = \begin{bmatrix} 1 & \alpha \\ 0 & A_2 \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} 1 & \alpha \\ 0 & A_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \alpha \\ \alpha^T & \alpha^T \alpha + A_2^T A_2 \end{bmatrix},$$

所以  $\alpha = 0, A_2^T A_2 = I_2$

故  $A_2$  为正交阵, 又  $\det A_2 = \det A_3 = 1$ , 由 6 题知

$$A_2 = \begin{bmatrix} \cos \varphi & \sin \varphi \\ -\sin \varphi & \cos \varphi \end{bmatrix}.$$

(3) 因为  $A \sim B$ , 而相似的矩阵有相同的迹.

所以  $a_{11} + a_{22} + a_{33} = \text{tr} A = \text{tr} B = 1 + 2\cos \varphi$ ,

故  $\cos \varphi = \frac{1}{2}(a_{11} + a_{22} + a_{33} - 1)$ .

28. 欧几里得空间  $V$  的线性变换  $\mathcal{A}$  在由向量  $\alpha_1 = (1, 2, 1)^T, \alpha_2 = (1, 1, 2)^T, \alpha_3 = (1, 1, 0)^T$  组成的基下用矩阵  $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 0 & 5 & -1 \\ 2 & 7 & -3 \end{bmatrix}$  给出. 求伴随变换  $\mathcal{A}^*$  在同一基下的矩阵, 假定基向量的坐标是在某标准正交基下给出的.

证 设  $\mathcal{A}$  在标准正交基  $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$  下的方阵为  $A$ , 从基  $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$  到基  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  的过渡矩阵为  $T$ , 则  $T$  的列恰为已知  $\alpha_i$  的坐标列. 又设  $\mathcal{A}$  在基  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  下的方阵为  $B$ , 故有

$$B = T^{-1}AT \rightarrow A = TBT^{-1}.$$

又由定义知  $\mathcal{A}^*$  在基  $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$  下的方阵为  $A^T$ , 由此得  $\mathcal{A}^*$  在基  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  下的方阵表示为

$$B_1 = T^{-1}A^T T = T^{-1}(TBT^{-1})^T T = T^{-1}(T^{-1})^T B^T T^T T$$

记  $T^T T = P$ , 则

$$\begin{aligned} B_1 = P^{-1}B^T P &= \begin{bmatrix} 6 & 5 & 3 \\ 5 & 6 & 2 \\ 3 & 2 & 2 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 1 & 5 & 7 \\ 3 & -1 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 6 & 5 & 3 \\ 5 & 6 & 2 \\ 3 & 2 & 2 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} -5 & -3 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \\ 7 & 1 & -7 \end{bmatrix} P = \begin{bmatrix} -36 & -37 & -15 \\ 30 & 30 & 14 \\ 26 & 27 & 9 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

29. 在标准正交基  $e_1, e_2, e_3$  下, 求线性变换  $\mathcal{A}$  的伴随变换  $\mathcal{A}^*$  的矩阵表示, 其中  $\mathcal{A}$  分别变向量  $\alpha_1 = (0, 0, 1), \alpha_2 = (0, 1, 1), \alpha_3 = (1, 1, 1)$  为  $\beta_1 = (1, 2, 1), \beta_2 = (3, 1, 2), \beta_3 = (7, -1, 4)$ . 这里所有向量的坐标都在基  $e_1, e_2, e_3$  下给出.

解 设  $\mathcal{A}$  在基  $e_1, e_2, e_3$  下的方阵表示为  $A$ , 则  $\mathcal{A}^*$  在此基下的方阵为  $A^T$ .

因为  $\mathcal{A}\alpha_1 = \beta_1, \mathcal{A}\alpha_2 = \beta_2, \mathcal{A}\alpha_3 = \beta_3$ ,

故它们在基  $e_1, e_2, e_3$  下的坐标形式为

$$\beta_1^T = A\alpha_1^T, \beta_2^T = A\alpha_2^T, \beta_3^T = A\alpha_3^T,$$

这里  $\alpha_i^T, \beta_i^T$  分别代表向量  $\alpha_i, \beta_i$  在基  $e_1, e_2, e_3$  上的坐标列. 上式也就是向量  $\alpha_i$  与其在  $\mathcal{A}$  下的像  $\beta_i$  的坐标之间的关系式.

也可以写为  $(\beta_1^T, \beta_2^T, \beta_3^T) = A(\alpha_1^T, \alpha_2^T, \alpha_3^T)$

所以  $A = (\beta_1^T, \beta_2^T, \beta_3^T)(\alpha_1^T, \alpha_2^T, \alpha_3^T)^{-1}$

$$\begin{aligned} &= \begin{bmatrix} 1 & 3 & 7 \\ 2 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 7 \\ 2 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 4 & 2 & 1 \\ -2 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

所以  $\mathcal{A}^*$  在基  $e_1, e_2, e_3$  下的方阵为

$$A^T = \begin{bmatrix} 4 & -2 & 2 \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

30. 试举例说明, 如果方阵  $A$  的行向量两两正交, 它的列向量并不一定是两两正交的.

解 如单位方阵, 其行、列均是两两正交的, 但方阵

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

虽行是两两正交的, 但列向量却不是两两正交的.

31. 试证: 正交方阵的任一子方阵的特征根的模小于或等于 1.

证 设正交方阵

$$\Omega = \begin{bmatrix} \Omega_{11} & \Omega_{12} \\ \Omega_{21} & \Omega_{22} \end{bmatrix}$$

则由  $\Omega^T \Omega = I$  可得关系式

$$\Omega_{11}^T \Omega_{11} + \Omega_{21}^T \Omega_{21} = I.$$

对  $\Omega$  的子方阵  $\Omega_{11}$ , 设  $\lambda$  为其特征值,  $x$  为相应的特征向量, 于是有

$$\Omega_{11} x = \lambda x$$

两边取共轭转置后再与原式相乘有

$$\bar{\lambda} \bar{x}^T x = \bar{x}^T \Omega_{11}^T \Omega_{11} x = \bar{x}^T (I - \Omega_{21}^T \Omega_{21}) x,$$

$$\text{所以} \quad (1 - |\lambda|^2) \bar{x}^T x = \bar{x}^T \Omega_{21}^T \Omega_{21} x \geq 0$$

(因为  $\Omega_{21} x$  是一个列量, 右边是这个向量的模平方, 所以非负) 又  $\bar{x}^T x > 0$ ,

所以  $|\lambda| \leq 1$

又对  $\Omega$  的任一子方阵, 可通过交换行、列把它换到“西北角”, 这可通过方阵两边同乘第一种初等方阵完成. 且后者仍是正交方阵. (单位阵经交换两行后得到的方阵称为第一种初等方阵)

32. 如果  $A$  和  $B$  都是正交方阵, 且  $\det A = -\det B$ , 则方阵  $A+B$  是奇异方阵.

证 方法 1 因为  $A, B$  均正交方阵, 所以  $A^T B$  仍为正交方阵, 且  $\det(A^T B) = -1$ , 又复根共轭出现, 特征根模均为 1, 行列式等于特征值之积, 故  $-1$  为  $A^T B$  的特征根. 所以

$$|-I - A^T B| = 0 \rightarrow |I + A^T B| = 0$$

$$\text{故} \quad |A+B| = |A| |I + A^T B| = 0,$$

故  $A+B$  是奇异方阵.

方法 2 由  $A^T A = B^T B = I, \det A \neq 0$ , 可知

$$\det(A+B) = \det A \det(I + A^T B) \quad (*)$$

$$= \det B \cdot \det(I + B^T A) = -\det A \cdot \det(I + B^T A)$$

$$\text{于是得} \quad \det(I + A^T B) = -\det(I + B^T A) = -\det(I + A^T B)$$

因  $(I + B^T A)^T = I + A^T B$ , 故最后一个等号成立.

所以  $\det(I + A^T B) = 0$ , 再由  $(*)$  式即知有

$\det(A+B) = 0$ , 故  $A+B$  奇异.

33. 设方阵  $A$  的秩为  $r$ , 试证  $A$  能表成  $A = PTQ$ , 其中  $Q$  为  $n$  阶正交方阵,

$$T = \begin{bmatrix} \begin{bmatrix} t_{11} & & \\ \vdots & \ddots & \\ t_{r1} & & t_{rr} \end{bmatrix} & O^{(r, n-r)} \\ T_1^{(n-r, r)} & O^{(n-r, n-r)} \end{bmatrix}, \text{ 其中 } t_{ii} > 0 \ (i = 1, 2, \dots, r),$$

$P$  是第一种初等方阵之乘积.

证 因为  $r(A)=r$ , 故经第一种初等变换后可使方阵的前  $r$  行线性无关. 即设

$$P^{-1}A = \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_r \\ \vdots \\ \alpha_n \end{bmatrix}, \text{ 使 } \alpha_1, \dots, \alpha_r \text{ 线性无关}$$

把  $\alpha_1, \dots, \alpha_r$  正交化为  $Q_1, \dots, Q_r$ , 扩充为  $Q_1, \dots, Q_n$ , 有

$$R\alpha_1 + \dots + R\alpha_i = RQ_1 + \dots + RQ_i \quad 1 \leq i \leq r$$

即每个  $\alpha_i$  仅由  $Q_1, \dots, Q_i$  线性表出, 记为

$$\begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_r \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} t_{11} & & \\ \vdots & \ddots & \\ t_{r1} & \dots & t_{rr} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Q_1 \\ \vdots \\ Q_r \end{bmatrix}, \quad t_{ii} > 0,$$

见定理 9.1 Schmidt 正交化. 又因为  $\alpha_{r+1}, \dots, \alpha_n$  可由  $\alpha_1, \dots, \alpha_r$  线性表出, 所以可仅由  $Q_1, \dots, Q_r$  线性表出.

设

$$\begin{bmatrix} \alpha_{r+1} \\ \vdots \\ \alpha_n \end{bmatrix} = T_1 \begin{bmatrix} Q_1 \\ \vdots \\ Q_r \end{bmatrix},$$

故

$$P^{-1}A = \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_r \\ \vdots \\ \alpha_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} t_{11} & & & \\ \vdots & \ddots & & \\ t_{r1} & \dots & t_{rr} & \\ & T_1 & & \\ & & O & \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Q_1 \\ \vdots \\ Q_r \\ \vdots \\ Q_n \end{bmatrix}$$

两边左乘  $P$  即得结论.

注 可逆阵  $P$  的  $Q, R$  分解, 即  $P=QR$  的证明是对  $P$  的列做 Schmidt 正交化, 其中  $Q$  是正交方阵(其列是标准正交基),  $R$  是上三角阵, 取其转置得

$$P^T = R^T Q.$$

则  $R^T$  为下三角阵, 这样就得到对一个可逆阵的行做 Schmidt 正交化得到分解是一个下三角阵乘正交阵, 本题正是用的这个分解.

34. 设  $K$  是  $n$  阶斜对称方阵, 并设  $\lambda$  是它的纯虚特征根,  $\alpha$  是属于特征根  $\lambda$  的  $K$  的特征向量, 记  $\alpha = \beta + i\gamma$ , 试证:  $\beta$  和  $\gamma$  正交且长度相等.

证 方法 1 设  $\lambda = \mu i$  是  $K$  的特征根, 则有

$$K(\beta + i\gamma) = \mu i(\beta + i\gamma)$$

展开得

$$\begin{cases} K\beta = -\mu\gamma & \text{①} \\ K\gamma = \mu\beta & \text{②} \end{cases}$$

用  $\gamma^T$  左乘 ①  $\gamma^T K\beta = -\mu\gamma^T\gamma$ , ② 转置后右乘  $\beta$   $\gamma^T K\beta = \mu\beta^T\beta$

这两式左边相等, 故有  $\mu(\beta^T\beta - \gamma^T\gamma) = 0$  所以  $\beta^T\beta = \gamma^T\gamma$ , 即  $\beta$  与  $\gamma$  长度相等.

又因为  $K$  是斜对称的, 所以对任  $x$ , 恒有  $x^T Kx = 0$ , ① 左乘  $\beta^T$  得:  $\beta^T K\beta = -\mu\beta^T\gamma = 0$ ,

所以  $\beta^T\gamma = 0$ , 故  $\beta$  与  $\gamma$  正交.

证法 2 因为复根共轭出现, 所以当  $\lambda$  为  $K$  的特征根时,  $\bar{\lambda} = -i\mu$  也是  $K$  的特征根. 故由

$$K\alpha = \lambda\alpha \rightarrow K\bar{\alpha} = \bar{\lambda}\bar{\alpha},$$

又由  $K$  的属于不同特征值的特征向量是正交的, 于是有

$$\begin{aligned} 0 &= \langle \beta + i\gamma, \beta - i\gamma \rangle = \langle \beta, \beta \rangle + \langle i\gamma, \beta \rangle + \langle \beta, -i\gamma \rangle + \langle i\gamma, -i\gamma \rangle \\ &= \langle \beta, \beta \rangle - \langle \gamma, \gamma \rangle - i\langle \gamma, \beta \rangle - i\langle \beta, \gamma \rangle \end{aligned}$$

由实部为 0, 虚部为 0, 并利用  $\langle \beta, \gamma \rangle = \langle \gamma, \beta \rangle$  知

$$\langle \beta, \beta \rangle = \langle \gamma, \gamma \rangle, \quad \langle \beta, \gamma \rangle = 0.$$

35. 设  $A$  和  $B$  都是规范方阵, 如果  $AB$  也是规范方阵, 试证  $BA$  也是规范方阵.

证 此题利用: ① 定理 9.15;  $S$  是规范阵  $\Leftrightarrow \text{tr}SS^T = \sum_{j=1}^n |\lambda_j|^2$ , 其中  $\lambda_j$  为  $S$  的特征根;

② 对任  $n$  阶方阵  $P, Q$ ,  $\text{tr}PQ = \text{tr}QP$ ;  $|\lambda I - PQ| = |\lambda I - QP|$ . 也就是说  $PQ$  与  $QP$  的特征值和迹分别相等.

$$\begin{aligned} \text{tr}(BA)(BA)^T &= \text{tr}(BAA^T B^T) = \text{tr}BA^T AB^T \\ &= \text{tr}AB^T BA^T = \text{tr}ABB^T A^T = \text{tr}(AB)(AB)^T \\ &= \sum_{j=1}^n |\lambda_j^{(AB)}|^2 = \sum_{j=1}^n |\lambda_j^{(BA)}|^2. \end{aligned}$$

其中第二个等号是因为  $AA^T = A^T A$ ; 第三个等号是因为  $\text{tr}PQ = \text{tr}QP$ , 该处  $P = BA^T, Q = AB^T$ ; 第四个等号是因为  $B^T B = BB^T$ ; 第六个等号是用定理 9.15 的必要性; 第七个等号是因为  $AB$  与  $BA$  的特征值相同. 故由定理 9.15 的充分性知  $BA$  是规范方阵.

36. 设  $A$  是  $n$  阶实对称方阵, 且  $A^2 = A$ , 证明: 存在正交方阵  $T$ , 使得

$$T^{-1}AT = \begin{bmatrix} I_r & \\ & 0 \end{bmatrix}, \text{ 其中 } r = \text{rank}A.$$

证 方法 1 因为  $A^2 = A$ , 设  $\lambda$  为  $A$  的特征值,  $x$  为相应特征向量, 故由  $Ax = \lambda x$  知有

$$\lambda x = Ax = A^2 x = AAx = \lambda Ax = \lambda^2 x,$$

因  $x \neq 0$ , 所以  $\lambda^2 = \lambda$ , 故  $\lambda = 0$  或  $1$ , 又由定理 9.5 的系 2 知存在正交方阵  $T$ , 使

$$T^{-1}AT = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_r & \\ & 0 \end{bmatrix}.$$

方法2 由  $A(A-I)=0 \rightarrow r(A)+r(A-I)=n$ , 所以  $A$  属于特征值 0 和 1 的特征子空间维数和等于  $n$ . (事实上当  $r(A)=r < n$ ,  $\det A=0$ , 说明 0 是  $A$  的特征值,  $Ax=0$  的解空间是  $n-r$  维的, 恰是特征子空间的维数, 而  $\det(A-I)=0$ , 说明 1 是  $A$  的特征值,  $r(A-I)=n-r(A)=n-r$ , 所以  $(A-I)x$  的解空间是  $n-(n-r)=r$  维的) 在这两个子空间中选标准正交向量组, 又因为  $A$  是对称方阵, 所以其属于不同特征值的特征向量是正交的. 于是得正交方阵  $T$ , 使  $T^{-1}AT = \text{diag}\{1, \dots, 1, 0, \dots, 0\}$ .

37. 试证: 若  $2n+1$  阶正交方阵  $Q$  的行列式为 1, 则必有一个属于特征根 1 的特征向量.

证 因为  $AA^T = I, \det(A^T - I) = \det(A - I)^T = \det(A - I)$ ,

$$\begin{aligned} \text{所以 } |I - A| &= |AA^T - A| = |A||A^T - I| = |A||A - I| = |A - I| \\ &= (-1)^{2n+1} |I - A| = -|I - A|, \end{aligned}$$

故  $|I - A| = 0$ , 所以 1 是  $A$  的特征值. 于是  $(I - A)x = 0$  有非零解.

故  $A$  有一个属于特征根 1 的特征向量.

38. 设  $A, B$  均为  $n$  阶实对称方阵,  $A$  正定, 证明:  $tA + B$  对充分大的实数  $t$  也正定.

证 由定理 9.13, 存在可逆阵  $P$ , 使得

$$P^T A P = I, \quad P^T B P = \text{diag}\{d_1, \dots, d_n\},$$

则

$$P^T (tA + B) P = tI + \begin{bmatrix} d_1 & & \\ & \ddots & \\ & & d_n \end{bmatrix},$$

故只要取  $t > \max_i |d_i|$ , 就有  $t + d_i > 0 \quad i = 1, \dots, n$ . 于是知  $tA + B$  的正惯性指数为  $n$ , 故正定.

39. 设  $A, B$  均为半正定实对称  $n$  阶方阵, 证明  $AB$  的特征值是非负实数.

证 因为  $A \geq 0, B \geq 0$ , 所以存在  $n$  阶方阵  $P, Q$  使  $A = P^T P, B = Q^T Q$ , 则  $AB = P^T P Q^T Q$ , 而此方阵特征值与方阵

$$P Q^T Q P^T = (Q P^T)^T (Q P^T)$$

的特征值相同(参见 8.4 节 2 题). 而后者是半正定对称阵(事实上记  $M = P Q^T Q P^T$ , 则

①  $M^T = M$ , 故  $M$  是对称阵; ② 对任  $x$ , 有  $x^T M x = x^T P Q^T Q P^T x = (Q P^T x)^T (Q P^T x) \geq 0$ ),

故  $AB$  的特征值非负.

40. 设  $S$  是对称实方阵, 试证: 存在  $t > 0$  使

$$tI + S > 0, \quad -tI + S < 0.$$

证 由定理 9.5 系 2, 存在正交方阵  $\Omega$ , 使

$$\Omega^T S \Omega = \text{diag}\{\lambda_1, \dots, \lambda_n\},$$

$$\Omega^T (tI + S) \Omega = \begin{bmatrix} t + \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & t + \lambda_n \end{bmatrix}$$

所以当  $t > \max_i |\lambda_i|$  时  $t + \lambda_i > 0, i = 1, \dots, n$ , 于是  $tI + S > 0$ . 而此时也有  $-t + \lambda_i < 0$ , 故



$$-tI + S < 0.$$

41. 试证: 实方阵  $A$  是规范方阵的充要条件为它有极分解式

$$A = S\Omega = \Omega S.$$

其中  $\Omega$  是实正交方阵,  $S$  为实对称阵.

解 由定理 9.11 知: 对任实方阵  $A$ , 存在实正交方阵  $\Omega$  和半正定实对称阵  $S_1$  和  $S_2$ , 使得

$$A = S_2\Omega = \Omega S_1.$$

$\Rightarrow$  (必要性) 若  $A^T A = A A^T$ , 则

$$(\Omega S_1)^T \Omega S_1 = S_2 \Omega (\Omega S_1)^T$$

所以

$$S_1^T S_1 = S_2 S_2^T \rightarrow S_1^2 = S_2^2,$$

又因为  $S_1, S_2$  均半正定, 所以  $S_1^2, S_2^2$  均半正定故知

$$S = S_1^2 = S_2^2 \quad \text{故 } S_1 = S_2.$$

最后一步是用定理 9.9: 对任半正定实对称阵  $S$ , 存在唯一的半正定实对称方阵  $S_1$  使  $S = S_1^2$ .

$\Leftarrow$  当  $A = S\Omega = \Omega S$  时

$$A^T A = S^T \Omega^T \Omega S = S^T S = S S^T = S \Omega \Omega^T S^T = A A^T,$$

所以  $A$  是规范阵.

42. 第 13 题中的实对称方阵  $S$  中, 哪些是正定和半正定的? 对这样的  $S$  求对称方阵  $S_1$  使  $S = S_1^2$ .

解 只有(4)和(5)是正定的, 故只对这两个方阵进行分解. 由定理 9.7, 对实对称阵  $S$ , 存在正交方阵  $\Omega$ , 使

$$\Omega^T S \Omega = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n), \quad \lambda_i > 0, 1 \leq i \leq n.$$

所以

$$S = \Omega \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \Omega^T,$$

故令  $S_1 = \Omega \text{diag}(\sqrt{\lambda_1}, \dots, \sqrt{\lambda_n}) \Omega^T$ , 则有  $S = S_1^2$ .

(4)

$$\Omega = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} -2 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & -2 \\ 1 & 2 & 2 \end{bmatrix}$$

所以

$$S_1 = \Omega \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 2 & \\ & & \sqrt{7} \end{bmatrix} \Omega^T = \frac{1}{9} \begin{bmatrix} 12 + \sqrt{7} & 2\sqrt{7} & 6 - 2\sqrt{7} \\ 2\sqrt{7} & 6 + 4\sqrt{7} & 6 - 4\sqrt{7} \\ 6 - 2\sqrt{7} & 6 - 4\sqrt{7} & 9 + 4\sqrt{7} \end{bmatrix}.$$

(5)

$$\Omega = \begin{bmatrix} \frac{2}{\sqrt{5}} & -\frac{2}{3\sqrt{5}} & -\frac{1}{3} \\ 0 & \frac{\sqrt{5}}{3} & -\frac{2}{3} \\ \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{4}{3\sqrt{5}} & \frac{2}{3} \end{bmatrix},$$

$$S_1 = \Omega \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & \sqrt{10} \end{bmatrix} \Omega^T = \frac{1}{9} \begin{bmatrix} 8 + \sqrt{10} & -2 + 2\sqrt{10} & 2 - 2\sqrt{10} \\ -2 + 2\sqrt{10} & 5 + 4\sqrt{10} & 4 - 4\sqrt{10} \\ 2 - 2\sqrt{10} & 4 - 4\sqrt{10} & 5 + 4\sqrt{10} \end{bmatrix}.$$

43. 对第 12 题中的方阵  $S$ , 作如第 42 题.

解 12 题中(2), (3)是正定的, 故只对这两个方阵进行分解.

对  $S = \begin{bmatrix} 17 & -8 & 4 \\ -8 & 17 & -4 \\ 4 & -4 & 11 \end{bmatrix}$ , 取  $\Omega = \begin{bmatrix} \frac{2}{3} & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{18}} \\ -\frac{2}{3} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{18}} \\ \frac{1}{3} & 0 & \frac{4}{\sqrt{18}} \end{bmatrix}$

有

$$\Omega^T S \Omega = \begin{bmatrix} 27 & & \\ & 9 & \\ & & 9 \end{bmatrix}$$

则

$$S_1 = \Omega \begin{bmatrix} 3\sqrt{3} & & \\ & 3 & \\ & & 3 \end{bmatrix} \Omega^T = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 5 + 4\sqrt{3} & 4 - 4\sqrt{3} & -2 + 2\sqrt{3} \\ 4 - 3\sqrt{3} & 5 + 4\sqrt{3} & 2 - 2\sqrt{3} \\ -2 + 2\sqrt{3} & 2 - 2\sqrt{3} & 8 + \sqrt{3} \end{bmatrix}.$$

使  $S = S_1^2$  对

$$S = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}, \quad \text{取 } \Omega = \begin{bmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix},$$

则

$$S_1 = \Omega \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 2 \end{bmatrix} \Omega^T = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 4 & 1 & 1 \\ 1 & 4 & 1 \\ 1 & 1 & 4 \end{bmatrix},$$

使  $S = S_1^2$ .

44. 用正交变换把下面二次曲面方程变为标准形, 并写出变换矩阵.

$$2xy + 2xz + 2yz = 1.$$

解  $Q(x, y, z) = 2xy + 2xz + 2yz = (x, y, z)A(x, y, z)^T$  其中

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

对  $A$  求特征值, 得  $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = \lambda_3 = -1$ , 求  $A$  的属于不同特征值的特征向量: 解  $AX = 2X$

得  $\alpha = (1, 1, 1)^T$ , 单位化得  $\eta_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}\alpha$ ; 解  $AX = -X$  得解空间为 2 维的, 取两线性无关的解

并 Schmidt 正交化得  $\eta_2 = \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)^T$ ,  $\eta_3 = \frac{1}{\sqrt{6}}(-1, 2, -1)^T$ , 于是

$$T = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} \end{bmatrix}, \quad \text{使 } T^T A T = \begin{bmatrix} 2 & & \\ & -1 & \\ & & -1 \end{bmatrix}.$$

故在变换  $(x, y, z)^T = T(\tilde{x}, \tilde{y}, \tilde{z})^T$  下得二次曲面的标准方程:

$$2\tilde{x}^2 - \tilde{y}^2 - \tilde{z}^2 = 1$$

这是双叶双曲面.

## 9.4 补充题与解答

1. 已知  $A, B$  都是  $n$  阶实对称阵, 且  $A$  正定,  $B$  半正定, 证明:  $\det(A+B) \geq \det A$ .

证 方法 1 由定理 9.13, 存在可逆阵  $P$ , 使得

$$P^T A P = I$$

$$P^T B P = D = \text{diag}\{\lambda_1, \dots, \lambda_n\},$$

于是有

$$\begin{aligned} \det P^T (A+B) P &= \det(I+D) = (1+\lambda_1) \cdots (1+\lambda_n) \\ &\geq 1 = \det I = \det(P^T A P) \end{aligned}$$

即得  $(\det P)^2 \det(A+B) \geq (\det P)^2 \det A$ ,

所以  $\det(A+B) \geq \det A$ .

方法 2 由已知  $A$  正定, 所以  $A^{-1}$  存在. 故得

$$\det(A+B) = \det(A(I+A^{-1}B)) = (\det A) \cdot \det(I+A^{-1}B),$$

又因为  $A^{-1}$  正定, 所以存在可逆阵  $P$ , 使  $A^{-1} = P^T P$ , 且因  $B$  半正定, 故存在方阵  $Q$ , 使得  $B = Q^T Q$ , 于是有

$$\det(I+A^{-1}B) = \det(I+P^T P Q^T Q) = \det(I+P Q^T Q P^T),$$

最后一个等号是因为: 对任  $n$  阶方阵  $M, N$  有  $|I+MN| = |I+NM|$ , 这里  $M = P^T, N = P Q^T Q$ .

因为  $P Q^T Q P^T = (Q P^T)^T (Q P^T) \geq 0$ , 即  $P Q^T Q P^T$  是半正定的, 故存在正交方阵  $T$ , 使  $T^{-1}(P Q^T Q P^T) T = \text{diag}\{\mu_1, \dots, \mu_n\}$ , 其中  $\mu_i \geq 0$ , 所以

$$\det(I+A^{-1}B) = (\det T^{-1}) \det(I+P Q^T Q P^T) \det T$$

$$= \det \left[ I + \begin{bmatrix} \mu_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \mu_n \end{bmatrix} \right]$$

$$=(1+\mu_1)\cdots(1+\mu_n)\geq 1$$

故得

$$\det(A+B) = (\det A) \cdot \det(I+A^{-1}B) \geq \det A.$$

2. 设  $A$  为  $n$  阶实正交方阵

(1) 若  $\det A = -1$ , 证明  $-1$  必为  $A$  的特征值;

(2) 若  $\lambda = \alpha + i\beta$  ( $\beta \neq 0, \alpha, \beta$  是实数) 是  $A$  的特征值,  $X = X_1 + iX_2$  ( $X_1, X_2 \in \mathbf{R}^n$ ) 是  $A$  的属于特征值  $\lambda$  的特征向量, 试证明: 向量  $X_1$  与  $X_2$  的模相等, 且相互正交.

证 (1) 因为  $\det A = -1, A^T A = I$ , 故知

$$|-I - A| = |-A^T A - A| = |A| |-A^T - I| = -|-I - A|$$

所以  $|-I - A| = 0$ , 故  $-1$  为  $A$  的特征值.

(2) 因为  $\lambda = \alpha + i\beta$  是  $A$  的特征值,  $A$  为实方阵, 故其特征多项式  $P_A(\lambda)$  是实系数多项式, 其根成共轭对出现, 所以  $\bar{\lambda} = \alpha - i\beta$  也是  $A$  的特征根. 由  $AX = \lambda X$ , 知  $A\bar{X} = \bar{\lambda}\bar{X}$  (前式两端取共轭即得), 又因为正交方阵  $A$  的属于不同特征值的特征向量相互正交, 所以  $X$  与  $\bar{X}$  正交, 即有

$$\begin{aligned} 0 &= (X, \bar{X}) = (X_1 + iX_2, X_1 - iX_2) \\ &= (X_1, X_1) + i(X_2, X_1) + i(X_1, X_2) - (X_2, X_2) \end{aligned}$$

由实部, 虚部分别等于 0, 知

$$(X_1, X_2) = (X_2, X_2) \rightarrow |X_1| = |X_2|;$$

$$i(X_2, X_1) + i(X_1, X_2) = 2i(X_1, X_2) = 0, \rightarrow (X_1, X_2) = 0.$$

3. 设  $\mathcal{A}$  为欧几里得空间  $V$  中的反对称变换, 即对任  $\alpha, \beta \in V$ , 都有  $(\mathcal{A}\alpha, \beta) = -(\alpha, \mathcal{A}\beta)$ ,

(1) 证明  $\mathcal{A}$  在标准正交基下的矩阵是反对称矩阵;

(2) 若  $W$  是  $\mathcal{A}$  的不变子空间, 证明  $W^\perp$  也是  $\mathcal{A}$  的不变子空间.

证 (1) 取  $V$  的标准正交基  $\epsilon_1, \dots, \epsilon_n$ , 并设  $\mathcal{A}$  在此基下的方阵表示为  $A$ . 又对任  $\alpha,$

$\beta \in V$ , 设  $\alpha = \sum_{i=1}^n x_i \epsilon_i, \beta = \sum_{j=1}^n y_j \epsilon_j$ , 于是有

$(\mathcal{A}\alpha, \beta) = -(\alpha, \mathcal{A}\beta)$  对一切  $\alpha, \beta \in V$  成立, 特别对基向量成立, 所以  $(\mathcal{A}\epsilon_i, \epsilon_j) = -(\epsilon_i,$

$\mathcal{A}\epsilon_j)$ , 又由  $\mathcal{A}(\epsilon_1, \dots, \epsilon_n) = (\epsilon_1, \dots, \epsilon_n)A$ , 知  $\mathcal{A}\epsilon_i = \sum_{k=1}^n a_{ki} \epsilon_k, \mathcal{A}\epsilon_j = \sum_{k=1}^n a_{kj} \epsilon_k$ , 故

$$(\mathcal{A}\epsilon_i, \epsilon_j) = -(\epsilon_i, \mathcal{A}\epsilon_j) \Leftrightarrow \left( \sum_{k=1}^n a_{ki} \epsilon_k, \epsilon_j \right) = - \left( \epsilon_i, \sum_{k=1}^n a_{kj} \epsilon_k \right), \rightarrow a_{ji} = -a_{ij} \Leftrightarrow A^T = -A.$$

注 (1) 事实上可以写为  $V$  的线性变换  $\mathcal{A}$  是反对称变换的充要条件是  $\mathcal{A}$  在标准正交基下的矩阵为反对称阵. (我们以上给的是必要性的证明) 其证明可以简述如下: 对任  $\alpha, \beta \in V$

$$\begin{aligned} (\mathcal{A}\alpha, \beta) &= -(\alpha, \mathcal{A}\beta) \Leftrightarrow (\mathcal{A}\epsilon_i, \epsilon_j) = -(\epsilon_i, \mathcal{A}\epsilon_j) \\ &\Leftrightarrow a_{ji} = -a_{ij} \Leftrightarrow A^T = -A. \end{aligned}$$

(2) 因为  $V = W + W^\perp$ , 又因为  $W$  是  $\mathcal{A}$  的不变子空间, 所以任  $\beta \in W$ , 有  $\mathcal{A}\beta \in W$ . 于是,

$\forall \alpha \in W^\perp$ , (要证  $\mathcal{A}\alpha \in W^\perp$ ) 有

$(\mathcal{A}\alpha, \beta) = -(\alpha, \mathcal{A}\beta) = 0$  (因为  $\alpha \in W^\perp, \mathcal{A}\beta \in W$ ) 故  $\mathcal{A}\alpha \in W^\perp$ , 所以  $W^\perp$  是  $\mathcal{A}$  的不变子空间.

4. 设三阶实对称方阵  $A$  的特征值为  $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = \lambda_3 = -1$ , 对应于特征值  $\lambda_1$  的特征向量为  $\xi_1 = (1, 0, 1)^T$ , 求  $A$ .

解 因为实对称阵  $A$  的属于不同特征值的特征向量相互正交, 故知  $A$  的属于特征值  $-1$  的特征向量应在与  $\xi_1$  垂直的平面上. 取

$$x_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}\xi_1, \quad x_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad x_3 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix},$$

且令  $T = (x_1, x_2, x_3)$ , 则有

$$\begin{aligned} A &= T \begin{bmatrix} 1 & & \\ & -1 & \\ & & -1 \end{bmatrix} T^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & & \\ & -1 & \\ & & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

注 这里属于特征值  $\lambda = -1$  的特征子空间是二维的, 它等于  $L(x_2, x_3) = c_1 x_2 + c_2 x_3, (c_1, c_2 \in \mathbf{R})$ , 因此  $T$  的 2, 3 列的选取不唯一, 但不影响  $A$  的结论.

5. 设  $\alpha_1, \dots, \alpha_m$  和  $\beta_1, \dots, \beta_m$  是  $n$  维欧几里得空间的两个向量组, 试证明: 存在一个正交变换  $\mathcal{A}$ , 使  $\mathcal{A}(\alpha_i) = \beta_i, (i = 1, \dots, m)$  的充分必要条件是  $(\alpha_i, \alpha_j) = (\beta_i, \beta_j), i, j = 1, \dots, m$ .

证  $\Rightarrow$  必要性显然. 因为由已知有  $\mathcal{A}\alpha_i = \beta_i$ , 又因为正交变换保持内积不变, 故

$$(\alpha_i, \alpha_j) = (\mathcal{A}\alpha_i, \mathcal{A}\alpha_j) = (\beta_i, \beta_j), \quad i, j = 1, \dots, m.$$

$\Leftarrow$  当  $(\alpha_i, \alpha_j) = (\beta_i, \beta_j), i, j = 1, \dots, m$ . (1)

令  $V_1 = L(\alpha_1, \dots, \alpha_m), V_2 = L(\beta_1, \dots, \beta_m)$ , 且有

$$V = V_1 \oplus V_1^\perp = V_2 \oplus V_2^\perp, \quad (2)$$

现作  $V_1$  到  $V_2$  的映射  $\varphi_1$  如下: 任  $\alpha \in V_1$ , 记  $\alpha = \sum_{i=1}^m k_i \alpha_i$ , 则  $\varphi_1(\alpha) = \beta = \sum_{i=1}^m k_i \beta_i$ , 即

$$\varphi_1(k_1 \alpha_1 + \dots + k_m \alpha_m) = k_1 \beta_1 + \dots + k_m \beta_m, \quad (3)$$

则根据(1)式可推出  $\varphi_1$  为  $V_1$  到  $V_2$  的一个同构映射<sup>(1)</sup>. 故知

$$\dim V_1 = \dim V_2 \xrightarrow{\text{由(2)}} \dim V_1^\perp = \dim V_2^\perp,$$

于是可建立  $V_1^\perp$  到  $V_2^\perp$  的同构映射  $\varphi_2$ .

任  $\gamma \in V$ , 有  $\gamma = \gamma_1 + \gamma_1'$ , 其中  $\gamma_1 \in V_1, \gamma_1' \in V_1^\perp$ , 令

$$\mathcal{A}\gamma = \varphi_1 \gamma_1 + \varphi_2 \gamma_1',$$

可以验证  $\mathcal{A}$  是  $V$  的一个线性变换<sup>(2)</sup>, 且保持向量内积<sup>(3)</sup>, 所以  $\mathcal{A}$  是正交变换. 又由

$$\alpha_i = \alpha_i + 0,$$

所以  $\mathcal{A}(\alpha_i) = \varphi_1 \alpha_i + \varphi_2 0 = \varphi_1 \alpha_i = \beta_i, i=1, \dots, m.$

注 为了主体证明的思路清楚,有几个细节问题在此补证.

(1) 证  $\varphi_1$  是同构映射. 首先,显然  $\varphi_1$  为满射(因为任  $\beta \in V_2$ , 有  $\beta = \lambda_1 \beta_1 + \dots + \lambda_m \beta_m$ , 则  $\alpha = \lambda_1 \alpha_1 + \dots + \lambda_m \alpha_m$ , 使  $\varphi_1(\alpha) = \beta$ ). 而  $\varphi_1$  为单射  $\Leftrightarrow \text{Ker} \varphi_1 = 0$ , 设  $\alpha \in \text{Ker} \varphi_1 \subset V_1$ , 则  $\alpha =$

$$\sum_{i=1}^m k_i \alpha_i, \text{ 于是有 } 0 = \varphi_1(\alpha) = k_1 \beta_1 + \dots + k_m \beta_m,$$

$$\begin{aligned} \text{故 } 0 &= \left( \sum_{i=1}^m k_i \beta_i, \sum_{j=1}^m k_j \beta_j \right) = \sum_{i=1}^m k_i \sum_{j=1}^m k_j (\beta_i, \beta_j) \\ &= \sum_{i=1}^m k_i \sum_{j=1}^m k_j (\alpha_i, \alpha_j) = (\alpha, \alpha) \end{aligned}$$

所以  $\alpha=0$ , 故  $\varphi_1$  是单射.

(上式第 3 个等号是因为  $(\alpha_i, \alpha_j) = (\beta_i, \beta_j)$ ), 故知  $\varphi_1$  是双射, 又由③知  $\varphi_1$  保加法, 保数乘: 即

$$\varphi_1(\alpha + \beta) = \varphi_1 \alpha + \varphi_1 \beta, \quad \varphi_1(k\alpha) = k\varphi_1(\alpha),$$

对任  $\alpha, \beta \in V_1, k \in \mathbf{R}$  成立. 故此知  $\varphi_1$  是同构映射.

(2) 证  $\mathcal{A}$  是线性变换.  $\forall a, b \in V$ , 设  $a = a_1 + a_2, b = b_1 + b_2$ , 其中  $a_1, b_1 \in V_1, a_2, b_2 \in V_1^\perp$ . 有

$$\begin{aligned} \mathcal{A}(a+b) &= \mathcal{A}(a_1 + a_2 + b_1 + b_2) = \varphi_1(a_1 + b_1) + \varphi_2(a_2 + b_2) \\ &= \varphi_1 a_1 + \varphi_1 b_1 + \varphi_2 a_2 + \varphi_2 b_2 = \mathcal{A}a + \mathcal{A}b. \\ \mathcal{A}(ka) &= \mathcal{A}(ka_1 + ka_2) = \varphi_1(ka_1) + \varphi_2(ka_2) \\ &= k(\varphi_1 a_1 + \varphi_2 a_2) = k\mathcal{A}a. \end{aligned}$$

(3) 证  $\mathcal{A}$  保持向量的内积不变.  $\forall a, b \in V$ , 有

$$\begin{aligned} (\mathcal{A}a, \mathcal{A}b) &= (\varphi_1 a_1 + \varphi_2 a_2, \varphi_1 b_1 + \varphi_2 b_2) \\ &= (\varphi_1 a_1, \varphi_1 b_1) + (\varphi_2 a_2, \varphi_2 b_2) + (\varphi_1 a_1, \varphi_2 b_2) + (\varphi_2 a_2, \varphi_1 b_1) \\ &= (a_1, b_1) + (a_2, b_2) + (a_1, b_2) + (a_2, b_1) \\ &= (a_1 + a_2, b_1 + b_2) = (a, b). \end{aligned}$$

其中第 3 个等号是因为:

$$\begin{aligned} (\varphi_1 a_1, \varphi_1 b_1) &= (a_1, b_1), \quad \text{因为 } (\alpha_i, \alpha_j) = (\beta_i, \beta_j); \\ (\varphi_2 a_2, \varphi_2 b_2) &= (a_2, b_2), \quad \text{因为 } \varphi_2 \text{ 是同构映射;} \\ (\varphi_1 a_1, \varphi_2 b_2) &= 0 = (a_1, b_2); \\ (\varphi_2 a_2, \varphi_1 b_1) &= 0 = (a_2, b_1). \end{aligned}$$

6. 设  $\eta$  是欧几里得空间的一个单位向量, 对任  $\alpha \in V$ , 定义  $\mathcal{A}(\alpha) = \alpha - 2(\eta \cdot \alpha)\eta$ , 证明

(1)  $\mathcal{A}$  是正交变换(这样的变换称为镜面反射);

(2)  $\mathcal{A}$  是第二类的;

(3) 如果  $n$  维欧几里得空间中, 正交变换  $\mathcal{B}$  以 1 作为一个特征值, 且属于特征值 1 的特征子空间  $V_1$  的维数是  $n-1$ , 那么  $\mathcal{B}$  是镜面反射.

证 (1) 对  $\forall \alpha, \beta \in V$ , 有

$$\begin{aligned}\mathcal{A}(\alpha + \beta) &= (\alpha + \beta) - 2(\eta, \alpha + \beta)\eta = \alpha + \beta - 2(\eta, \alpha)\eta - 2(\eta, \beta)\eta \\ &= \mathcal{A}\alpha + \mathcal{A}\beta,\end{aligned}$$

$$\mathcal{A}(k\alpha) = k\alpha - 2(\eta, k\alpha)\eta = k[\alpha - 2(\eta, \alpha)\eta] = k\mathcal{A}\alpha,$$

所以  $\mathcal{A}$  是线性变换.

又有

$$(\mathcal{A}\alpha, \mathcal{A}\beta) = (\alpha - 2(\eta, \alpha)\eta, \beta - 2(\eta, \beta)\eta) = (\alpha, \beta),$$

于是  $\mathcal{A}$  是正交变换.

(2) 将  $\eta$  扩充为  $V$  的一组标准正交基  $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ , 则

$$\text{因为 } \mathcal{A}\eta = \eta - 2(\eta, \eta)\eta = -\eta$$

$$\mathcal{A}\eta_i = \eta_i, \quad (i=2, \dots, n)$$

故  $\mathcal{A}$  在此基下的方阵表示为

$$A = \text{diag}\{-1, 1, \dots, 1\}$$

因为  $\det A = -1$ , 所以  $\mathcal{A}$  是第二类的.

(3) 取  $V_1$  的一组标准正交基  $\epsilon_1, \dots, \epsilon_{n-1}$ , 则因为  $V_1$  是  $\mathcal{B}$  的不变子空间, 而  $\mathcal{B}$  是正交变换, 所以  $V_1^\perp$  也是  $\mathcal{B}$  的不变子空间. 且  $\dim V_1^\perp = \dim V - \dim V_1 = 1$ , 故任  $\epsilon_n \in V_1^\perp$  ( $\epsilon_n \neq 0$ ), 有  $\mathcal{B}\epsilon_n = k\epsilon_n$ . 又因为  $\mathcal{B}$  的实特征值为  $\pm 1$ , 而复根共轭出现, 及  $\mathcal{B}$  恰有  $n-1$  个属于特征值 1 的线性无关的特征向量, 所以  $k = -1$ . 于是知  $\mathcal{B}$  在基  $\epsilon_1, \dots, \epsilon_{n-1}, \epsilon_n$  下的方阵表示为

$$B = \text{diag}\{1, 1, \dots, 1, -1\}.$$

$\forall \alpha \in V$ , 设  $\alpha = x_1\epsilon_1 + x_2\epsilon_2 + \dots + x_n\epsilon_n$ , 有

$$\begin{aligned}\mathcal{B}(\alpha) &= \mathcal{B}(x_1\epsilon_1 + \dots + x_n\epsilon_n) = x_1\mathcal{B}\epsilon_1 + \dots + x_{n-1}\mathcal{B}\epsilon_{n-1} + x_n\mathcal{B}\epsilon_n \\ &= x_1\epsilon_1 + \dots + x_{n-1}\epsilon_{n-1} - x_n\epsilon_n \\ &= x_1\epsilon_1 + \dots + x_n\epsilon_n - 2x_n\epsilon_n = \alpha - 2(\alpha, \epsilon_n)\epsilon_n,\end{aligned}$$

所以  $\mathcal{B}$  是镜面反射.

## 第10章

### 酉空间

#### 10.1 定义与定理

**定义 10.1** 设  $V$  是复数域  $\mathbf{C}$  上线性空间,  $g$  是  $V \times V$  到  $\mathbf{C}$  中函数, 若  $g$  满足: 对任  $\alpha, \beta, \alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2 \in V, k \in \mathbf{C}$  有

$$\begin{aligned} g(\alpha_1 + \alpha_2, \beta) &= g(\alpha_1, \beta) + g(\alpha_2, \beta); & g(k\alpha, \beta) &= \bar{k}g(\alpha, \beta); \\ g(\alpha, \beta_1 + \beta_2) &= g(\alpha, \beta_1) + g(\alpha, \beta_2); & g(\alpha, k\beta) &= kg(\alpha, \beta). \end{aligned}$$

则称  $g$  为半双线性型, 或称型。

**定义 10.2** 设  $h$  是复线性空间  $V$  上半双线性型, 若对任  $\alpha, \beta \in V$  有

$$h(\alpha, \beta) = \overline{h(\beta, \alpha)},$$

则称  $h$  为 Hermite 型. 而  $\mathcal{H}(\alpha) = h(\alpha, \alpha)$  称为由  $h$  决定的 Hermite 二次型.

**引理 10.1** 设  $h$  是复线性空间  $V$  上半双线性型, 则  $h$  是 Hermite 型的充要条件是对任  $\alpha \in V, h(\alpha, \alpha)$  均为实数.

**引理 10.2** Hermite 型  $h$  由其决定的 Hermite 二次型  $\mathcal{H}$  所完全决定, 即有 (极化恒等式)

$$\begin{aligned} h(\alpha, \beta) &= \frac{1}{4}\mathcal{H}(\alpha + \beta) - \frac{1}{4}\mathcal{H}(-\alpha + \beta) + \frac{i}{4}\mathcal{H}(i\alpha + \beta) - \frac{i}{4}\mathcal{H}(-i\alpha + \beta) \\ &= \frac{1}{4} \sum_{m=1}^4 i^m \mathcal{H}(i^m \alpha + \beta). \quad (\alpha, \beta \in V) \end{aligned}$$

**定义 10.3** 满足  $H = \bar{H}^T$  的方阵称为 Hermite 方阵.

**定理 10.1** (1) 对数域  $F$  上任一  $n$  阶 Hermite 方阵  $H$ , 存在域  $F$  上可逆方阵  $P$ , 使得

$$\bar{P}^T H P = \text{diag}(a_1, \dots, a_n) \quad (a_i \in \mathbf{R}, 1 \leq i \leq n).$$

(2) 设  $V$  是数域  $F$  上  $n$  维线性空间,  $g$  是  $V$  上 Hermite 型, 则存在  $V$  的基使得

$$\begin{aligned} g(\alpha, \beta) &= a_1 \bar{x}_1 y_1 + \dots + a_n \bar{x}_n y_n \quad (a_i \in \mathbf{R}, 1 \leq i \leq n), \\ g(\alpha, \alpha) &= a_1 \bar{x}_1 x_1 + \dots + a_n \bar{x}_n x_n, \end{aligned}$$

其中  $x_1, \dots, x_n$  和  $y_1, \dots, y_n$  分别是  $\alpha$  与  $\beta$  的坐标.

系 对任一 Hermite 方阵  $H$ , 存在可逆复方阵  $P$  使得

$$\bar{P}^T H P = \begin{bmatrix} I_p & & \\ & -I_q & \\ & & 0 \end{bmatrix},$$

且  $p, q$  由  $H$  唯一决定.



**定义 10.4** 若对任非零向量  $\alpha \in V$ , 均有  $h(\alpha, \alpha) > 0$ , 则称 Hermite 型  $h(\alpha, \beta) = \bar{x}^T H y$  是正定的, 此时也称 Hermite 方阵  $H$  为正定的, 记为  $H > 0$ . 正定 Hermite 型也称为 Hermite 内积.

**定理 10.2** 设  $H$  为 Hermite 方阵, 则  $H > 0$  (即  $H$  正定).

- (1)  $H$  共轭相合于  $I$ ;
- (2) 存在可逆阵  $P$ , 使  $H = \bar{P}^T P$ ;
- (3)  $H$  的特征根均为正实数;
- (4)  $H$  的顺序主子式均为正实数;
- (5)  $H$  的所有主子式均为正实数.

**定理 10.3** 设  $H$  为 Hermite 方阵, 则以下命题等价:

- (1)  $H \geq 0$  (即对任列向量  $x$  有  $\bar{x}^T H x \geq 0$ , 此时称  $H$  半正定);
- (2)  $H$  共轭相合于  $\begin{bmatrix} I_r & \\ & 0 \end{bmatrix}$ ;
- (3)  $H = \bar{Q}^T Q$ , 其中  $Q$  是某方阵;
- (4)  $H$  的所有主子式均为非负实数;
- (5)  $H$  的特征值均是非负实数.

**定理 10.4** (1) Hermite 方阵的特征根均为实数;

(2) 斜 Hermite 方阵 (即满足  $G = -\bar{G}^T$ ) 的特征根均为纯虚数.

**定义 10.5** 设  $V$  是复线性空间, 若  $V$  上定义着正定 Hermite 型  $g$ , 则  $V$  称为 (对于内积  $g$  的) 酉空间,  $g$  称为内积.

**定义 10.6** 设  $V$  是酉空间,

- (1) 向量  $\alpha \in V$  的长度定义为  $\|\alpha\| = \sqrt{\langle \alpha, \alpha \rangle}$ ;
- (2) 非 0 向量  $\alpha, \beta \in V$  的夹角定义为  $\theta = \cos^{-1} \frac{|\langle \alpha, \beta \rangle|}{\|\alpha\| \|\beta\|}$ .
- (3) 若  $\langle \alpha, \beta \rangle = 0$ , 则称  $\alpha$  与  $\beta$  正交.

**定理 10.5** (Gram-Schmidt 正交化) 对酉空间  $V$  中任一基  $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ , 存在着  $V$  的标准正交基  $\epsilon_1, \dots, \epsilon_n$  使

$$C\alpha_1 + \dots + C\alpha_k = C\epsilon_1 + \dots + C\epsilon_k$$

对任意  $1 \leq k \leq n$  成立.

**定理 10.6** 设  $\epsilon_1, \dots, \epsilon_n$  为酉空间  $V$  的标准正交基, 设方阵  $P$  是从基  $\epsilon_1, \dots, \epsilon_n$  到基  $e_1, \dots, e_n$  的过渡方阵, 即

$$(e_1, \dots, e_n) = (\epsilon_1, \dots, \epsilon_n)P,$$

则当且仅当  $\bar{P}^T P = I$  时,  $e_1, \dots, e_n$  为标准正交基.

**定义 10.7** 满足  $\bar{U}^T U = I$  的方阵称为酉阵. 酉方阵全体对乘法形成群, 称为酉群.

**系 1** 设  $\alpha_1, \dots, \alpha_n$  是酉空间  $V$  的基, 则存在  $V$  的标准正交基  $\epsilon_1, \dots, \epsilon_n$  和上三角方阵  $T$  使

$$(\epsilon_1, \dots, \epsilon_n) = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)T,$$

且  $T$  的主对角线上元素均为正数.

系 2 对每个正定 Hermite 方阵  $G$ , 总存在上三角方阵  $T$  使得

$$\bar{T}^T G T = I.$$

系 3 对任一可逆复方阵  $A$ , 唯一地存在着主对角线上元素为正数的上三角方阵  $T$  使得  $U = AT$  为酉阵.

系 4 对任一可逆复方阵  $A$ , 存在唯一的酉阵  $U$  和主对角线元素为正数的上三角方阵  $T$  使得

$$A = UT;$$

也唯一地存在酉阵  $U_1$  和主对角线元素为正数的下三角方阵  $L$  使得

$$A = LU_1$$

引理 10.3 任一复方阵  $A$  酉相似于上三角形方阵.

引理 10.4 若复方阵  $N$  为规范方阵 (满足  $\bar{N}^T N = N \bar{N}^T$ ) 且  $N$  酉相似于

$$\begin{bmatrix} N_1 & N_3 \\ O & N_2 \end{bmatrix} = \bar{U}^T N U$$

则  $N_3 = 0$ . (其中  $U$  为酉阵).

定理 10.7 (规范方阵谱定理) 任一复规范方阵  $N$  必酉相似于对角阵

$$\bar{U}^T N U = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{bmatrix}.$$

系 1 Hermite 方阵  $H$  必酉相似于

$$\text{diag}\{\lambda_1, \dots, \lambda_n\}, \quad \lambda_k \text{ 为实数}, 1 \leq k \leq n.$$

系 2 酉方阵  $U$  必酉相似于

$$\text{diag}\{e^{i\theta_1}, \dots, e^{i\theta_n}\}, \quad \theta_k \text{ 为实数}, 1 \leq k \leq n.$$

系 3 斜 Hermite 方阵  $K$  必酉相似于

$$\text{diag}\{ia_1, \dots, ia_n\}, \quad ia_k \text{ 为纯虚数或 } 0, 1 \leq k \leq n.$$

定义 10.8 若酉空间  $V$  的线性变换  $\mathcal{A}$  在标准正交基下的方阵表示为规范方阵, Hermite 方阵, 酉方阵, 或斜 Hermite 方阵, 则分别称  $\mathcal{A}$  为规范变换, Hermite 变换, 酉变换, 或斜 Hermite 变换. Hermite 变换也称为自伴随变换.

引理 10.5 酉空间  $V$  的规范变换  $\mathcal{N}$  的不变子空间  $W$  的正交补  $W^\perp$  也为  $\mathcal{N}$  的不变子空间.

定理 10.7' 设  $\mathcal{N}$  是  $n$  维酉空间  $V$  的规范变换, 则  $\mathcal{N}$  有  $n$  个标准正交的特征向量  $e_1, \dots, e_n$ . 于是  $V$  可以分解为  $n$  个一维不变子空间的正交直和

$$V = \mathbb{C}e_1 \oplus \dots \oplus \mathbb{C}e_n$$

且在每个一维不变子空间上  $\mathcal{N}$  的作用为数乘:

$$\mathcal{N}e_k = \lambda_k e_k \quad (\lambda_k \in \mathbb{C}, 1 \leq k \leq n).$$

系 1' 设  $\mathcal{H}$  为  $n$  维酉空间  $V$  的 Hermite 变换, 则存在  $V$  的标准正交基  $e_1, \dots, e_n$  使

$$\mathcal{H}e_k = \lambda_k e_k \quad (\lambda_k \in \mathbb{R}, 1 \leq k \leq n).$$

系 2' 设  $\mathcal{U}$  为  $n$  维酉空间  $V$  的酉变换, 则存在  $V$  的标准正交基  $e_1, \dots, e_n$  使

$$\mathcal{U}e_k = e^{i\theta_k} e_k \quad (\theta_k \in \mathbb{R}, 1 \leq k \leq n).$$

系 3' 设  $\mathcal{K}$  为  $n$  维酉空间  $V$  的斜 Hermite 变换, 则存在  $V$  的标准正交基  $e_1, \dots, e_n$  使

$$\mathcal{K}e_k = \sqrt{-1}a_k e_k \quad (a_k \in \mathbf{R}, 1 \leq k \leq n).$$

定理 10.8 对于  $n$  维酉空间  $V$  的每个线性变换  $\mathcal{A}$ , 存在着  $V$  的唯一线性变换  $\mathcal{A}^*$  (称为  $\mathcal{A}$  的伴随) 使得

$$\langle \mathcal{A}^* \alpha, \beta \rangle = \langle \alpha, \mathcal{A} \beta \rangle,$$

对任意  $\alpha, \beta \in V$  成立. 设  $\mathcal{A}$  及  $\mathcal{A}^*$  在一标准正交基下的方阵为  $A$  和  $A^*$ , 则

$$A^* = \bar{A}^T.$$

系 设  $\mathcal{A}$  为有限维酉空间  $V$  的线性变换,  $W$  为  $\mathcal{A}$  的不变子空间, 则  $W^\perp$  为  $\mathcal{A}^*$  的不变子空间.

定义 10.9 酉空间  $V$  上的规范变换  $\mathcal{N}$ , Hermite 变换  $\mathcal{H}$ , 酉变换  $\mathcal{U}$ , 斜 Hermite 变换  $\mathcal{K}$  分别由以下关系刻画:

$$\mathcal{N}\mathcal{N}^* = \mathcal{N}^*\mathcal{N}, \mathcal{H}^* = \mathcal{H}, \mathcal{U}\mathcal{U}^* = I, \mathcal{K}^* = -\mathcal{K}.$$

定义 10.10 设  $\mathcal{A}$  为酉空间  $V_1$  到  $V_2$  的线性映射, 若  $\langle \mathcal{A}\alpha, \mathcal{A}\beta \rangle = \langle \alpha, \beta \rangle$ , (对所有  $\alpha, \beta \in V_1$ ), 则称  $\mathcal{A}$  保持内积. 保持内积的双射线性映射称为同构映射. 若存在  $\mathcal{A}$  为  $V_1$  到  $V_2$  的同构映射则称  $V_1$  与  $V_2$  同构.

定理 10.9 设  $V_1$  和  $V_2$  均为  $n$  维酉空间,  $\mathcal{A}$  是  $V_1$  到  $V_2$  的线性映射, 则下列命题等价:

- (1)  $\mathcal{A}$  保持内积;
- (2)  $\mathcal{A}$  是(酉空间的)同构(映射);
- (3)  $\mathcal{A}$  把任意标准正交基映为标准正交基;
- (4)  $\mathcal{A}$  把某一标准正交基映为标准正交基;
- (5)  $\mathcal{A}$  在  $V_1$  和  $V_2$  标准正交基下的方阵表示为酉方阵.

系 1 维数相同的酉空间均同构, 特别  $n$  维酉空间均同构于列向量空间  $\mathbf{C}^{(n)}$ , 其中  $x, y \in \mathbf{C}^{(n)}$  的内积为  $\langle x, y \rangle = \bar{x}^T y$ .

系 2 设  $\mathcal{U}$  为酉空间  $V$  的线性变换, 则以下命题等价:

- (1)  $\mathcal{U}$  保持内积;
- (2)  $\mathcal{U}$  是自同构;
- (3)  $\mathcal{U}$  把任意标准正交基映为标准正交基;
- (4)  $\mathcal{U}$  把某一标准正交基映为标准正交基;
- (5)  $\mathcal{U}^* \mathcal{U} = \mathcal{U} \mathcal{U}^* = I$ ;
- (6)  $\mathcal{U}$  在标准正交基下的方阵表示为酉方阵;
- (7)  $\mathcal{U}$  是有限多次旋转变换的复合.

定理 10.10 设  $\{N_i\} (i \in S)$  是一族  $n$  阶规范方阵, 两两可交换, 则存在酉方阵  $U$  使  $N_i (i \in S)$  同时对角化, 即

$$\bar{U}^T N_i U = \begin{bmatrix} \lambda_1(i) & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n(i) \end{bmatrix}, \quad (i \in S)$$

其中  $\lambda_k(i) \in \mathbf{C}$  是  $N_i$  的特征根.

**系 1** 设  $\{N_i\} (i \in S)$  是一族  $n$  阶两两可交换的规范方阵, 则  $N_i (i \in S)$  有  $n$  个两两正交的单位(长)公共特征向量  $e_1, \dots, e_n \in \mathbb{C}^{(n)}$ , 即

$$N_i e_k = \lambda_k(i) e_k \quad (1 \leq k \leq n)$$

对任意  $i \in S$  成立. 而酉空间  $\mathbb{C}^{(n)}$  分解为  $n$  个两两正交的一维子空间的直和

$$\mathbb{C}^{(n)} = \mathbb{C}e_1 \oplus \dots \oplus \mathbb{C}e_n.$$

(这里  $\alpha, \beta \in \mathbb{C}^{(n)}$  的内积定义为  $\bar{\alpha}^T \beta$ ).

**定理 10.11** 设  $\{N_i\} (i \in S)$  是一族两两可交换的  $n$  阶规范方阵, 则存在酉方阵  $U$  使  $N_i (i \in S)$  同时对角化, 即

$$\bar{U}^T N_i U = \begin{bmatrix} \lambda_1(i) I & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_m(i) I \end{bmatrix}, \quad (i \in S)$$

其中  $\lambda_1, \dots, \lambda_m$  是族  $\{N_i\}$  的互异根(映射)(即对其中任两根  $\lambda_k, \lambda_j$ , 总有某  $i \in S$  使  $\lambda_k(i) \neq \lambda_j(i)$ ).

**系 1** 设  $\{N_i\} (i \in S)$  是一族两两可交换的  $n$  阶规范方阵, 则该族有  $m < n$  个互异的根(映射)  $\lambda_k (k=1, \dots, m)$ . 以  $V_k = V(\lambda_k)$  记属于  $\lambda_k$  的公共特征子空间, 则  $\mathbb{C}^{(n)}$  有正交直和分解

$$\mathbb{C}^{(n)} = V_1 \oplus \dots \oplus V_m,$$

且对

$$\alpha = \alpha_1 + \dots + \alpha_m, \quad (\alpha_k \in V_k)$$

有

$$N_i \alpha = \lambda_1(i) \alpha_1 + \dots + \lambda_m(i) \alpha_m. \quad (i \in S)$$

**定理 10.10'** 设  $V$  是  $n$  维酉空间,  $\{\mathcal{N}_i\} (i \in S)$  是  $V$  上一族两两可交换的规范变换. 则  $\mathcal{N}_i (i \in S)$  有  $n$  个单位正交公共特征向量  $e_1, \dots, e_n \in V$ . 于是  $e_1, \dots, e_n$  是  $V$  的标准正交基,  $V$  分解为一维子空间的直和:

$$V = \mathbb{C}e_1 \oplus \dots \oplus \mathbb{C}e_n,$$

对

$$\alpha = a_1 e_1 + \dots + a_n e_n, \quad (a_i \in \mathbb{C})$$

有

$$\mathcal{N}_i \alpha = a_1 \lambda_1(i) e_1 + \dots + a_n \lambda_n(i) e_n, \quad (i \in S)$$

亦即每个  $\mathcal{N}_i$  可分解为

$$\mathcal{N}_i = \lambda_1(i) \mathcal{E}_1 + \dots + \lambda_n(i) \mathcal{E}_n,$$

其中  $\mathcal{E}_k$  是正则投影:

$$\mathcal{E}_k: V \rightarrow \mathbb{C}e_k,$$

$$\sum a_j e_j \mapsto a_k e_k.$$

**定义 10.11** 设  $\{\mathcal{N}_i\} (i \in S)$  是酉空间  $V$  上的一族线性变换. 映射

$$\lambda: \{\mathcal{N}_i\} \rightarrow \mathbb{C}$$

将被称为此族上的根(映射): 如果有一非零向量  $\alpha \in V$  使对每个  $\mathcal{N}_i$  均有

$$\mathcal{N}_i \alpha = \lambda(\mathcal{N}_i) \alpha \quad (\forall i \in S).$$

此  $\alpha$  称为属于根(映射)  $\lambda$  的公共特征向量. 而其全体, 即

$$V(\lambda) = \{\alpha \in V \mid \mathcal{N}_i \alpha = \lambda(\mathcal{N}_i) \alpha, \forall i \in S\}$$

称为此族的属于根(映射)  $\lambda$  的特征子空间.

**定理 10.11'** 设  $V$  是  $n$  维酉空间,  $\{\mathcal{N}_i\} (i \in S)$  是一族两两可交换的  $V$  上的规范变换, 则该族有  $m < n$  个互异的根(映射)  $\lambda_k (k=1, \dots, m)$ . 以  $V_k = V(\lambda_k)$  记属于  $\lambda_k$  的公共特征子空间, 即

$$V_k = \{\alpha \in V \mid \mathcal{N}_i \alpha = \lambda_k(i) \alpha, \forall i \in S\},$$

则  $V$  分解为两两正交的子空间的直和:

$$V = V_1 \oplus \dots \oplus V_m.$$

这里记  $\lambda_k(\mathcal{N}_i) = \lambda_k(i)$ .

**系 1'** 设如定理 10.11', 记  $\mathcal{E}_k$  是  $V$  到  $V_k$  的正则投影 ( $1 \leq k \leq m$ ), 即对

$$\alpha = \alpha_1 + \dots + \alpha_m \quad (\alpha_k \in V_k) \text{ 有 } \mathcal{E}_k(\alpha) = \alpha_k,$$

则  $\mathcal{E}_k \mathcal{E}_j = 0$  (当  $k \neq j$ ),  $1 = \mathcal{E}_1 + \dots + \mathcal{E}_m$ ,

且族中每个  $\mathcal{N}_i$  可分解为

$$\mathcal{N}_i = \lambda_1(i) \mathcal{E}_1 + \dots + \lambda_m(i) \mathcal{E}_m,$$

(这称为  $\mathcal{N}_i$  在族中的谱分解)

**引理 10.6** 酉空间  $V$  上的线性变换  $\mathcal{A}$  全体与型  $f$  全体间 1-1 对应:

$$f(\alpha, \beta) = \langle \alpha, \mathcal{A}\beta \rangle.$$

在同一标准正交基下, 二者的方阵为同一方阵  $A$ , 即

$$\mathcal{I}(\mathcal{A}\beta) = Ay, \quad f(\alpha, \beta) = \langle \alpha, \mathcal{A}\beta \rangle = \bar{x}^T Ay.$$

**定义 10.12** 标准正交基下方阵为规范方阵, Hermite 方阵, 酉方阵, 斜 Hermite 方阵的型分别称为规范型, Hermite 型, 酉型和斜 Hermite 型.

**系 1** 对  $n$  维酉空间  $V$  上任一(半双线性)型  $f$ , 存在  $V$  的标准正交基使  $f$  的方阵为上三角形方阵.

**系 2** 设  $f$  为  $n$  维酉空间  $V$  上的规范(半双线性)型, 则存在标准正交基使  $f$  的方阵为对角形, 特别对任意  $\alpha, \beta \in V$  有

$$f(\alpha, \beta) = \lambda_1 \bar{x}_1 y_1 + \dots + \lambda_n \bar{x}_n y_n \quad (\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{C}),$$

其中  $x = (x_1, \dots, x_n)^T, y = (y_1, \dots, y_n)^T$  为  $\alpha$  与  $\beta$  的坐标列.

**系 3(主轴定理)** 设  $f$  为  $n$  维酉空间  $V$  上的 Hermite 型, 则存在标准正交基使  $f$  的方阵为实对角形, 特别对任  $\alpha, \beta \in V$  有

$$f(\alpha, \beta) = \lambda_1 \bar{x}_1 y_1 + \dots + \lambda_n \bar{x}_n y_n, \quad (\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}),$$

其中  $x_1, \dots, x_n$  及  $y_1, \dots, y_n$  分别为  $\alpha, \beta$  的坐标.

**系 4** 设  $f$  为  $n$  维酉空间  $V$  上的酉(半双线性)型, 则存在标准正交基使  $f$  的方阵为对角形, 特别对任  $\alpha, \beta \in V$ , 设  $x_1, \dots, x_n$  及  $y_1, \dots, y_n$  分别为  $\alpha, \beta$  的坐标, 则

$$f(\alpha, \beta) = e^{i\theta_1} \bar{x}_1 y_1 + \dots + e^{i\theta_n} \bar{x}_n y_n, \quad (\theta_1, \dots, \theta_n \in \mathbb{R}).$$

**系 5** 设  $f$  为  $n$  维酉空间  $V$  上的斜 Hermite 型, 则存在标准正交基使  $f$  的方阵为对角形, 特别对任  $\alpha, \beta \in V$ , 其坐标分别为  $\{x_k\}, \{y_k\}$ , 则

$$f(\alpha, \beta) = \sqrt{-1}(a_1 \bar{x}_1 y_1 + \dots + a_n \bar{x}_n y_n), \quad (a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}).$$

**系 6** (1) Hermite 方阵  $H$  正定的充分必要条件是:

$H = N^2$ , 其中  $N$  为正定 Hermite 方阵, 由  $H$  唯一决定.

(2) Hermite 方阵  $H$  半正定的充分必要条件是:

$H=N^2$ , 其中  $N$  为半正定 Hermite 方阵, 由  $H$  唯一决定.

**定理 10.12(极分解定理)** 设  $V$  是  $n$  维酉空间,  $\mathcal{A}$  为其任一变换, 则

$$\mathcal{A} = \mathcal{U}\mathcal{H} = \mathcal{H}_1\mathcal{U}_1,$$

其中  $\mathcal{U}, \mathcal{U}_1$  为酉变换,  $\mathcal{H}$  和  $\mathcal{H}_1$  为半正定 Hermite 变换, 且  $\mathcal{H}$  和  $\mathcal{H}_1$  唯一由  $\mathcal{A}$  决定.

**系 1(方阵极分解)** 任一复方阵  $A$  可表为

$$A = UH = H_1U_1,$$

其中  $U, U_1$  为酉方阵,  $H$  和  $H_1$  为半正定 Hermite 方阵, 且  $H$  和  $H_1$  由  $A$  唯一决定.

**引理 10.7** 对任一  $n \times m$  复矩阵  $A$ , 总有酉方阵  $U_1$  及  $U_2$  使

$$U_1AU_2 = \begin{bmatrix} A_1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix},$$

其中  $A_1$  为  $r$  阶可逆方阵,  $r(A)=r$ .

**定理 10.13(矩阵的酉相抵标准形)** 设  $n \times m$  阶复矩阵  $A$  的秩为  $r$ , 则有酉方阵  $U_1$  和  $U_2$  使

$$A = U_1 \begin{bmatrix} \lambda_1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & \lambda_r & & \\ & & & 0 & \\ & & & & \ddots \\ & & & & & 0 \end{bmatrix} U_2,$$

其中  $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_r > 0, \lambda_1^2, \dots, \lambda_r^2$  为  $\bar{A}^T A$  的所有非 0 特征根.

**定义 10.13** 全体实正交变换称为正交群; 全体酉变换  $\mathcal{U}$  称为酉群.

**定义 10.14** 设  $V$  为线性空间,  $g$  是  $V$  上的非退化双线性型或半双线性型.  $(V, g)$  的一个自同构是指保持  $g$  不变的  $V$  的线性变换  $\mathcal{A}$ , 即  $\mathcal{A}$  满足

$$g(\mathcal{A}\alpha, \mathcal{A}\beta) = g(\alpha, \beta) \quad (\alpha, \beta \in V).$$

$(V, g)$  的自同构全体记为  $\text{Aut}(V, g)$ , 称为  $(V, g)$  的自同构群.

**定义 10.15** (1) 当  $g$  为实线性空间  $V$  上正定对称双线性型时,  $\text{Aut}(V, g)$  称为正交群;

(2) 当  $g$  为复线性空间  $V$  上正定 Hermite 型时,  $\text{Aut}(V, g)$  称为酉群;

(3) 当  $g$  为线性空间  $V$  上交错型时,  $\text{Aut}(V, g)$  称为辛群;

(4) 当  $g$  为实线性空间  $V$  上非正定对称双线性型时,  $\text{Aut}(V, g)$  称为 Lorentz 群.

## 10.2 解题方法介绍

**Gram-Schmidt 正交化程序:** 设  $\alpha_1, \dots, \alpha_n$  是酉空间  $V$  中基. 则令

$$\beta_1 = \alpha_1, \quad e_1 = \beta_1 / \|\beta_1\| = \alpha_1 / \|\alpha_1\|,$$

$$\beta_2 = \alpha_2 - \langle \overline{\alpha_2}, e_1 \rangle e_1, \quad e_2 = \beta_2 / \|\beta_2\|,$$

$$\beta_k = \alpha_k - \sum_{i=1}^{k-1} \langle \overline{\alpha_k}, e_i \rangle e_i, \quad e_k = \beta_k / \|\beta_k\|, \quad k = 3, \dots, n.$$

则  $e_1, \dots, e_n$  为酉空间标准正交基. 注意这里公式与欧几里得空间不同之处, 即每个  $e_i$  前系数要取共轭.

Cauchy-Schwarz 不等式的证明: 对任  $\alpha, \beta \in V$ ,

$$|\langle \alpha, \beta \rangle| \leq \|\alpha\| \|\beta\|.$$

用内积写出:  $\langle \alpha, \beta \rangle \overline{\langle \alpha, \beta \rangle} \leq \langle \alpha, \alpha \rangle \langle \beta, \beta \rangle$ .

证 设  $\alpha \neq 0$ , 对任  $\lambda \in \mathbb{C}$  有

$$\begin{aligned} 0 &\leq \langle \lambda\alpha + \beta, \lambda\alpha + \beta \rangle = \langle \lambda\alpha, \lambda\alpha \rangle + \langle \lambda\alpha, \beta \rangle + \langle \beta, \lambda\alpha \rangle + \langle \beta, \beta \rangle \\ &= \bar{\lambda}\lambda \langle \alpha, \alpha \rangle + \bar{\lambda}\langle \alpha, \beta \rangle + \lambda\langle \beta, \alpha \rangle + \langle \beta, \beta \rangle \\ &= \bar{\lambda}(\lambda\langle \alpha, \alpha \rangle + \langle \alpha, \beta \rangle) + \lambda\langle \beta, \alpha \rangle + \langle \beta, \beta \rangle \end{aligned}$$

取  $\lambda = -\langle \alpha, \beta \rangle / \langle \alpha, \alpha \rangle$ , 则有

$$-\frac{\langle \alpha, \beta \rangle \langle \beta, \alpha \rangle}{\langle \alpha, \alpha \rangle} + \langle \beta, \beta \rangle \geq 0$$

即

$$\langle \alpha, \beta \rangle \langle \alpha, \beta \rangle \leq \langle \alpha, \alpha \rangle \langle \beta, \beta \rangle.$$

### 10.3 习题与解答

1. 详细证明定理 10.1 (即 Hermite 方阵及 Hermite 型的有理标准形).

证 用归纳法: 对一阶方阵结论显然, 今假设对  $n-1$  阶方阵结论成立, 现在来看  $n$  阶方阵. 设  $H = (h_{ij})$ .

$$(1) \text{ 若 } h_{11} \neq 0, \text{ 记 } H = \begin{bmatrix} h_{11} & \bar{\alpha}^T \\ \alpha & H_{n-1} \end{bmatrix}, \text{ 令 } P_1 = \begin{bmatrix} 1 & -h_{11}^{-1}\bar{\alpha}^T \\ 0 & I_{n-1} \end{bmatrix},$$

$$\text{则 } \bar{P}_1^T H P_1 = \begin{bmatrix} h_{11} & 0 \\ 0 & H_{n-1} - \alpha h_{11}^{-1} \bar{\alpha}^T \end{bmatrix}.$$

其中  $H_{n-1} - \alpha h_{11}^{-1} \bar{\alpha}^T$  是  $n-1$  阶 Hermite 方阵, 由归纳假设存在可逆阵  $Q$ , 使  $\bar{Q}^T (H_{n-1} - \alpha h_{11}^{-1} \bar{\alpha}^T) Q$  为对角阵. 故取

$$P_2 = \begin{bmatrix} 1 & \\ & Q \end{bmatrix}, \quad \text{令 } P = P_1 P_2$$

则  $\bar{P}^T H P$  为对角阵.

(2) 若  $h_{11} = 0$ , 而  $h_{ii} \neq 0 (i \geq 2)$ , 可经  $1, i$  行 (和列) 对换使  $(1, 1)$  位元素不等于 0, 这只要取  $P = P_{1i}$  即可.

(3) 若  $h_{ii} = 0 (i = 1, \dots, n)$ , 但有某一  $h_{ij} \neq 0$ , 不妨设为  $h_{12} \neq 0$ , 令

$$P_1 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & & & \\ 1 & -1 & & & \\ & & 1 & & \\ & & & \ddots & \\ & & & & 1 \end{bmatrix}$$

则  $\bar{P}_1^T H P$  归于情形 (1).

以上证明若对 Hermite 型写出就是大块配方法. 见《高等代数学》225 页.

2. 详细证明定理 10.2 (即 Hermite 方阵正定的等价条件).

证 (0)  $\Rightarrow$  (1) 由  $H > 0$ , 所以对任非零列向量  $x, \bar{x}^T H x > 0$ , 故由定理 10.1 知存在可逆阵  $P$ , 使

$$\bar{P}^T H P = \text{diag}\{a_1, \dots, a_n\} \quad (a_i \in \mathbf{R}, 1 \leq i \leq n)$$

其中  $a_i > 0$ . 对任  $i$  成立. 再取  $P_1 = \text{diag}\left\{\frac{1}{\sqrt{a_1}}, \dots, \frac{1}{\sqrt{a_n}}\right\}$ , 则有  $\overline{(PP_1)}^T H (PP_1) = I$ .

(1)  $\Rightarrow$  (2) 因为  $H$  共轭相合于  $I$ , 所以存在可逆阵  $Q$ , 使

$$\bar{Q}^T H Q = I, \text{ 令 } P = Q^{-1}, \text{ 得 } H = \bar{P}^T P.$$

(2)  $\Rightarrow$  (0) 若  $H = \bar{P}^T P$ ,  $P$  可逆, 则对任非零列向量  $x$ , 有

$$\bar{x}^T H x = \overline{(Px)}^T (Px) > 0, \text{ 所以 } H > 0.$$

(3) 由定理 10.7 系 1, 存在酉阵  $U$ , 使  $\bar{V}^T H V = \text{diag}\{\lambda_1, \dots, \lambda_n\}$ , 故  $H > 0 \Leftrightarrow \lambda_i > 0$ .

(4)  $\Rightarrow$  因为  $H > 0$ , 所以  $\det H = \det(\bar{P}^T P) = |\det P|^2 > 0$ , 再因  $k$  个变数  $x_1, \dots, x_k$  的 Hermite 二次型

$$g_k(x_1, \dots, x_k) = g(x_1, \dots, x_k, 0, \dots, 0) > 0$$

所以 
$$\det H_k = \begin{vmatrix} h_{11} & \cdots & h_{1k} \\ \vdots & & \vdots \\ h_{k1} & \cdots & h_{kk} \end{vmatrix} > 0, \quad k = 1, 2, \dots, n-1.$$

特别  $g(x_1, 0, \dots, 0) > 0 \rightarrow h_{11} > 0$ .

$\Leftarrow$  记  $H$  的各阶顺序主子式为  $d_1, \dots, d_n$ , 由已知,  $d_i > 0, i = 1, \dots, n$ . 设

$$H = \begin{bmatrix} H_{n-1} & \beta \\ \bar{\beta}^T & h_{nn} \end{bmatrix}, \text{ 因为 } \det H_{n-1} > 0, \text{ 所以 } H_{n-1}^{-1} \text{ 存在.}$$

取

$$P = \begin{bmatrix} I_{n-1} & -H_{n-1}^{-1}\beta \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

则

$$\begin{aligned} \bar{P}^T H P &= \begin{bmatrix} I_{n-1} & 0 \\ -\bar{\beta}^T H_{n-1}^{-1} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} H_{n-1} & \beta \\ \bar{\beta}^T & h_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_{n-1} & -H_{n-1}^{-1}\beta \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} H_{n-1} & 0 \\ 0 & h_{nn} - \bar{\beta}^T H_{n-1}^{-1}\beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} H_{n-1} & 0 \\ 0 & b \end{bmatrix}, \end{aligned}$$

因为  $\det P = 1$ , 所以  $\det H = (\det H_{n-1})b$ , 故  $b = \frac{d_n}{d_{n-1}} > 0$ , 递推之, 有

$$H \cong \begin{bmatrix} H_{n-1} & 0 \\ 0 & \frac{d_n}{d_{n-1}} \end{bmatrix} \cong \begin{bmatrix} d_1 & & & \\ & \frac{d_2}{d_1} & & \\ & & \ddots & \\ & & & \frac{d_n}{d_{n-1}} \end{bmatrix},$$



因对角线元素全为正,所以  $H > 0$ .

(5) 充分性显然.

$\Rightarrow$  分别取  $x = (0, \dots, 0, x_i, 0, \dots, 0)^T$ , 则由  $g(x, x) > 0$ ,  $\rightarrow$  得  $h_{ii} > 0, i = 1, 2, \dots, n$ .

取  $x = (0, \dots, 0, x_i, 0, \dots, 0, x_j, 0, \dots, 0)^T$ , 可得

$$\begin{vmatrix} h_{ii} & h_{ij} \\ h_{ij} & h_{jj} \end{vmatrix} > 0 \quad i, j = 1, \dots, n$$

(因为  $g_{ij}(x_i, x_j) > 0$ , 所以其系数行列式  $> 0$ ).

一般可取  $x_{i_1}, \dots, x_{i_k} \neq 0$ , 而其余分量为 0, 得到

$$\begin{vmatrix} h_{i_1 i_1} & \cdots & h_{i_1 i_k} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ h_{i_k i_1} & \cdots & h_{i_k i_k} \end{vmatrix} > 0, \quad k = 3, \dots, n-1.$$

(因为  $g(x_{i_1}, \dots, x_{i_k}) > 0$ , 所以其系数行列式  $> 0$ ).

3. 详细证明定理 10.3 (即 Hermite 方阵半正定的等价条件).

证 (1)  $\Rightarrow$  (2) 由  $H \geq 0$ , 所以对任  $x$  均有  $\bar{x}^T H x \geq 0$ , 故知存在可逆阵  $P$ , 使

$$\bar{P}^T H P = \text{diag}\{a_1, \dots, a_n\}, \quad (0 \leq a_i \in \mathbf{R}, 1 \leq i \leq n)$$

不妨设  $a_1, \dots, a_r > 0, a_{r+1} = \dots = a_n = 0$ , 故取  $P_1 = \text{diag}\left\{\frac{1}{\sqrt{a_1}}, \dots, \frac{1}{\sqrt{a_r}}, 1, \dots, 1\right\}$  则有

$$(\bar{P} P_1)^T H (P P_1) = \begin{bmatrix} I_r & O \\ O & O \end{bmatrix}$$

(2)  $\Rightarrow$  (3) 由 (2) 存在可逆阵  $T$ , 使

$$\bar{T}^T H T = \begin{bmatrix} I_r & O \\ O & O \end{bmatrix} \rightarrow H = T \begin{bmatrix} I_r & O \\ O & O \end{bmatrix} \bar{T}^T = \bar{Q}^T Q$$

其中

$$Q = \begin{bmatrix} I_r & O \\ O & O \end{bmatrix} \bar{T}^T, \quad \text{有 } \text{rank} Q = \text{rank} H.$$

(3)  $\Rightarrow$  (1) 当  $H = \bar{Q}^T Q$  时, 有  $\bar{H}^T = (\overline{Q^T Q})^T = \bar{Q}^T Q = H$ , 且对任  $x$  有

$$\bar{x}^T H x = \bar{x}^T \bar{Q}^T Q x = (\overline{Qx})^T (Qx) \geq 0,$$

(因为  $Qx$  是一列向量, 上式相当于其模平方, 所以总是非负的, 等号仅当  $Qx = 0$  时成立).

以下证 (1)  $\Leftrightarrow$  (4)

方法 1: 对任  $\lambda > 0$  有

$$\bar{x}^T H x \geq 0 \Leftrightarrow \bar{x}^T (\lambda I + H) x = \lambda \bar{x}^T x + \bar{x}^T H x > 0 \quad (2)$$

$$\Leftrightarrow \lambda I + H \text{ 的所有主子式 } > 0 \quad (3)$$

由于 (2), (3) 式皆为  $\lambda$  的函数, 所以取极限  $\lambda \rightarrow 0$  即得

$$\bar{x}^T H x \geq 0 \Leftrightarrow H \text{ 的所有主子式 } \geq 0.$$

方法 2:  $\Rightarrow$  因为  $H \geq 0$  所以  $\det H = \det(\bar{Q}^T Q) = |\det Q|^2 \geq 0$ , 再因  $k$  个变数  $x_{i_1}, \dots, x_{i_k}$  的 Hermite 二次型

$$g_k(x_{i_1}, \dots, x_{i_k}) = g(0, \dots, x_{i_1}, \dots, x_{i_2}, \dots, x_{i_k}, 0, \dots, 0) \geq 0$$

所以 
$$\det H_k = \begin{vmatrix} h_{i_1 i_1} & \cdots & h_{i_1 i_k} \\ \vdots & & \vdots \\ h_{i_k i_1} & \cdots & h_{i_k i_k} \end{vmatrix} \geq 0, \quad k = 1, \cdots, n-1.$$

⇐当  $H$  的所有主子式均  $\geq 0$  时

$$|-\lambda I - H| = (-1)^n (\lambda^n + a_1 \lambda^{n-1} + \cdots + a_{n-1} \lambda + a_n)$$

其中  $a_i$  为  $H$  的  $i$  阶主子式之和 ( $i=1, \cdots, n$ ), 故上式在  $\lambda > 0$  时不为 0, 即  $H$  无负特征根, 所以  $H \geq 0$ .

4. 设  $M_n(F)$  为数域  $F$  上  $n$  阶方阵全体, 是  $F$  上  $n^2$  维线性空间. 对  $A = (a_{ij})$ ,  $B = (b_{ij})$ , 定义

$$g(A, B) = \langle A, B \rangle = \sum_{i,j} \overline{a_{ij}} b_{ij}.$$

证明  $g$  是  $V = M_n(F)$  上的 Hermite 内积 (即正定 Hermite 型). 并证明

$$\langle A, B \rangle = \text{tr}(\overline{A}^T B) = \text{tr}(B \overline{A}^T).$$

证 (1)  $g$  是半双线性型, 因为

$$\begin{aligned} g(A_1 + A_2, B) &= \sum_{i,j} (\overline{a_{ij}} + \overline{c_{ij}}) b_{ij} = \sum_{i,j} \overline{a_{ij}} b_{ij} + \sum_{i,j} \overline{c_{ij}} b_{ij} \\ &= g(A_1, B) + g(A_2, B), \quad g(kA, B) = \overline{k} g(A, B); \end{aligned}$$

同理有  $g(A, B_1 + B_2) = g(A, B_1) + g(A, B_2)$ ,  $g(A, kB) = k g(A, B)$ .

(2)  $g$  是 Hermite 型. 因为满足

$$g(A, B) = \sum_{ij} \overline{a_{ij}} b_{ij} = \sum_{ij} a_{ij} \overline{b_{ij}} = \overline{g(B, A)}.$$

(3)  $g$  是正定的. 因为对任  $A \in M_n(F)$  有

$$g(A, A) = \sum_{ij} \overline{a_{ij}} a_{ij} > 0, \quad (A \neq 0),$$

所以  $g$  是  $V$  上的 Hermite 内积.

又记

$$\overline{A}^T B = (W_{ij}), \quad B \overline{A}^T = (\mu_{ij}),$$

而

$$\begin{aligned} W_{ii} &= \overline{a_{1i}} b_{1i} + \cdots + \overline{a_{ni}} b_{ni} = \sum_{k=1}^n \overline{a_{ki}} b_{ki} \\ \mu_{ii} &= b_{i1} \overline{a_{11}} + \cdots + b_{in} \overline{a_{in}} = \sum_{k=1}^n b_{ik} \overline{a_{ik}} \end{aligned}$$

故

$$\begin{aligned} \text{tr}(\overline{A}^T B) &= \sum_{i=1}^n W_{ii} = \sum_{i,k} \overline{a_{ki}} b_{ki} = g(A, B), \\ \text{tr}(B \overline{A}^T) &= \sum_{i=1}^n \mu_{ii} = \sum_{i,k} \overline{a_{ik}} b_{ik} = g(A, B). \end{aligned}$$

5. 设  $V$  是  $[0, 1]$  区间上复值连续函数全体, 证明以下是 Hermite 内积:

$$\langle f, g \rangle = \int_0^1 \overline{f(t)} g(t) dt.$$

证 (1) 因为  $\langle f_1 + f_2, g \rangle = \int_0^1 \overline{(f_1 + f_2)} g dt = \int_0^1 \bar{f}_1 g dt + \int_0^1 \bar{f}_2 g dt = \langle f_1, g \rangle + \langle f_2, g \rangle$ ;

$$\langle kf, g \rangle = \int_0^1 \overline{kf} g dt = \bar{k} \int_0^1 \bar{f} g dt = \bar{k} \langle f, g \rangle$$

同理有  $\langle f, g_1 + g_2 \rangle = \langle f, g_1 \rangle + \langle f, g_2 \rangle$ ;  $\langle f, kg \rangle = k \langle f, g \rangle$ .

所以  $\langle f, g \rangle$  是半双线性型.

(2) 又因为

$$\langle f, g \rangle = \int_0^1 \bar{f} g dt = \int_0^1 \overline{g f} dt = \overline{\langle g, f \rangle}.$$

所以是 Hermite 二次型(以上也称为共轭对称性)

(3) 对任  $f \in V$  有

$$\langle f, f \rangle = \int_0^1 \bar{f} f dt = \int_0^1 |f|^2 dt > 0, \quad (f \neq 0)$$

故  $\langle f, g \rangle$  是  $V$  上的 Hermite 内积.

6. 设  $g$  是  $V_2$  的 Hermite 内积,  $\varphi: V_1 \rightarrow V_2$  是线性映射单射, 则  $g \circ \varphi$  是  $V_1$  的 Hermite 内积. (若记  $g(\alpha, \beta) = \langle \alpha, \beta \rangle$ , 则  $(g \circ \varphi)(x, y) = \langle \varphi x, \varphi y \rangle$ ).

证 由(1)  $g$  是  $V_2$  的内积, 故对任  $\alpha, \beta, \alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2 \in V_2, k \in \mathbb{C}$  有:

$$\textcircled{1} g(\alpha_1 + \alpha_2, \beta) = g(\alpha_1, \beta) + g(\alpha_2, \beta), g(k\alpha_1, \beta) = \bar{k} g(\alpha_1, \beta);$$

$$g(\alpha, \beta_1 + \beta_2) = g(\alpha, \beta_1) + g(\alpha, \beta_2), g(\alpha, k\beta) = k g(\alpha, \beta);$$

$$\textcircled{2} g(\alpha, \beta) = \overline{g(\beta, \alpha)}; \textcircled{3} g(\alpha, \alpha) > 0, \alpha \neq 0$$

(2)  $\varphi$  是线性映射单射. 故对任  $x_1, x_2 \in V_1, k \in \mathbb{C}$  有

$$\textcircled{1} \varphi(x_1 + x_2) = \varphi(x_1) + \varphi(x_2), \varphi(kx) = k\varphi(x).$$

$$\textcircled{2} \text{ 若 } x_1 \neq x_2, \text{ 则 } \varphi(x_1) \neq \varphi(x_2).$$

由以上两个已知条件, 可得对任  $x, y, x_1, x_2, y_1, y_2 \in V_1, k \in \mathbb{C}$  有

$$\begin{aligned} \textcircled{1} (g \circ \varphi)(x_1 + x_2, y) &= \langle \varphi(x_1 + x_2), \varphi(y) \rangle \stackrel{(2)}{=} \langle \varphi x_1 + \varphi x_2, \varphi y \rangle \\ &\stackrel{(1)}{=} \langle \varphi x_1, \varphi y \rangle + \langle \varphi x_2, \varphi y \rangle \stackrel{(2)}{=} (g \circ \varphi)(x_1, y) + (g \circ \varphi)(x_2, y); \\ (g \circ \varphi)(kx, y) &= \langle \varphi(kx), \varphi y \rangle = \langle k\varphi x, \varphi y \rangle = \bar{k} (g \circ \varphi)(x, y); \end{aligned}$$

同理可得

$$(g \circ \varphi)(x, y_1 + y_2) = (g \circ \varphi)(x, y_1) + (g \circ \varphi)(x, y_2)$$

$$(g \circ \varphi)(x, ky) = k(g \circ \varphi)(x, y).$$

$$\textcircled{2} (g \circ \varphi)(x, y) = \langle \varphi x, \varphi y \rangle \stackrel{(1)}{=} \overline{\langle \varphi y, \varphi x \rangle} \stackrel{(2)}{=} \overline{(g \circ \varphi)(y, x)}$$

$$\textcircled{3} \text{ 对任 } 0 \neq x \in V_1$$

$$(g \circ \varphi)(x, x) = \langle \varphi x, \varphi x \rangle = g(\varphi(x), \varphi(x)) \stackrel{(1)}{>} 0.$$

所以  $g \circ \varphi$  是  $V_1$  的内积, 即它是正定的 Hermite 型.

7. 设  $g$  是  $V$  上 Hermite 内积, 证明:  $g(\alpha, \beta) = 0$  对任意  $\beta \in V$  成立当且仅当  $\alpha = 0$ .

证  $\Rightarrow$  当  $\beta = \alpha$  时, 有  $g(\alpha, \alpha) = 0$ , 由  $g$  正定, 所以  $\alpha = 0$ ;

$\Leftarrow$  当  $\alpha = 0$  时, 有  $g(\alpha, \beta) = g(0 \cdot \alpha_1, \beta) = 0 \cdot g(\alpha_1, \beta) = 0$

对任  $\beta \in V$  成立.

8. 证明:  $V$  上两 Hermite 内积  $g_1$  和  $g_2$  的和仍为 Hermite 内积, 内积  $g$  的正常数倍仍为内积.

证 首先给出两个内积的和, 及内积的正常数倍的定义: 对任  $\alpha, \beta \in V, k > 0$

$$(g_1 + g_2)(\alpha, \beta) \stackrel{D}{=} g_1(\alpha, \beta) + g_2(\alpha, \beta); (kg)(\alpha, \beta) = k(g(\alpha, \beta)).$$

故由已知  $g_1, g_2, g$  是内积, 则对任  $\alpha, \beta, \alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2 \in V, k \in F$  有

$$\textcircled{1} (g_1 + g_2)(\alpha_1 + \alpha_2, \beta) = g_1(\alpha_1 + \alpha_2, \beta) + g_2(\alpha_1 + \alpha_2, \beta) = g_1(\alpha_1, \beta) + g_1(\alpha_2, \beta) + g_2(\alpha_1, \beta) + g_2(\alpha_2, \beta) = (g_1 + g_2)(\alpha_1, \beta) + (g_1 + g_2)(\alpha_2, \beta);$$

$$(g_1 + g_2)(k\alpha, \beta) = g_1(k\alpha, \beta) + g_2(k\alpha, \beta) = \bar{k}g_1(\alpha, \beta) + \bar{k}g_2(\alpha, \beta) = \bar{k}(g_1 + g_2)(\alpha, \beta);$$

同理可得

$$(g_1 + g_2)(\alpha, \beta_1 + \beta_2) = (g_1 + g_2)(\alpha, \beta_1) + (g_1 + g_2)(\alpha, \beta_2),$$

$$(g_1 + g_2)(\alpha, k\beta) = k(g_1 + g_2)(\alpha, \beta).$$

$$\textcircled{2} (g_1 + g_2)(\alpha, \beta) = g_1(\alpha, \beta) + g_2(\alpha, \beta) = \overline{g_1(\beta, \alpha)} + \overline{g_2(\beta, \alpha)} = \overline{(g_1 + g_2)(\beta, \alpha)}.$$

③ 对  $\alpha \neq 0$  有

$$(g_1 + g_2)(\alpha, \alpha) = g_1(\alpha, \alpha) + g_2(\alpha, \alpha) > 0.$$

由上知  $g_1 + g_2$  是半双线性型, 有共轭对称性及正定性, 故  $g_1 + g_2$  是 Hermite 内积.

对  $kg(k > 0)$  同样讨论它的①半双线性, ②共轭对称性, ③正定性, 可知  $kg$  亦是 Hermite 内积. (当  $g$  是内积时).

9. 在酉空间中证明平行四边形法则:

$$\|\alpha + \beta\|^2 + \|\alpha - \beta\|^2 = 2\|\alpha\|^2 + 2\|\beta\|^2.$$

证

$$\begin{aligned} \text{左边} &= \langle \alpha + \beta, \alpha + \beta \rangle + \langle \alpha - \beta, \alpha - \beta \rangle \\ &= \langle \alpha, \alpha \rangle + \langle \beta, \beta \rangle + \langle \alpha, \beta \rangle + \langle \beta, \alpha \rangle + \langle \alpha, \alpha \rangle + \langle -\beta, -\beta \rangle + \langle \alpha, -\beta \rangle + \langle -\beta, \alpha \rangle \\ &= 2\langle \alpha, \alpha \rangle + 2\langle \beta, \beta \rangle = \text{右边}. \end{aligned}$$

10. 求第 4 题中一标准正交基.

解 记  $E_{ij}$  为  $(i, j)$  位元素为 1, 而其余元素为 0 的  $n$  阶方阵, 则

$$E_{11}, \dots, E_{1n}, E_{21}, \dots, E_{2n}, \dots, E_{n1}, \dots, E_{nn},$$

为 4 题中一标准正交基. 任  $A = (a_{ij}) \in M_n(F)$  在此标准正交基下的坐标为

$$(a_{11}, \dots, a_{1n}, a_{21}, \dots, a_{2n}, \dots, a_{n1}, \dots, a_{nn})^T \in F^{(n^2)},$$

而 4 题中内积  $\text{tr}(\bar{A}^T B) = \sum_{i,j=1}^n \bar{a}_{ij} b_{ij}$ , 正相当于  $F^{(n^2)}$  中内积

$$(x, y) = \sum_{i=1}^{n^2} \bar{x}_i y_i = \bar{x}_1 y_1 + \dots + \bar{x}_{n^2} y_{n^2}.$$

\* 11. 令  $f_n(x) = \sqrt{2} \cos 2\pi n x, g_n(x) = \sqrt{2} \sin 2\pi n x$ . 对第 5 题中空间和内积证明

(1)  $\{1, f_1, g_1, f_2, g_2, \dots\}$  是标准正交基.

(2)  $e^{i2\pi n x} (n \in \mathbb{Z})$  是标准正交基.

证 (1) 因为  $\langle 1, 1 \rangle = \int_0^1 1 dt = 1$ ,

$$\langle f_n, f_n \rangle = \int_0^1 2\cos^2 2\pi n t dt = \int_0^1 (1 + \cos 4\pi n t) dt = 1,$$

$$\langle g_n, g_n \rangle = \int_0^1 2\sin^2 2\pi n t dt = \int_0^1 (1 - \cos 4\pi n t) dt = 1,$$

$$\langle 1, f_n \rangle = \int_0^1 \sqrt{2} \cos 2\pi n t dt = \frac{\sqrt{2}}{2n\pi} \sin 2\pi n t \Big|_0^1 = 0$$

$$\langle 1, g_n \rangle = \int_0^1 \sqrt{2} \sin 2\pi n t dt = 0,$$

$$\langle f_m, f_n \rangle = \int_0^1 2\cos 2\pi m t \cos 2\pi n t dt = \int_0^1 [\cos 2\pi(m+n)t + \cos 2\pi(m-n)t] dt = 0, m \neq n,$$

$$\langle g_m, g_n \rangle = \int_0^1 2\sin 2\pi m t \sin 2\pi n t dt = \int_0^1 [\cos 2\pi(m-n)t - \cos 2\pi(m+n)t] dt = 0, m \neq n,$$

$$\langle f_m, g_n \rangle = \int_0^1 2\cos 2\pi m t \sin 2\pi n t dt = \int_0^1 [\sin 2\pi(m+n)t - \sin 2\pi(n-m)t] dt = 0,$$

故  $\{1, f_1, g_1, \dots\}$  是标准正交基.

$$(2) \langle e^{i2\pi m x}, e^{i2\pi n x} \rangle = \int_0^1 e^{-i2\pi m x} \cdot e^{i2\pi n x} dx = \int_0^1 e^{i2\pi(n-m)x} dx = \begin{cases} 1, m = n \\ 0, m \neq n \end{cases}$$

故  $e^{i2\pi n x} (n \in \mathbb{Z})$  是标准正交基.

12. 对第 4, 5 题中的内积, 叙述 Schwarz 不等式的相应结果.

解 Schwarz 不等式: 对任  $\alpha, \beta \in$  酉空间, 有

$$|\langle \alpha, \beta \rangle| \leq \|\alpha\| \|\beta\|.$$

(1) (4 题中内积下), 对任  $A, B \in M_n(F)$ , 有

$$|\operatorname{tr}(\bar{A}^T B)| \leq (\operatorname{tr}(\bar{A}^T A) \cdot \operatorname{tr}(\bar{B}^T B))^{\frac{1}{2}},$$

也即

$$\left| \sum_{i,j=1}^n \bar{a}_{ij} b_{ij} \right|^2 \leq \left( \sum_{i,j=1}^n |a_{ij}|^2 \right) \left( \sum_{i,j=1}^n |b_{ij}|^2 \right).$$

(2) (5 题中内积下), 对任  $f, g \in V$ , 有

$$\left| \int_0^1 \overline{f(t)} g(t) dt \right| \leq \left( \int_0^1 \overline{f(t)} f(t) dt \cdot \int_0^1 \overline{g(t)} g(t) dt \right)^{\frac{1}{2}}.$$

13. 证明: 若酉空间中向量  $\beta$  是正交向量集  $\alpha_1, \dots, \alpha_m$  的线性组合, 则

$$\beta = \sum_{k=1}^m \frac{\langle \alpha_k, \beta \rangle}{\|\alpha_k\|^2} \alpha_k;$$

证 设

$$\beta = x_1 \alpha_1 + \dots + x_m \alpha_m,$$

两边用  $\alpha_k$  做内积, 得

$$\langle \alpha_k, \beta \rangle = \langle \alpha_k, \sum_{i=1}^m x_i \alpha_i \rangle = \sum_{i=1}^m x_i \langle \alpha_k, \alpha_i \rangle = x_k \langle \alpha_k, \alpha_k \rangle,$$

所以

$$x_k = \langle \alpha_k, \beta \rangle / \langle \alpha_k, \alpha_k \rangle$$

故得证.

14. 设  $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$  为可逆复方阵, 求主对角线上元素为正数的上三角形方阵  $T$ , 使  $U$

$=AT$  为酉方阵.

解 方法 1 设  $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = (\alpha_1, \alpha_2)$ , 对  $\alpha_1, \alpha_2$  进行 Schmidt 正交化得:

$$e_1 = \frac{\beta_1}{\|\beta_1\|} = \frac{\alpha_1}{\|\alpha_1\|} = \frac{1}{\sqrt{|a|^2 + |c|^2}} \begin{bmatrix} a \\ c \end{bmatrix} = (\alpha_1, \alpha_2) \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{|a|^2 + |c|^2}} \\ 0 \end{bmatrix},$$

$$\beta_2 = \alpha_2 - \frac{\bar{a}b + \bar{c}d}{|a|^2 + |c|^2} \alpha_1 = (\alpha_1, \alpha_2) \begin{bmatrix} -\frac{\bar{a}b + \bar{c}d}{|a|^2 + |c|^2} \\ 1 \end{bmatrix},$$

所以  $U = (e_1, e_2) = AT = (\alpha_1, \alpha_2) \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{|a|^2 + |c|^2}} & -\frac{\bar{a}b + \bar{c}d}{|a|^2 + |c|^2} k \\ 0 & k \end{bmatrix}$

又因为  $|\det U| = 1$ ,  $|\det A| = |ad - bc|$ ,  $|\det T| = k \cdot \frac{1}{\sqrt{|a|^2 + |c|^2}}$ , 故由  $U = AT$  两边取行列式得

$$k = \sqrt{|a|^2 + |c|^2} / |ad - bc|,$$

所以  $T = \begin{bmatrix} \frac{1}{\rho} & -\frac{\bar{a}b + \bar{c}d}{\rho |ad - bc|} \\ 0 & \frac{\rho}{|ad - bc|} \end{bmatrix},$

其中  $\rho = \sqrt{|a|^2 + |c|^2}.$

方法 2  $T$  的第二列也可由直接计算  $\beta_2$  的模并把  $\beta_2$  单位化得到: 记  $\rho = |a|^2 + |c|^2$ , 则

$$\beta_2 = \begin{bmatrix} b \\ a \end{bmatrix} - \frac{\langle \alpha_2, e_1 \rangle}{\rho} \alpha_1 = \frac{1}{\rho} \begin{bmatrix} b\rho - (\bar{a}b + \bar{c}d)a \\ d\rho - (\bar{a}b + \bar{c}d)c \end{bmatrix}$$

故

$$\begin{aligned} |\beta_2|^2 &= \langle \beta_2, \beta_2 \rangle = \frac{1}{\rho^2} \{ [\bar{b}\rho - (\bar{a}b + \bar{c}d)\bar{a}][b\rho - (\bar{a}b + \bar{c}d)a] \\ &\quad + [\bar{d}\rho - (\bar{a}b + \bar{c}d)\bar{c}][d\rho - (\bar{a}b + \bar{c}d)c] \} \\ &= \frac{1}{\rho^2} [\rho^2 |b|^2 - \bar{a}b\rho(\bar{a}b + \bar{c}d) - \bar{a}b\rho(\bar{a}b + \bar{c}d) + |a|^2 |\bar{a}b + \bar{c}d|^2 \\ &\quad + |d|^2 \rho^2 - \bar{c}d\rho(\bar{a}b + \bar{c}d) - \bar{c}d\rho(\bar{a}b + \bar{c}d) + |c|^2 |\bar{a}b + \bar{c}d|^2] \\ &= \frac{1}{\rho} [(|b|^2 + |d|^2)(|a|^2 + |c|^2) - |a|^2 |b|^2 - \bar{a}b\bar{c}d - |ab|^2 - \\ &\quad \bar{a}b\bar{c}d - \bar{a}b\bar{c}d - |c|^2 |d|^2 - \bar{a}b\bar{c}d - |c|^2 |d|^2 + |\bar{a}b + \bar{c}d|^2] \\ &= \frac{1}{\rho} (|b|^2 |c|^2 + |a|^2 |d|^2 - \bar{a}b\bar{c}d - \bar{a}b\bar{c}d) \\ &= \frac{1}{\rho} |ad - bc|^2 \end{aligned}$$

所以  $e_2 = \frac{\rho^{1/2}}{|ad - bc|} \beta_2 = \frac{\sqrt{|a|^2 + |c|^2}}{|ad - bc|} \alpha_2 - \frac{\bar{a}b + \bar{c}d}{\rho^{1/2} |ad - bc|} \alpha_1.$

故 
$$U=(e_1, e_2)=AT=(\alpha_1, \alpha_2) \begin{bmatrix} \rho^{-\frac{1}{2}} & -\frac{\bar{a}b+\bar{c}d}{\rho^{1/2}|ad-bc|} \\ 0 & \frac{\rho^{1/2}}{|ad-bc|} \end{bmatrix}.$$

15. 设  $V$  为酉空间,  $W$  是其一子空间, 对  $\beta \in V$ , 若存在  $\alpha \in W$  使  $\|\beta - \alpha\| \leq \|\beta - \gamma\|$  对所有  $\gamma \in W$  成立, 则称  $\alpha$  是  $\beta$  到  $W$  的最近点或正射影. 证明:

(1)  $\alpha \in W$  是  $\beta$  到  $W$  的正射影当且仅当  $\beta - \alpha$  与  $W$  中向量均正交;

(2) 若  $\beta$  到  $W$  的正射影存在, 则必唯一;

(3) 若  $W$  是有限维的, 则任一  $\beta \in V$  在  $W$  的正射影存在(且唯一). 记  $W$  的正交基为  $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ , 则  $\beta$  到  $W$  的正射影即为

$$\alpha = \sum_{k=1}^m \frac{\langle \alpha_k, \beta \rangle}{\|\alpha_k\|^2} \alpha_k;$$

(4) 若  $\alpha$  是  $\beta$  在  $W$  的正射影, 则  $\beta - \alpha$  是  $\beta$  在  $W^\perp$  的正射影. (这里  $W^\perp = \{x \in V \mid \langle x, y \rangle = 0 \text{ 对所有 } y \in W\}$  称为  $W$  的正交补).

证 (1)  $\Rightarrow$  若  $\exists \gamma \in W$ , 使  $\beta - \alpha$  与  $\gamma$  不正交, 不妨设  $\gamma$  为单位向量, 把  $\gamma, \beta - \alpha$  Schmidt 正交化得

$$\beta_2 = (\beta - \alpha) - \overline{\langle \beta - \alpha, \gamma \rangle} \gamma, \quad \text{有 } \langle \beta_2, \gamma \rangle = 0$$

记  $\alpha_1 = \alpha + \langle \beta - \alpha, \gamma \rangle \gamma$ , 则  $\alpha_1 \in W$  (因为  $\alpha, \gamma \in W$ ), 且

$$\begin{aligned} \|\beta - \alpha_1\|^2 &= \langle \beta - \alpha_1, \beta - \alpha_1 \rangle = \langle \beta - \alpha - \overline{\langle \beta - \alpha, \gamma \rangle} \gamma, \beta - \alpha - \overline{\langle \beta - \alpha, \gamma \rangle} \gamma \rangle \\ &= \langle \beta, \beta \rangle - \langle \beta, \alpha \rangle - \overline{\langle \beta - \alpha, \gamma \rangle} \langle \beta, \gamma \rangle - \langle \alpha, \beta \rangle + \langle \alpha, \alpha \rangle + \overline{\langle \beta - \alpha, \gamma \rangle} \langle \alpha, \gamma \rangle \\ &\quad - \langle \beta - \alpha, \gamma \rangle \langle \gamma, \beta \rangle + \langle \beta - \alpha, \gamma \rangle \langle \gamma, \alpha \rangle + \langle \beta - \alpha, \gamma \rangle \overline{\langle \beta - \alpha, \gamma \rangle} \\ &= (\langle \beta, \beta \rangle - \langle \beta, \alpha \rangle - \langle \alpha, \beta \rangle + \langle \alpha, \alpha \rangle) - \overline{\langle \beta - \alpha, \gamma \rangle} \langle \beta - \alpha, \gamma \rangle \\ &\quad - \langle \beta - \alpha, \gamma \rangle \langle \gamma, \beta - \alpha \rangle + \langle \beta - \alpha, \gamma \rangle \overline{\langle \beta - \alpha, \gamma \rangle} \\ &= \|\beta - \alpha\|^2 - |\langle \beta - \alpha, \gamma \rangle|^2 < \|\beta - \alpha\|^2 \end{aligned}$$

即  $\|\beta - \alpha_1\| < \|\beta - \alpha\|$  与  $\alpha$  是  $\beta$  到  $W$  的正射影矛盾. 故必  $\beta - \alpha$  与  $W$  中所有向量均正交.

$\Leftarrow \forall \gamma \in W$ , 因为  $\alpha - \gamma \in W$ , 所以  $\langle \beta - \alpha, \alpha - \gamma \rangle = 0$  (因  $\beta - \alpha$  与  $W$  中向量均正交). 于是有

$$\begin{aligned} \|\beta - \gamma\|^2 &= \langle \beta - \gamma, \beta - \gamma \rangle = \langle \beta - \alpha + \alpha - \gamma, \beta - \alpha + \alpha - \gamma \rangle \\ &= \langle \beta - \alpha, \beta - \alpha \rangle + \langle \alpha - \gamma, \beta - \alpha \rangle + \langle \beta - \alpha, \alpha - \gamma \rangle + \langle \alpha - \gamma, \alpha - \gamma \rangle \\ &= \|\beta - \alpha\|^2 + \|\alpha - \gamma\|^2 > \|\beta - \alpha\|^2, \end{aligned}$$

由定义, 知  $\alpha$  是  $\beta$  到  $W$  的正射影.

(2) 若  $\alpha_1, \alpha_2$  均是  $\beta$  到  $W$  的正射影, 则由  $\alpha_1 \in W, \alpha_2 \in W$ , 所以  $\alpha_1 - \alpha_2 \in W$ , 故由(1)知有

$$\langle \beta - \alpha_1, \alpha_2 - \alpha_1 \rangle = 0, \quad \langle \beta - \alpha_2, \alpha_1 - \alpha_2 \rangle = 0,$$

于是  $\langle \alpha_1 - \alpha_2, \alpha_1 - \alpha_2 \rangle$

$$\begin{aligned} &= \langle \alpha_1, \alpha_1 \rangle - \langle \alpha_2, \alpha_1 \rangle - \langle \alpha_1, \alpha_2 \rangle + \langle \alpha_2, \alpha_2 \rangle \\ &= \langle \alpha_2, \alpha_2 \rangle - \langle \alpha_2, \alpha_1 \rangle + \langle \beta, \alpha_1 \rangle - \langle \beta, \alpha_2 \rangle - \langle \beta, \alpha_1 \rangle + \langle \beta, \alpha_2 \rangle + \langle \alpha_1, \alpha_1 \rangle - \langle \alpha_1, \alpha_2 \rangle \\ &= \langle \beta - \alpha_2, \alpha_1 - \alpha_2 \rangle + \langle \beta - \alpha_1, \alpha_2 - \alpha_1 \rangle = 0 + 0 = 0 \end{aligned}$$

所以  $\alpha_1 - \alpha_2 = 0$ , 即  $\alpha_1 = \alpha_2$  (正射影唯一).

(3) 因为  $\alpha \in W$ , 所以  $\alpha$  可由  $\alpha_1, \dots, \alpha_m$  线性表出

设  $\alpha = k_1 \alpha_1 + \dots + k_m \alpha_m$ ,

则由  $\beta - \alpha$  与  $\alpha_1, \dots, \alpha_m$  均正交, 知

$$0 = \langle \beta - \alpha, \alpha_i \rangle = \langle \beta, \alpha_i \rangle - \left\langle \sum_{j=1}^m k_j \alpha_j, \alpha_i \right\rangle = \langle \beta, \alpha_i \rangle - \bar{k}_i \langle \alpha_i, \alpha_i \rangle$$

所以

$$k_i = \frac{\langle \beta, \alpha_i \rangle}{\langle \alpha_i, \alpha_i \rangle} = \frac{\langle \alpha_i, \beta \rangle}{\|\alpha_i\|^2}$$

即

$$\alpha = \sum_{i=1}^m \frac{\langle \alpha_i, \beta \rangle}{\|\alpha_i\|^2} \alpha_i.$$

(4) 当  $\alpha$  是  $\beta$  在  $W$  的正射影时, 由(1)的必要性知  $\beta - \alpha$  与  $W$  中向量均正交, 所以  $\beta - \alpha \in W^\perp$ ; 又对任  $\gamma \in W^\perp$ , 有:

$$\langle \beta - (\beta - \alpha), \gamma \rangle = \langle \alpha, \gamma \rangle = 0 \quad (\text{因 } \alpha \in W),$$

由(1)的充分性知  $\beta - \alpha$  恰是  $\beta$  在  $W^\perp$  的正射影.

16. 设  $W$  是酉空间  $V$  的有限维子空间, 把  $\beta \in V$  映为其在  $W$  中正射影  $\alpha$  的变换  $\mathcal{E}: V \rightarrow W, \beta \mapsto \alpha$ , 称为  $V$  到  $W$  的正射影(变换)

(1) 证明:  $\mathcal{E}$  是  $V$  的幂等变换(即  $\mathcal{E}^2 = \mathcal{E}$ ), 象  $\text{Im } \mathcal{E} = W$ , 核  $\ker \mathcal{E} = W^\perp$  (正交补  $W^\perp$  的定义见前题), 且  $V = W \oplus W^\perp$ ;

(2)  $I - \mathcal{E}$  是  $V$  到  $W^\perp$  的正射影变换, 幂等, 象为  $W^\perp$ , 核为  $W$ .

证 方法 1 (1) ① 任  $\beta \in V, \mathcal{E}\beta = \alpha = \mathcal{E}\alpha = \mathcal{E}^2\beta$ , 所以  $\mathcal{E}^2 = \mathcal{E}$ ; ② 显然  $\text{Im } \mathcal{E} \subseteq W$ , 又任  $\gamma \in W$ , 有  $\gamma = \mathcal{E}\gamma \in \text{Im } \mathcal{E}$ , 所以  $\text{Im } \mathcal{E} = W$ ; ③  $\forall \xi \in W^\perp$ , 对所有  $\gamma \in W$  有

$$0 = \langle \xi - \mathcal{E}\xi, \gamma \rangle = \langle \xi, \gamma \rangle - \langle \mathcal{E}\xi, \gamma \rangle,$$

所以

$$\langle \mathcal{E}\xi, \gamma \rangle = 0 \rightarrow \mathcal{E}\xi = 0 \quad (\text{因 } \mathcal{E}\xi \in W)$$

所以

$$W^\perp \subseteq \ker \mathcal{E}, \rightarrow \ker \mathcal{E} = W^\perp$$

(事实上, 任  $\eta \in \ker \mathcal{E}$ , 有  $\mathcal{E}\eta = 0$ , 故  $0 = \langle \eta - \mathcal{E}\eta, \gamma \rangle = \langle \eta, \gamma \rangle$ , 对所有  $\gamma \in W$  成立, 所以  $\eta \in W^\perp \rightarrow \ker \mathcal{E} \subseteq W^\perp$ ).

(2) 由上题(4)知: 当  $\alpha$  是  $\beta$  在  $W$  的正射影时,  $\beta - \alpha$  是  $\beta$  在  $W^\perp$  的正射影, 故

$$I - \mathcal{E}: V \rightarrow W^\perp$$

$$\beta \mapsto \beta - \alpha$$

是  $V$  到  $W^\perp$  的正射影变换. ① 因为  $(I - \mathcal{E})^2 = I - 2\mathcal{E} + \mathcal{E}^2 = I - \mathcal{E}$ , 所以  $I - \mathcal{E}$  是幂等变换;

② 任  $\beta \in V, (I - \mathcal{E})\beta = \beta - \alpha \in W^\perp$ , 所以  $\text{Im}(I - \mathcal{E}) \subseteq W^\perp$ , 又任  $\xi \in W^\perp$ , 有  $\xi = \xi - \mathcal{E}\xi = (I - \mathcal{E})\xi \in \text{Im}(I - \mathcal{E})$ ,  $\rightarrow W^\perp \subseteq \text{Im}(I - \mathcal{E})$ , 所以  $\text{Im}(I - \mathcal{E}) = W^\perp$ ; ③  $\forall \gamma \in \ker(I - \mathcal{E})$ , 有  $0 = (I - \mathcal{E})\gamma = \gamma - \mathcal{E}\gamma \rightarrow \mathcal{E}\gamma = \gamma$ , 故  $\gamma \in W$ , 反之, 对任  $\alpha \in W$ , 有  $0 = \alpha - \mathcal{E}\alpha = (I - \mathcal{E})\alpha$ , 所以  $\alpha \in \ker(I - \mathcal{E})$ , 故有  $\ker(I - \mathcal{E}) = W$ .

方法 2 (1) ① 显然  $\text{Im } \mathcal{E} \subseteq W$ , 又对任  $\alpha \in W$ , 有  $\mathcal{E}\alpha = \alpha$ , (因为  $\|\alpha - \alpha\| \leq \|\alpha - \gamma\|$  对一切  $\gamma \in W$  成立) 所以  $\mathcal{E}$  是满射, 从而有  $\text{Im } \mathcal{E} = W$ .

② 同时知, 对任  $\beta \in V$ , (设  $\mathcal{E}\beta = \alpha \in W$ ) 有



$$\mathcal{E}^2\beta = \mathcal{E}\alpha = \alpha = \mathcal{E}\beta, \quad \text{所以 } \mathcal{E}^2 = \mathcal{E},$$

即  $\mathcal{E}$  是幂等变换.

③ 由①还知, 对任  $\alpha \in W$ , 当  $\alpha \neq 0$  时,  $\mathcal{E}\alpha = \alpha \neq 0$ , 故  $\ker \mathcal{E} \cap W = \{0\}$ , 又

$$\dim V = n = \dim \ker \mathcal{E} + \dim \operatorname{Im} \mathcal{E} = \dim(\ker \mathcal{E} + \operatorname{Im} \mathcal{E})$$

$$\text{所以} \quad V = \ker \mathcal{E} \oplus W = W^\perp \oplus W.$$

任  $\beta \in V$ , 有  $\beta = \alpha + (\beta - \alpha)$ , 其中  $\alpha = \mathcal{E}\beta \in W = \operatorname{Im} \mathcal{E}$ ,  $\beta - \alpha \in W^\perp$ .

因为  $\mathcal{E}(\beta - \alpha) = \mathcal{E}\beta - \mathcal{E}\alpha = \alpha - \alpha = 0$ , 所以  $\beta - \alpha \in \ker \mathcal{E}$  故  $W^\perp = \ker \mathcal{E}$ .

(2) 由(1)对任  $\beta \in V$ , 有直和分解

$$\beta = \alpha + (\beta - \alpha) = \mathcal{E}\beta + (I - \mathcal{E})\beta = (I - (I - \mathcal{E}))\beta + (I - \mathcal{E})\beta.$$

故  $\operatorname{Im}(I - \mathcal{E}) = W^\perp$ ,  $\ker(I - \mathcal{E}) = W$ , 且  $(I - \mathcal{E})^2 = I - 2\mathcal{E} + \mathcal{E}^2 = I - \mathcal{E}$ .

17. 设  $\alpha_1, \dots, \alpha_m$  是酉空间  $V$  中一个非 0 正交向量集, 则对任意  $\beta$  有 (Bessel 不等式):

$$\sum_{k=1}^m \frac{|\langle \alpha_k, \beta \rangle|^2}{\|\alpha_k\|^2} \leq \|\beta\|^2,$$

且等号成立当且仅当  $\beta = \sum_k \langle \alpha_k, \beta \rangle \|\alpha_k\|^{-2} \alpha_k$ .

证 方法 1 记  $W = L(\alpha_1, \dots, \alpha_m)$ , 且设  $\alpha$  是  $\beta$  在  $W$  的正射影, 则由 15 题知:  $\beta - \alpha$  与  $W$  中向量均正交, 特别有

$$\langle \beta - \alpha, \alpha \rangle = 0, \langle \alpha, \alpha - \beta \rangle = 0$$

于是得

$$\begin{aligned} \|\beta\|^2 &= \langle \beta, \beta \rangle = \langle \beta - \alpha, \beta \rangle + \langle \alpha, \beta \rangle \\ &= \langle \beta - \alpha, \beta \rangle + \langle \alpha, \beta \rangle - \langle \beta - \alpha, \alpha \rangle + \langle \alpha, \alpha - \beta \rangle \\ &= \langle \beta - \alpha, \beta - \alpha \rangle + \langle \alpha, \alpha \rangle \\ &= \|\beta - \alpha\|^2 + \|\alpha\|^2 \end{aligned}$$

这是酉空间的勾股定理. 故有

$$\|\beta\|^2 \geq \|\alpha\|^2,$$

等号成立当且仅当  $\|\beta - \alpha\| = 0$ , 即  $\beta = \alpha \in W$ . 又由 15 题(3)知

$$\alpha = \sum_{k=1}^m \frac{\langle \alpha_k, \beta \rangle}{\|\alpha_k\|^2} \alpha_k, \quad \text{所以 } \|\alpha\|^2 = \sum_{k=1}^m \frac{|\langle \alpha_k, \beta \rangle|^2}{\|\alpha_k\|^2}.$$

故得 Bessel 不等式.

方法 2 把  $\alpha_1, \dots, \alpha_m$  扩充为  $V$  的正交基 (因为  $\alpha_1, \dots, \alpha_m$  线性无关, 所以可先扩为  $V$  的基, 再正交化得到):

$$\alpha_1, \dots, \alpha_m, \alpha_{m+1}, \dots, \alpha_n,$$

于是任  $\beta \in V$ , 设  $\beta = \mu_1 \alpha_1 + \dots + \mu_m \alpha_m + \dots + \mu_n \alpha_n$ , 两边与  $\alpha_k$  做内积有

$$\langle \alpha_k, \beta \rangle = \langle \alpha_k, \sum_{j=1}^n \mu_j \alpha_j \rangle = \mu_k \langle \alpha_k, \alpha_k \rangle, \quad k = 1, \dots, n.$$

故

$$\beta = \sum_{k=1}^n \frac{\langle \alpha_k, \beta \rangle}{\|\alpha_k\|^2} \alpha_k,$$

$$\text{由此得} \quad \|\beta\|^2 = \sum_{k=1}^n \mu_k \mu_k \langle \alpha_k, \alpha_k \rangle = \sum_{k=1}^n \frac{|\langle \alpha_k, \beta \rangle|^2}{\|\alpha_k\|^2} \geq \sum_{k=1}^m \frac{|\langle \alpha_k, \beta \rangle|^2}{\|\alpha_k\|^2}.$$

(其中 $\geq$ 是因 $n$ 个正数之和变为 $m$ 个正数之和)等号当且仅当 $\mu_{m+1}=\cdots=\mu_n=0$ ,即 $\beta\in L(\alpha_1,\cdots,\alpha_m)$ 成立.

18. 把 Bessel 不等式(前题)用于第 11 题,写出相应结果.

解 任 $f\in V$ ,因为 $\{1,f_1,g_1,f_2,g_2,\cdots\}$ 是标准正交基,所以 $\|f_k\|=\|g_k\|=1(k=1,2,\cdots)$ ,故由 17 题有

$$|\langle 1, f \rangle|^2 + \sum_{k=1}^m (|\langle f_k, f \rangle|^2 + |\langle g_k, f \rangle|^2) \leq \|f\|^2,$$

$$\text{即} \quad \left| \int_0^1 f(t) dt \right|^2 + \sum_{k=1}^m \left( \left| \int_0^1 \bar{f}_k f dt \right|^2 + \left| \int_0^1 \bar{g}_k f dt \right|^2 \right) \leq \int_0^1 |f(t)|^2 dt,$$

右边为定值,左边当 $m$ 增大时,值增大,故部分和单调增有上界.于是得 Bessel 不等式:

$$\left| \int_0^1 f(t) dt \right|^2 + \sum_{k=1}^{\infty} \left( \left| \int_0^1 \bar{f}_k f dt \right|^2 + \left| \int_0^1 \bar{g}_k f dt \right|^2 \right) \leq \int_0^1 |f(t)|^2 dt.$$

同理,因为 $\{e^{i2n\pi x} \mid n \in \mathbb{Z}\}$ 是标准正交基,故对任 $f \in V$ 有

$$\int_0^1 |f(t)|^2 dt \geq \sum_{k=1}^{\infty} \left| \int_0^1 e^{-i2k\pi t} f(t) dt \right|^2.$$

19. 设 $V=M_n(\mathbb{C})$ 中定义内积 $\langle A, B \rangle = \text{tr}(\bar{A}^T B)$ (见第 4 题),求对角方阵所成子空间 $W$ 的正交补 $W^\perp$ .

解 因 $\{E_{11}, \cdots, E_{1n}, \cdots, E_{n1}, \cdots, E_{nn}\}$ 是 $n^2$ 维线性空间 $M_n(\mathbb{C})$ 的标准正交基,其中 $E_{ij}$ 是 $(i,j)$ 位元素为 1,而其余元素皆为 0 的 $n$ 阶方阵.

由 $E_{11}, E_{22}, \cdots, E_{nn}$ 均是对角阵,且任对角阵都是它们的线性组合,故

$$W = L(E_{11}, E_{22}, \cdots, E_{nn}).$$

又 $V=W \oplus W^\perp$ ,所以 $E_{ij}, i, j=1, \cdots, n$ 中去掉这 $n$ 个向量得到的标准正交向量组就是 $W^\perp$ 的基,故 $\dim W^\perp = n^2 - n$ ,即

$$W = L(E_{12}, \cdots, E_{1n}, E_{21}, E_{23}, \cdots, E_{2n}, \cdots, E_{n1}, \cdots, E_{nn-1}).$$

20. 设法决定所有可能的 2 阶酉方阵.

解 设 $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ ,由 $\bar{A}^T A = I = A \bar{A}^T$ 得

$$\begin{bmatrix} \bar{a} & \bar{c} \\ \bar{b} & \bar{d} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{a} & \bar{c} \\ \bar{b} & \bar{d} \end{bmatrix}.$$

即

$$\begin{cases} \bar{a}a + \bar{c}c = 1 \\ \bar{a}b + \bar{c}d = 0 \\ \bar{b}b + \bar{d}d = 1 \end{cases}, \begin{cases} \bar{a}a + \bar{b}b = 1 \\ \bar{a}c + \bar{b}d = 0 \\ \bar{c}c + \bar{d}d = 1 \end{cases} \quad \text{且} \quad |\det A| = |ad - bc| = 1,$$

故知 $|a|=|d| \leq 1, |b|=|c| \leq 1$ ,于是令

$$a = e^{i\alpha} \cos \theta \rightarrow b = e^{i\beta} \sin \theta \rightarrow c = \pm e^{i\beta_1} \sin \theta \rightarrow d = \pm e^{i\alpha_1} \cos \theta,$$

又由 $\bar{a}b = -\bar{c}d$ 知 $c, d$ 反号,由 $|\det A| = 1$ ,知 $\alpha + \alpha_1 = \beta + \beta_1$ .故

$$A = \begin{bmatrix} e^{i\alpha} \cos \theta & e^{i\beta} \sin \theta \\ -e^{i\beta_1} \sin \theta & e^{i\alpha_1} \cos \theta \end{bmatrix}, \quad \text{其中} \quad \alpha + \alpha_1 = \beta + \beta_1 \quad 0 \leq \theta < 2\pi.$$

21. 设  $V=M_n(\mathbb{C})$  中定义内积  $\langle A, B \rangle = \text{tr}(\bar{A}^T B)$  (见第 4 题). 每个  $M \in V$  定义了  $V$  的一个线性变换

$$T_M: A \mapsto MA.$$

证明:  $T_M$  是酉变换当且仅当  $M$  为酉方阵.

证  $\Leftarrow$  当  $M$  为酉阵, 即  $\bar{M}^T M = I$  时, 因  $\{E_{ij} | i, j=1, \dots, n\}$  是标准正交基, 而

$$\langle ME_{ij}, ME_{kl} \rangle = \text{tr}(\bar{E}_{ij}^T \bar{M}^T M E_{kl}) = \text{tr}(\bar{E}_{ij}^T E_{kl}) = \begin{cases} 1 & i=k \text{ 且 } j=l \\ 0 & i \neq k \text{ 或 } j \neq l. \end{cases}$$

故  $T_M$  把标准正交基变为标准正交基, 因此是酉变换.

$\Rightarrow$  方法 1 当  $T_M$  是酉变换时, 对任  $A, B \in M_n(\mathbb{C})$  有

$$\langle MA, MB \rangle = \langle A, B \rangle = \text{tr}(\bar{A}^T B),$$

所以

$$\text{tr}(\bar{A}^T \bar{M}^T M B) = \text{tr}(\bar{A}^T B)$$

记  $M=(\beta_1, \dots, \beta_n)$ , 分别取  $A=B=E_{ii}, i=1, \dots, n$ , 代入上式得

$$\bar{\beta}_i^T \beta_i = 1, \rightarrow \langle \beta_i, \beta_i \rangle = 1$$

再取  $B=E_{ii}$ , 而  $A=E_{jj}, 1 \leq i < j \leq n$ , 得

$$\bar{\beta}_j^T \beta_i = 0 \rightarrow \langle \beta_j, \beta_i \rangle = 0, \quad 1 \leq i < j \leq n$$

故  $M$  的列模为 1, 且相互之间正交, 所以  $\bar{M}^T M = I$ , 即  $M$  为酉阵.

方法 2 设  $M=(m_{ij})$ , 由  $T_M$  是酉变换, 利用 6.3 节 28 题知线性变换  $T_M$  在基  $E_{11}, \dots, E_{1n}, \dots, E_{n1}, \dots, E_{nn}$  下的方阵表示为

$$T = (m_{ij} I_n),$$

且  $T$  为酉阵, 所以  $\bar{T}^T T = I$ . 由此矩阵乘积可得

$$\sum_{k=1}^n \bar{m}_{ki} m_{kj} = \delta_{ij} = \begin{cases} 1 & i=j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$$

故得  $\bar{M}^T M = I$ . 以下我们看  $n=2$  时的情况, 便可理解:  $n=2$  时, 设

$$M = \begin{bmatrix} m_{11} & m_{12} \\ m_{21} & m_{22} \end{bmatrix}, \text{ 则 } T = (m_{ij} I_2) = \begin{bmatrix} m_{11} & & m_{12} & \\ & m_{11} & & m_{12} \\ m_{21} & & m_{22} & \\ & m_{21} & & m_{22} \end{bmatrix}$$

由  $\bar{T}^T T = I$  得

$$\sum_{k=1}^2 \bar{m}_{ki} m_{ki} = 1, \quad i=1, 2; \quad \sum_{k=1}^2 \bar{m}_{ki} m_{kj} = 0, \quad i \neq j, \quad i, j=1, 2.$$

$$\text{所以 } \bar{M}^T M = \begin{bmatrix} \sum_{k=1}^2 \bar{m}_{k1} m_{k1} & \sum_{k=1}^2 \bar{m}_{k1} m_{k2} \\ \sum_{k=1}^2 \bar{m}_{k2} m_{k1} & \sum_{k=1}^2 \bar{m}_{k2} m_{k2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I_2.$$

22. 设  $\mathcal{E}$  为  $n$  维酉空间  $V$  到子空间  $W$  的正射影变换 (见第 15, 16 题), 求  $\mathcal{E}$  的伴随变换  $\mathcal{E}^*$ .

解 由 16 题知  $V = \text{Im } \mathcal{E} \oplus \ker \mathcal{E} = W \oplus W^\perp$ , 设  $\dim W = r$ , 则  $\dim W^\perp = n - r$ . 在  $W$  中取

标准正交基  $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ , 在  $W^\perp$  中取标准正交基  $\alpha_{r+1}, \dots, \alpha_n$ , 则  $\alpha_1, \dots, \alpha_r, \alpha_{r+1}, \dots, \alpha_n$  是  $V$  的基, 且正射影变换  $\mathcal{E}$  在此基上的方阵表示为

$$A = \begin{bmatrix} I_r & O \\ O & O \end{bmatrix}$$

又  $\mathcal{E}$  的伴随变换  $\mathcal{E}^*$  在此标准正交基下的方阵为  $B = \bar{A}^T = A$ , 故

$$\mathcal{E}^* = \mathcal{E}.$$

23. 设酉空间  $V = M_n(\mathbb{C})$  中定义内积  $\langle A, B \rangle = \text{tr}(\bar{A}^T B)$ , 及线性变换  $T_M: A \mapsto MA$  (见第 21 题). 求  $T_M$  的伴随变换.

解 设  $M = (m_{ij})$ . 由 6.3 节的 28 题知线性变换  $T_M$  在标准正交基  $E_{11}, \dots, E_{1n}, \dots, E_{n1}, \dots, E_{nn}$  下的方阵为

$$T = (m_{ij} I_n), \quad (\text{是 } n^2 \text{ 阶方阵})$$

又由定理 10.8 知  $T_M$  的伴随变换  $T_M^*$  在此基下的方阵为  $B = \bar{T}^T = (\bar{m}_{ji} I_n)$ , 故

$$T_M^*: A \mapsto \bar{M}^T A, \quad \text{即} \quad T_M^* = T_{\bar{M}^T}.$$

24. 设酉空间  $V$  由复数域上多项式组成, 定义内积

$$\langle f, g \rangle = \int_0^1 \overline{f(t)} g(t) dt,$$

对  $f = \sum a_k x^k$ , 记  $\bar{f} = \sum \bar{a}_k x^k$ , 多项式  $f$  定义了  $V$  上的线性变换

$$T_f: g \mapsto fg.$$

求证  $T_f$  的伴随变换存在, 即为  $T_{\bar{f}}$ .

证 定义  $V$  上的线性变换

$$T_f^*: g \mapsto \bar{f}g$$

则有

$$\langle T_f^* g_1, g_2 \rangle = \int_0^1 \overline{\bar{f}g_1} g_2 dt = \int_0^1 \overline{g_1} f g_2 dt = \langle g_1, T_f g_2 \rangle,$$

由定理 10.8 知  $T_f^*$  是  $T_f$  的伴随变换. 即  $T_f^* = T_{\bar{f}}$ .

注: 若  $\dim V = n$ , 设  $e_1, \dots, e_n$  为其标准正交基, 则  $T_f$  在此基下的方阵表示为

$$A = (a_{ij}) = \begin{bmatrix} \langle fe_1, e_1 \rangle & \langle fe_2, e_1 \rangle & \cdots & \langle fe_n, e_1 \rangle \\ \langle fe_1, e_2 \rangle & \langle fe_2, e_2 \rangle & \cdots & \langle fe_n, e_2 \rangle \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \langle fe_1, e_n \rangle & \langle fe_2, e_n \rangle & \cdots & \langle fe_n, e_n \rangle \end{bmatrix} = (\langle fe_j, e_i \rangle),$$

其中  $A$  的第  $j$  列是  $fe_j$  在基  $e_1, \dots, e_n$  下的坐标. 于是其伴随变换  $T_f^*$  在同一基下的方阵表示为  $B = \bar{A}^T = (\bar{a}_{ji}) = (b_{ij})$ . 而

$$\bar{a}_{ji} = \overline{\langle fe_i, e_j \rangle} = \langle e_j, fe_i \rangle = \int_0^1 \bar{e}_j f e_i dt = \int_0^1 \overline{f e_j} e_i dt = \langle \bar{f} e_j, e_i \rangle$$

所以

$$T_f^* = T_{\bar{f}}.$$

25. 设  $V$  为  $n$  维酉空间,  $\mathcal{A}$  和  $\mathcal{B}$  为  $V$  上线性变换,  $c \in \mathbb{C}$ . 证明伴随变换的如下性质.

$$(1) (\mathcal{A} + \mathcal{B})^* = \mathcal{A}^* + \mathcal{B}^*; \quad (2) (c\mathcal{A})^* = \bar{c}\mathcal{A}^*;$$

$$(3) (\mathcal{A}\mathcal{B})^* = \mathcal{B}^* \mathcal{A}^*; \quad (4) (\mathcal{A}^*)^* = \mathcal{A};$$

(5)  $(\mathcal{A}^*)^{-1} = (\mathcal{A}^{-1})^*$  (当  $\mathcal{A}$  可逆时).

证 此题可用两种语言来叙述, 这里先用“变换”的语言来论证. 用定理 10.8 的前半部: 对每个  $V$  上的线性变换  $\mathcal{A}$ , 存在唯一的线性变换  $\mathcal{A}^*$  使对任  $\alpha, \beta \in V$  有

$$\langle \mathcal{A}^* \alpha, \beta \rangle = \langle \alpha, \mathcal{A} \beta \rangle.$$

$$(1) \langle \alpha, (\mathcal{A} + \mathcal{B}) \beta \rangle = \langle \alpha, \mathcal{A} \beta \rangle + \langle \alpha, \mathcal{B} \beta \rangle = \langle \mathcal{A}^* \alpha, \beta \rangle + \langle \mathcal{B}^* \alpha, \beta \rangle = \langle \mathcal{A}^* \alpha + \mathcal{B}^* \alpha, \beta \rangle = \langle (\mathcal{A}^* + \mathcal{B}^*) \alpha, \beta \rangle,$$

所以

$$(\mathcal{A} + \mathcal{B})^* = \mathcal{A}^* + \mathcal{B}^*;$$

$$(2) \langle \alpha, c \mathcal{A} \beta \rangle = c \langle \alpha, \mathcal{A} \beta \rangle = c \langle \mathcal{A}^* \alpha, \beta \rangle = \langle \bar{c} \mathcal{A}^* \alpha, \beta \rangle,$$

所以

$$(c \mathcal{A})^* = \bar{c} \mathcal{A}^*;$$

$$(3) \langle \alpha, \mathcal{A} \mathcal{B} \beta \rangle = \langle \mathcal{A}^* \alpha, \mathcal{B} \beta \rangle = \langle \mathcal{B}^* \mathcal{A}^* \alpha, \beta \rangle,$$

所以

$$(\mathcal{A} \mathcal{B})^* = \mathcal{B}^* \mathcal{A}^*;$$

$$(4) \text{ 由 } \langle \alpha, \mathcal{A} \beta \rangle = \langle \mathcal{A}^* \alpha, \beta \rangle, \text{ 两边取共轭得}$$

$$\langle \mathcal{A} \beta, \alpha \rangle = \langle \beta, \mathcal{A}^* \alpha \rangle = \langle (\mathcal{A}^*)^* \beta, \alpha \rangle,$$

由伴随变换的唯一性知  $(\mathcal{A}^*)^* = \mathcal{A}$ ;

$$(5) \text{ 首先 } I^* = I, \text{ 即恒等变换是自伴随的. 由 (3)}$$

$$\mathcal{A}^* (\mathcal{A}^{-1})^* = (\mathcal{A}^{-1} \mathcal{A})^* = I^* = I,$$

所以

$$(\mathcal{A}^*)^{-1} = (\mathcal{A}^{-1})^*.$$

此题也可用矩阵的语言来论证, 即利用定理 10.8 的后半部: 设  $\mathcal{A}$  及  $\mathcal{A}^*$  在同一标准正交基下的方阵为  $A$  和  $A^*$ , 则  $A^* = \bar{A}^T$ .

$$(1) \text{ 因为 } \overline{(A+B)^T} = \bar{A}^T + \bar{B}^T, \text{ 所以 } (\mathcal{A} + \mathcal{B})^* = \mathcal{A}^* + \mathcal{B}^*;$$

$$(2) \text{ 因为 } \overline{cA^T} = \bar{c} \bar{A}^T, \text{ 所以 } (c\mathcal{A})^* = \bar{c} \mathcal{A}^*;$$

$$(3) \text{ 因为 } \overline{(AB)^T} = \bar{B}^T \bar{A}^T, \text{ 所以 } (\mathcal{A} \mathcal{B})^* = \mathcal{B}^* \mathcal{A}^*;$$

$$(4) \text{ 因为 } \overline{(\bar{A}^T)^T} = A, \text{ 所以 } (\mathcal{A}^*)^* = \mathcal{A};$$

$$(5) \text{ 因为 } (\bar{A}^T) (\overline{A^{-1}})^T = \overline{(AA^{-1})^T} = I, \text{ 所以 } (\bar{A}^T)^{-1} = \overline{(A^{-1})^T}, \text{ 故 } (\mathcal{A}^*)^{-1} = (\mathcal{A}^{-1})^*.$$

26. 证明:  $n$  维酉空间  $V$  的每个线性变换  $\mathcal{A}$  可写为

$$\mathcal{A} = \mathcal{H}_1 + \sqrt{-1} \mathcal{H}_2,$$

其中  $\mathcal{H}_i$  为 Hermite 变换 (即自伴随变换).

证 因为  $\mathcal{A} = \frac{\mathcal{A} + \mathcal{A}^*}{2} + \frac{\mathcal{A} - \mathcal{A}^*}{2} = \frac{\mathcal{A} + \mathcal{A}^*}{2} + i \cdot \frac{\mathcal{A} - \mathcal{A}^*}{2i} = \mathcal{H}_1 + i \mathcal{H}_2$ , 且

$$(\mathcal{H}_1)^* = \left( \frac{\mathcal{A} + \mathcal{A}^*}{2} \right)^* = \mathcal{H}_1;$$

$$(\mathcal{H}_2)^* = \left( \frac{\mathcal{A} - \mathcal{A}^*}{2i} \right)^* = \frac{-(\mathcal{A}^* - \mathcal{A})}{2i} = \mathcal{H}_2.$$

故  $\mathcal{H}_1, \mathcal{H}_2$  均为 Hermite 变换.

27. 酉空间  $\mathbf{C}^{(2)}$  中内积定义为  $\langle x, y \rangle = \bar{x}^T y$ . 设线性变换  $\mathcal{A}$  把自然基  $\epsilon_1, \epsilon_2$  依次变换为  $(1, -2)^T, (i, -1)^T$ . 求  $\mathcal{A}^*(x_1, x_2)^T$ .

解 由已给的内积定义知自然基为标准正交基, 又由  $\mathcal{A}\epsilon_1 = (1, -2)^T$ ,  $\mathcal{A}\epsilon_2 = (i, -1)^T$ , 故  $\mathcal{A}$  在基  $\epsilon_1, \epsilon_2$  下的方阵表示为

$$A = \begin{bmatrix} 1 & i \\ -2 & -1 \end{bmatrix},$$

于是知  $\mathcal{A}^*$  在此基上的方阵为  $\bar{A}^T = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -i & -1 \end{bmatrix}$ , 故得

$$\mathcal{A}^* \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -i & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 - 2x_2 \\ -ix_1 - x_2 \end{pmatrix}.$$

28. 设  $\mathcal{A}$  为  $n$  维酉空间  $V$  的线性变换, 证明  $\mathcal{A}^*$  的象集是  $\mathcal{A}$  的核的正交补.

证 由题意即是要证  $\text{Im } \mathcal{A}^* = (\ker \mathcal{A})^\perp$ . 首先有

$$\dim(\ker \mathcal{A})^\perp = n - \dim(\ker \mathcal{A}) = n - (n - \mathcal{A} \text{ 的秩}) = \mathcal{A} \text{ 的秩},$$

而

$$\mathcal{A}^* \text{ 的秩} = \bar{A}^T \text{ 的秩} = A \text{ 的秩} = \mathcal{A} \text{ 的秩}$$

其中  $\bar{A}^T$  与  $A$  分别为  $\mathcal{A}^*$  和  $\mathcal{A}$  在同一标准正交基下的方阵表示. 故得

$$\dim(\text{Im } \mathcal{A}^*) = \dim(\ker \mathcal{A})^\perp.$$

又对任  $\alpha \in \text{Im } \mathcal{A}^*$ , (必存在  $\eta \in V$ , 使  $\alpha = \mathcal{A}^* \eta$ ),  $\beta \in \ker \mathcal{A}$ ,

$$\langle \alpha, \beta \rangle = \langle \mathcal{A}^* \eta, \beta \rangle = \langle \eta, \mathcal{A}\beta \rangle = \langle \eta, 0 \rangle = 0,$$

所以  $\alpha \in (\ker \mathcal{A})^\perp$ , 故  $\text{Im } \mathcal{A}^* \subseteq (\ker \mathcal{A})^\perp$ , 故得证.

29. 设  $V = M_n(\mathbb{C})$  中内积定义为  $\langle A, B \rangle = \text{tr}(\bar{A}^T B)$  (见第 4 题). 对固定的可逆方阵  $P$ , 定义  $V$  的线性变换  $T_P: A \mapsto P^{-1}AP$ . 求  $T_P$  的伴随变换.

解 令  $T_P^*: A \mapsto (\bar{P}^T)^{-1}A\bar{P}^T$ , 即  $T_P^* = T_{\bar{P}^T}$ , 则对任  $A, B \in M_n(\mathbb{C})$  有

$$\begin{aligned} \langle T_P^* A, B \rangle &= \langle (\bar{P}^T)^{-1}A\bar{P}^T, B \rangle = \text{tr}(P\bar{A}^T P^{-1}B) \stackrel{\text{①}}{=} \text{tr}(\bar{A}^T P^{-1}BP) \\ &= \langle A, P^{-1}BP \rangle = \langle A, T_P B \rangle. \end{aligned}$$

其中①用到: 对任  $n$  阶方阵  $M, N$ , 有  $\text{tr}(MN) = \text{tr}(NM)$ , 由  $T_P$  的伴随变换是唯一的, 所以  $T_P^* = T_{\bar{P}^T}$  是  $T_P$  的伴随变换.

30. 设  $V_1 = \mathbb{R}^{(3)}$  按标准内积定义为酉空间 (即欧几里得空间),  $\mathbb{R}$  上 3 阶斜对称方阵全体  $V_2$  按如下内积定义为酉空间:  $\langle A, B \rangle = \frac{1}{2} \text{tr}(A^T B)$ .  $V_1$  到  $V_2$  上的映射  $\mathcal{A}$  定义为:

$$\mathcal{A}: \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} 0 & -x_3 & x_2 \\ x_3 & 0 & -x_1 \\ -x_2 & x_1 & 0 \end{bmatrix}.$$

求证  $\mathcal{A}$  是  $V_1$  到  $V_2$  的酉空间同构.

证 任  $\alpha, \beta \in V_1$ , 设  $\alpha = (x_1, x_2, x_3)^T$ ,  $\beta = (y_1, y_2, y_3)^T$ , 则

$$\mathcal{A}\alpha = \begin{bmatrix} 0 & -x_3 & x_2 \\ x_3 & 0 & -x_1 \\ -x_2 & x_1 & 0 \end{bmatrix} = A_1, \quad \mathcal{A}\beta = \begin{bmatrix} 0 & -y_3 & y_2 \\ y_3 & 0 & -y_1 \\ -y_2 & y_1 & 0 \end{bmatrix} = A_2,$$

(1)  $\mathcal{A}$  是 1-1 对应 (即双射): ① 因为当  $\alpha \neq \beta$  时,  $\mathcal{A}\alpha \neq \mathcal{A}\beta$ , 对一切  $\alpha, \beta \in V_1$  成立, 故是单射. ② 任  $A \in V_2$ , 设

$$A = \begin{bmatrix} 0 & a_{12} & a_{13} \\ -a_{12} & 0 & a_{23} \\ -a_{13} & -a_{23} & 0 \end{bmatrix}, \quad \text{则 } \mathcal{A} \begin{bmatrix} -a_{23} \\ a_{13} \\ -a_{12} \end{bmatrix} = A,$$

所以是满射;

$$(2) \mathcal{A}(\alpha + \beta) = \mathcal{A} \begin{bmatrix} x_1 + y_1 \\ x_2 + y_2 \\ x_3 + y_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -(x_3 + y_3) & x_2 + y_2 \\ x_3 + y_3 & 0 & -(x_1 + y_1) \\ -(x_2 + y_2) & x_1 + y_1 & 0 \end{bmatrix} = \mathcal{A}\alpha + \mathcal{A}\beta$$

同理  $\mathcal{A}(k\alpha) = k\mathcal{A}\alpha$ , 所以是线性映射;

(3)

$$\begin{aligned} \langle \mathcal{A}\alpha, \mathcal{A}\beta \rangle &= \langle A_1, A_2 \rangle = \frac{1}{2} \text{tr}(A_1^T A_2) = \frac{1}{2} \text{tr} \begin{bmatrix} x_2 y_2 + x_3 y_3 & * & * \\ * & x_3 y_3 + x_1 y_1 & * \\ * & * & x_2 y_2 + x_1 y_1 \end{bmatrix} \\ &= x_1 y_1 + x_2 y_2 + x_3 y_3 = \alpha^T \beta = \langle \alpha, \beta \rangle \end{aligned}$$

所以  $\mathcal{A}$  保持内积, 故  $\mathcal{A}$  是  $V_1$  到  $V_2$  的同构映射.

31. 设  $V$  是酉空间,  $\mathcal{H}$  是  $V$  上 Hermite 变换 (即自伴随变换). 证明:

(1)  $\|\alpha + i\mathcal{H}\alpha\| = \|\alpha - i\mathcal{H}\alpha\|$  (对任意  $\alpha \in V$ );

(2)  $\alpha + i\mathcal{H}\alpha = \beta + i\mathcal{H}\beta$  当且仅当  $\alpha = \beta$ ;

(3)  $I + i\mathcal{H}$  非奇异;

(4)  $I - i\mathcal{H}$  非奇异;

(5)  $\mathcal{U} = (I - i\mathcal{H})(I + i\mathcal{H})^{-1}$  是酉变换 (此处设  $V$  是有限维).

证 (1)  $\|\alpha + i\mathcal{H}\alpha\|^2 = \langle \alpha + i\mathcal{H}\alpha, \alpha + i\mathcal{H}\alpha \rangle = \langle \alpha, \alpha \rangle + \langle \mathcal{H}\alpha, \mathcal{H}\alpha \rangle - i\langle \mathcal{H}\alpha, \alpha \rangle + i\langle \alpha, \mathcal{H}\alpha \rangle$   
 $= \|\alpha - i\mathcal{H}\alpha\|^2;$

(2)  $\Leftarrow$  充分性显然;

$\Rightarrow$  由已知等式得  $i\mathcal{H}(\alpha - \beta) = -(\alpha - \beta) \rightarrow \mathcal{H}(\alpha - \beta) = \frac{1}{i}(\alpha - \beta)$ , 由  $\mathcal{H}$  的特征值为实数,

所以  $\alpha - \beta = 0$ , 即  $\alpha = \beta$ . (事实上, 若  $\alpha \neq \beta$ , 则  $\alpha - \beta$  是  $\mathcal{H}$  的属于特征值  $\frac{1}{i}$  的特征向量, 与  $\mathcal{H}$  的特征值为实数矛盾.)

(3) 因为  $\mathcal{H}$  的特征值均为实数, 所以  $\det(I + i\mathcal{H}) = \det i\left(\frac{1}{i}I + \mathcal{H}\right) \neq 0$ , 故  $I + i\mathcal{H}$  非奇异. (这里  $H$  为  $\mathcal{H}$  在  $V$  中标准正交基下的方阵表示,  $H$  是 Hermite 阵.)

(4) 同(3), 因为  $|I - i\mathcal{H}| = \left| i\left(\frac{1}{i}I - \mathcal{H}\right) \right|$ ,  $\frac{1}{i}$  不是  $H$  的特征值. 所以  $\left| \frac{1}{i}I - H \right| \neq 0$ .

(5) 因为  $(I + i\mathcal{H})(I - i\mathcal{H}) = (I - i\mathcal{H})(I + i\mathcal{H})$ , 前后均乘  $(I - i\mathcal{H})^{-1}$  得

$$(I - i\mathcal{H})^{-1}(I + i\mathcal{H}) = (I + i\mathcal{H})(I - i\mathcal{H})^{-1}.$$

于是由

$$\begin{aligned} \mathcal{U}^* &= ((I + i\mathcal{H})^{-1})^* (I - i\mathcal{H})^* = (I^* - i\mathcal{H}^*)^{-1} (I + i\mathcal{H}^*) \\ &= (I - i\mathcal{H})^{-1} (I + i\mathcal{H}), \end{aligned}$$

利用前式可得

$$\mathcal{U}^* = (I + i\mathcal{H})(I - i\mathcal{H})^{-1},$$

所以

$$U^* U = U U^* = I.$$

故知  $U$  是酉变换.

32. 设  $\theta$  为实数, 证明以下方阵酉相似

$$\begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} e^{i\theta} & 0 \\ 0 & e^{-i\theta} \end{bmatrix}.$$

解

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda - \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \lambda - \cos\theta \end{vmatrix} = \lambda^2 - 2\lambda\cos\theta + 1,$$

所以

$$\lambda = \cos\theta \pm i \sin\theta = e^{\pm i\theta},$$

对  $\lambda_1 = \cos\theta + i \sin\theta$ , 解得全部特征向量为  $X_1 = c_1 \begin{bmatrix} i \\ 1 \end{bmatrix}$ , 取  $e_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix}$ ;

对  $\lambda_2 = \cos\theta - i \sin\theta$ , 解得特征向量为  $X_2 = c_2 \begin{bmatrix} 1 \\ i \end{bmatrix}$ , 取  $e_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}$ , 令

$$U = (e_1, e_2) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} i & 1 \\ 1 & i \end{bmatrix},$$

则  $U$  为酉阵, 且有

$$U^{-1} \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix} U = \begin{bmatrix} e^{i\theta} & \\ & e^{-i\theta} \end{bmatrix}.$$

33. 设酉空间  $C^{(2)}$  中有标准内积, 在自然基下线性变换  $\mathcal{A}$  的方阵表示为

$$A = \begin{bmatrix} 1 & i \\ i & 1 \end{bmatrix},$$

证明  $\mathcal{A}$  是规范变换, 求  $C^{(2)}$  中由  $\mathcal{A}$  的特征向量构成的一个标准正交基.

解 由

$$\bar{A}^T A = \begin{bmatrix} 1 & -i \\ -i & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & i \\ i & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & i \\ i & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -i \\ -i & 1 \end{bmatrix} = A \bar{A}^T,$$

所以  $A$  是规范阵, 从而  $\mathcal{A}$  是规范变换 (满足  $\mathcal{A}^* \mathcal{A} = \mathcal{A} \mathcal{A}^*$ ). 又

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -i \\ -i & \lambda - 1 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)^2 + 1 = \lambda^2 - 2\lambda + 2,$$

所以

$$\lambda = 1 \pm i,$$

对  $\lambda = 1 + i$ , 解  $(\lambda I - A)x = 0$ , 得  $x = c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ , 取  $e_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ ;

对  $\lambda = 1 - i$ , 解  $(\lambda I - A)x = 0$ , 得  $x = c_2 \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$ , 取  $e_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$ .

则  $e_1, e_2$  为  $C^{(2)}$  的标准正交基 (且均为  $\mathcal{A}$  的特征向量).

34. 证明: 线性变换  $\mathcal{A}$  是规范 (正规) 的当且仅当  $\mathcal{A} = \mathcal{H}_1 + i\mathcal{H}_2$ , 其中  $\mathcal{H}_1$  和  $\mathcal{H}_2$  是可交换的 Hermite 变换.

证 由第 26 题我们已有: 对任一线性变换  $\mathcal{A}$ , 均有  $\mathcal{A} = \mathcal{H}_1 + i\mathcal{H}_2$ , 其中  $\mathcal{H}_1, \mathcal{H}_2$  均为 Hermite 变换. 故这里只需证明

$$\mathcal{A} \text{ 是规范的 } \Leftrightarrow \mathcal{H}_1 \mathcal{H}_2 = \mathcal{H}_2 \mathcal{H}_1.$$



由  $\mathcal{A} = \mathcal{H}_1 + i\mathcal{H}_2$ , 得  $\mathcal{A}^* = (\mathcal{H}_1 + i\mathcal{H}_2)^* = \mathcal{H}_1^* - i\mathcal{H}_2^* = \mathcal{H}_1 - i\mathcal{H}_2$ ,

所以 
$$\begin{aligned}\mathcal{A}^* \mathcal{A} &= (\mathcal{H}_1 - i\mathcal{H}_2)(\mathcal{H}_1 + i\mathcal{H}_2) = \mathcal{H}_1^2 - i\mathcal{H}_2\mathcal{H}_1 + i\mathcal{H}_1\mathcal{H}_2 + \mathcal{H}_2^2, \\ \mathcal{A}\mathcal{A}^* &= (\mathcal{H}_1 + i\mathcal{H}_2)(\mathcal{H}_1 - i\mathcal{H}_2) = \mathcal{H}_1^2 + i\mathcal{H}_2\mathcal{H}_1 - i\mathcal{H}_1\mathcal{H}_2 + \mathcal{H}_2^2\end{aligned}$$

于是

$$\mathcal{A}^* \mathcal{A} = \mathcal{A}\mathcal{A}^* \iff 2i\mathcal{H}_1\mathcal{H}_2 = 2i\mathcal{H}_1\mathcal{H}_2 \iff \mathcal{H}_1\mathcal{H}_2 = \mathcal{H}_2\mathcal{H}_1,$$

故知

$$\mathcal{A} \text{ 是规范的 } \iff \mathcal{A}^* \mathcal{A} = \mathcal{A}\mathcal{A}^* \iff \mathcal{H}_1\mathcal{H}_2 = \mathcal{H}_2\mathcal{H}_1.$$

35. 设  $\mathcal{N}$  是  $n$  维酉空间  $V$  的规范(正规)线性变换, 证明有一复系数多项式  $f$  使

$$\mathcal{N}^* = f(\mathcal{N}).$$

证 方法 1 设  $\mathcal{N}$  在某标准正交基下的方阵表示为

$$N = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{bmatrix},$$

则  $\mathcal{N}^*$  在同一基下的方阵表示为

$$\bar{N}^T = \begin{bmatrix} \bar{\lambda}_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \bar{\lambda}_n \end{bmatrix}.$$

记  $m_i(X) = (X - \lambda_1) \cdots (X - \lambda_n) / (X - \lambda_i)$ ,  $i = 1, \dots, n$ , 令

$$f(X) = \sum_{i=1}^n \frac{m_i(X)}{m_i(\lambda_i)} \bar{\lambda}_i,$$

则

$$f(N) = \begin{bmatrix} f(\lambda_1) & & \\ & \ddots & \\ & & f(\lambda_n) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \bar{\lambda}_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \bar{\lambda}_n \end{bmatrix}.$$

所以

$$N^* = \bar{N}^T = f(N) \rightarrow \mathcal{N}^* = f(\mathcal{N}).$$

方法 2 首先证明:  $\mathcal{N}^*$  与“所有和  $\mathcal{N}$  可交换的变换”可交换, 即  $\mathcal{N}^* \in \mathcal{C}(\mathcal{C}(\mathcal{N}))$ , 再由定理 7.20 知  $\mathcal{N}^*$  是  $\mathcal{N}$  的多项式.

事实上, 设线性变换  $\mathcal{B}$  与  $\mathcal{N}$  可交换, 即有  $\mathcal{N}\mathcal{B} = \mathcal{B}\mathcal{N}$ , 则因  $\mathcal{N}$  是正规变换, 故在  $V$  中存在标准正交基, 使  $\mathcal{N}$  的方阵表示为

$$N = \begin{bmatrix} \lambda_1 I_{n_1} & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_s I_{n_s} \end{bmatrix}, \text{ 其中 } \lambda_1, \dots, \lambda_s \text{ 互异.}$$

记  $\mathcal{B}$  的方阵表示为  $B$ , 由  $NB = BN$  得

$$\lambda_i B_{ij} = \lambda_j B_{ij}, \text{ 因为 } i \neq j \text{ 时, } \lambda_i \neq \lambda_j, \text{ 所以 } B_{ij} = 0,$$

故有

$$NB = \begin{bmatrix} \lambda_1 B_{11} & & \\ & \lambda_2 B_{22} & \\ & & \ddots \\ & & & \lambda_s B_{ss} \end{bmatrix} = BN,$$

由此得

$$N^* B = \begin{bmatrix} \bar{\lambda}_1 B_{11} & & & \\ & \bar{\lambda}_2 B_{22} & & \\ & & \ddots & \\ & & & \bar{\lambda}_s B_s \end{bmatrix} = N^* B$$

也即有  $N^* B = B N^*$ .

36. 设  $2n$  阶复方阵

$$J = \begin{bmatrix} O & I_n \\ -I_n & O \end{bmatrix}, \quad M = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}.$$

试求  $A, B, C, D$  所应满足的条件以使  $M^T J M = J$ .

解 首先在  $M^T J M = J$  的两边取行列式, 知有  $(\det M)^2 = 1$ , 所以  $|M| = \pm 1$ . 又由

$$M^T J M = \begin{bmatrix} A^T & C^T \\ B^T & D^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} O & I_n \\ -I_n & O \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A^T C - C^T A & A^T D - C^T B \\ B^T C - D^T A & B^T D - D^T B \end{bmatrix}$$

知有

$$\begin{cases} -C^T A + A^T C = 0 & \text{①} \rightarrow A^T C = C^T A \\ -C^T B + A^T D = I_n & \text{②} \\ -D^T A + B^T C = -I_n & \text{③} \\ -D^T B + B^T D = 0 & \text{④} \rightarrow B^T D = D^T B \end{cases}$$

故  $A^T C$  为对称阵,  $B^T D$  也是对称阵. 且亦知②与③实为同一条件(因为②转置即为③).

由上知  $M$  可逆 ( $\det M = \pm 1$ ), 于是:

(1) 若  $A$  可逆, 有  $\det M = |A| |D - CA^{-1}B|$ . 而当  $A$  可逆时, 由②得:  $-C^T A A^{-1} B + A^T D = I_n$ , 把①代入得,  $-A^T C A^{-1} B + A^T D = I$ , 所以  $A^T (D - CA^{-1}B) = I$ , 又因为  $|A^T| = |A|$ , 在上式两边取行列式有

$$\det(A^T) \det(D - CA^{-1}B) = 1, \rightarrow \det M = 1.$$

(2) 若  $B$  可逆, 有  $\det M = (-1)^n |B| |C - DB^{-1}A|$ . 这由

$$\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_n & O \\ -B^{-1}A & I_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} O & B \\ C - DB^{-1}A & D \end{bmatrix}$$

两边取行列式立得. 又当  $B$  可逆时, 由③式得  $-D^T B B^{-1}A + B^T C = -I_n \rightarrow -B^T D B^{-1}A + B^T C = -I_n$ , 故有

$$B^T (DB^{-1}A - C) = I_n \rightarrow |B^T| |DB^{-1}A - C| = 1,$$

所以  $\det M = (-1)^n |B| |C - DB^{-1}A| = |B| |DB^{-1}A - C| = 1$

由于  $M$  可逆, 故  $A, B$  中总有一可逆, (否则  $M$  的行秩小于  $2n$ , 即行非满秩的) 于是知  $\det M = 1$ . 综上有  $A, B, C, D$  满足的条件为①, ②, ④及  $\det M = 1$ . 一个特殊的情况是若  $A = D = 0$ , 则由②知有

$$-C^T B = I_n \rightarrow B^{-1} = -C^T.$$

若  $B = I_n$ , 则  $C = -I_n$ , 即  $M = J$ .

## 10.4 补充题与解答

1. 设  $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -2 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$ , 试求一个酉阵  $U$ , 使得  $\bar{U}^T A U$  为上三角阵.

解 方法1 首先求  $A$  的特征多项式, 因为  $P_A(\lambda) = |\lambda I - A| = \lambda^3 - 1$ , 所以  $\lambda_1 = 1$  为  $A$  的实特征值. 对  $\lambda_1 = 1$ , 解得模为 1 的特征向量  $x_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1, 0)^T$ , 将其扩充为  $\mathbf{C}^{(3)}$  的标准正交基, 取

$$x_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1, 0)^T, \quad x_3 = (0, 0, 1)^T$$

令  $U_1 = (x_1, x_2, x_3)$ , 则  $U_1$  是酉阵. 且有

$$\bar{U}_1^T A U_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -\frac{3}{\sqrt{2}} \\ 0 & -1 & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & \sqrt{2} & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \alpha \\ 0 & A_2 \end{bmatrix},$$

其中  $\alpha = (0, -\frac{3}{\sqrt{2}})$ ,  $A_2$  为右下角二阶方阵. 对  $A_2$  解得属于特征值  $\lambda_2 = \frac{-1 + \sqrt{3}i}{2}$  的特征向量  $y_1 = \left(-\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1 + i\sqrt{3}}{\sqrt{6}}\right)^T$ , 将其扩充为  $\mathbf{C}^{(2)}$  的标准正交基,

$$y_1 = \begin{bmatrix} -\frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1 + i\sqrt{3}}{\sqrt{6}} \end{bmatrix}, \quad y_2 = \begin{bmatrix} \frac{1 - i\sqrt{3}}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix},$$

令  $U_2 = (y_1, y_2)$ , 则  $U_2$  是酉阵, 且有

$$\bar{U}_2^T A U_2 = \begin{bmatrix} \frac{-1 + i\sqrt{3}}{2} & -\frac{3i}{\sqrt{6}} \\ 0 & \frac{-1 - i\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix},$$

令

$$U = U_1 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & U_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1 - i\sqrt{3}}{2\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{-1 + i\sqrt{3}}{2\sqrt{3}} \\ 0 & \frac{1 + i\sqrt{3}}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix}$$

则得

$$U^{-1}AU = \begin{bmatrix} 1 & \frac{-\sqrt{3}-3i}{2} & -\frac{3}{\sqrt{6}} \\ 0 & \frac{-1+i\sqrt{3}}{2} & -\frac{3i}{\sqrt{6}} \\ 0 & 0 & \frac{-1-i\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix}. \quad (U^{-1} = \bar{U}^T).$$

方法 2 由  $P_A(\lambda) = \lambda^3 - 1 = 0$  得

$$\lambda_1 = 1, \quad \lambda_2 = \frac{-1+i\sqrt{3}}{2}, \quad \lambda_3 = \frac{-1-i\sqrt{3}}{2},$$

对  $\lambda_i$ , 分别解  $(\lambda_i I - A)x = 0$ , 得各相应的特征向量: 取  $x_1 = (1, 1, 0)^T$ ;  $x_2 = \left(\frac{1+i\sqrt{3}}{2}, 1, 1\right)^T$ ;  $x_3 = \left(\frac{1-i\sqrt{3}}{2}, 1, 1\right)^T$ , 令  $P = (x_1, x_2, x_3)$ , 则有

$$P^{-1}AP = \text{diag}\left\{1, \frac{-1+i\sqrt{3}}{2}, \frac{-1-i\sqrt{3}}{2}\right\}.$$

又由定理 10.6 的系 4 知: 对复方阵  $P$  有  $U, T$  分解, 即

$$P = UT,$$

其中  $P$  可逆,  $U$  为酉阵,  $T$  为对角线元素为正数的上三角阵.

所以  $(UT)^{-1}A(UT) = D, \rightarrow U^{-1}AU = TDT^{-1}.$

因为上三角阵的逆为上三角阵, 上三角阵之积为上三角阵. 故  $TDT^{-1}$  为上三角阵. 且因  $U$  为酉阵, 故  $U^{-1} = \bar{U}^T$ .

此方法要对  $P$  的列进行 Schmidt 正交化, 故计算量较大. 书写如下:

$$e_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}x_1, \quad \text{记 } \beta_1 = x_1, \text{ 则 } e_1 = \frac{1}{|\beta_1|}\beta_1,$$

$$\beta_2 = x_2 - (x_2, e_1)e_1 = x_2 - \frac{3+i\sqrt{3}}{2\sqrt{2}}e_1 = \left(\frac{-1+i\sqrt{3}}{4}, \frac{1-i\sqrt{3}}{4}, 1\right)^T,$$

$$|\beta_2| = \sqrt{\frac{3}{2}}, \text{ 所以 } e_2 = \frac{1}{|\beta_2|}\beta_2,$$

$$\beta_3 = x_3 - (x_3, e_1)e_1 - (x_3, e_2)e_2 = x_3 - \frac{3-i\sqrt{3}}{2\sqrt{2}}e_1 - \frac{\sqrt{3}+i}{2\sqrt{2}}e_2$$

$$= \left[-\frac{i}{\sqrt{3}}, \frac{i}{\sqrt{3}}, \frac{\sqrt{3}-i}{2\sqrt{3}}\right]^T,$$

$$|\beta_3| = 1, \text{ 所以 } e_3 = \beta_3$$

反解之, 得

$$x_1 = |\beta_1| e_1 = \sqrt{2}e_1,$$

$$x_2 = |\beta_2| e_2 + (x_2, e_1)e_1 = \sqrt{\frac{3}{2}} \cdot e_2 + \frac{3+i\sqrt{3}}{2\sqrt{2}}e_1,$$

$$x_3 = |\beta_3| e_3 + (x_3, e_1)e_1 + (x_3, e_2)e_2 = e_3 + \frac{3i\sqrt{3}}{2\sqrt{2}}e_1 + \frac{\sqrt{3}+i}{2\sqrt{2}}e_2,$$

即有

$$(x_1, x_2, x_3) = (e_1, e_2, e_3) \begin{bmatrix} \sqrt{2} & \frac{3+i\sqrt{3}}{2\sqrt{2}} & \frac{3-i\sqrt{3}}{2\sqrt{2}} \\ 0 & \sqrt{\frac{3}{2}} & \frac{\sqrt{3}+i}{2\sqrt{2}} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = UT,$$

而

$$U = (e_1, e_2, e_3) = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{-1+i\sqrt{3}}{2\sqrt{6}} & -\frac{i}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1-i\sqrt{3}}{2\sqrt{6}} & \frac{i}{\sqrt{3}} \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{\sqrt{3}-i}{2\sqrt{3}} \end{bmatrix},$$

使得  $\bar{U}^T AU$  为上三角阵.

2. 设  $A, B$  是正定 Hermite 阵, 若  $AB$  是 Hermite 阵, 证明  $AB$  正定.

证 方法 1 由已知  $AB$  是 Hermite 阵, 故

$$AB = (\overline{AB})^T = \bar{B}^T \bar{A}^T = BA,$$

即  $A, B$  乘法可交换. 由定理 10.10 知,  $\exists$  酉阵  $U$ , 使

$$\bar{U}^T AU = \text{diag}\{\lambda_1, \dots, \lambda_n\},$$

$$\bar{U}^T BU = \text{diag}\{\mu_1, \dots, \mu_n\},$$

则有

$$\begin{aligned} \bar{U}^T ABU &= \bar{U}^T AU \bar{U}^T BU \\ &= \text{diag}\{\lambda_1 \mu_1, \dots, \lambda_n \mu_n\}, \end{aligned}$$

因为  $\lambda_i \mu_i > 0, i=1, \dots, n$ . 所以  $AB$  正定.

方法 2 因为  $A, B$  正定, 所以  $\exists$  可逆阵  $P, Q$  使  $A = \bar{P}^T P, B = \bar{Q}^T Q$ , 则

$$AB = \bar{P}^T P \bar{Q}^T Q = \bar{P}^T P \bar{Q}^T Q \bar{P}^T (\bar{P}^T)^{-1},$$

故知  $AB$  与  $P \bar{Q}^T Q \bar{P}^T$  相似,

而  $P \bar{Q}^T Q \bar{P}^T = (\overline{Q \bar{P}^T})^T Q \bar{P}^T$  是正定 Hermite 阵, 故其特征值全为正, 于是由相似的矩阵有相同的特征值得知:  $AB$  的特征值皆为正. 又已知  $AB$  为 Hermite 阵, 所以  $AB$  正定.

方法 3 设  $A, B$  分别为  $U_n(\mathbb{C})$  中的线性变换  $\mathcal{A}, \mathcal{B}$  在标准正交基下的矩阵, 则  $\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{AB}$  均为 Hermite 变换, 由

$$\mathcal{AB} = (\mathcal{AB})^* = \mathcal{B}^* \mathcal{A}^* = \mathcal{BA},$$

知  $\mathcal{A}, \mathcal{B}$  乘法可交换. 故必存在  $U_n(\mathbb{C})$  的标准正交基  $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$  使得

$$\mathcal{A}\eta_i = \lambda_i \eta_i, \quad \mathcal{B}\eta_i = \mu_i \eta_i, \quad i=1, \dots, n.$$

于是, 对任  $\alpha \in V$ , 设  $\alpha = \sum_{i=1}^n x_i \eta_i$ , 有

$$(\mathcal{AB}\alpha, \alpha) = \left( \mathcal{AB} \sum_{i=1}^n x_i \eta_i, \sum_{j=1}^n x_j \eta_j \right) = \left( \sum_{i=1}^n x_i \lambda_i \mu_i \eta_i, \sum_{j=1}^n x_j \eta_j \right)$$

$$= \sum_{i=1}^n x_i \sum_{j=1}^n \bar{x}_j \lambda_i \mu_j (\eta_i, \eta_j) = \sum_{i=1}^n x_i \bar{x}_i \lambda_i \mu_i > 0.$$

(这里用到因  $\mathcal{A}, \mathcal{B}$  正定, 所以  $\lambda_i, \mu_i$  均为正) 故知  $\mathcal{AB}$  为正定 Hermite 变换, 故  $AB$  是正定 Hermite 阵.

### 线性变换族(群表示)与特征

以下第 3~17 题, 介绍线性变换族, 即群表示与特征理论.

3. 设  $G$  是群, 其元素均(可视)为复数域上线性空间  $V$  的自同构(即可逆线性变换), 且

$$(\sigma_2 \sigma_1)(\alpha) = \sigma_2(\sigma_1 \alpha) \quad (\text{对任意 } \sigma_1, \sigma_2 \in G, \alpha \in V).$$

(例如设有  $G$  到  $V$  的自同构群  $GL(V)$  的映射  $\rho: G \rightarrow GL(V)$  且  $\rho(\sigma_2 \sigma_1) = \rho(\sigma_2) \rho(\sigma_1)$ , 则  $\sigma \in G$  可视作  $V$  的自同构:  $\sigma(\alpha) = \rho(\sigma)(\alpha)$ ). 此时, 常称  $V$  (的自同构群) 是  $G$  的一个线性表示(如《高等代数学》中 6.4 节).  $G$  中元素的公共不变子空间称为  $G$  的不变子空间. 现设  $G$  为  $g$  元有限群,  $V$  的维数为  $n$ ,  $W$  是  $G$  的不变子空间, 则  $W$  有一(直和)补子空间  $W^\circ$  也为  $G$  的不变子空间.

证 设  $W'$  是  $W$  的(直和)补子空间,  $\pi$  是  $V$  到  $W$  的正则投影(即  $\pi(\alpha_1 + \alpha_2) = \alpha_1, \alpha_1 \in W, \alpha_2 \in W'$ ). 令

$$\pi^\circ = \frac{1}{g} \sum_{\sigma \in G} \sigma \pi \sigma^{-1},$$

则  $\pi^\circ(V) \subset W$ , 对  $\alpha \in W$ , 有  $\sigma^{-1} \alpha \in W$ ,

$$\pi \sigma^{-1} \alpha = \sigma^{-1} \alpha, \quad \sigma \pi \sigma^{-1} \alpha = \alpha, \quad \pi^\circ \alpha = \alpha.$$

所以  $\pi^\circ$  是  $V$  到  $W$  的投影, 记  $W^\circ = \ker \pi^\circ$ , 则知有直和  $V = W \oplus W^\circ$ . 而且更有

$$\rho \pi^\circ = \pi^\circ \rho \quad (\text{对任意 } \rho \in G),$$

这是由于

$$\begin{aligned} \rho \pi^\circ \rho^{-1} &= \frac{1}{g} \sum_{\sigma \in G} \rho \sigma \pi \sigma^{-1} \rho^{-1} = \frac{1}{g} \sum_{\sigma \in G} (\rho \sigma) \pi (\rho \sigma)^{-1} \\ &= \frac{1}{g} \sum_{\sigma' \in G} \sigma' \pi \sigma'^{-1} = \pi^\circ, \end{aligned}$$

其中第 3 个等号是令  $\rho \sigma = \sigma'$ , 当  $\sigma$  遍历  $G$  时可知  $\sigma'$  也遍历  $G$ .

现若  $\alpha \in W^\circ, \rho \in G$ , 则  $\pi^\circ \alpha = 0$ , 故  $\pi^\circ \rho \alpha = \rho \pi^\circ \alpha = 0$ , 即知  $\rho \alpha \in W^\circ$ , 这说明  $W^\circ$  是  $G$  中任一变换  $\rho$  的不变子空间.

4. 设  $V, G, W$  如补充题 3, 且  $V$  是酉空间有内积  $h$  (即  $h$  是正定 Hermite 型).

(1) 令

$$\hat{h}(\alpha, \beta) = \sum_{\sigma \in G} h(\sigma \alpha, \sigma \beta),$$

则  $\hat{h}$  为  $G$  的不变内积(即  $\hat{h}(\rho \alpha, \rho \beta) = \hat{h}(\alpha, \beta), \rho \in G$ ).

(2) 记  $\hat{h}(\alpha, \beta) = \langle \alpha, \beta \rangle$  且  $V$  对此内积为酉空间. 证明  $W$  对此内积的正交补  $W^\perp$  是  $G$  的不变子空间(从而给出补充题 3 的另一证明).

(3) 存在  $V$  的基, 使  $G$  中变换的方阵表示均为酉方阵.

证 (1)  $\hat{h}(\rho \alpha, \rho \beta) = \sum_{\sigma \in G} h(\sigma \rho \alpha, \sigma \rho \beta) = \sum_{\sigma' \in G} h(\sigma' \alpha, \sigma' \beta) = \hat{h}(\alpha, \beta)$ , 其中  $\sigma' = \sigma \rho, \sigma$  遍

历  $G$  则  $\sigma'$  遍历  $G$ .

(2) 取  $W$  的标准正交基  $e_1, \dots, e_r$ , 扩展为  $V$  的标准正交基  $e_1, \dots, e_r, \dots, e_n$ , 则  $e_{r+1}, \dots, e_n$  张成的子空间  $W^\perp$  是  $W$  的正交补,  $V = W \oplus W^\perp$ , 显然对于  $\rho \in G$  有

$$\langle \rho e_1, \rho e_n \rangle = \langle e_1, e_n \rangle = 0,$$

即  $\rho e_n \perp \rho e_1$ , 同样可知  $\rho e_n \perp \rho e_i (1 \leq i \leq r)$ , 但是  $\rho e_1, \dots, \rho e_r$  张成  $W$ , 故  $\rho e_n \perp W$ , 即  $\rho e_n \in W^\perp$ . 同理知  $\rho e_j \in W^\perp (r < j \leq n)$ , 故  $W^\perp$  为  $G$  的不变子空间.

(3) 任取  $V$  (对 (2) 中内积) 的标准正交基, 设  $\rho \in G$  的方阵表示为  $A$ ,  $\alpha, \beta \in V$  的坐标列为  $x, y$ , 则因为内积在  $G$  下不变, 故

$$\langle \rho \alpha, \rho \beta \rangle = \langle \alpha, \beta \rangle \quad \text{即} \quad \bar{x}' A' A y = \bar{x}' y$$

对任意  $x, y \in C^{(n)}$  成立, 即知  $\bar{A}' A = I$ , 即  $A$  为酉方阵.

5. 设  $V$  是  $n$  维复线性空间,  $G$  是  $V$  上有限个线性变换构成的群如补充题 3. 则  $V$  可分解为直和:

$$V = W_1 \oplus W_2 \oplus \dots \oplus W_s,$$

其中  $W_i$  为  $G$  的不可约不变子空间 (即  $W_i$  是  $G$  的不变子空间, 且不包含  $G$  的其他真不变子空间 ( $\neq 0, W_i$ )) ( $1 \leq i \leq s$ ).

证 若  $V$  对  $G$  是不可约的 (即不含真不变子空间), 则  $V = V$  即为所求分解. 若  $V$  可约, 则由补充题 3 可知  $V = W \oplus W^\circ$ , 其中  $W$  和  $W^\circ$  为  $G$  的不变子空间. 对  $V$  的维数  $\dim(V)$  进行归纳法. 按归纳法可设  $W = W_1 \oplus \dots \oplus W_r$ ,  $W^\circ = W_{r+1} \oplus \dots \oplus W_s$ , 其中  $W_i$  为  $G$  的不可约不变子空间. 由此即得所需的分解  $V = W \oplus W^\circ = W_1 \oplus \dots \oplus W_s$ .

6. 设  $V_1$  和  $V_2$  为有限维复线性空间, 有限群  $G$  中的元素同时是  $V_1$  和  $V_2$  的线性变换而且群运算与变换的复合一致 (当  $\sigma \in G$  视为  $V_i$  的线性变换时常记为  $\sigma_i (i=1, 2)$ ). 若有线性空间同构  $\tau: V_1 \rightarrow V_2$  使  $\tau \sigma_1 = \sigma_2 \tau$  (对任意  $\sigma \in G$ ), 则称  $V_1$  与  $V_2$  对  $G$  同构. 现设  $\varphi: V_1 \rightarrow V_2$  为线性映射且  $\varphi \sigma_1 = \sigma_2 \varphi$  (对任意  $\sigma \in G$ ), 且  $V_1$  和  $V_2$  对  $G$  均是不可约的, 则:

(1) 若  $V_1$  与  $V_2$  对  $G$  不同构, 则  $\varphi = 0$ .

(2) 若  $V_1 = V_2, \sigma_1 = \sigma_2 (\sigma \in G)$ , 则  $\varphi$  为数乘变换.

证 (1)  $\varphi = 0$  时显然. 若  $\varphi \neq 0, W_1 = \ker \varphi$ , 则对  $\alpha \in W_1$  有  $\varphi \sigma_1 \alpha = \sigma_2 \varphi \alpha = 0$ , 故  $\sigma_1 \alpha \in W_1$ , 即知  $W_1$  是  $G$  的不变子空间. 因为  $V_1$  对  $G$  不可约, 故  $W_1 = V_1$  或  $0$ . 若  $W_1 = V_1$  则  $\varphi = 0$ , 不可能. 类似地可得  $\varphi(W_2) = V_2$ . 这说明  $\varphi$  是  $V_1$  与  $V_2$  对  $G$  的同构, 与所设矛盾.

(2) 设  $\lambda$  是  $\varphi$  的特征根, 记  $\varphi' = \varphi - \lambda$ , 则  $\ker \varphi' \neq 0$  (含特征向量), 且  $\sigma_2 \varphi' = \varphi' \sigma_1$ , 由 (1) 可知这只能是  $\varphi' = 0$ , 即  $\varphi = \lambda$ .

7. 设如补充题 6, 记  $g$  为  $G$  的元素个数. 设  $\Psi: V_1 \rightarrow V_2$  为线性映射, 记

$$\Psi^\circ = \frac{1}{g} \sum_{\rho \in G} \rho_2^{-1} \Psi \rho_1$$

(1) 若  $V_1$  与  $V_2$  对  $G$  不同构, 则  $\Psi^\circ = 0$ .

(2) 若  $V_1 = V_2, \sigma_1 = \sigma_2$  (当  $\sigma \in G$ ), 则  $\Psi^\circ = \text{tr}(\Psi)/n$  为数乘 (其中  $n = \dim(V_1)$ ,  $\text{tr}(\Psi)$  为  $\Psi$  方阵表示的迹).

证 (1) 由下式知  $\sigma_2 \Psi^\circ = \Psi^\circ \sigma_1$  (对任意  $\sigma \in G$ ):

$$\sigma_2^{-1} \Psi^\circ \sigma_1 = \frac{1}{g} \sum_{\rho \in G} \sigma_2^{-1} \rho_2^{-1} \Psi \rho_1 \sigma_1 = \frac{1}{g} \sum_{\rho \in G} (\rho \sigma)_2^{-1} \Psi (\rho \sigma)_1$$

$$= \frac{1}{g} \sum_{\rho' \in G} \rho_2'^{-1} \Psi \rho_1' = \Psi^\circ$$

(其中  $\rho' = \rho\sigma$ ). 由补充题 6. (1) 即知  $\Psi^\circ = 0$ .

(2) 由补充题 6. (2) 知  $\Psi^\circ = \lambda$  为其特征值. 由

$$\text{tr}(\Psi^\circ) = \frac{1}{g} \sum_{\rho \in G} \text{tr}(\rho_1^{-1} \Psi \rho_1) = \text{tr}(\Psi),$$

及  $\text{tr}(\lambda) = n\lambda$ , 知  $\lambda = \text{tr}(\Psi)/n$ .

8. 设如上题, 对  $t \in G$ , 记  $t_1$  (即  $t$  作为  $V_1$  的变换) 的方阵表示为  $T_1 = (a_{ij}(t))$ ,  $t_2$  的方阵为  $T_2 = (b_{ij}(t))$ . 则在情形(1)有

$$\sum_{t \in G} b_{ik}(t^{-1}) a_{mj}(t) = 0 \quad (\text{对任意 } i, k, m, j).$$

在情形(2)有

$$\frac{1}{g} \sum_{t \in G} b_{ik}(t^{-1}) a_{mj}(t) = \frac{1}{n} \delta_{ij} \delta_{km} = \begin{cases} \frac{1}{n}, & \text{当 } i = j, k = m. \\ 0, & \text{否则.} \end{cases}$$

证 (1) 记上题中  $\Psi$  和  $\Psi^\circ$  的矩阵表示为  $(x_{ij})$  和  $(x_{ij}^\circ)$ . 则  $\Psi^\circ$  的定义说明

$$x_{ij}^\circ = \frac{1}{g} \sum_{t \in G, k, m} b_{ik}(t^{-1}) x_{km} a_{mj}(t)$$

右方为  $x_{km}$  的齐次线性型, 对任意的  $x_{km}$  值为 0, 说明其系数均为 0, 即得所欲证.

(2) 此时  $\Psi^\circ = \lambda = \text{tr}(\Psi)/n$ , 故  $x_{ij}^\circ = \lambda \delta_{ij}$ ,  $\lambda = \frac{1}{n} \sum \delta_{km} x_{km}$ ,  $\Psi^\circ$  的定义式化为

$$\frac{1}{g} \sum_{t, k, m} b_{ik}(t^{-1}) x_{km} a_{mj}(t) = x_{ij}^\circ = \frac{1}{n} \sum_{k, m} \delta_{ij} \delta_{km} x_{km},$$

考虑等式两边  $x_{km}$  的系数即得所欲证.

9. 设  $V$  是有限维复线性空间, 有限群  $G$  中元素可看作  $V$  的可逆线性变换 (即如补充题 3). 对  $\sigma \in G$  定义  $\chi(\sigma) = \text{tr}(\sigma)$  为  $\sigma$  的方阵表示的迹 (也等于  $\sigma$  特征根的和), 则  $\chi$  是  $G$  到  $\mathbb{C}$  的一个函数, 称为  $G$  (对于  $V$ ) 的一个特征. 对  $G$  上的任意复值函数  $\varphi, \Psi$  定义内积 (正定 Hermite 型):

$$\langle \varphi, \Psi \rangle = \frac{1}{g} \sum_{t \in G} \varphi(t)^* \Psi(t),$$

其中  $c^* = \bar{c}$  为  $c$  的复共轭,  $g = \#G$  为  $G$  的元素个数.

(1) 若  $V$  对  $G$  不可约, 则  $\langle \chi, \chi \rangle = 1$ .

(2) 若  $G$  中元可同时看作线性空间  $V_1$  和  $V_2$  的线性变换 (即如补充题 6 情形), 且  $V_1$  和  $V_2$  对  $G$  不同构也不可约, 记  $\chi_1$  和  $\chi_2$  为  $G$  对  $V_1$  和  $V_2$  的特征, 则  $\langle \chi_1, \chi_2 \rangle = 0$ .

证 (1) 记  $t \in G$  的方阵表示为  $T = (a_{ij}(t))$ , 则  $\chi(t) = \sum a_{ii}(t)$ . 由于  $G$  为  $g$  个元素的群, 故  $t^g = 1$ ,  $\chi(t)^g = \chi(t^g) = \chi(1) = 1$ . 故  $\chi(t)$  为  $g$  次单位根,  $\chi(t)^* = \chi(t^{-1})$ .

$$\begin{aligned} \langle \chi, \chi \rangle &= \frac{1}{g} \sum_i \chi(t^{-1}) \chi(t) = \frac{1}{g} \sum_i \left( \sum_i a_{ii}(t^{-1}) \right) \left( \sum_j a_{jj}(t) \right) \\ &= \frac{1}{g} \sum_{i,j} \sum_t a_{ii}(t^{-1}) a_{jj}(t) \end{aligned}$$



而由上题情形(2)知

$$\frac{1}{g} \sum_{t \in G} a_{ii}(t^{-1}) a_{jj}(t) = \frac{1}{n} \delta_{ij},$$

$$\text{故 } \langle \chi, \chi \rangle = \left( \sum_{i,j} \delta_{ij} \right) / n = n/n = 1.$$

(2) 按(1)中同样方法,利用上题第一情形即得.

10. 设  $V$  和  $G$  如上题(或补充题 3),  $G$  的相应特征为  $\chi$ . 设  $V$  分解为  $G$  的不变不可约子空间的直和(如补充题 5):

$$V = W_1 \oplus W_2 \oplus \cdots \oplus W_s.$$

若  $W$  是  $G$  的任一不变不可约子空间,相应的  $G$  的特征为  $\Psi$ , 则与  $W$  对  $G$  同构的  $W_i$  的个数为  $\langle \chi, \Psi \rangle = \frac{1}{g} \sum_{t \in G} \chi(t) \cdot \Psi(t)$ .

证 记  $\chi_i$  为  $G$  对  $W_i$  的特征(即设  $t \in G$  视为  $W_i$  上变换方阵表示为  $T_i$ , 则  $\chi_i(t) = \text{tr}(T_i)$ ). 于是

$$\chi = \chi_1 + \chi_2 + \cdots + \chi_s.$$

故  $\langle \chi, \Psi \rangle = \langle \chi_1, \Psi \rangle + \cdots + \langle \chi_s, \Psi \rangle$ . 由上题知  $\langle \chi_i, \Psi \rangle = 1$  或  $0$  (当  $W_i$  与  $W$  对  $G$  同构或否), 即得所欲证.

11. 设有限群  $G$  可看作复线性空间  $V_1$  和  $V_2$  的线性变换(子)群(如补充题 6),  $\chi_1$  和  $\chi_2$  是  $G$  的相应的特征, 则当且仅当  $\chi_1 = \chi_2$  时,  $V_1$  与  $V_2$  对于  $G$  同构.

证 若  $V_1$  与  $V_2$  对于  $G$  同构, 则有线性空间同构  $\tau: V_1 \rightarrow V_2$  使  $\tau\sigma_1 = \sigma_2\tau$  (对任意  $\sigma \in G$ ). 取定  $V_1$  和  $V_2$  的基之后, 设  $\tau$  和  $\sigma_i$  (即  $\sigma$  作为  $V_i$  的变换) 的方阵表示为  $T$  和  $A_i$ , 则由  $\tau\sigma_1 = \sigma_2\tau$  知  $TA_1 = A_2T$ , 即  $A_1 = T^{-1}A_2T$ , 故  $\chi_1(\sigma) = \text{tr}(A_1) = \text{tr}(A_2) = \chi_2(\sigma)$ , 即知  $\chi_1 = \chi_2$ .

反之, 若  $\chi_1 = \chi_2$ , 则由上题可知在  $V_1$  和  $V_2$  的直和分解中, 与给定不可约空间  $W$  对  $G$  同构的子空间个数相同, 故可作这样的分解:  $V_1 = W_1 \oplus \cdots \oplus W_s$ ,  $V_2 = W'_1 \oplus \cdots \oplus W'_s$ , 且  $W_i$  与  $W'_i$  对  $G$  同构 ( $1 \leq i \leq s$ ), 即知  $V_1$  与  $V_2$  对  $G$  同构.

12. 设  $G$  是  $V$  的一些线性变换构成的群(如补充题 3 或 9),  $\chi$  是相应的  $G$  的特征, 则  $\langle \chi, \chi \rangle$  为正整数, 且  $\langle \chi, \chi \rangle = 1$  当且仅当  $V$  对  $G$  不可约.

证 按第 10 题将  $V$  分解且不妨设对  $G$  同构的  $W_i$  相等(这样的诸  $W_i$  决定相同的  $G$  的特征), 故在对  $G$  同构意义下可设

$$V = m_1 W_1 \oplus \cdots \oplus m_h W_h,$$

其中  $W_1, \dots, W_h$  对  $G$  互不同构, 决定不同的  $G$  的特征  $\chi_1, \dots, \chi_h$ , 且  $m_i$  为正整数. 于是知

$$\chi = m_1 \chi_1 + \cdots + m_h \chi_h$$

由  $\chi_i$  的正交性和规范性(第 9 题), 即知

$$\langle \chi, \chi \rangle = m_1^2 + \cdots + m_h^2$$

为正整数, 而  $\langle \chi, \chi \rangle = 1$  当且仅当  $h=1, m_1=1$ .

13. 设  $G$  为有限群, 对  $G$  的每一个元素  $t$  设定一个不定元  $X_t$  (有时记  $X_t$  为  $t$ ), 则以  $\{X_t | t \in G\}$  为基生成复线性空间  $V$ . 每个  $\sigma \in G$  自然是  $V$  的线性变换:  $\sigma(X_t) = X_{\sigma t}$ .  $V$  称为

$G$  的正则空间(表示),相应的  $G$  的特征  $r_G$  称为  $G$  的正则特征.

(1)  $r_G(1)=g$  ( $G$  的元素个数,即  $V$  的维数),

$r_G(t)=0$ , 当  $t \neq 1$ .

(2)  $G$  的任一  $m$  维不可约(不变)空间  $W$  均  $m$  重含于  $G$  的正则空间  $V$  (即  $W$  与  $m$  个  $W_i$  对  $G$  同构,在第 10 题分解中).

(3) 设  $V=m_1W_1 \oplus \cdots \oplus m_hW_h$  为正则空间  $V$  的分解(如上题证明),其中  $m_i=W_i$  的重数  $=\dim W_i$ ,则

$$m_1^2 + \cdots + m_h^2 = g,$$

$$m_1\chi_1(t) + \cdots + m_h\chi_h(t) = 0 \quad (\text{当 } 1 \neq t \in G),$$

其中  $\chi_i$  是  $G$  对  $W_i$  的特征( $\chi(t)=\text{tr}(T_i)$ ,  $T_i$  是  $t$  作为  $W_i$  变换的方阵).

证. (1) 若  $1 \neq t \in G$ , 则  $ts \neq s (s \in G)$ , 故  $t$  (作为  $V$  上线性变换) 的方阵  $T$  的对角线元素为 0, 故  $r_G(t)=\text{tr}(T)=0$ . 而若  $t=1$ , 则  $T=I$ ,  $\text{tr}(T)=g$ .

(2) 由第 10 题知  $W_i$  含于  $V$  的重数为

$$\langle r_G, \chi_i \rangle = \frac{1}{g} \sum_{t \in G} r_G(t) \chi_i(t) = \frac{1}{g} g \chi_i(1) = \chi_i(1) = m_i.$$

(3)  $r_G(t)=m_1\chi_1(t) + \cdots + m_h\chi_h(t)$ , 取  $i=1$  则  $\chi_i(1)=\dim W_i=m_i$  即得上一式. 而当  $t \neq 1$  时  $r_G(t)=0$ , 即得下一式.

14. 有限群  $G$  上的函数  $f$  称为(共轭)类函数是指  $f$  满足  $f(t\sigma t^{-1})=f(\sigma)$  (对任意  $\sigma, t \in G$ ).  $G$  上类函数全体记为  $\mathcal{C}_G$ , 是一个复线性空间.  $G$  的特征全体  $\chi_1, \cdots, \chi_h$  (如第 12 题证明中, 不计对  $G$  的同构) 是  $\mathcal{C}_G$  的标准正交基(内积如第 9 题定义).

证 由第 9 题知  $\chi_1, \cdots, \chi_h$  相互正交, 只需再证它们生成  $\mathcal{C}_G$ . 任取  $f \in \mathcal{C}_G$ , 设  $V$  为  $G$  的正则空间如第 13 题,  $\chi$  为相应特征. 令

$$\varphi = \sum_{t \in G} f(t)t$$

为  $V$  上线性变换, 以  $\varphi_i, t_i$  记  $\varphi, t$  到  $W_i$  的限制, 为  $W_i$  的线性变换,  $W_i$  是定义特征  $\chi_i$  的  $G$  的不可约不变空间, 维数为  $m_i$ . 于是对  $\sigma \in G$  有

$$\begin{aligned} \sigma^{-1}\varphi_i\sigma &= \sum_{t \in G} f(t)\sigma^{-1}t_i\sigma = \sum_{t \in G} f(t)(\sigma^{-1}t\sigma)_i \\ &= \sum_{t' \in G} f(\sigma t' \sigma^{-1})t'_i = \sum_{t' \in G} f(t')t'_i = \varphi_i \end{aligned}$$

故  $\varphi_i\sigma = \sigma\varphi_i$ . 由补充第 6 题知  $\varphi_i = \lambda_i$  为数乘.

$$\text{tr}(\varphi_i) = m_i\lambda_i, \text{tr}(\varphi_i) = \sum_{t \in G} f(t)\text{tr}(t_i) = \sum_t f(t)\chi_i(t),$$

故  $\lambda_i = \frac{1}{m_i} \sum f(t)\chi_i(t) = (g/m_i) \langle f^*, \chi_i \rangle$ . 现设  $f^*$  与所有  $\chi_1, \cdots, \chi_h$  正交, 则  $\varphi_i = \lambda_i = 0 (1 \leq i \leq h)$ , 故由  $V$  的分解知  $\varphi = 0$ . 设  $\{X_i\}$  为  $V$  的基, 则

$$0 = \varphi(X_1) = \sum_{t \in G} f(t)tX_1 = \sum_{t \in G} f(t)X_t.$$

故  $f(t)=0$  (当  $t \in G$ ), 即  $f=0$ . 这也说明若  $f$  与所有  $\chi_i^* (1 \leq i \leq h)$  正交, 则  $f=0$ . 即得所欲证.

15. 有限群  $G$  的不同的不可约特征个数  $h$  等于  $G$  的共轭类数, 这也是对  $G$  不可约的

不变空间个数(不计  $G$  同构意义下)(对  $s, t \in G$ , 若存在  $\sigma \in G$  使  $s = \sigma t \sigma^{-1}$  则称  $s, t$  共轭、按共轭关系对  $G$  分类, 类的个数称为  $G$  的共轭类数). 特别可知, 阿贝尔群  $G$  的特征个数为  $g = \#G$ .

证 设  $G$  的共轭类为  $C_1, \dots, C_k$ , 则类函数  $f \in \mathcal{C}_k$  在每个  $C_i$  中元素取同一值  $\lambda_i$ . 反之, 任意指定在  $C_i$  中元素的值  $\lambda_i (1 \leq i \leq k)$ , 则可得到一个类函数. 故知类函数空间  $\mathcal{C}_G$  的维数为  $k$ . 另一方面, 由上题知  $\mathcal{C}_G$  的维数为特征的个数  $h$ , 故  $h = k$ .

16. (典型分解) 设  $g$  元有限群  $G$  的全部不同的不可约特征为  $\chi_1, \dots, \chi_h$ , 次数分别为  $m_1, \dots, m_h$  (即  $\chi_i$  是以  $G$  作变换群的不可约不变空间  $W_i$  的特征,  $m_i = \dim W_i$ ,  $h$  为  $G$  的共轭类数, 见第 9, 15 题). 设  $V$  为任一复线性空间, 以  $G$  中元素为线性变换, 令

$$\pi_i = \frac{m_i}{g} \sum_{t \in G} \chi_i(t)^* t, \quad V_i = \pi_i V, (1 \leq i \leq h).$$

则  $V = V_1 \oplus V_2 \oplus \dots \oplus V_h$ ,

这称为  $V$  的典型分解,  $V_i$  为  $G$  的不变子空间,  $\pi_i$  为  $V$  到  $V_i$  的正则投影 (即在  $V_j$  的限制为  $\delta_{ij}$ ), 且每一个  $V_i$  中任二  $G$  的不可约不变子空间均  $G$ -同构, 而不同的  $V_i$  和  $V_j$  的任意  $G$  的不可约不变子空间均非  $G$ -同构.

证 先将  $V$  分解为  $G$ -不可约不变子空间的直和如第 5 题:

$$V = U_1 \oplus \dots \oplus U_s,$$

将  $G$ -同构于  $W_i$  的所有  $U_j$  加起来记为  $V_i (1 \leq i \leq h)$ . 则得  $V = V_1 \oplus \dots \oplus V_h$ . 由第 14 题的证明可知  $\pi_j$  (相当于 14 题的  $\varphi$  和  $\varphi_j$ ) 限制到  $W_i$  后为数乘  $\lambda_{ji} = \langle \chi_j, \chi_i \rangle = \delta_{ij}$ , 这里  $W_i$  是  $m_i$  维  $G$ -不可约不变空间, 决定的特征为  $\chi_i$ . 这也说明  $\pi_j$  限制到  $V_j$  (它的  $G$ -不变不可约子空间均  $G$ -同构于  $W_j$ , 故均决定特征  $\chi_j$ ) 为 1, 而  $\pi_j$  限制到  $V_i (i \neq j)$  为 0. 即知  $\pi_j$  是  $V$  到  $V_j$  的正则投影,  $V_j = \pi_j V$ .

17. 设  $G$  为有限群,  $W$  是任意  $G$ -不可约复线性空间 (即  $G$  的元素均可视为  $W$  的线性变换且  $W$  无非平凡的  $G$  中元素的公共不变子空间). 若  $G$  为阿贝尔群则  $W$  的维数必为 1, 反之亦然 (即若  $G$  不是阿贝尔群, 则必存在维数  $\geq 2$  的  $W$ ).

证 由补充题 15 知,  $G$  的不可约特征  $\{\chi_i\}$  (对应于  $G$ -不可约的互不同构空间  $\{W_i\}$ ) 的个数  $h$  为  $G$  的共轭类数. 而据补充题 13 知  $m_1^2 + \dots + m_h^2 = g (m_i = \dim W_i, g = \#G)$ . 故  $G$  为阿贝尔群当且仅当  $h = g$ , 这又相当于  $m_1 = \dots = m_h = 1$ .

18. 设  $\mathcal{A}$  是  $n$  维酉空间  $V$  上的规范变换,  $W \subset V$ , 且  $W$  是  $\mathcal{A}$  的不变子空间,  $W^\perp$  是  $W$  在  $V$  中的正交补, 求证:  $\mathcal{A}$  在  $W^\perp$  上的限制  $\mathcal{A}|_{W^\perp}$  是规范变换.

证 在  $W$  中取标准正交基  $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ , 并扩充为  $V$  的标准正交基

$$\alpha_1, \dots, \alpha_r, \beta_{r+1}, \dots, \beta_n,$$

故有

$$W^\perp = L(\beta_{r+1}, \dots, \beta_n), \quad V = W \oplus W^\perp.$$

又因为  $W$  是  $\mathcal{A}$  的不变子空间, 故  $\mathcal{A}$  在基  $\alpha_1, \dots, \alpha_r, \beta_{r+1}, \dots, \beta_n$  下的方阵表示为

$$M = \begin{bmatrix} A_1 & C \\ O & A_2 \end{bmatrix}.$$

则由  $\mathcal{A}$  是规范变换, 知  $M$  是规范方阵. 故有

$$\bar{M}^T M = M \bar{M}^T \rightarrow \begin{bmatrix} \bar{A}_1^T & O \\ \bar{C}^T & \bar{A}_2^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_1 & C \\ O & A_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_1 & C \\ O & A_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{A}_1^T & O \\ \bar{C}^T & \bar{A}_2^T \end{bmatrix},$$

$$\text{即} \quad \begin{bmatrix} \bar{A}_1^T A_1 & \bar{A}_1^T C \\ \bar{C}^T A_1 & \bar{C}^T C + \bar{A}_2^T A_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_1 \bar{A}_1^T + C \bar{C}^T & C \bar{A}_2^T \\ A_2 \bar{C}^T & A_2 \bar{A}_2^T \end{bmatrix}$$

$$\text{故有} \quad \begin{cases} \bar{A}_1^T A_1 = A_1 \bar{A}_1^T + C \bar{C}^T \\ \bar{C}^T C + \bar{A}_2^T A_2 = A_2 \bar{A}_2^T \end{cases} \quad (1)$$

$$(2) \quad \bar{C}^T C + \bar{A}_2^T A_2 = A_2 \bar{A}_2^T \quad (2)$$

(2)式两边取迹(即对角线元素之和)得

$$\text{tr}(\bar{C}^T C) + \text{tr}(\bar{A}_2^T A_2) = \text{tr}(A_2 \bar{A}_2^T), \quad (3)$$

这是由于两个方阵相等,它们的对角线元素之和当然相等,以及对任两  $n$  阶方阵  $A, B$ , 有  $\text{tr}(A+B) = \text{tr}A + \text{tr}B$ .

记  $C = (C_1, \dots, C_{n-r})$ ,  $\bar{C}^T C = (d_{ij})$ , 则  $d_{ii} = \bar{C}_i^T C_i$ , 故

$$\text{tr} \bar{C}^T C = \sum_{i=1}^n d_{ii} = \sum_{i=1}^n \bar{C}_i^T C_i = \sum_{i=1}^n \|C_i\|^2 \geq 0,$$

等号仅当  $C_i = 0 (i=1, \dots, n-r)$  成立.

又  $\text{tr}(\bar{A}_2^T A_2) = \text{tr} A_2 \bar{A}_2^T$  (利用对任  $n$  阶方阵  $A, B$ , 有  $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$ ). 其证明如下: 设  $A = (a_{ij})$ ,  $B = (b_{ij})$ ,  $AB = (h_{ij})$ ,  $BA = (\tilde{h}_{ij})$ , 则

$$\text{tr} AB = \sum_{i=1}^n h_{ii} = \sum_{i=1}^n \left( \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{ki} \right) = \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{ki},$$

$$\text{tr} BA = \sum_{k=1}^n \tilde{h}_{kk} = \sum_{k=1}^n \sum_{i=1}^n b_{ki} a_{ik} = \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{ki},$$

于是得  $\text{tr} AB = \text{tr} BA$ . )故由(3)式知:

$$\text{tr} \bar{C}^T C' = 0 \rightarrow C_i = 0, \quad i = 1, 2, \dots, n-r,$$

故知  $C=0$ , 再代回(2)中即得

$$\bar{A}_2^T A_2 = A_2 \bar{A}_2^T,$$

即  $A_2$  为规范阵, 而此时有

$$M = \begin{bmatrix} A_1 & \\ & A_2 \end{bmatrix}$$

故  $A_2$  就是  $\mathcal{A}|_{W^\perp}$  在基  $\beta_{r+1}, \dots, \beta_n$  上的方阵表示, 因  $A_2$  为规范阵,  $\beta_{r+1}, \dots, \beta_n$  为标准正交基, 故  $\mathcal{A}|_{W^\perp}$  为规范变换(见定义 10.8).

## 张量积与外积

## 11.1 定义与定理

定义 11.1 设  $V_1, \dots, V_r, V$  及  $W$  是域  $F$  上的线性空间. 记

$$\prod_{i=1}^r V_i = V_1 \times \cdots \times V_r,$$

为  $(v_1, \dots, v_r)$  全体, 其中  $v_i \in V_i$ , 当  $V_1 = \cdots = V_r = V$  时, 也记

$$V \times \cdots \times V = V^r.$$

映射

$$f: \prod_{i=1}^r V_i \rightarrow W,$$

称为多线性映射或多线性型, 是指对任  $i (i=1, \dots, r)$  和  $c \in F$  均有

$$f(v_1, \dots, v_i + v'_i, \dots, v_r) = f(v_1, \dots, v_i, \dots, v_r) + f(v_1, \dots, v'_i, \dots, v_r),$$

$$f(v_1, \dots, cv_i, \dots, v_r) = cf(v_1, \dots, v_i, \dots, v_r).$$

全体这种多线性映射记为  $L(V_1, \dots, V_r; W)$ .

定义 11.2 设  $T$  是  $F$  上线性空间, 且

$$\tau: V_1 \times \cdots \times V_r \rightarrow T$$

是多线性映射. 若对  $F$  上任意的线性空间  $W$  和任意的多线性映射

$$f: V_1 \times \cdots \times V_r \rightarrow W,$$

均存在唯一线性映射  $f_*: T \rightarrow W$  使得复合映射  $f_* \circ \tau = f$ , 则称  $(T, \tau)$  具有万有性或泛性.

以  $V_1 \times \cdots \times V_r$  中元素集为基(自由)生成的  $F$  上的线性空间记为  $M$ . 设  $N$  为  $M$  的子空间, 由定义 11.2 前两式左右两边之差那样的元素全体生成.

定理 11.1 (1) 记商空间  $M/N = T$ , 模  $N$  自然映射为  $\tau: V_1 \times \cdots \times V_r \rightarrow T$ , 则  $(T, \tau)$  具万有性.

(2) 具万有性的  $(T, \tau)$  在同构意义下是唯一存在的, 也就是说, 设  $(T, \tau)$  具万有性, 那么  $(T', \tau')$  具万有性当且仅当有线性空间的同构

$$\rho: T \cong T' \quad \text{使} \quad \tau' = \rho \tau.$$

系 1 设如定义 11.2 或定理 11.1, 则有线性空间的同构

$$\tau^*: L(T; W) \cong L(V_1, \dots, V_r; W),$$

$$f_* \mapsto f_* \circ \tau.$$

定义 11.3 若  $(T, \tau)$  具万有性, 则称  $(T, \tau)$  为  $V_1, \dots, V_r$  的一个张量积(空间). 张量积(空间)在同构意义下唯一, 记为  $V_1 \otimes \cdots \otimes V_r$ . 记  $\tau(v_1, \dots, v_r)$  为  $v_1 \otimes \cdots \otimes v_r$ , 称为向量

$v_1, \dots, v_r$  的张量积.

**定理 11.2** 设  $\dim V_i = d_i$ , 则  $\dim V_1 \otimes \dots \otimes V_r = d_1 d_2 \dots d_r$ . 又若  $\epsilon_{i1}, \dots, \epsilon_{id_i}$  是  $V_i$  的基, 则

$$\epsilon_{1j_1} \otimes \dots \otimes \epsilon_{rj_r} \quad (1 \leq j_i \leq d_i, \quad 1 \leq i \leq r)$$

是  $V_1 \otimes \dots \otimes V_r$  的基.

**定义 11.4** 设  $A = (a_{ij}) \in M_{m \times n}(F)$ ,  $B = (b_{ij}) \in M_{m' \times n'}(F)$ , 则  $mm' \times nn'$  矩阵

$$(a_{ij}B) = \begin{bmatrix} a_{11}B & \dots & a_{1n}B \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{m1}B & \dots & a_{mn}B \end{bmatrix},$$

称为  $A$  与  $B$  的 Kronecker 积(可以证明这也在定义 11.3 下  $A$  与  $B$  的张量积).

**定理 11.3** 对任意线性空间  $V_1, V_2, V_3$ , 有以下线性空间的自然同构:

$$(1) (V_1 \otimes V_2) \otimes V_3 \cong V_1 \otimes (V_2 \otimes V_3) \cong V_1 \otimes V_2 \otimes V_3,$$

$$(2) (V_1 \oplus V_2) \otimes V_3 \cong (V_1 \otimes V_3) \oplus (V_2 \otimes V_3),$$

分别由以下对应给出(对任意  $v_i \in V_i$ ):

$$(1) (v_1 \otimes v_2) \otimes v_3 \mapsto v_1 \otimes (v_2 \otimes v_3) \mapsto v_1 \otimes v_2 \otimes v_3,$$

$$(2) (v_1 + v_2) \otimes v_3 \mapsto (v_1 \otimes v_3) + (v_2 \otimes v_3).$$

**定义 11.5** 对任两个张量积空间  $V_1 \otimes \dots \otimes V_r$  和  $V_{r+1} \otimes \dots \otimes V_{r+s}$  中任两张量

$$t = v_1 \otimes \dots \otimes v_r, \quad u = v_{r+1} \otimes \dots \otimes v_{r+s},$$

称  $t \otimes u = v_1 \otimes \dots \otimes v_r \otimes v_{r+1} \otimes \dots \otimes v_{r+s}$  为张量( $t$  和  $u$ )的积, 它是  $V_1 \otimes \dots \otimes V_r \otimes \dots \otimes V_{r+s}$  中元素.

**引理 11.1** 设  $\varphi_i$  是  $V_i$  到  $V'_i$  的线性映射( $i=1, 2$ ), 则  $V_1 \otimes V_2$  到  $V'_1 \otimes V'_2$  有唯一的线性映射  $T(\varphi_1, \varphi_2)$  满足

$$T(\varphi_1, \varphi_2)(v_1 \otimes v_2) = \varphi_1(v_1) \otimes \varphi_2(v_2) \quad (\text{对任 } v_i \in V_i).$$

**定理 11.4** 记  $V$  的线性变换全体为  $\text{End}(V)$ . 设  $V_1, V_2$  为有限维线性空间, 则有线性空间的自然同构

$$\text{End}(V_1) \otimes \text{End}(V_2) \cong \text{End}(V_1 \otimes V_2),$$

$$\varphi_1 \otimes \varphi_2 \mapsto T(\varphi_1, \varphi_2).$$

**系 1** 把定理 11.4 中的同构视为等同, 则

$$(\varphi_1 \otimes \varphi_2)(\psi_1 \otimes \psi_2) = (\varphi_1 \psi_1) \otimes (\varphi_2 \psi_2),$$

对任意  $\varphi_1 \otimes \varphi_2, \psi_1 \otimes \psi_2 \in \text{End}(V_1) \otimes \text{End}(V_2) = \text{End}(V_1 \otimes V_2)$  成立.

**定理 11.5** 设  $V_1, V_2$  为有限维线性空间, 以  $V^*$  记  $V$  的对偶空间, 则有线性空间的自然同构

$$V_1^* \otimes V_2^* \cong (V_1 \otimes V_2)^*,$$

$$f_1 \otimes f_2 \mapsto T(f_1, f_2).$$

(把同构视为等同, 也可以写为:  $V_1^* \otimes V_2^* = (V_1 \otimes V_2)^*$ ,

$$f_1 \otimes f_2 = T(f_1, f_2), (f_1 \otimes f_2)(v_1 \otimes v_2) = f_1(v_1)f_2(v_2).$$

**系** 当  $V_1$  和  $V_2$  为有限维时, 有线性空间的自然同构

$$V_1^* \otimes V_2^* \stackrel{\theta}{\cong} L(V_1, V_2; F),$$

$$\theta(f_1, f_2)(v_1, v_2) = (f_1 \otimes f_2)(v_1 \otimes v_2) = f_1(v_1)f_2(v_2).$$

**定义 11.6** 设  $V$  为域  $F$  上的  $n$  维线性空间,  $V^*$  为其对偶空间, 则形如

$$T_q^p(V) = V \otimes \cdots \otimes V \otimes V^* \otimes \cdots \otimes V^*$$

的张量积 ( $p$  重  $V, q$  重  $V^*$ ), 称为  $V$  的  $(p, q)$  型张量积 (空间), 其中元素 (张量) 称为  $p$  次反变 (逆变) 且  $q$  次共变 (协变) 张量. 也记  $T_q^p(V) = T^p(V)$ .

**定理 11.6** 设  $(p, q)$  型张量  $t$  对基  $\{e_i\}$  和  $\{\bar{e}_i\}$  的分量表示分别为  $\xi$  和  $\bar{\xi}$ , 即

$$t = \sum \xi_{j_1 \cdots j_q}^{i_1 \cdots i_p} e_{i_1} \otimes \cdots \otimes e_{i_p} \otimes f^{j_1} \otimes \cdots \otimes f^{j_q}$$

$$= \sum \bar{\xi}_{m_1 \cdots m_q}^{k_1 \cdots k_p} \bar{e}_{k_1} \otimes \cdots \otimes \bar{e}_{k_p} \otimes \bar{f}^{m_1} \otimes \cdots \otimes \bar{f}^{m_q}$$

其中  $\{f^i\}$  和  $\{\bar{f}^i\}$  分别为  $\{e_i\}$  和  $\{\bar{e}_i\}$  的对偶基. 若  $\bar{e}_i = \sum_j a_j^i e_j, \bar{f}^i = \sum_j b_j^i f^j$ , 则对不同基的分量间变换法则为

$$\xi_{j_1 \cdots j_q}^{i_1 \cdots i_p} = \sum a_{k_1}^{i_1} \cdots a_{k_p}^{i_p} b_{j_1}^{m_1} \cdots b_{j_q}^{m_q} \bar{\xi}_{m_1 \cdots m_q}^{k_1 \cdots k_p},$$

$$\bar{\xi}_{m_1 \cdots m_q}^{k_1 \cdots k_p} = \sum a_{m_1}^{j_1} \cdots a_{m_q}^{j_q} b_{i_1}^{k_1} \cdots b_{i_p}^{k_p} \xi_{j_1 \cdots j_q}^{i_1 \cdots i_p}.$$

**定义 11.7** (张量的乘积) 对于  $(p, q)$  和  $(r, s)$  型两张量

$$t_1 = v_1 \otimes \cdots \otimes v_p \otimes f_1 \otimes \cdots \otimes f_q \in T_q^p(V),$$

$$t_2 = u_1 \otimes \cdots \otimes u_r \otimes g_1 \otimes \cdots \otimes g_s \in T_s^r(V),$$

定义  $t_1$  和  $t_2$  的积为  $(p+r, q+s)$  型张量.

$$t_1 \otimes t_2 = v_1 \otimes \cdots \otimes v_p \otimes u_1 \otimes \cdots \otimes u_r \otimes f_1 \otimes \cdots \otimes f_q \otimes g_1 \otimes \cdots \otimes g_s.$$

**定义 11.8** 线性空间族  $T_q^p(V) (p, q=0, 1, 2, \cdots)$  的外直和空间记为  $T(V)$ . 定义 11.7 中的张量间的乘积可按分配律扩展到  $T(V)$  中, 故  $T(V)$  是一个线性空间, 同时又是一个环, 它是域  $F$  上的代数, 称为张量代数.

**定义 11.9** 张量空间  $T^r(V)$  中含平方因子元素:

$x_1 \otimes \cdots \otimes x_r$  (其中有  $x_i = x_j$  对某  $1 \leq i \neq j \leq r$  成立), 全体生成的线性子空间记为  $K$ . 商空间记为  $T^r(V)/K = \Lambda^r(V)$ , 称为  $V$  的  $r$  重外积 (幂) 空间. 模  $K$  的自然映射记为

$$\omega: T^r(V) \rightarrow \Lambda^r(V),$$

$$t \mapsto \bar{t} = t + K.$$

而且记  $\omega(v_1 \otimes \cdots \otimes v_r) = v_1 \wedge \cdots \wedge v_r$ , 称为向量  $v_1, \cdots, v_r \in V$  的外积 (或交错积).  $\Lambda^r(V)$  中元素称为  $r$ -向量,  $\Lambda^r(V^*)$  中元素称为  $r$ -余向量.

**引理 11.2** 对任  $v_1, \cdots, v_r, v'_i \in V$  及  $c \in F$ , 有

(1) 多线性: 对任  $1 \leq i \leq r$  成立

$$v_1 \wedge \cdots \wedge (v_i + v'_i) \wedge \cdots \wedge v_r = v_1 \wedge \cdots \wedge v_r + v_1 \wedge \cdots \wedge v'_i \wedge \cdots \wedge v_r;$$

$$v_1 \wedge \cdots \wedge (cv_i) \wedge \cdots \wedge v_r = c(v_1 \wedge \cdots \wedge v_r).$$

(2) 交错性: 当  $v_i = v_j (i \neq j)$  时, 有  $v_1 \wedge \cdots \wedge v_r = 0$ .

**定义 11.10** 设  $V$  和  $W$  为  $F$  上线性空间, 且设  $f: V^r \rightarrow W$  为多线性映射. 若当  $v_i = v_j$  (对任  $1 \leq i \neq j \leq r$ ) 时总有  $f(v_1, \cdots, v_r) = 0$ , 则称  $f$  是交错的.

**定理 11.7 (外积的万有性)** 设  $V$  和  $W$  是域  $F$  上线性空间, 则对任意交错的多线性映射  $f: V^r \rightarrow W$ , 存在着唯一的线性映射  $f': \wedge^r(V) \rightarrow W$ , 使得  $f'(v_1 \wedge \cdots \wedge v_r) = f(v_1, \cdots, v_r)$  对任意  $v_1, \cdots, v_r \in V$  成立. 特别, 取  $W = F$ , 则对应  $f' \mapsto f$  给出线性空间的自然同构:

$$(\wedge^r V)^* \cong AL(V^r; F),$$

其中  $AL(V^r; W)$  表示交错的多线性映射全体 (由  $V^r$  到  $W$ ).

**定义 11.11**  $\wedge(V) = \bigoplus_{r=0}^n \wedge^r(V)$  称为  $V$  的外代数或 Grassmann 代数.

**定理 11.8** 设  $V$  是  $F$  上  $n$  维线性空间.

(1)  $\dim \wedge^r(V) = C_n^r$  (当  $1 \leq r \leq n$ ) 或 0 (当  $r > n$ );  $\dim \wedge(V) = 2^n$ .

(2)  $\wedge^r(V)$  有如下的基

$$e_{i_1} \wedge \cdots \wedge e_{i_r} \quad (1 \leq i_1 < i_2 < \cdots < i_r \leq n)$$

其中  $e_1, \cdots, e_n$  是  $V$  的基,  $1 \leq r \leq n$ .

**定理 11.9** 设  $V$  与  $V^*$  是域  $F$  上互为对偶的有限维线性空间, 则有线性空间的自然同构

$$\psi: \wedge^r(V^*) \cong (\wedge^r(V))^*,$$

$$\psi(f_1 \wedge \cdots \wedge f_r)(v_1 \wedge \cdots \wedge v_r) = \det(f_i(v_j)).$$

其中  $f_i \in V^*, v_j \in V, 1 \leq i, j \leq r$ .

**系 1** 对有限维线性空间  $V$  有自然同构

$$\lambda: \wedge^r(V^*) \cong AL(V^r; F),$$

$$\lambda(f_1 \wedge \cdots \wedge f_r)(v_1, \cdots, v_r) = \det(f_i(v_j)).$$

**系 2** 设  $f \in \wedge^r V^*$  和  $w \in \wedge^r V$  的坐标表示分别为

$$f = \sum_{i_1 < \cdots < i_r} f_{i_1 \cdots i_r} f^{i_1} \wedge \cdots \wedge f^{i_r},$$

$$w = \sum_{i_1 < \cdots < i_r} w^{i_1 \cdots i_r} e_{i_1} \wedge \cdots \wedge e_{i_r},$$

则

$$\psi(f)w = (f, w) = \sum_{i_1 < \cdots < i_r} f_{i_1 \cdots i_r} w^{i_1 \cdots i_r}.$$

**定义 11.12** 张量空间  $T^r(V^*)$  由下式

$$\mathcal{A}(f_1 \otimes \cdots \otimes f_r) = \sum_{\sigma_1 \cdots \sigma_r} (-1)^{\tau(\sigma_1 \cdots \sigma_r)} f_{\sigma_1} \otimes \cdots \otimes f_{\sigma_r}$$

定义的线性变换  $\mathcal{A}$  称为交错化算子 (其中  $\sigma_1 \cdots \sigma_r$  过  $12 \cdots r$  的排列).

**定理 11.10** 设  $V$  是数域  $F$  上有限维线性空间, 则有外积空间与交错张量空间的自然同构

$$\pi: \wedge^r(V^*) \cong AT^r(V^*) \subset T^r(V^*),$$

$$\pi(f_1 \wedge \cdots \wedge f_r) = \mathcal{A}(f_1 \otimes \cdots \otimes f_r).$$

**定理 11.10'** 设  $V$  是数域  $F$  上有限维线性空间, 则有如下线性空间的自然同构

$$\pi: \wedge^r(V) \cong AT^r(V) \subset T^r(V),$$

$$\pi(v_1 \wedge \cdots \wedge v_r) = \mathcal{A}(v_1 \otimes \cdots \otimes v_r).$$



其中  $AT(V)$  是交错张量全体,  $\mathcal{A}$  为  $T(V)$  的线性变换, 定义为

$$\mathcal{A}(v_1 \otimes \cdots \otimes v_r) = \sum_{\sigma_1 \cdots \sigma_r} (-1)^{\tau(\sigma_1 \cdots \sigma_r)} v_{\sigma_1} \otimes \cdots \otimes v_{\sigma_r}.$$

**引理 11.3** (1) 定义 11.12 中  $\mathcal{A}$  的象均为交错张量.

(2) 若  $t \in T(V^*)$  为交错张量, 则  $\mathcal{A}(t) = (r!)t$ .

**定理 11.11** 对交错张量  $t_1 \in AT^r(V)$  和  $t_2 \in AT^s(V)$ , 定义它们的外积为

$$t_1 \wedge t_2 = \frac{1}{r!s!} \mathcal{A}(t_1 \otimes t_2),$$

则  $AT(V) = AT^0(V) \oplus AT^1(V) \oplus \cdots \oplus AT^n(V)$  是一个代数. 而且若将  $\wedge^r V$  与  $AT^r(V)$  视为等同, 则此处定义与下式中积的定义一致, 外代数  $\wedge V$  与  $AT(V)$  完全相同. 对  $W_1 = v_1 \wedge \cdots \wedge v_r$ ,  $W_2 = u_1 \wedge \cdots \wedge u_s$ , 其外积定义为:

$$W_1 \wedge W_2 = v_1 \wedge \cdots \wedge v_r \wedge u_1 \wedge \cdots \wedge u_s \in \wedge^{r+s} V \subset \wedge V.$$

## 11.2 习题与解答

1. 设  $V$  为域  $F$  上线性空间, 证明如下映射是线性空间的同构:

$$\begin{aligned} \theta: V \otimes F^n &\rightarrow V^n, \\ v \otimes (c_1, \cdots, c_n) &\mapsto (c_1 v, \cdots, c_n v). \end{aligned}$$

**证** 注意  $F^n = F \oplus \cdots \oplus F$  是  $n$  个  $F$  的直和 (线性空间的外直和), 同样这里  $V^n$  也是指  $V$  的外直和. 由于  $V \otimes F \cong V$  (在映射  $v \otimes a \mapsto av$  之下), 故  $V \otimes (F \oplus \cdots \oplus F) = (V \otimes F) \oplus \cdots \oplus (V \otimes F) \cong V \oplus \cdots \oplus V$ . 也可以直接验证  $\theta$  是线性映射, 是双射, 从而是同构, 详证如下:

(1)  $\theta$  是线性映射: 这按题意即知. 因为  $V \otimes F^n$  的元素均是形如  $\sum_{v, c_i} v \otimes (c_1, \cdots, c_n)$  的有限和, 而按题意应有

$$\theta\left(\sum_{v, c_i} v \otimes (c_1, \cdots, c_n)\right) = \sum_{v, c_i} \theta(v \otimes (c_1, \cdots, c_n)),$$

由此易知  $\theta$  是线性映射.

(2)  $\theta$  是单射: 若  $(c_1 v, \cdots, c_n v) = 0$ , 按外直和定义知应有  $c_i v = 0 (1 \leq i \leq n)$ , 故  $v = 0$  或  $c_i = 0$ , 即知  $v \otimes (c_1, \cdots, c_n) = 0$ .

(3)  $\theta$  是满射: 对任意  $(v_1, \cdots, v_n) \in V \oplus \cdots \oplus V$ , 令  $\alpha_i = v_i \otimes \epsilon_i \in V \otimes F^n$  (其中  $\epsilon_i$  只有第  $i$  分量非 0, 为 1), 则

$$\begin{aligned} \theta(\alpha_1 + \cdots + \alpha_n) &= \theta(\alpha_1) + \cdots + \theta(\alpha_n) = (v_1, 0, \cdots, 0) + \cdots + (0, \cdots, 0, v_n) \\ &= (v_1, \cdots, v_n). \end{aligned}$$

故  $\theta$  是满射.

2. 设  $V_1 \otimes V_2$  中  $\sum_{i=1}^s x_i \otimes y_i = 0$  且  $x_1, \cdots, x_s$  线性无关, 则  $y_1 = \cdots = y_s = 0$ .

**证** 反证法. 若  $y_1, \cdots, y_s$  不全为 0, 不妨设  $y_1, \cdots, y_r$  非 0 而  $y_{r+1} = \cdots = y_s = 0$ . 取  $V_1$  的基  $x_1, \cdots, x_s, \cdots, x_m$ , 取  $V_2$  的基  $\beta_1, \cdots, \beta_n$ , 并设  $y_i = \sum a_{ij} \beta_j (1 \leq i \leq r)$  于是  $a_{ij}$  不

全为 0, 因为  $y_i \neq 0$ . 则

$$\begin{aligned} 0 &= \sum_{i=1}^r x_i \otimes y_i = x_1 \otimes y_1 + \cdots + x_r \otimes y_r \\ &= a_{11}x_1 \otimes \beta_1 + \cdots + a_{1n}x_1 \otimes \beta_n + \cdots + a_{r1}x_r \otimes \beta_1 + \cdots + a_{rn}x_r \otimes \beta_n. \end{aligned}$$

由于  $x_1 \otimes \beta_1, \cdots, x_1 \otimes \beta_n, \cdots, x_r \otimes \beta_1, \cdots, x_r \otimes \beta_n$  线性无关(它们是  $V_1 \otimes V_2$  的基的一部分), 故与系数  $a_{ij}$  不全为 0 矛盾.

3. 设  $S, V, W$  是域  $F$  上有限维线性空间, 若线性映射  $\varphi: S \rightarrow V$  是单射, 则  $\varphi \otimes 1_W: S \otimes W \rightarrow V \otimes W$  也是单射.

证 证法 1 映射为单射相当于有左逆. 设  $\psi$  是  $\varphi$  的左逆, 则

$$(\psi \otimes 1) \circ (\varphi \otimes 1) = (\psi \circ \varphi) \otimes (1 \circ 1) = 1 \otimes 1$$

为恒等映射, 故  $\varphi \otimes 1$  有左逆  $\psi \otimes 1$ , 是单射.

证法 2 设  $(\varphi \otimes 1)(s \otimes w) = \varphi(s) \otimes w = 0$  (其中  $s \in S, w \in W$ ). 则  $\varphi(s) = 0$  或  $w = 0$ , 即  $s = 0$  或  $w = 0$ , 从而  $s \otimes w = 0$ . 故  $\varphi \otimes 1$  为单射.

4. 复数全体  $\mathbb{C}$  可看作实数域  $\mathbb{R}$  上线性空间(2 维), 也可看作  $\mathbb{C}$  上线性空间. 作为这两种线性空间,  $\mathbb{C}$  与自身的张量积分别记为:

$$\mathbb{C} \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C} \quad \text{和} \quad \mathbb{C} \otimes_{\mathbb{C}} \mathbb{C}.$$

试问  $\mathbb{C} \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$  与  $\mathbb{C} \otimes_{\mathbb{C}} \mathbb{C}$  是否相等? 分别求出它们的基. 它们中的哪些运算不同, 有何不同?

解  $\mathbb{C} \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$  与  $\mathbb{C} \otimes_{\mathbb{C}} \mathbb{C}$  不相等.  $\mathbb{C} \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$  的基为  $\{1 \otimes 1, 1 \otimes i, i \otimes 1, i \otimes i\}$ . 而  $\mathbb{C} \otimes_{\mathbb{C}} \mathbb{C}$  的基为  $\{1 \otimes 1\}$ . 它们的数乘运算不同:  $\mathbb{C} \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$  的数乘为实数乘, 而  $\mathbb{C} \otimes_{\mathbb{C}} \mathbb{C}$  的数乘为复数乘.

5. 设  $V$  是复数域  $\mathbb{C}$  上  $n$  维空间, 于是  $V$  自然是  $\mathbb{R}$  上  $2n$  维空间.  $V$  作为  $\mathbb{R}$  和  $\mathbb{C}$  上空间的与自身的内积分别记为  $V \otimes_{\mathbb{R}} V$  和  $V \otimes_{\mathbb{C}} V$ , 试问二者是否相同, 基有何关系, 哪些运算不同?

解  $V \otimes_{\mathbb{R}} V$  与  $V \otimes_{\mathbb{C}} V$  不相等. 设  $V$  作为  $\mathbb{C}$  上线性空间的基为  $\alpha_1, \cdots, \alpha_n$ , 则  $V$  作为  $\mathbb{R}$  上的线性空间基为  $\alpha_1, \cdots, \alpha_n, i\alpha_1, \cdots, i\alpha_n$ .  $V \otimes_{\mathbb{C}} V$  的基为  $\{\alpha_k \otimes \alpha_j\} (1 \leq k, j \leq n)$ .  $V \otimes_{\mathbb{R}} V$  的基为

$$\{\alpha_k \otimes \alpha_j, i\alpha_k \otimes \alpha_j, \alpha_k \otimes i\alpha_j, i\alpha_k \otimes i\alpha_j\} \quad (1 \leq k, j \leq n).$$

它们的数乘运算不同:  $V \otimes_{\mathbb{C}} V$  中的数乘允许用复数乘.

6. 试证明有如下线性空间的自然同构:

$$\text{Hom}(V_1 \otimes V_2, V_3) \cong \text{Hom}(V_1, \text{Hom}(V_2, V_3)),$$

其中  $\text{Hom}(V_1, V_2)$  是  $V_1$  到  $V_2$  的线性映射全体,  $V_i$  是域  $F$  上的线性空间 ( $i=1, 2, 3$ ).

证 任取  $f \in L(V_1 \times V_2; V_3)$  (即双线性映射), 对任一固定的  $x \in V_1$ , 则有线性映射  $\sigma: V_2 \rightarrow V_3, y \mapsto f(x, y)$ . 因此每个  $f$  定义了  $\text{Hom}(V_1, \text{Hom}(V_2, V_3))$  中一个元素  $\theta(f): x \mapsto \sigma$ . 反之, 任一  $\varphi \in \text{Hom}(V_1, \text{Hom}(V_2, V_3))$  定义了一个双线性映射  $f: (x, y) \mapsto \varphi(x)(y)$ , 而且  $\theta(f) = \varphi$  (因为  $\theta(f)(x)y = \sigma y = f(x, y) = \varphi(x)y$ ). 故  $\theta$  是  $L(V_1 \times V_2; V_3)$  到  $\text{Hom}(V_1, \text{Hom}(V_2, V_3))$  的 1:1 对应. 容易看出  $\theta$  是线性空间的同构(设  $\theta(f_i) = \varphi_i (i=1, 2)$  如上, 则易验证

$$\begin{aligned} \theta(f_1 + f_2)(x)y &= (\varphi_1 + \varphi_2)(x)y, \\ \theta(cf)(x)y &= c\theta(f)(x)y, \end{aligned}$$

(对任意  $x \in V_1, y \in V_2, c \in F$ ). 再由  $L(V_1 \times V_2; V_3) \cong L(V_1 \otimes V_2, V_3)$ , 即得所欲证.

7. 设  $V_1$  和  $V_2$  是域  $F$  上两个线性空间, 维数分别为  $m$  和  $n$ . 设  $U$  是  $F$  上  $mn$  维线性空间, 且满足如下条件:

(1) 存在  $V_1 \times V_2$  到  $U$  的一个双线性映射  $\sigma$ ;

(2) 若  $\alpha_1, \dots, \alpha_m$  和  $\beta_1, \dots, \beta_n$  是  $V_1$  与  $V_2$  的基, 则  $\{\sigma(\alpha_i, \beta_j)\}$  是  $U$  的一个基;

试证明  $(U, \sigma)$  是  $V_1$  和  $V_2$  的(一个)张量积.

证 只需证明  $(U, \sigma)$  具万有性. 对  $F$  上任意线性空间  $W$ , 和每个  $f \in L(V_1 \times V_2; W)$ , 令  $f_*(\sigma(\alpha_i, \beta_j)) = f(\alpha_i, \beta_j)$ , 则可扩展  $f_*$  为  $U$  到  $W$  的线性映射(因为  $\{\sigma(\alpha_i, \beta_j)\}$  是  $U$  的基), 故  $(U, \sigma)$  具有万有性.

8. 设  $V_1, V_2$  和  $U$  是  $F$  上线性空间, 维数分别为  $m, n$  和  $mn$ . 分别取它们的基  $\{\alpha_i\}, \{\beta_j\}, \{\gamma_{ij}\}$ . 对  $v_1 = \sum_{i=1}^m a_i \alpha_i$  和  $v_2 = \sum_{j=1}^n b_j \beta_j$ , 定义

$$\sigma(v_1, v_2) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_i b_j \gamma_{ij} \in U.$$

试证明  $(U, \sigma)$  是  $V_1$  和  $V_2$  的一个张量积.

证 显然  $\sigma$  是双线性映射:  $V_1 \times V_2 \rightarrow U$ , 且满足第 7 题的条件. 故得证.

9. 设  $(T, \tau)$  是  $V_1$  和  $V_2$  的张量积(见定义 11.2), 试说明  $\tau: V_1 \times V_2 \rightarrow T$  是否为满射, 为什么?

解  $\tau$  不是满射,  $\tau$  的像生成线性空间  $T$ .  $\tau$  的像均形如

$$\tau(v_1, v_2) = v_1 \otimes v_2 \quad (v_i \in V_i),$$

称为主张量. 而  $T$  的元素是主张量的有限线性组合.(第 11 题中例子说明  $T$  中有的张量不是主张量.)

10. 说明张量积无交换律, 即一般  $v_1 \otimes v_2 \neq v_2 \otimes v_1$ .

解 设  $V$  的基为  $\alpha_1, \alpha_2$ ; 则  $V \otimes V$  的基为

$$\alpha_1 \otimes \alpha_1, \alpha_1 \otimes \alpha_2, \alpha_2 \otimes \alpha_1, \alpha_2 \otimes \alpha_2,$$

特别可知

$$\alpha_1 \otimes \alpha_2 \neq \alpha_2 \otimes \alpha_1.$$

11. 设如第 8 题, 且  $m, n \geq 2$ . 试证明  $\alpha_1 \otimes \beta_1 + \alpha_2 \otimes \beta_2$  不是主张量(即不能表示为  $v_1 \otimes v_2$  ( $v_i \in V_i$ )).

证 反证法. 设  $\alpha_1 \otimes \beta_1 + \alpha_2 \otimes \beta_2 = v_1 \otimes v_2$ ,  $v_1 = a_1 \alpha_1 + \dots + a_m \alpha_m$ ,  $v_2 = b_1 \beta_1 + \dots + b_n \beta_n$ , 则

$$\alpha_1 \otimes \beta_1 + \alpha_2 \otimes \beta_2 = v_1 \otimes v_2 = \sum_{i,j} a_i b_j \alpha_i \otimes \beta_j,$$

比较两边  $\alpha_1 \otimes \beta_1$  和  $\alpha_2 \otimes \beta_2$  的系数可知  $a_1 b_1 = 1, a_2 b_2 = 1$ . 特别可知  $a_1, b_1, a_2, b_2$  均非 0. 故右方  $\alpha_1 \otimes \beta_2$  一项的系数  $a_1 b_2 \neq 0$ , 与左方矛盾. 故  $\alpha_1 \otimes \beta_1 + \alpha_2 \otimes \beta_2$  不是主张量.

12. 设  $A, B$  为  $m, n$  阶方阵, 试求  $\text{tr}(A \otimes B)$ ,  $\det(A \otimes B)$ , 及  $A \otimes B$  的全部特征值(设  $A, B$  的特征值已知, 基域为  $\mathbb{C}$ ); 并证明  $A \otimes B$  与  $B \otimes A$  相似.

解 (1)  $A \otimes B$  即为  $A = (a_{ij})$  和  $B = (b_{ij})$  的 Kronecker 积  $(a_{ij} B)$ . 故

$$\text{tr}(A \otimes B) = \sum_{i=1}^m \text{tr}(a_{ii} B) = \left( \sum_{i=1}^m a_{ii} \right) (\text{tr} B) = (\text{tr} A) (\text{tr} B).$$

(2) 设  $A$  的特征根为  $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ ;  $B$  的特征根为  $\mu_1, \dots, \mu_n$ , 则  $A \otimes B$  的特征根为  $\{\lambda_i \mu_j\}$  ( $1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n$ ). 由此也可知

$$\det(A \otimes B) = (\det A)^n (\det B)^m.$$

证 设  $P^{-1}AP = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & * \\ & \ddots & \\ & & \lambda_m \end{bmatrix} = \Lambda = (\lambda_{ij})$  为上三角方阵, 其中  $P = (p_{ij})$ . 则易知

$$(p_{ij}I)^{-1}(a_{ij}B)(p_{ij}I) = \begin{bmatrix} \lambda_1 B & & * \\ & \ddots & \\ & & \lambda_m B \end{bmatrix}$$

为准上三角方阵, 这里  $(p_{ij}I)$  是  $mn$  阶方阵, 分为  $m^2$  块,  $(i, j)$  位置的  $n \times n$  块为  $p_{ij}I$ . 同理  $(a_{ij}B)$  的  $(i, j)$  位块为  $n \times n$  阵  $a_{ij}B$ . (这是因为  $P^{-1}AP = \Lambda$  相当于  $AP = P\Lambda$ , 将元素的运算对应到分块运算则得到  $(a_{ij}I)(p_{ij}I) = (p_{ij}I)(\lambda_{ij}I)$ , 从而得到

$$(a_{ij}B)(p_{ij}I) = (p_{ij}I)(\lambda_{ij}B),$$

即  $(p_{ij}I)^{-1}(a_{ij}B)(p_{ij}I) = (\lambda_{ij}B)$ . 所以  $A \otimes B = (a_{ij}B)$  的特征根即是  $\lambda_1 B, \dots, \lambda_m B$  的特征根的合并, 即为  $\{\lambda_i \mu_j\}$ .

(3)  $A \otimes B = (a_{ij}B)$  和  $B \otimes A = (b_{ij}A)$  是同一线性映射在两个不同基下的方阵表示, 所以是相似的. 设  $V = M_{m \times n}(F)$  为域  $F$  上  $m \times n$  矩阵全体构成的  $F$  上的  $m \times n$  维线性空间. 考虑  $V$  的如下线性变换  $\sigma$ :

$$\sigma(X) = AXB, \quad (X \in V = M_{m \times n}(F)),$$

取  $V$  的(有序)基  $E_{11}, E_{12}, \dots, E_{1n}, E_{21}, E_{22}, \dots, E_{2n}, \dots, E_{m1}, E_{m2}, \dots, E_{mn}$ . 注意任意矩阵

$$X = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_m \end{bmatrix} \in V \text{ 在此基下的坐标列为 } \hat{X} = \begin{bmatrix} x_1^T \\ \vdots \\ x_m^T \end{bmatrix}, \text{ (其中 } x_i \text{ 是 } X \text{ 的第 } i \text{ 行), 故}$$

$$\sigma(X) = AXB = \begin{bmatrix} a_{11}x_1 + \dots + a_{1m}x_m \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{m1}x_1 + \dots + a_{mn}x_m \end{bmatrix} B = \begin{bmatrix} a_{11}x_1 B + \dots + a_{1m}x_m B \\ \dots \\ a_{m1}x_1 B + \dots + a_{mn}x_m B \end{bmatrix}.$$

故  $\sigma(X)$  的坐标列为

$$\begin{aligned} (\sigma(X))^{\wedge} &= \begin{bmatrix} a_{11}B^T x_1^T + \dots + a_{1m}B^T x_m^T \\ \dots \\ a_{m1}B^T x_1^T + \dots + a_{mn}B^T x_m^T \end{bmatrix} = (a_{ij}B^T) \begin{bmatrix} x_1^T \\ \vdots \\ x_m^T \end{bmatrix} \\ &= (A \otimes B^T) \hat{X}. \end{aligned}$$

故  $A \otimes B^T = (a_{ij}B^T)$  是  $\sigma$  在上述基下的方阵表示. 再取  $V$  的(有序)基  $E_{11}, E_{21}, \dots, E_{m1}, E_{12}, E_{22}, \dots, E_{m2}, \dots, E_{1n}, E_{2n}, \dots, E_{mn}$ , 则  $X = (y_1, \dots, y_n) \in V$  在此基下的坐标列为

$$\tilde{X} = \begin{bmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix},$$

其中  $y_j$  为  $X$  的第  $j$  列. 故

$$\begin{aligned}\sigma(X) &= AXB = A(y_1, \dots, y_n)(b_{ij}) = A(b_{11}y_1 + \dots + b_{n1}y_n, \dots, b_{1n}y_1 + \dots + b_{nn}y_n) \\ &= (b_{11}Ay_1 + \dots + b_{n1}Ay_n, \dots, b_{1n}Ay_1 + \dots + b_{nn}Ay_n).\end{aligned}$$

故  $\sigma(X)$  的坐标列为

$$(\sigma(X))^{\sim} = \begin{bmatrix} b_{11}Ay_1 + \dots + b_{n1}Ay_n \\ \vdots \\ b_{1n}Ay_1 + \dots + b_{nn}Ay_n \end{bmatrix} = (b_{ji}A) \begin{bmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} = (B^T \otimes A) \begin{bmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}.$$

故  $B^T \otimes A = (b_{ji}A)$  是  $\sigma(X)$  在上述基下的方阵表示. 故  $A \otimes B^T$  和  $B^T \otimes A$  是同一线性变换  $\sigma$  在不同基下的方阵表示. 故  $A \otimes B^T$  与  $B^T \otimes A$  相似.  $A \otimes B$  与  $B \otimes A$  相似.

13. 设  $V$  是域  $F$  上  $n$  维线性空间,  $E$  是  $F$  的  $d$  次扩域 (即  $E \supset F$ ), 且  $E$  作为  $F$  上线性空间有维数  $d$ . 证明  $E \otimes V$  是  $E$  上线性空间, 其中数乘定义为  $k(x \otimes v) = (kx) \otimes v$ . 且若  $\alpha_1, \dots, \alpha_n$  是  $V$  在  $F$  上的基, 则  $1 \otimes \alpha_1, \dots, 1 \otimes \alpha_n$  是  $E \otimes V$  在  $E$  上的基 ( $E \otimes V$  称为  $V$  的基域到  $E$  的扩展).

证  $E$  和  $V$  均为  $F$  上的线性空间, 故其张量积  $E \otimes V$  是域  $F$  上的  $nd$  维线性空间. 对  $k \in E, x \otimes v \in E \otimes V$ , 定义“数乘” $k(x \otimes v) = (kx) \otimes v$ , 亦即  $k\left(\sum_i x_i \otimes v_i\right) = \sum_i (kx_i) \otimes v_i$ . 易知  $E \otimes V$  是  $E$  上线性空间;  $E \otimes V$  对加法是阿贝尔群 (因为是  $F$  上的线性空间), 对  $E$  上的数乘满足:

$$\begin{aligned}(k_1 + k_2)(x \otimes v) &= ((k_1 + k_2)x) \otimes v = (k_1x + k_2x) \otimes v \\ &= (k_1x) \otimes v + (k_2x) \otimes v = k_1(x \otimes v) + k_2(x \otimes v), \\ k(x_1 \otimes v_1 + x_2 \otimes v_2) &= k(x_1 \otimes v_1) + k(x_2 \otimes v_2), \\ k_2(k_1(x \otimes v)) &= k_2((k_1x) \otimes v) = (k_2k_1x) \otimes v = (k_2k_1)(x \otimes v), \\ 1 \cdot (x \otimes v) &= x \otimes v.\end{aligned}$$

若  $E$  在  $F$  上的基为  $e_1, \dots, e_d$ , 则  $\{e_i \otimes \alpha_j\} (1 \leq i \leq d, 1 \leq j \leq n)$  为  $E \otimes V$  在  $F$  上的基. 特别可知  $\{e_i \otimes \alpha_j\}$  是  $E \otimes V$  在  $F$  上的生成元集, 从而  $\{1 \otimes \alpha_j\} (1 \leq j \leq n)$  是  $E \otimes V$  在  $E$  上的生成元集. 只需再证明它们在  $E$  上线性无关. 若有  $k_1, \dots, k_n \in E$  使  $\sum_{j=1}^n k_j(1 \otimes \alpha_j) = 0$ , 设

$$k_j = \sum_{i=1}^d c_{ij}e_i, \quad c_{ij} \in F, \text{ 则}$$

$$0 = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^d c_{ij}e_i(1 \otimes \alpha_j) = \sum_{i,j} c_{ij}(e_i \otimes \alpha_j),$$

故知  $c_{ij} = 0 (1 \leq i \leq d, 1 \leq j \leq n)$  (因为  $\{e_i \otimes \alpha_j\}$  是  $E \otimes V$  在  $F$  上的基), 从而知  $k_1 = \dots = k_n = 0$ . 即知  $\{1 \otimes \alpha_j\}$  在  $E$  上线性无关, 是  $E \otimes V$  在  $E$  上的基.

14. 设  $V$  是  $\mathbf{R}$  上欧几里得空间, 内积为  $g(\alpha, \beta) = \langle \alpha, \beta \rangle$ . 试证明  $T'(V)$  中可定义内积

$$\langle \alpha_1 \otimes \dots \otimes \alpha_r, \beta_1 \otimes \dots \otimes \beta_r \rangle = \langle \alpha_1, \beta_1 \rangle \times \dots \times \langle \alpha_r, \beta_r \rangle$$

设  $e_1, \dots, e_n$  是  $V$  的标准正交基, 试求  $T'(V)$  的标准正交基.

解 欧几里得空间  $V$  是自对偶空间, 即其对偶空间是自身:  $V^* = V$ . 故由定理 11.5 知  $T'(V)$  的对偶空间  $(T'(V))^* = T'(V^*) = T'(V)$ , 即  $T'(V)$  也是自对偶的, 这一自对偶决定了  $T'(V)$  的内积 (见定理 11.5):

$$\langle \alpha_1 \otimes \cdots \otimes \alpha_r, \beta_1 \otimes \cdots \otimes \beta_r \rangle = \langle \alpha_1, \beta_1 \rangle \cdots \langle \alpha_r, \beta_r \rangle, \quad (*)$$

也可以直接验证(\*)式决定  $T^r(V)$  的一个内积(即正定对称双线性型):

(1) 正定性: 注意

$$\langle \alpha_1 \otimes \cdots \otimes \alpha_r, \alpha_1 \otimes \cdots \otimes \alpha_r \rangle = \langle \alpha_1, \alpha_1 \rangle \cdots \langle \alpha_r, \alpha_r \rangle,$$

故若  $\alpha_1 \otimes \cdots \otimes \alpha_r \neq 0$ , 则每个  $\alpha_i \neq 0 (1 \leq i \leq r)$ , 故  $\langle \alpha_i, \alpha_i \rangle > 0$ , 即知上式为正. 而若  $\alpha_1 \otimes \cdots \otimes \alpha_r = 0$ , 则存在一个  $\alpha_i = 0$ , 即知上式为 0.

(2) 对称性: 由  $\langle \alpha, \beta \rangle$  的对称性即知.

(3) 双线性: 此内积的定义正是由(\*)式双线性地拓展到  $T^r(V)$  上.

若  $e_1, \cdots, e_n$  是  $V$  的标准正交基, 则

$$\{e_{i_1} \otimes \cdots \otimes e_{i_r}\}, \quad (1 \leq i_1, \cdots, i_r \leq n),$$

为  $T^r(V)$  的标准正交基:

(1) 若  $e_{i_1} \otimes \cdots \otimes e_{i_r} \neq e_{j_1} \otimes \cdots \otimes e_{j_r}$ , 则不妨设  $e_{i_1} \neq e_{j_1}$ , 于是  $\langle e_{i_1}, e_{j_1} \rangle = 0$ , 故

$$\langle e_{i_1} \otimes \cdots \otimes e_{i_r}, e_{j_1} \otimes \cdots \otimes e_{j_r} \rangle = \langle e_{i_1}, e_{j_1} \rangle \cdots \langle e_{i_r}, e_{j_r} \rangle = 0.$$

(2)  $\langle e_{i_1} \otimes \cdots \otimes e_{i_r}, e_{i_1} \otimes \cdots \otimes e_{i_r} \rangle = \langle e_{i_1}, e_{i_1} \rangle \cdots \langle e_{i_r}, e_{i_r} \rangle = 1 \cdots 1 = 1.$

15. 设  $\mathcal{A}$  和  $\mathcal{B}$  是  $V_1$  和  $V_2$  的线性变换, 在基  $\alpha_1, \cdots, \alpha_m$  和  $\beta_1, \cdots, \beta_n$  下的方阵表示分别为  $A$  和  $B$ . 于是  $\alpha_1 \otimes \beta_1, \cdots, \alpha_1 \otimes \beta_n, \alpha_2 \otimes \beta_1, \cdots, \alpha_2 \otimes \beta_n, \cdots, \alpha_m \otimes \beta_1, \cdots, \alpha_m \otimes \beta_n$  是  $V_1 \otimes V_2$  的基. 试证明  $\mathcal{A} \otimes \mathcal{B}$  作为  $V_1 \otimes V_2$  的线性变换在上述基下的方阵表示为  $A \otimes B$ .

证 设  $\alpha, \beta \in V$  的坐标列为  $x = (x_1, \cdots, x_m)^T$  和  $y = (y_1, \cdots, y_n)^T$ . 则

$$\alpha \otimes \beta = \left( \sum_i x_i \alpha_i \right) \otimes \left( \sum_j y_j \beta_j \right) = \sum_{i,j} x_i y_j (\alpha_i \otimes \beta_j).$$

故  $\alpha \otimes \beta$  的坐标列为

$$(x_1 y_1, \cdots, x_1 y_n, \cdots, x_m y_1, \cdots, x_m y_n)^T = \begin{bmatrix} x_1 y \\ \vdots \\ x_m y \end{bmatrix} = x \otimes y.$$

因为  $\mathcal{A}\alpha$  的坐标列为  $Ax$ ,  $\mathcal{B}\beta$  的坐标列为  $By$ , 记  $A = (a_{ij}), B = (b_{ij})$ . 则  $(\mathcal{A} \otimes \mathcal{B})(\alpha \otimes \beta) = (\mathcal{A}\alpha) \otimes (\mathcal{B}\beta)$  的坐标列为  $(Ax) \otimes (By)$ , 而

$$\begin{aligned} (Ax) \otimes (By) &= \begin{bmatrix} (a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n)By \\ \vdots \\ (a_{m1}x_1 + \cdots + a_{mn}x_n)By \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11}Bx_1y + \cdots + a_{1n}Bx_ny \\ \vdots \\ a_{m1}Bx_1y + \cdots + a_{mn}Bx_ny \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} a_{11}B & \cdots & a_{1n}B \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1}B & \cdots & a_{mn}B \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 y \\ \vdots \\ x_n y \end{bmatrix} = (A \otimes B)(x \otimes y). \end{aligned}$$

即  $(\mathcal{A} \otimes \mathcal{B})(\alpha \otimes \beta)$  的坐标列为  $(A \otimes B)(x \otimes y)$ , 这说明  $\mathcal{A} \times \mathcal{B}$  的方阵表示为  $A \otimes B$ .

16. 设  $v_1, \cdots, v_r \in V$  是线性空间  $V$  中  $r$  个向量. 试证明:  $v_1 \wedge \cdots \wedge v_r = 0$  当且仅当  $v_1, \cdots, v_r$  线性相关.

证  $\Leftarrow$  设  $v_r$  线性相关时, 不妨设  $v_r = \sum_{i=1}^{r-1} k_i v_i$  是  $v_1, \cdots, v_{r-1}$  的线性组合, 于是有

$$v_1 \wedge \cdots \wedge v_{r-1} \wedge v_r = v_1 \wedge \cdots \wedge v_{r-1} \wedge \left( \sum_i k_i v_i \right)$$

$$= \sum_{i=1}^{r-1} k_i (v_1 \wedge \cdots \wedge v_{r-1} \wedge v_i) = \sum_{i=1}^{r-1} 0 = 0.$$

( $v_1 \wedge \cdots \wedge v_{r-1} \wedge v_i = 0$  是因为含有平方因子(重因子)).

反之,若  $v_1, \dots, v_r$  线性无关,则可扩充为  $V$  的基,从而  $v_1 \wedge \cdots \wedge v_r$  是  $\wedge^r V$  的基中一元素,故非 0. (此即说明了当  $v_1 \wedge \cdots \wedge v_r = 0$  时必有  $v_1, \dots, v_r$  线性相关).

17. 设  $W$  是  $V$  的一个子空间,基为  $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ , 令  $\omega = \alpha_1 \wedge \cdots \wedge \alpha_r$ . 试证明  $\omega$  不随  $W$  的基的不同选取而变化(不计非 0 常数倍意义下),且  $\omega$  与  $W$  相互决定:

$$W = \{\alpha \in V \mid \alpha \wedge \omega = 0\}.$$

(在一定意义上,  $\omega$  可称为  $W$  的“外积法线”,  $\omega$  的长度是基中向量张成的  $r$  维平行体的体积——如果进一步假定  $V$  是欧几里得空间的话.  $\omega \in \wedge^r V$  的坐标(在定理 11.8(2)中)称为子空间  $W$  的 Plücker 坐标,它在不计非 0 常数倍意义下唯一).

证 设  $\beta_1, \dots, \beta_r$  为  $W$  的另一基,  $(\beta_1, \dots, \beta_r) = (\alpha_1, \dots, \alpha_r)A$ , 其中  $A = (a_{ij})$  为  $r$  阶可逆方阵,则

$$\begin{aligned} \beta_1 \wedge \cdots \wedge \beta_r &= \left( \sum_{i_1=1}^r a_{1i_1} \alpha_{i_1} \right) \wedge \cdots \wedge \left( \sum_{i_r=1}^r a_{ri_r} \alpha_{i_r} \right) \\ &= \sum_{1 \leq i_1, \dots, i_r \leq r} a_{1i_1} \cdots a_{ri_r} \alpha_{i_1} \wedge \cdots \wedge \alpha_{i_r}. \end{aligned}$$

当  $i_1, \dots, i_r$  不是  $1, 2, \dots, r$  的排列时(即  $i_1, \dots, i_r$  中有相等的),  $\alpha_{i_1} \wedge \cdots \wedge \alpha_{i_r} = 0$ . 故上述和式实为取遍  $1, 2, \dots, r$  的排列  $i_1, \dots, i_r$ . 此时经对换可以将  $\alpha_{i_1} \wedge \cdots \wedge \alpha_{i_r}$  化为  $\alpha_1 \wedge \cdots \wedge \alpha_r$ , 每次对换变一次符号,故知

$$\begin{aligned} \beta_1 \wedge \cdots \wedge \beta_r &= \sum_{i_1 \cdots i_r} (-1)^{\tau(i_1 \cdots i_r)} a_{1i_1} \cdots a_{ri_r} \alpha_1 \wedge \cdots \wedge \alpha_r \\ &= (\det A) \alpha_1 \wedge \cdots \wedge \alpha_r. \end{aligned}$$

故  $\beta_1 \wedge \cdots \wedge \beta_r$  与  $\alpha_1 \wedge \cdots \wedge \alpha_r$  相差非 0 常数倍  $\det A$ .

又由第 16 题可知  $\alpha \wedge \omega = \alpha \wedge \alpha_1 \wedge \cdots \wedge \alpha_r = 0$  当且仅当  $\alpha, \alpha_1, \dots, \alpha_r$  线性相关,这相当于  $\alpha$  是  $\alpha_1, \dots, \alpha_r$  的线性组合,即  $\alpha \in W$ .

如果  $V$  是欧几里得空间,则  $V$  是自对偶的:  $V^* = V$ . 从而由定理 11.9 可知  $\wedge^r V = \wedge^r V^*$  也是自对偶的,内积为  $\langle \alpha_1 \wedge \cdots \wedge \alpha_r, v_1 \wedge \cdots \wedge v_r \rangle = \det(\langle \alpha_i, v_j \rangle)$ . 若取  $\alpha_1, \dots, \alpha_r$  为  $W$  的标准正交基,则

$$\langle \omega, \omega \rangle = \langle \alpha_1 \wedge \cdots \wedge \alpha_r, \alpha_1 \wedge \cdots \wedge \alpha_r \rangle = \det(\langle \alpha_i, \alpha_j \rangle) = \det I = 1,$$

即  $\omega$  长度为 1(在  $\wedge^r V$  中). 此时  $\omega$  在另一基  $\beta_1, \dots, \beta_r$  下的长度  $\beta_1 \wedge \cdots \wedge \beta_r = \det A$ , 恰为  $\beta_1, \dots, \beta_r$  张成的  $r$  维平行体的体积.

18. 对每个线性映射  $\mathcal{A}: V \rightarrow V'$  (这里  $V$  和  $V'$  是  $F$  上线性空间), 试证明如下是线性映射:

$$\wedge(\mathcal{A}): \wedge(V) \rightarrow \wedge(V')$$

$$\wedge(\mathcal{A})(v_1 \wedge \cdots \wedge v_r) = \mathcal{A}v_1 \wedge \cdots \wedge \mathcal{A}v_r,$$

(对任意  $v_1, \dots, v_r \in V$ ). 进而证明  $\wedge(\mathcal{A})$  还保持外代数中的(外)乘法:  $\wedge(\mathcal{A})(w \wedge u) = (\wedge(\mathcal{A})w) \wedge (\wedge(\mathcal{A})u)$  对任意  $w, u \in \wedge(V)$  成立.

证 注意

$$\begin{aligned}\wedge(\mathcal{A})((v_1 + v'_1) \wedge v_2 \wedge \cdots \wedge v_r) &= \wedge(\mathcal{A})(v_1 \wedge v_2 \wedge \cdots \wedge v_r \\ &\quad + v'_1 \wedge v_2 \wedge \cdots \wedge v_r)\end{aligned}$$

而  $\mathcal{A}(v_1 + v'_1) \wedge \cdots \wedge \mathcal{A}v_r = (\mathcal{A}v_1 + \mathcal{A}v'_1) \wedge \cdots \wedge \mathcal{A}v_r = \mathcal{A}v_1 \wedge \cdots \wedge \mathcal{A}v_r + \mathcal{A}v'_1 \wedge \mathcal{A}v_2 \wedge \cdots \wedge \mathcal{A}v_r$ . 故题中映射可按线性拓展为  $\wedge(V)$  到  $\wedge(V')$  的线性映射. 设

$$w = v_1 \wedge \cdots \wedge v_r, \quad u = u_1 \wedge \cdots \wedge u_s,$$

$$\begin{aligned}\text{则 } \wedge(\mathcal{A})(w \wedge u) &= \wedge(\mathcal{A})(v_1 \wedge \cdots \wedge v_r \wedge u_1 \wedge \cdots \wedge u_s) = \mathcal{A}v_1 \wedge \cdots \wedge \mathcal{A}v_r \wedge \mathcal{A}u_1 \wedge \cdots \wedge \mathcal{A}u_s \\ &= (\wedge(\mathcal{A})w) \wedge (\wedge(\mathcal{A})u).\end{aligned}$$

19. 记号如第 18 题, 若  $V' = V$  即  $\mathcal{A}$  是  $V$  的线性变换, 则  $\wedge(\mathcal{A})$  给出  $\wedge^r(V)$  的线性变换. 且证明: (1)  $(\wedge(\mathcal{A}))(\wedge(\mathcal{B})) = \wedge(\mathcal{A}\mathcal{B})$ ;

(2) 若  $\mathcal{A}$  可逆则  $\wedge(\mathcal{A})$  也可逆, 且  $(\wedge(\mathcal{A}))^{-1} = \wedge(\mathcal{A}^{-1})$ .

证 (1) 因为对任意  $v_1, \cdots, v_r \in V$ , 有

$$\begin{aligned}(\wedge(\mathcal{A}))(\wedge(\mathcal{B}))(v_1 \wedge \cdots \wedge v_r) &= \wedge(\mathcal{A})(\mathcal{B}v_1 \wedge \cdots \wedge \mathcal{B}v_r) \\ &= (\mathcal{A}\mathcal{B})v_1 \wedge \cdots \wedge (\mathcal{A}\mathcal{B})v_r = \wedge(\mathcal{A}\mathcal{B})(v_1 \wedge \cdots \wedge v_r),\end{aligned}$$

故  $(\wedge(\mathcal{A}))(\wedge(\mathcal{B})) = \wedge(\mathcal{A}\mathcal{B})$ .

(2) 由(1)知

$$(\wedge(\mathcal{A}^{-1}))(\wedge(\mathcal{A})) = \wedge(\mathcal{A}^{-1}\mathcal{A}) = \wedge(1)$$

为恒等变换, 故  $\wedge(\mathcal{A})$  可逆且逆为  $\wedge(\mathcal{A}^{-1})$ .

20. 设  $\mathcal{A}$  为张量空间的交错化算子 (见定义 11.12) 试证明  $\mathcal{A}$  与任一  $\sigma \in S_r$  可交换, 即

$$\mathcal{A} \circ \sigma = \sigma \circ \mathcal{A} = sg(\sigma)\mathcal{A}.$$

证 只需证明  $\mathcal{A}\sigma, \sigma\mathcal{A}, s(\sigma)\mathcal{A}$  三者任一张量  $t$  上的作用相等 (这里记  $\mathcal{A}\sigma = \mathcal{A} \circ \sigma$ ,  $s(\sigma) = sg(\sigma)$ ).

$$\begin{aligned}(\mathcal{A}\sigma)(t) &= \mathcal{A}(\sigma t) = \sum_{\tau \in S_r} s(\tau) \tau(\sigma t) = s(\sigma) \sum_{\tau} s(\sigma) s(\tau) \tau \sigma(t) \\ &= s(\sigma) \sum_{\tau} s(\tau\sigma) (\tau\sigma)(t) = s(\sigma) \sum_{\rho \in S_r} s(\rho) \rho(t) = s(\sigma) \mathcal{A}(t).\end{aligned}$$

同理可证  $(\sigma\mathcal{A})(t) = s(\sigma) \mathcal{A}(t)$ .

21. 设  $\mathcal{A}$  如第 20 题, 证明  $\ker \mathcal{A} = K$  为  $T^r(V)$  中含平方因子元素生成的子空间.

证 设  $t \in K$  为  $T^r(V)$  中含平方因子元素, 即  $t = v_1 \otimes \cdots \otimes v_r$ , 其中  $v_i = v_j$  ( $1 \leq i \neq j \leq r$ ). 记对换  $\tau(ij) \in S_r$ , 则  $\tau t = t$ . 而由第 20 题知

$$\mathcal{A}(t) = \mathcal{A}(\tau t) = sg(\tau) \mathcal{A}(t) = -\mathcal{A}(t),$$

故  $\mathcal{A}(t) = 0$ , 即  $t \in \ker \mathcal{A}$ , 故  $K \subset \ker \mathcal{A}$ . 又由引理 11.3, 定理 11.10' 和定义 11.9 知

$$\begin{aligned}T^r(V)/\ker \mathcal{A} &\cong \mathcal{A}(T^r(V)) = AT^r(V) \cong \wedge^r(V) \\ &= T^r(V)/K,\end{aligned}$$

故知  $\ker \mathcal{A} = K$ .

22. 有的作者按如下方式定义交错化算子  $\hat{\mathcal{A}}: T^r(V) \rightarrow T^r(V)$ , 即对  $t \in T^r(V)$  令



$$\hat{\mathcal{A}}(t) = \frac{1}{r!} \sum_{\sigma \in S_r} \text{sg}(\sigma) \sigma(t).$$

证明  $\ker \hat{\mathcal{A}} = \ker \mathcal{A} = K$ , 且当  $t$  为交错张量时有  $\hat{\mathcal{A}}(t) = t$ , 从而  $\hat{\mathcal{A}}^2 = \hat{\mathcal{A}}$ .

证 显然  $\hat{\mathcal{A}} = \frac{1}{r!} \mathcal{A}$ . 故  $\hat{\mathcal{A}}(t) = 0$  当且仅当  $\mathcal{A}(t) = 0$ , 故  $\ker \hat{\mathcal{A}} = \ker \mathcal{A} = K$ . 而当  $t$  为交错张量时,

$$\hat{\mathcal{A}}(t) = \frac{1}{r!} \mathcal{A}(t) = \frac{r!}{r!} t = t.$$

对任一  $u \in T^r(V)$ ,

$$t = \hat{\mathcal{A}}(u) = \frac{1}{r!} \mathcal{A}(u) \subset AT^r(V) \text{ 为交错张量.}$$

故

$$\hat{\mathcal{A}}^2(u) = \hat{\mathcal{A}}(t) = t = \hat{\mathcal{A}}(u),$$

这说明  $\hat{\mathcal{A}}^2 = \hat{\mathcal{A}}$ .

23. 设  $w_1 \in \wedge^r(V)$ ,  $w_2 \in \wedge^s(V)$ , 试证明  $w_1 \wedge w_2 = (-1)^{rs} w_2 \wedge w_1$ .

证 设  $V$  的基为  $e_1, \dots, e_n$ , 则  $\wedge^r(V)$  的基为  $\{e_{i_1} \wedge \dots \wedge e_{i_r} \mid 1 \leq i_1 < \dots < i_r \leq n\}$ . 设  $w_1 = \sum_i a_i e_{i_1} \wedge \dots \wedge e_{i_r}$ ,  $w_2 = \sum_j b_j e_{j_1} \wedge \dots \wedge e_{j_s}$ , 其中记  $i = i_1 \dots i_r$ ,  $j = j_1 \dots j_s$ . 于是

$$\begin{aligned} w_1 \wedge w_2 &= \left( \sum_i a_i e_{i_1} \wedge \dots \wedge e_{i_r} \right) \wedge \left( \sum_j b_j e_{j_1} \wedge \dots \wedge e_{j_s} \right) \\ &= \sum_{i,j} a_i b_j e_{i_1} \wedge \dots \wedge e_{i_r} \wedge e_{j_1} \wedge \dots \wedge e_{j_s}. \end{aligned}$$

显然

$e_{i_1} \wedge \dots \wedge e_{i_r} \wedge e_{j_1} \wedge \dots \wedge e_{j_s} = (-1)^r e_{j_1} \wedge e_{i_1} \wedge \dots \wedge e_{i_r} \wedge e_{j_2} \wedge \dots \wedge e_{j_s}$ , 即  $e_{j_1}$  可经  $r$  次相邻对换移到最左边, 而每次对换改变一次正负号. 同样可以依次将  $e_{j_2}, \dots, e_{j_s}$  均经  $r$  次相邻对换移到  $e_{i_1}$  的左方, 共改变符号  $rs$  次故

$$e_{i_1} \wedge \dots \wedge e_{i_r} \wedge e_{j_1} \wedge \dots \wedge e_{j_s} = (-1)^{rs} e_{j_1} \wedge \dots \wedge e_{j_s} \wedge e_{i_1} \wedge \dots \wedge e_{i_r}.$$

故知

$$\begin{aligned} w_1 \wedge w_2 &= \sum_{i,j} a_i b_j (-1)^{rs} e_{j_1} \wedge \dots \wedge e_{j_s} \wedge e_{i_1} \wedge \dots \wedge e_{i_r} \\ &= (-1)^{rs} \left( \sum_j b_j e_{j_1} \wedge \dots \wedge e_{j_s} \right) \wedge \left( \sum_i a_i e_{i_1} \wedge \dots \wedge e_{i_r} \right) \\ &= (-1)^{rs} w_2 \wedge w_1. \end{aligned}$$

24. 多线性映射  $f: V^r \rightarrow W$  称为对称的, 是指

$$f(\dots, v_i, \dots, v_j, \dots) = f(\dots, v_j, \dots, v_i, \dots)$$

对任意  $v_i, v_j \in V$  和  $1 \leq i, j \leq r$  成立. 证明这相当于  $\sigma f = f$  对任意  $\sigma \in S_r$  成立.

证 题中条件相当于  $\sigma f = f$  对任意对换  $\sigma = (i, j)$  成立 ( $1 \leq i, j \leq r$ ). 若题中条件成立, 任意置换  $\sigma \in S_r$  可分解为  $\sigma = \sigma_s \dots \sigma_2 \sigma_1$  (其中  $\sigma_1, \dots, \sigma_s$  均为对换), 于是

$$\sigma f = (\sigma_s \dots \sigma_2 \sigma_1) f = (\sigma_s \dots \sigma_2)(\sigma_1 f) = (\sigma_s \dots \sigma_2) f = \dots = \sigma_s f = f.$$

反之, 若  $\sigma f = f$  对任意  $\sigma \in S_r$  成立, 则因任一对换  $\sigma = (i, j)$  也属于  $S_r$ , 对  $\sigma f = f$ , 即为题中

条件.

25. 设  $V$  是域  $F$  上线性空间,  $M$  为  $T^r(V)$  中如下形式的元素全体生成的子空间:

$$x_1 \otimes \cdots \otimes x_r - x_{\sigma_1} \otimes \cdots \otimes x_{\sigma_r}$$

( $\sigma$  过  $S_r$ ;  $\sigma_k = \sigma(k)$ ,  $x_i \in V$ ). 定义商空间

$$S^r(V) = T^r(V)/M,$$

称为  $V$  的  $r$  重对称积(幂). 记模  $M$  的自然映射为

$$\zeta: T^r(V) \rightarrow S^r(V),$$

$$t \mapsto t + M,$$

记  $\zeta(v_1 \otimes \cdots \otimes v_r) = v_1 \cdots v_r$  (或  $v_1 \vee \cdots \vee v_r$ ), 称为  $v_1, \dots, v_r$  的对称积. 试证明:

(1) 对称积是对称的(或称交换的), 即

$$v_1 \cdots v_i \cdots v_j \cdots v_r = v_1 \cdots v_j \cdots v_i \cdots v_r \quad (\text{对任意 } i, j);$$

(2) 对称积有多线性(或称分配律), 即

$$v_1 \cdots (v_i + v'_i) \cdots v_r = v_1 \cdots v_i \cdots v_r + v_1 \cdots v'_i \cdots v_r;$$

$$v_1 \cdots (cv_i) \cdots v_r = cv_1 \cdots v_r.$$

(3) 如下复合映射是对称映射:

$$V^r \rightarrow T^r(V) \rightarrow S^r(V),$$

$$(v_1, \dots, v_r) \mapsto v_1 \otimes \cdots \otimes v_r \mapsto v_1 \cdots v_r.$$

证 (1) 因为

$$\alpha = v_1 \otimes \cdots \otimes v_i \otimes \cdots \otimes v_j \otimes \cdots \otimes v_r - v_1 \otimes \cdots \otimes v_j \otimes \cdots \otimes v_i \otimes \cdots \otimes v_r \in M,$$

故

$$0 = \zeta(\alpha) = v_1 \cdots v_i \cdots v_j \cdots v_r - v_1 \cdots v_j \cdots v_i \cdots v_r.$$

(2)

$$\begin{aligned} v_1 \cdots (v_i + v'_i) \cdots v_r &= \zeta(v_1 \otimes \cdots \otimes (v_i + v'_i) \otimes \cdots \otimes v_r) \\ &= \zeta(v_1 \otimes \cdots \otimes v_i \otimes \cdots \otimes v_r + v_1 \otimes \cdots \otimes v'_i \otimes \cdots \otimes v_r) \\ &= v_1 \cdots v_i \cdots v_r + v_1 \cdots v'_i \cdots v_r. \end{aligned}$$

而对任意  $c \in F$ ,

$$\begin{aligned} v_1 \cdots (cv_i) \cdots v_r &= \zeta(v_1 \otimes \cdots \otimes (cv_i) \otimes \cdots \otimes v_r) \\ &= \zeta(cv_1 \otimes \cdots \otimes v_i \otimes \cdots \otimes v_r) = cv_1 \cdots v_i \cdots v_r. \end{aligned}$$

(3) 记题中复合映射为  $f$ , 则

$$\begin{aligned} f(v_1, \dots, v_i, \dots, v_j, \dots, v_r) &= v_1 \cdots v_i \cdots v_j \cdots v_r = v_1 \cdots v_j \cdots v_i \cdots v_r \\ &= f(v_1, \dots, v_j, \dots, v_i, \dots, v_r) \end{aligned}$$

对任意  $1 \leq i, j \leq r$  成立, 故  $f$  是对称映射.

26. (对称积的万有性) 设如上题, 对任一线性空间  $W$  和对称多线性映射  $f: V^r \rightarrow W$ , 必存在唯一的线性映射  $f_*: S^r(V) \rightarrow W$  使  $f_*(v_1 \cdots v_r) = f(v_1, \dots, v_r)$  对任意  $v_1, \dots, v_r \in V$  成立.

证 由张量积的万有性, 知道存在唯一的线性映射

$$f_*: T^r(V) \rightarrow W, \quad \text{使 } f_*(v_1 \otimes \cdots \otimes v_r) = f(v_1, \dots, v_r)$$

对任意  $v_1, \dots, v_r \in V$  成立. 因  $f$  是对称的, 故知第 25 题中的子空间  $M \subset \ker f_*$ . ( $M$  由  $\alpha =$

$v_1 \otimes \cdots \otimes v_r - v_{\sigma_1} \otimes \cdots \otimes v_{\sigma_r}$  生成, 而  $f_*(\alpha) = f_*(v_1 \otimes \cdots \otimes v_r) - f_*(v_{\sigma_1} \otimes \cdots \otimes v_{\sigma_r}) = f(v_1, \cdots, v_r) - f(v_{\sigma_1}, \cdots, v_{\sigma_r}) = 0$ . 故知第 25 题中映射  $\zeta$  的核  $\ker \zeta = M \subset \ker f_*$ . 因此, 对于  $T^r(V)$  中的每一个模  $M$  同余类  $t + M \in S^r(V)$ , 其中的所有张量 (不仅在映射  $\zeta$  下的像) 在  $f_*$  下的像也都相同. 故  $f_*$  自然地决定了一个映射

$$f_*: S^r(V) \rightarrow W,$$

使得

$$f_*(v_1 \cdots v_r) = f_*(v_1 \otimes \cdots \otimes v_r) = f(v_1, \cdots, v_r).$$

27. 记号如上题. 令  $S(V) = \bigoplus_{r=0}^{\infty} S^r(V)$  为外直和空间, 约定  $S^0(V) = F$ . 由  $T(V) = \bigoplus_{r=0}^{\infty} T^r(V)$  中的乘法定义  $S(V)$  中的乘法, 即令

$$\zeta(t_1 \otimes t_2) = \zeta(t_1)\zeta(t_2).$$

(或记为  $\zeta(t_1) \vee \zeta(t_2)$ ,  $\zeta$  见第 25 题). 证明  $S(V)$  是一个代数 (称为对称代数).

证 由  $T(V)$  中乘法的结合律可得  $S(V)$  中乘法的结合律: 由

$$(t_1 \otimes t_2) \otimes t_3 = t_1 \otimes (t_2 \otimes t_3) \text{ 可知 } \zeta(t_1 \otimes t_2)\zeta(t_3) = \zeta(t_1)\zeta(t_2 \otimes t_3), \text{ 即} \\ (\zeta(t_1)\zeta(t_2))\zeta(t_3) = \zeta(t_1)(\zeta(t_2)\zeta(t_3)).$$

同样, 由  $T(V)$  中的分配律可得  $S(V)$  中的分配律. 所以  $S(V)$  是一个环, 又是  $F$  上的线性空间. 且对于  $c \in F$ , 由  $(ct_1) \otimes t_2 = t_1 \otimes (ct_2)$  可知

$$(c\zeta(t_1)) \otimes \zeta(t_2) = \zeta(ct_1) \otimes \zeta(t_2) = (\zeta(t_1)) \otimes (c\zeta(t_2)).$$

故知  $S(V)$  是  $F$  上的代数.

28. 记号如上题. 设  $V$  的基为  $e_1, \cdots, e_n$  (注意  $V = S^1(V) \subset S(V)$ ). 证明对称代数  $S(V)$  与  $F$  上  $n$  元多项式 (形式) 代数  $F[X_1, \cdots, X_n]$  同构, 即如下映射是双射且保持加法, 数乘和乘法:

$$\varphi: S(V) \rightarrow F[X_1, \cdots, X_n] \\ e_i \mapsto X_i \quad (i = 1, \cdots, n).$$

证 设  $X_1, \cdots, X_n$  是互异的不定元, 记  $P_r$  为  $X_1, \cdots, X_n$  的  $r$  次齐次多项式全体,  $v_i = a_{i1}e_1 + \cdots + a_{in}e_n$ . 定义映射

$$f: V^r \rightarrow P_r \\ (v_1, \cdots, v_r) \mapsto (a_{11}X_1 + \cdots + a_{1n}X_n) \cdots (a_{r1}X_1 + \cdots + a_{rn}X_n),$$

显然  $f$  是多线性对称映射. 由对称积的万有性 (第 26 题) 可知存在唯一的线性映射  $\varphi: S^r(V) \rightarrow P_r$  使

$$\varphi(v_1 \cdots v_r) = f(v_1, \cdots, v_r) = \prod_{i=1}^r \left( \sum_{j=1}^n a_{ij} X_j \right)$$

特别可知当  $v_1, \cdots, v_r$  都取基  $e_1, \cdots, e_n$  中向量时有:

$$\varphi(e_{i_1} \cdots e_{i_r}) = X_{i_1} X_{i_2} \cdots X_{i_r}.$$

由于单项式集  $\{X_{i_1} X_{i_2} \cdots X_{i_r}\}$  在  $F$  上是线性无关的, 故集合  $\{e_{i_1} \cdots e_{i_r}\}$  在  $F$  上是线性无关的 (这也称为  $e_1, \cdots, e_n$  在  $F$  上是代数独立的). 所以映射  $\varphi: S^r(V) \rightarrow P_r$  是线性空间的同构映射.  $\varphi$  决定了线性空间同构  $S(V) \rightarrow F[X_1, \cdots, X_n]$ , 仍记为  $\varphi$ , 而且将  $S(V)$  中的乘法对应为多项式乘法:

$$\begin{aligned}\varphi(v_1 \cdots v_r v_{r+1} \cdots v_{r+s}) &= \prod_{i=1}^{r+s} \left( \sum_{j=1}^n a_{ij} X_j \right) = \left[ \prod_{i=1}^r \left( \sum_{j=1}^n a_{ij} X_j \right) \right] \left[ \prod_{i=1}^s \sum_{j=1}^n a_{ij} X_j \right] \\ &= \varphi(v_1 \cdots v_r) \varphi(v_{r+1} \cdots v_{r+s}).\end{aligned}$$

故  $\varphi$  为对称代数  $S(V)$  与多项式代数  $F[X_1, \dots, X_n]$  之间的同构.

29. 如下定义的  $T^r(V)$  的线性变换  $\mathcal{S}$  称为对称化算子:

$$\mathcal{S}(t) = \sum_{\sigma \in S_r} \sigma(t)$$

证明这相当于定义

$$\mathcal{S}(v_1 \otimes \cdots \otimes v_r) = \sum_{\sigma \in S_r} v_{\sigma_1} \otimes \cdots \otimes v_{\sigma_r},$$

且  $\ker \mathcal{S} = M$  ( $M$  如第 25 题).

证 (1) 记  $u = v_1 \otimes \cdots \otimes v_r$ , 则对  $\sigma \in S_r$ , 已知  $\sigma u = v_{\sigma_1} \otimes \cdots \otimes v_{\sigma_r}$ . 故由  $\mathcal{S}(t) = \sum_{\sigma \in S_r} \sigma(t)$

可知

$$\mathcal{S}(u) = \sum_{\sigma \in S_r} \sigma(u) = \sum_{\sigma} v_{\sigma_1} \otimes \cdots \otimes v_{\sigma_r}.$$

反之, 由于任一张量  $t \in T^r(V)$  可表为形如  $v_1 \otimes \cdots \otimes v_r$  的主张量的和, 故由

$$\mathcal{S}(v_1 \otimes \cdots \otimes v_r) = \sum_{\sigma} v_{\sigma_1} \otimes \cdots \otimes v_{\sigma_r},$$

即知  $\mathcal{S}(t) = \sum_{\sigma} \sigma(t)$ .

(2) 由第 25 题知  $M$  由形如  $u - \sigma u$  的张量生成 (这里  $u = v_1 \otimes \cdots \otimes v_r$  为主张量).

$$\begin{aligned}\mathcal{S}(u - \sigma u) &= \sum_{\tau \in S_r} \tau(u - \sigma u) = \sum_{\tau \in S_r} (\tau u - \tau \sigma u) \\ &= \sum_{\tau \in S_r} \tau(u) - \sum_{\tau \in S_r} \tau \sigma(u).\end{aligned}$$

记  $\tau' = \tau \sigma$ , 则当  $\tau$  遍历  $S_r$  时,  $\tau'$  也遍历  $S_r$ , 故由上式知

$$\mathcal{S}(u - \sigma u) = \mathcal{S}(u) - \sum_{\tau' \in S_r} \tau'(u) = \mathcal{S}(u) - \mathcal{S}(u) = 0.$$

即知  $u - \sigma u \in \ker \mathcal{S}$ , 从而  $M \subset \ker \mathcal{S}$ .

(3) 对称积空间的对偶空间  $(S^r(V))^*$  与对称多线性映射集  $SL(V^r; F)$  是同构的. 这可由对称积的万有性 (第 26 题) 得到: 对每个  $f \in SL(V^r; F)$ , 存在唯一的  $f_s \in (S^r(V))^* = L(S^r(V); F)$  使

$$f_s(v_1 \cdots v_r) = f(v_1, \dots, v_r),$$

即  $f = f_s \zeta$  (其中  $\zeta$  在第 25 题定义,  $\tau$  为张量积如在定义 11.2 或定理 11.1). 如同定理 11.1 的系 1 或定理 11.7 一样, 对应  $f_s \mapsto f$  给出同构  $(S^r(V))^* \cong SL(V^r; F)$ .

(4)  $\mathcal{S}$  的像  $\mathcal{S}(T^r(V))$  恰为对称张量全体  $ST^r(V)$  (张量  $t$  是对称的当且仅当  $\tau t = t$  对任意  $\tau \in S_r$  成立). 首先, 由于

$$\tau \mathcal{S}(t) = \tau \sum_{\sigma \in S_r} \sigma(t) = \sum_{\sigma \in S_r} \tau \sigma(t) = \sum_{\sigma' \in S_r} \sigma'(t) = \mathcal{S}(t),$$

故知  $\mathcal{S}$  的像均为对称张量, 另一方面, 若  $t$  为对称张量, 则

$$\mathcal{S}(t) = \sum_{\sigma \in S_r} \sigma(t) = \sum_{\sigma \in S_r} (t) = (r!)t$$

仍为对称张量. 故

$$\mathcal{S}(T^r(V)) = ST^r(V).$$

(5) 由上述知

$$T^r(V)/\ker \mathcal{S} \cong \mathcal{S}(T^r(V)) = ST^r(V) \cong ST^r(V^*) \cong SL(V^r; F),$$

最后的同构是由于  $T^r(V^*) \cong L(V^r; F)$ , 即  $V^*$  的张量积同构于  $V$  上多线性映射集, 故其中的对称张量对应于对称多线性映射. 另一方面, 由第 25 题和 (3) 知

$$T^r(V)/M \cong S^r(V) \cong (S^r(V))^* \cong SL(V^r; F).$$

这就知道  $M$  与  $\ker \mathcal{S}$  的维数相同, 再由 (2) 即知  $M = \ker \mathcal{S}$ .

30. 设  $V$  是域  $F$  上的  $n$  维线性空间. 试证明  $\bigwedge^{(n-1)}(V)$  中每个元素 (即  $(n-1)$ -向量) 均为可因子分解的 (可表为  $v_1 \wedge \cdots \wedge v_r$  ( $v_1, \dots, v_r \in V$ ) 形式的  $r$ -向量称为可因子分解的, 也称为主  $r$ -向量).

证 设  $e_1, \dots, e_n$  为  $V$  的基,  $w_i = e_1 \wedge \cdots \wedge e_{i-1} \wedge e_{i+1} \wedge \cdots \wedge e_n$  (无因子  $e_i$ ), 则  $w_1, \dots, w_n$  是  $\bigwedge^{(n-1)} V$  的基. 每个  $w \in \bigwedge^{(n-1)} V$  可表为  $w = k_1 w_1 + \cdots + k_n w_n$ ,  $k_i \in F$ . 而对  $V$  中每个向量  $\alpha = x_1 e_1 + \cdots + x_n e_n$ ,  $x_i \in F$ , 外积

$$\alpha \wedge w = \left( \sum_i x_i e_i \right) \wedge \left( \sum_j k_j w_j \right) = \sum_{i,j} x_i k_j (e_i \wedge w_j),$$

注意当  $i \neq j$  时  $e_i \wedge w_j = 0$ , 而  $e_i \wedge w_i = (-1)^{i-1} e_1 \wedge \cdots \wedge e_n$ . 故

$$\alpha \wedge w = (e_1 \wedge \cdots \wedge e_n) \sum_{i=1}^n x_i k_i (-1)^{i-1}.$$

故  $\alpha \wedge w = 0$  当且仅当  $k_1 x_1 - k_2 x_2 + \cdots + (-1)^{n-1} k_n x_n = 0$ , 当  $w$  固定时 (即固定  $k_1, \dots, k_n$ ), 解  $(x_1, \dots, x_n)$  是  $F^n$  的  $n-1$  维子空间. 故  $W = \{\alpha \in V \mid \alpha \wedge w = 0\}$  是  $V$  的  $n-1$  维子空间. 由第 17 题知,  $w$  应当是  $W$  的“外积法线”. 所以  $w$  应可表示为  $w = (k v_1) \wedge \cdots \wedge v_{n-1}$ , 其中  $v_1, \dots, v_{n-1}$  是  $W \subset V$  的基.

31. 设  $V$  是  $\mathbb{Q}$  上四维线性空间,  $e_1, \dots, e_4$  为其基, 试证明  $w = e_1 \wedge e_2 + e_3 \wedge e_4$  不可因子分解 (定义见上题).

证 若  $w = e_1 \wedge e_2 + e_3 \wedge e_4$  可分解为  $w = \alpha_1 \wedge \cdots \wedge \alpha_r$ , 则  $\alpha_1, \dots, \alpha_r$  必线性无关 (因为  $w \neq 0$ ), 生成一个  $r \geq 1$  维子空间  $W$ . 按第 17 题知  $W$  由所有满足  $\alpha \wedge w = 0$  的  $\alpha \in V$  组成. 若  $\alpha = x_1 e_1 + x_2 e_2 + x_3 e_3 + x_4 e_4$ , 则

$$\begin{aligned} \alpha \wedge w &= (x_1 e_1 + x_2 e_2 + x_3 e_3 + x_4 e_4) \wedge (e_1 \wedge e_2 + e_3 \wedge e_4) \\ &= x_1 e_1 \wedge e_3 \wedge e_4 + x_2 e_2 \wedge e_3 \wedge e_4 + x_3 e_1 \wedge e_2 \wedge e_3 + x_4 e_1 \wedge e_2 \wedge e_4. \end{aligned}$$

故  $\alpha \wedge w = 0$  当且仅当  $x_1 = x_2 = x_3 = x_4 = 0$ , 即  $\alpha = 0$ . 所以  $W = \{0\}$ . 这说明  $w$  不可分解.

### 11.3 补充题与解答

1. 设  $V$  是  $n$  维复线性空间,  $\{e_i\}$  为其基. 由下式定义  $V \otimes V$  的自同构  $\theta$ :

$$\theta(e_i \otimes e_j) = e_j \otimes e_i \quad (1 \leq i, j \leq n).$$

(1) 证明  $\theta(\alpha \otimes \beta) = \beta \otimes \alpha$  (对任意  $\alpha, \beta \in V$ ), 且  $\theta^2 = 1$ .

$$(2) V \otimes V = \text{Sym}^2(V) \oplus \text{Alt}^2(V)$$

为直和分解,其中  $\text{Sym}^2(V)$  由满足  $\theta(\alpha) = \alpha$  所有  $\alpha \in V$  组成,  $\text{Alt}^2(V)$  为满足  $\theta(\alpha) = -\alpha$  的所有  $\alpha \in V$ .

(3) 求  $\text{Sym}^2(V)$  和  $\text{Alt}^2(V)$  的基与维数.

(4) 若  $G$  为  $V$  的可逆线性变换构成的一个有限群(如同 7.4 节题 3), 则  $\text{Sym}^2(V)$  和  $\text{Alt}^2(V)$  均为  $G$ (中元素公共)的不变子空间, 分别称为对称平方和交错平方子空间. ( $\sigma \in G$  对  $V_1 \otimes V_2$  的作用由下式定义:  $\sigma(v_1 \otimes v_2) = (\sigma v_1) \otimes (\sigma v_2)$ ).

证 (1) 设  $\alpha = \sum x_i e_i$ ,  $\beta = \sum y_j e_j$ , 则

$$\begin{aligned} \theta(\alpha \otimes \beta) &= \theta\left(\sum_i \sum_j x_i y_j e_i \otimes e_j\right) = \sum_{i,j} x_i y_j \theta(e_i \otimes e_j) \\ &= \sum_{i,j} x_i y_j e_j \otimes e_i = \left(\sum_j y_j e_j\right) \otimes \left(\sum_i x_i e_i\right) \\ &= \beta \otimes \alpha. \theta^2(\alpha \otimes \beta) = \theta(\beta \otimes \alpha) = \alpha \otimes \beta, \text{ 故 } \theta^2 = 1. \end{aligned}$$

(2) 注意  $\theta$  是线性空间  $U = V \otimes V$  的线性变换且满足  $\theta^2 = 1$ , 故存在  $U$  的基  $u_1, \dots, u_n$  使得  $\theta$  的方阵表示为

$$S = \begin{bmatrix} I_s & \\ & -I_t \end{bmatrix},$$

这对应着  $U$  的分解

$$V_1 \otimes V_2 = U_1 \oplus U_2.$$

其中  $U_1, U_2$  均为  $\theta$  的不变子空间, 分别由  $u_1, \dots, u_s$  和  $u_{s+1}, \dots, u_{s+t}$  生成, 且  $\theta$  在  $U_1$  和  $U_2$  限制  $\theta_1$  和  $\theta_2$  的方阵表示分别为  $I_s$  和  $-I_t$ , 这说明  $U_1$  的元素  $\alpha$  满足  $\theta(\alpha) = \theta_1(\alpha) = \alpha$ ,  $U_2$  的元素  $\beta$  满足  $\theta(\beta) = -\beta$ . 任意  $\alpha \in U$  可分解为  $\alpha = \alpha_1 + \alpha_2$ ,  $\alpha_i \in U_i$ ,

$$\theta(\alpha) = \theta(\alpha_1 + \alpha_2) = \theta_1 \alpha_1 + \theta_2 \alpha_2 = \alpha_1 - \alpha_2.$$

故  $\theta(\alpha) = \alpha$  当且仅当  $\alpha_2 = 0$ , 即  $\alpha \in U_1$ ;  $\theta(\alpha) = -\alpha$  当且仅当  $\alpha_1 = 0$ , 即  $\alpha \in U_2$ .

(3) 显然  $e_i \otimes e_j + e_j \otimes e_i$  ( $i \leq j$ ) 均属于  $\text{Sym}^2(V)$ , 共  $n(n+1)/2$  个. 而  $e_i \otimes e_j - e_j \otimes e_i$  ( $i < j$ ) 均属于  $\text{Alt}^2(V)$ , 共  $n(n-1)/2$  个. 由于  $n(n+1)/2 + n(n-1)/2 = n^2 = \dim V \otimes V$ , 且上述元素均线性无关, 故它们分别为  $\text{Sym}^2(V)$  和  $\text{Alt}^2(V)$  的基.

(4) 对  $\sigma \in G$ , 显然  $\theta(\sigma(e_i \otimes e_j + e_j \otimes e_i))$

$$\begin{aligned} &= \theta((\sigma e_i) \otimes (\sigma e_j) + (\sigma e_j) \otimes (\sigma e_i)) \\ &= (\sigma e_i) \otimes (\sigma e_j) + (\sigma e_j) \otimes (\sigma e_i), \\ &= \sigma(e_i \otimes e_j + e_j \otimes e_i), \end{aligned}$$

故  $\sigma(e_i \otimes e_j + e_j \otimes e_i)$  仍属于  $\text{Sym}^2(V)$ , 故知  $\text{Sym}^2(V)$  是  $G$  的不变子空间. 同样可知  $\text{Alt}^2(V)$  为  $G$  的不变子空间.

2. 设  $V \otimes V = \text{Sym}^2(V) \oplus \text{Alt}^2(V)$  和  $G$  如上题, 记  $\chi, \chi_+^2$  和  $\chi_-^2$  为  $V, \text{Sym}^2(V)$  和  $\text{Alt}^2(V)$  决定的  $G$  的特征(即对  $\sigma \in G, \chi_+^2(\sigma)$  为  $\sigma$  作为  $\text{Sym}^2(V)$  的变换的方阵的迹). 则对任意  $\sigma \in G$  有

$$\begin{aligned} \chi_+^2(\sigma) &= (\chi(\sigma)^2 + \chi(\sigma^2))/2, \\ \chi_-^2(\sigma) &= (\chi(\sigma)^2 - \chi(\sigma^2))/2, \end{aligned}$$

$$\chi^2 = \chi_+^2 + \chi_-^2.$$

证 对  $\sigma \in G$ , 可取  $V$  的基  $\{e_i\}$  使  $e_i$  均为  $\sigma$  的特征向量 (因为由 7.4 节题 4 知  $\sigma$  的方阵表示可为酉方阵), 设  $\sigma e_i = \lambda_i e_i$ ,  $\lambda_i$  为复数, 则

$$\chi(\sigma) = \sum_{i=1}^n \lambda_i, \quad \chi(\sigma^2) = \sum \lambda_i^2,$$

另一方面, 我们知道  $\text{End}(V_1) \otimes \text{End}(V_2) = \text{End}(V_1 \otimes V_2)$ , 故

$$\begin{aligned} (\sigma \otimes \sigma)(e_i \otimes e_j + e_j \otimes e_i) &= (\sigma e_i) \otimes (\sigma e_j) + (\sigma e_j) \otimes (\sigma e_i) \\ &= (\lambda_i e_i) \otimes (\lambda_j e_j) + (\lambda_j e_j) \otimes (\lambda_i e_i) = \lambda_i \lambda_j (e_i \otimes e_j + e_j \otimes e_i), \end{aligned}$$

$$(\sigma \otimes \sigma)(e_i \otimes e_j - e_j \otimes e_i) = \lambda_i \lambda_j (e_i \otimes e_j - e_j \otimes e_i)$$

这说明  $\text{Sym}^2(V)$  的变换  $\sigma \otimes \sigma$  的方阵表示是对角形, 故

$$\chi_+^2(\sigma) = \text{tr}(\sigma \otimes \sigma) = \sum_{i \leq j} \lambda_i \lambda_j = \sum \lambda_i^2 + \sum_{i < j} \lambda_i \lambda_j = \frac{1}{2} (\sum \lambda_i)^2 + \frac{1}{2} \sum \lambda_i^2,$$

$$\chi_-^2(\sigma) = \sum_{i < j} \lambda_i \lambda_j = \frac{1}{2} (\sum \lambda_i)^2 - \frac{1}{2} \sum \lambda_i^2.$$

3. 设  $G_i$  为复线性空间  $V_i$  的一些自同构组成的群,  $\chi_i$  为  $G_i$  的相应特征 (参见上两题) ( $i=1, 2$ ). 则群直积  $G = G_1 \times G_2 = \{(\sigma_1, \sigma_2) \mid \sigma_1 \in G_1, \sigma_2 \in G_2\}$  可视为  $V_1 \otimes V_2$  的自同构组成的群: 即对  $\sigma_i \in G_i, v_i \in V_i$  定义

$$(\sigma_1, \sigma_2)(v_1 \otimes v_2) = (\sigma_1 v_1) \otimes (\sigma_2 v_2),$$

且  $G$  由此决定的特征  $\chi$  满足

$$\chi(\sigma_1, \sigma_2) = \chi_1(\sigma_1) \cdot \chi_2(\sigma_2).$$

(1) 若  $V_i$  对  $G_i$  不可约 ( $i=1, 2$ ), 则  $V_1 \otimes V_2$  对  $G_1 \times G_2$  不可约.

(2) 设  $V$  为任一线性空间, 以  $G = G_1 \times G_2$  中元素为自同构且对  $G$  不可约, 则必有  $V = V_1 \otimes V_2$  如上述 (对于某线性空间  $V_1, V_2$ ).

证 设  $V_1$  的基为  $\{e_i\}$ ,  $V_2$  的基为  $\{e_j\}$ , 维数分别为  $n$  和  $m$ , 并设  $\sigma_1 \in G_1$  在基  $\{e_i\}$  下的方阵表示为  $A = (a_{ij})$ ,  $\sigma_2 \in G_2$  在基  $\{e_j\}$  下方阵为  $B = (b_{ij})$ . 则  $V_1 \otimes V_2$  以  $\{e_i \otimes e_j\}$  为基,  $(\sigma_1, \sigma_2)$  在此基下方阵表示为  $A \otimes B = (a_{ij} b_{kl})$  (见 11.3 节题 15), 故

$$\chi(\sigma_1, \sigma_2) = \text{tr}(A \otimes B) = \text{tr}(A) \cdot \text{tr}(B) = \chi_1(\sigma_1) \chi_2(\sigma_2).$$

(1) 由 7.4 节题 9 知,

$$\frac{1}{g_1} \sum_{t_1 \in G_1} \chi_1(t_1)^* \chi_1(t_1) = 1, \quad \frac{1}{g_2} \sum_{t_2 \in G_2} \chi_2(t_2)^* \chi_2(t_2) = 1.$$

相乘得

$$\frac{1}{g} \sum_{t_1, t_2} \chi(t_1, t_2)^* \chi(t_1, t_2) = 1.$$

这说明  $V_1 \otimes V_2$  对  $G_1 \times G_2$  不可约 (补充题 12).

(2) 以  $G$  为自同构群的空间  $V$  由相应定义的特征  $\chi$  唯一决定 ( $G$ -同构意义下, 见 10.4 节题 11). 故只需证  $\chi$  可由如下形式定义的特征生成:  $\Psi(\sigma_1, \sigma_2) = \chi_1(\sigma_1) \chi_2(\sigma_2)$  (见 10.4 节题 14). 这又只需证明: 若  $G$  的类函数  $f$  与上述特征  $\Psi$  均正交则  $f=0$  (也见第 14 题). 现设  $G$  的类函数  $f$  满足

$$0 = \langle f, \Psi \rangle = \frac{1}{g} \sum_{t_1, t_2} f(t_1, t_2)^* \chi_1(t_1) \chi_2(t_2) \quad (\text{任意 } \chi_1, \chi_2).$$

固定  $\chi_2$ , 令  $g(t_1) = \sum_{t_2 \in G_2} f(t_1, t_2)^* \chi_2(t_2)$ , 则

$$\langle g, \chi_1^* \rangle = \sum_{t_1 \in G_1} g(t_1) \chi_1(t_1) = 0 \quad (\text{任意 } \chi_1).$$

因为  $g$  为  $G_1$  的类函数, 上述说明  $g=0$ , 同样的讨论适用于  $\chi_2$  和  $f(t_1, t_2)^*$ , 即由

$$0 = g(t_1) = \sum_{t_2} f(t_1, t_2)^* \chi_2(t_2) \text{ 则说明 } f(t_1, t_2) = 0, \text{ 证毕.}$$



## 符号说明

$AL$	交错多线性映射 (11.1)
$\text{Aut}(V, g)$	$(V, g)$ 的自同构群 (10.1)
$\mathcal{A}$	线性变换(6.1); 交错化算子(11.1)
$\mathcal{A}^*$	$\mathcal{A}$ 的伴随变换 (8.1)
$\mathbb{C}$	复数域 (1.1)
$C_n^k$	等于 $n! / (k!(n-k)!)$
$C(f)$	$f(\lambda)$ 的友阵 (7.1)
$C_{\alpha/W}$	向量 $\alpha$ 到 $W$ 的导子 (7.1)
$\deg(f)$	多项式 $f$ 的次数 (1.1)
$\dim(V)$	$V$ 的维数 (5.1)
$\text{End}(V)$	$V$ 上线性变换全体 (6.1)
$E_{ij}$	只在 $(i, j)$ 位上为 1 其余元素为 0 的矩阵
$F$	一个域(本书作为基域)
$\mathbb{F}_p$	$p$ 元有限域 (1.1)
$F^n$	域 $F$ 上 $n$ 维行向量空间 (3.1)
$F^{(n)}$	域 $F$ 上 $n$ 维列向量空间 (3.1)
$F[X]$	域 $F$ 上多项式形式环 (1.1)
$F[\lambda]$	域 $F$ 上多项式形式环(以 $\lambda$ 为不定元) (6.1)
$F(X)$	$F$ 上有理式(形式)域, 有理函数域 (1.1)
$F[[X]]$	$F$ 上形式幂级数环 (1.1)
$F[X_1, \dots, X_n]$	$F$ 上 $n$ 元多项式环 (1.1)
$F[\mathcal{A}]$	线性变换 $\mathcal{A}$ 的多项式全体 (6.1)
$F\alpha_1 + \dots + F\alpha_s$	向量 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 的线性组合全体(以 $F$ 中数为组合系数)
$\text{Hom}(V_1, V_2)$	$V_1$ 到 $V_2$ 的线性映射全体 (6.1)
$J_k(c)$	$k$ 阶若当块 (7.1)
$J(p(\lambda)^k)$	广义若当块 (7.1)
$\ker \varphi$	映射 $\varphi$ 的核 (4.1), (5.1)
$L(V_1, \dots, V_r; W)$	$V_1, \dots, V_r$ 到 $W$ 的多线性映射集 (11.1)
$M_{m \times n}(F)$	$F$ 上 $m \times n$ 矩阵全体(线性空间) (4.1)
$M_n(F)$	$F$ 上 $n$ 阶方阵全体(环, 代数) (4.1)
$m(\lambda)$	极小多项式 (7.1)

$m_\alpha(\lambda)$	$\alpha$ 的最小零化子 (7.1)
$\mathbf{N}$	自然数全体 (1.1)
$\mathbf{Q}$	有理数域 (1.1)
$\mathbf{R}$	实数域 (1.1)
$V$	常表示线性空间 (4.1)
$V^*$	$V$ 的对偶空间 (8.1, 11.1)
$V/W$	$V$ 模 $W$ 的商空间 (5.1)
$\mathbf{Z}$	整数环
$\mathbf{Z}/m\mathbf{Z}$	整数模 $m$ 同余类环 (1.1)
$\delta_{ij}$	Kronecker delta (8.1)
$\delta_j^i$	Kronecker delta (11.1)
$\lambda$	(1) 常数; (2) 不定元
$\lambda$ -矩阵	元素为多项式( $\lambda$ 为不定元)的矩阵
$\sigma_i$	初等对称多项式 (1.1)
$\tau(i_1 \cdots i_n)$	排列 $i_1 \cdots i_n$ 的逆序数
$\Omega$	常表示正交方阵
$\langle \alpha, \beta \rangle$	$\alpha$ 与 $\beta$ 的内积 (8.1, 9.1, 10.1)
$a b$	$a$ 整除 $b$ (1.1)
$\varphi \circ \psi$	映射 $\varphi$ 与 $\psi$ 的复合 (5.1)
$A \times B$	集合 $A$ 与 $B$ 的直积(笛卡尔积)
$V_1 \oplus V_2$	空间 $V_1$ 与 $V_2$ 的直和 (5.1, 11.1)
$V_1 \otimes V_2$	空间 $V_1$ 与 $V_2$ 的张量积 (11.1)
$v_1 \otimes \cdots \otimes v_r$	向量 $v_1, \cdots, v_r$ 的张量积 (11.1)
$T^r(V)$	空间 $V$ 的 $r$ 重张量积 (11.1)
$\Lambda^r(V)$	空间 $V$ 的 $r$ 重外积 (11.1)
$v_1 \wedge \cdots \wedge v_r$	向量 $v_1, \cdots, v_r$ 的外积 (11.1)
$W^\perp$	$W$ 的正交(补)子空间 (8.1, 9.1, 10.1)
$\equiv$	同余于 (1.1, 7.1)
$\sim$	相抵于(4.1), (线性)等价于 (3.1)
$\approx$	相合于 (8.1)
$\cong$	同构于 (5.1)
$A \rightarrow B$	集合 $A$ 映射到 $B$
$a \mapsto b$	元素 $a$ 映射到 $b$
$A \Rightarrow B$	命题 $A$ 蕴含 $B$

[ G e n e r a l   I n f o r m a t i o n ]

书名 = 高等代数解题方法

作者 = 许甫华      张贤科编著

页数 = 4 1 8

S S 号 = 1 0 4 6 3 3 3 3

出版日期 = 2 0 0 1 年 0 9 月第 1 版

封面页	
书名页	
版权页	
前言页	
目录页	
引言	
第 1 章	数与多项式
	1 . 1 定义与定理
	1 . 2 解题方法介绍
	1 . 3 习题与解答
	1 . 4 补充题与解答
第 2 章	行列式
	2 . 1 定义与定理
	2 . 2 解题方法介绍
	2 . 3 习题与解答
	2 . 4 补充题与解答
第 3 章	线性方程组
	3 . 1 定义与定理
	3 . 2 解题方法介绍
	3 . 3 习题与解答
	3 . 4 补充题与解答
第 4 章	矩阵的运算与相抵
	4 . 1 定义与定理
	4 . 2 解题方法介绍
	4 . 3 习题与解答
	4 . 4 补充题与解答
第 5 章	线性 ( 向量 ) 空间
	5 . 1 定义与定理
	5 . 2 解题方法介绍
	5 . 3 习题与解答
	5 . 4 补充题与解答
第 6 章	线性变换
	6 . 1 定义与定理
	6 . 2 解题方法介绍
	6 . 3 习题与解答
	6 . 4 补充题与解答
第 7 章	方阵相似标准形与空间分解
	7 . 1 定义与定理
	7 . 2 解题方法介绍
	7 . 3 习题与解答
	7 . 4 补充题与解答
第 8 章	双线性型、二次型与方阵相合
	8 . 1 定义与定理
	8 . 2 解题方法介绍
	8 . 3 习题与解答
	8 . 4 补充题与解答
第 9 章	欧几里得空间
	9 . 1 定义与定理
	9 . 2 解题方法介绍
	9 . 3 习题与解答
	9 . 4 补充题与解答
第 1 0 章	酉空间
	1 0 . 1 定义与定理
	1 0 . 2 解题方法介绍
	1 0 . 3 习题与解答
	1 0 . 4 补充题与解答
第 1 1 章	张量积与外积
	1 1 . 1 定义与定理
	1 1 . 2 习题与解答
	1 1 . 3 补充题与解答

符号说明  
附录页